

临床医学多选题丛书

妇 产 科 题 解

主 编 苏正身

妇产科分册 巴景阳

主 编 舒槐荫

王德智

辽宁科学技术出版社

一九八四年·沈阳

编者 (依姓氏笔画为序)

王德智	巴景阳	刘丽娴
张忠福	陆景明	舒槐荫

临床医学多选题丛书

妇产科题解

Fuchanke Tijie

主 编 苏正身

妇产科分册
主 编 巴景阳 舒槐荫 王德智

辽宁科学技术出版社出版 (沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行 丹东印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 10 字数: 232,000

1984年12月第1版 1984年12月第1次印刷

责任编辑: 刘 刊 责任校对: 刘文英

封面设计: 吴凤旗

印数: 1—54,000

统一书号: 14288·41 定价: 1.35元

前 言

为了帮助医学院校的学生、教师和医院的医师了解多选题考试方法,熟悉多选题类型,提高分析问题和解决问题的能力,提高教学和医疗质量,编了这套《临床医学多选题丛书》。本书从近年日本医师国家考试题和国内高等医学院校部分内科、外科、妇产科、儿科试题中,编选了两千余个有代表性的试题,并从疾病的病因、病理、诊断、治疗等方面作了扼要而系统的解说。

本书包括内科、外科、妇产科、儿科四个分册。在问题的编排上,参照各科现行的全国通用教材的顺序,对其中符合教学大纲所规定必须掌握的内容,在问题的左边标明*号,以利于医学生查阅。在问题的选择上,以常用的A、B、C、K类型多选题为主。A类试题,又称最佳回答题;B类试题,又称配伍题;C类试题,又称比较选择题;K类试题,又称复合是非题。由于A类和K类试题用途较为广泛,故选收的比例大些。应用试题多用简短病例,有的安排些图表,以衡量临床能力。在问题的解说上,力求反映医学的最新进展,作到理论联系实际,主次分明,重点突出。

目前,国内外出版的多选题试题较多,本书只着重于选编适合医学生、教师和临床医师学习,应用较广,内容较新,具有代表性的试题,以便对衡量教学和医疗质量、选拔培养人材以及开展医学教育研究等方面,发挥一定的参考作用。

在妇产科分册的编写过程中,曾蒙赵文义同志积极支持,在此表示感谢!

编 者

一九八四年二月

目 录

问 题	1
产科疾病 (1~368问)	1
妇科疾病 (369~551问)	82
答 案	122
题 解	126
产科疾病	126
妇科疾病	251

问 题

产 科 疾 病

* 【问题 1】 关于正常骨产道，下述哪项是正确的？

- A 骨盆入口前后径比横径大
- B 中骨盆横径比前后径大
- C 骨盆入口平面是骨盆最宽平面
- D 中骨盆平面是骨盆最窄平面
- E 站立时，骨盆入口平面与地平面平行

* 【问题 2】 子宫峡部相当于：

- A 子宫颈的最狭窄部分
- B 子宫体最狭窄的部分
- C 子宫颈阴道上部
- D 子宫颈阴道部
- E 子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分

【问题 3】 关于生殖器解剖下列哪项是错误的？

- A 阴道粘膜由复层鳞状上皮所覆盖无腺体
- B 子宫颈阴道部亦为鳞状上皮覆盖
- C 宫颈管粘膜为高柱状上皮所覆盖，有腺体
- D 宫颈外口鳞状上皮与柱状上皮交界处为宫颈癌好发部位
- E 子宫峡部粘膜与宫颈粘膜相同

* 【问题 4】 左侧卵巢动脉来自同侧：

- A 髂内动脉
- B 肾动脉
- C 髂外动脉
- D 腹主动脉
- E 腹下动脉

* 【问题5】 子宫动脉来自:

- A 髂外动脉
- B 髂内动脉
- C 腹主动脉
- D 肾动脉
- E 阴道动脉

【问题6】 有关成熟卵泡哪项不正确?

- A 妇女一生中仅有400~500个卵泡发育成熟
- B 成熟卵泡直径10~12毫米
- C 每一月经周期中一般只有一个卵泡成熟
- D 卵泡外膜分泌雌激素
- E 一般在下次月经期前14天排卵

* 【问题7】 子宫颈粘液受激素影响发生周期变化中哪项错误?

- A 雌激素使粘液分泌量增加
- B 孕激素使粘液分泌量减少
- C 雌激素使粘液变为粘稠

D 孕激素使粘液涂片出现椭圆小体

E 雌激素使粘液涂片出现羊齿状结晶

* 【问题8】 雌、孕激素对阴道粘膜上皮的周期性变化中哪项错误?

- A 在孕激素影响下底层细胞增生
- B 雌激素使细胞内富有糖原
- C 雌激素使阴道上皮厚度增加
- D 孕激素使阴道上皮角化前细胞脱落
- E 雌激素使表层细胞角化

* 【问题9】 子宫内膜腺体出现含糖原的空泡,相当于:

- A 子宫内膜增生早期
- B 子宫内膜增生晚期
- C 子宫内膜分泌早期
- D 子宫内膜分泌晚期
- E 子宫内膜月经前期

* 【问题10】 典型子宫颈粘液结晶变化主要是由哪

种激素影响的?

- A 孕激素
- B 雌激素
- C 促卵泡素
- D 绒毛膜促性腺素
- E 促黄体生成素

* 【问题11】 促性腺激素分泌最多见于:

- A 新生儿阶段
- B 哺乳期
- C 月经来潮前期
- D 更年期
- E 绝经期

* 【问题12】 关于月经调节机制哪项错误?

- A 持续中枢分泌促性腺激素释放激素使垂体分泌促卵泡素增多
- B 促卵泡素增多可使卵泡发育成熟
- C 卵泡成熟时出现雌激素高峰
- D 雌激素高峰对周期中枢为正反馈
- E 周期中枢分泌促性腺激素释放激素使促卵泡素增多, 促使卵泡

发育

* 【问题13】 不能判断卵巢有无排卵的是:

- A 基础体温测定
- B 子宫颈粘液检查
- C 测定尿中孕二醇
- D 测定尿中促卵泡素
- E 阴道脱落细胞检查

* 【问题14】 关于妊娠生理哪项正确?

- A 卵子从卵巢排出后, 受精能力可保持3天
- B 卵子受精的地点是在输卵管伞部
- C 桑葚胚比孕卵体积大
- D 囊状胚只能着床于子宫体部内膜
- E 孕10周时胚胎已进入胎儿阶段

【问题15】 关于蜕膜哪项是正确的?

- A 卵子受精后子宫内膜发生蜕膜变
- B 孕卵与子宫蜕膜结合称为着床
- C 与极滋养层接触的蜕膜称真蜕膜

D 真蜕膜将发展为胎盘的母体部分

E 包蜕膜与真蜕膜逐渐融合而无法分离

* 【问题16】 正常妊娠时孕妇血清或尿中绒毛膜促性腺激素的高峰出现于：

A 妊娠 6 ~ 8 周

B 妊娠 8 ~ 10 周

C 妊娠 12 ~ 14 周

D 妊娠 14 ~ 16 周

E 妊娠 16 ~ 18 周

* 【问题17】 正常脐带内的血管是：

A 一条动脉一条静脉

B 一条动脉二条静脉

C 一条静脉二条动脉

D 二条动脉二条静脉

E 只有两条静脉

* 【问题18】 关于羊水哪项错误？

A 孕足月时略显混浊，不透明

B 偏碱性

C 是一种透析液

D 母体与羊水间的交换主要由羊膜完成

E 羊水与胎儿间的交换主要通过消化道，与呼吸道无关

* 【问题19】 首次产前检查应在何孕周为宜？

A 确定妊娠时开始

B 妊娠 16 周

C 妊娠 20 周

D 妊娠 24 周

E 妊娠 28 周以后

* 【问题20】 关于胎动哪项错误？

A 初感胎动的时间为妊娠 18 ~ 20 周

B 正常胎动每小时 3 ~ 5 次

C 12 小时胎动计数小于 10 次者，提示胎儿在子宫内缺氧

D 胎动增多，一般提示胎儿有较好的储备力

E 胎盘功能显著减退时，胎心先消失，然后胎动消失

* 【问题21】 临产的主要标志是：

A 自觉腰酸

- B 阴道见红
- C 胎膜自然破裂
- D 胎头衔接
- E 规律性子宫收缩

* 【问题22】 对临产前后的生理变化，哪项认识是错误的？

- A 子宫对催产素的敏感性于临近分娩时最高
- B 阴道见红是由于绒毛膜血管破裂所致
- C 产程的长短主要取决于宫颈扩张期
- D 圆韧带收缩有助于胎先露下降
- E 正常分娩时也可出现缩复环

* 【问题23】 子宫收缩最强的部位是：

- A 子宫角部
- B 子宫底部
- C 子宫体部
- D 子宫下段
- E 子宫颈部

* 【问题24】 关于临产后宫缩的特点，下列哪一项叙述是错误的？

- A 有节律性的阵发性收缩，由弱到强
- B 自子宫两角开始，先向宫底中部集中，再向下扩展
- C 宫底部最强，下段最弱
- D 体部肌纤维收缩变短变宽，松弛时恢复原状
- E 宫缩高峰时子宫体变硬

* 【问题25】 临产后使子宫颈口扩张的主要机制是：

- A 雌三醇增多使宫颈伸展性增强
- B 子宫收缩向上牵引宫颈
- C 羊水囊的扩张作用
- D 胎先露直接压迫宫颈
- E 圆韧带的收缩作用

* 【问题26】 正常分娩胎头入盆时是以哪一径线衔接？

- A 枕下前凶径
- B 枕额径
- C 枕颏径

D 双顶径

E 双颞径

* 【问题27】 关于正常分娩哪项是错误的？

A 初产妇胎头衔接比经产妇早

B 经产妇子宫颈消失和子宫颈口扩张同时进行

C 枕先露中以枕左前位最多见

D 胎头下降的动作是间断进行的

E 宫缩强度是判断产程进展的重要指标

* 【问题28】 正常分娩胎头完成俯屈后，下述哪条径线与骨盆最大径线一致？

A 枕下前囟径

B 枕额径

C 枕颞径

D 双顶径

E 双颞径

* 【问题29】 已婚妇女30岁，停经48天，阴道点滴流血8天，伴轻微腹痛，应首先考虑：

A 先兆流产

B 功能性子宫出血

C 过期流产

D 输卵管妊娠

E 难免流产

* 【问题30】 孕8~12周易发生不全流产的主要原因是：

A 雌激素分泌不足

B 孕激素分泌不足

C 绒毛膜促性腺激素分泌减少

D 绒毛发育不良

E 绒毛发育繁盛

* 【问题31】 晚期习惯性流产最常见的原因是：

A 黄体功能不全

B 甲状腺功能低下

C 先天性子宫发育异常

D 子宫肌瘤

E 子宫颈内口松弛

* 【问题32】 关于输卵管妊娠的诊断哪项是错误的？

A 无停经史者不能否定输卵管妊娠

B 后穹窿穿刺阴性时，可排除输卵管妊娠

C 诊断刮宫子宫内膜有
A—S反应者，不能
确诊输卵管妊娠

D 尿妊娠试验阴性者不
能排除输卵管妊娠

E 只有腹痛而无阴道流
血者，提示胚胎继续
存活

* 【问题33】 输卵管妊娠胚
胎死亡的可靠根据是：

A 阴道少量流血

B 排出蜕膜管型

C 尿妊娠试验阴性

D 早孕反应消失

E 出现腹痛

* 【问题34】 输卵管妊娠与
人流后子宫颈管粘连的主
要鉴别点是：

A 有停经史

B 严重下腹痛

C 直肠下坠感

D 下腹部出现反跳痛

E 移动浊音阳性

* 【问题35】 关于妊娠中毒
症哪项是正确的？

A 妊娠中毒症均发生于
孕24周以后

B 轻度妊娠中毒症不能
直接发展为重度妊娠
中毒症

C 有贫血者不易并发妊
娠中毒症性心脏病

D 有的子痫患者可以只
有昏迷而无抽搐

E 重度妊娠中毒症时，
血压常超过200/120
毫米汞柱

* 【问题36】 先兆子痫和中
度妊娠中毒症的主要区别
是：

A 血压高度

B 尿蛋白多少

C 眼底有无小动脉痉挛

D 尿中有无管型和红白
细胞

E 有无头痛

* 【问题37】 孕30周均正常，
自孕31周出现浮肿、孕35
周出现头痛，检查发现血
压160/100毫米汞柱，浮
肿(+++)，尿蛋白(++)，
未见红、白细胞及管型，
眼底检查小动脉与小静脉
管径比例为1：2，视网

膜水肿,应考虑的诊断是:

- A 中度妊娠中毒症
- B 妊娠合并慢性肾炎
- C 原发性高血压合并妊娠
- D 先兆子痫
- E 不能确定诊断

* 【问题38】 妊娠中毒症时应用硫酸镁最早出现的中毒反应是:

- A 呼吸减慢
- B 心率减慢
- C 尿量减少
- D 腱反射迟钝或消失
- E 腱反射亢进

* 【问题39】 30岁妇女,第一胎,妊娠34周,有原发性高血压史,合并妊娠中毒症。3小时前突然腹痛,阴道流血,色鲜红,如月经量。体检:血压70/40毫米汞柱,脉搏110次/分,宫底在剑突下二指,子宫硬,肌壁松弛不完全,胎位不清,胎心音消失。肛查:颈管未消失,宫口未

开。最恰当的处理是:

- A 立即扩张宫口,破膜,催产素静脉滴注引产
- B 立即人工破膜,等待自然分娩
- C 以抢救休克为主,因死胎不急于引产
- D 抢救休克,尽快剖腹产终止妊娠
- E 人工破膜加催产素静脉滴注引产

* 【问题40】 关于过期妊娠哪项正确?

- A 超过预产期两周以上尚未临产者均为过期妊娠
- B 过度成熟胎儿神经系统对缺氧耐受性强于成熟儿
- C 妊娠过期后羊水量增加速度减慢
- D 妊娠过期愈久胎儿体重越大
- E 胎头在分娩过程中不易变形

【问题41】 羊水过多与哪

类胎儿畸形无关?

- A 无脑儿
- B 脊柱裂
- C 食道闭锁
- D 胃肠道阻塞
- E 锁肛

* 【问题42】 关于死胎哪项是错误的?

- A 胎儿娩出时, 无心跳、呼吸等生命征象者, 一律诊断为死胎
- B 胎儿死亡以后, 大多数在两周内自然分娩
- C 如超过四周仍未分娩, 则有可能发生DIC
- D 胎儿死亡后羊水中甲胎蛋白显示高值
- E 24小时尿中雌三醇值低于3毫克者常提示胎儿死亡

* 【问题43】 妊娠合并心脏病易发生心衰的时期是:

- A 妊娠24~28周
- B 妊娠28~32周

C 妊娠32~36周

D 妊娠36周~临产

E 临产~胎儿娩出后

* 【问题44】 妊娠合并心脏病时, 诊断早期心衰的可靠依据是:

- A 踝部出现凹陷性水肿
- B 心脏浊音界轻微扩大
- C 心尖部闻及二级收缩期杂音
- D 休息时心率超过110次/分
- E 肺底偶闻啰音, 深呼吸后消失

* 【问题45】 心脏病产妇第三产程预防产后出血的最佳措施是:

- A 排空膀胱
- B 按摩子宫
- C 肌注催产素
- D 肌注麦角新碱
- E 静注西地兰

* 【问题46】 急性病毒性肝炎之治疗原则下列哪项错误?

- A 早期妊娠并发病毒性肝炎时, 应在治疗期



行人工流产

- B 中期妊娠并发病毒性肝炎时，不宜终止妊娠
- C 继续妊娠时，应注意防治妊娠中毒症
- D 临产后应避免第二产程延长，积极防治产后出血
- E 产后用四环素预防感染

* 【问题47】 妊娠合并重型病毒性肝炎时，服用广谱抗菌素的主要目的是：

- A 控制肝炎发展
- B 消除体内感染灶
- C 预防感染
- D 预防DIC
- E 预防肝昏迷

* 【问题48】 下述情况出现宫缩乏力时，可用催产素的是：

- A 头盆倾度不均
- B 持续性枕后位
- C 子宫不协调性收缩
- D 宫颈水肿
- E 单纯臀位

* 【问题49】 临产后处理不协调性子宫收缩时，首选的措施是：

- A 肌肉注射杜冷丁
- B 温肥皂水灌肠
- C 人工破膜
- D 静脉滴注催产素
- E 静脉补充能量

* 【问题50】 哪类狭窄骨盆可见坐骨结节间径增宽？

- A 单纯性扁平骨盆
- B 横径狭窄骨盆
- C 漏斗骨盆
- D 佝偻病性扁平骨盆
- E 骨软化症骨盆

* 【问题51】 某孕妇骨盆外测量时，髂前上棘间径27厘米，髂嵴间径27厘米，粗隆间径30厘米，骶耻外径17厘米，坐骨结节间径11厘米，其诊断应考虑：

- A 均小骨盆
- B 横径狭窄骨盆
- C 漏斗型骨盆
- D 单纯性扁平骨盆
- E 佝偻病性扁平骨盆

* 【问题52】 某孕妇做阴道

检查时，骶耻外径 >12 厘米，骶骨凹度呈中弧，两坐骨棘内突、骶棘韧带 <2 指，尾骨活动性良好，耻骨弓角度为 75° ，其诊断应考虑：

- A 偏斜骨盆
- B 单纯扁平骨盆
- C 佝偻病扁平骨盆
- D 漏斗型骨盆
- E 均小骨盆

* 【问题53】 具备下列哪项情况，分娩时方可“试产”？

- A 头位，骨盆入口轻度狭窄
- B 头位，中骨盆狭窄
- C 头位，骨盆出口狭窄
- D 臀位，骨盆入口轻度狭窄
- E 臀位，骨盆出口轻度狭窄

* 【问题54】 孕足月初产，宫口开全2小时，持续性枕后位，双顶径棘下1厘米，胎心正常，恰当的分娩方式是：

- A 等待自然分娩
- B 胎头吸引器助产
- C 以手转正胎头产钳助产
- D 剖腹产
- E 催产素滴流

* 【问题55】 试验分娩常用于下述哪类狭窄骨盆？

- A 漏斗骨盆
- B 横径狭窄骨盆
- C 骨软化症骨盆
- D 偏斜骨盆
- E 单纯性扁平骨盆

* 【问题56】 属于胎势异常的是：

- A 枕先露
- B 混合臀位
- C 斜位
- D 横位
- E 面先露

* 【问题57】 妊娠期发现臀位的，何时矫正为宜？

- A 妊娠24周以前
- B 妊娠24周至28周
- C 妊娠28周至32周
- D 妊娠32周至36周
- E 妊娠36周以后

- * 【问题58】 孕足月初产，臀位，宫底32厘米，阴道检查：宫口开大4厘米，胎膜已破，足先露，对角径11厘米，恰当的处理方式是：
- A 外倒转术
 - B 等待自然分娩
 - C 臀位助娩术
 - D 臀位牵引术
 - E 剖腹产术
- * 【问题59】 哪项不是横位的常见并发症？
- A 原发性宫缩乏力
 - B 胎膜早破
 - C 脐带脱垂
 - D 子宫狭窄环
 - E 子宫破裂
- * 【问题60】 妊娠足月，初产忽略性横位，手脱垂，胎心率140/分，宫口开全，破水24小时，下腹脐耻之间出现一凹陷，最佳处理方法是：
- A 立即给镇静剂
 - B 抗休克治疗
 - C 乙醚麻醉，行内倒转术
 - D 立即剖腹产
 - E 立即将手消毒送回阴道内
- * 【问题61】 孕足月初产横位，胎膜已破，宫口开大5厘米，胎心正常，最佳处理是：
- A 内倒转术
 - B 外倒转术
 - C 等待自然分娩
 - D 催产素引产
 - E 以上四个都不是
- * 【问题62】 临产后诊断脑积水的可靠根据是：
- A 胎心听诊部位高于脐部
 - B 胎头浮动不入盆，跨耻征阳性
 - C 破膜后，前羊水量过多
 - D 触诊胎头有乒乓球感
 - E 触诊胎头囟门及颅缝明显增宽
- * 【问题63】 关于软产道损伤哪项是错误的？
- A 胎儿娩出后立即多量

出血，血色鲜红，提示宫颈裂伤

B 宫颈裂伤多发生在相当时钟的3点及9点处

C 分娩期子宫破裂多见于子宫下段

D 子宫下段剖腹产术后的疤痕子宫破裂，常为不全破裂

E 严重的二度会阴裂伤可有肛门括约肌部分撕裂

* 【问题64】 易引起子宫破裂的胎位是：

A 单臀位

B 枕横位

C 颏前位

D 横位

E 枕后位

* 【问题65】 关于子宫破裂哪项错误？

A 多发生于经产妇

B 常见的原因是胎儿先露部下降受阻

C 子宫如无疤痕，破裂均发生于第二产程

D 破裂前有时无病理缩复环

E 子宫下段剖腹产后的疤痕子宫破裂，常为不完全破裂

* 【问题66】 产后出血最常见的原因是：

A 胎盘残留

B 胎盘部分剥离

C 子宫颈裂伤

D 子宫收缩乏力（子宫弛缓出血）

E 凝血机制障碍

* 【问题67】 与产后出血无关的是：

A 前置胎盘

B 重度妊娠中毒症

C 羊水过多症

D 过期妊娠

E 早产

* 【问题68】 胎儿娩出后4分钟，产妇开始出现多量活动性阴道流血，最可能是：

A 宫颈裂伤

B 凝血功能障碍

C 阴道静脉破裂