

李文瑞主编

金匱要略
附方

中国科学技术出版社

金匱要略 汤证论治

李文瑞 主编

李文瑞 李迟 李钱 编著

127713



A0281898

中国科学技术出版社

1993年3月

内 容 提 要

“惟仲景一部，最为众方之祖”；“众诀之宗，群方之祖”。作者参考了古今中外方书八十余部，以及 1949 年以降，全国各地中医杂志有关《金匱要略》诸方之文献，并结合临证实践，将《金匱要略》二百余方，逐一论述，编著而成本书。

本书论述之方剂，深入浅出，能广泛应用于临证各科，可谓中医临证治疗方法灵活多样之必备者。

本书体例：原文、方组、临证参考用量、功效、主治（主症、副症）、方论、转机、注意事项、禁忌、腹证、类方鉴别、应用范围、临证加减法、衍方、文献参考、治验案例等。

本书供临证中医师、研究方剂学者之阅读和参考。

金匱要略 汤证论治

主编：李文瑞

责任编辑：邓鼎年 刘秋生

封面设计：刘秋生

中国科学技术出版社出版（北京海淀区白石桥路 32 号）

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京新华印刷厂印刷

*

开本：787×1092 毫米 1/16 印张：53.5 插页 12 字数：1200 千字

1993 年 3 月第一版 1993 年 3 月第一次印刷

印数：2500 册 定价：80.00 元

ISBN 7-5046-0445-3 / R · 101

登记证号：（京）175 号

序

李文瑞教授曾著《伤寒论汤证论治》一书，彼时吾尝为序，至今已二载余矣。现《金匱要略汤证论治》又将付梓，实姊妹之作也。观之洋洋，自当欣然而乐为之再序哉！

众所周知，长沙太守张仲景“勤求古训，博采众方”，为《伤寒杂病论》合十六卷。后历经战火纷乱，《伤寒论》虽得以传世，而杂病却未见其书。幸喜翰林学士王洙于蠹简中得《金匱玉函要略方》三卷，经孙奇、林亿等人校理，方使《金匱方论》得以传世。

治伤寒之学，历代人才辈出，相比之下，研金匱者则较为稀少。金匱一书，为理论与临证紧密相连之经典著，赵本之序有云：“要略之方，果足用乎？曰：天地气化无穷，人身之病，亦变化无穷。仲景之书，载道者也。医之良者，引例推类，可谓无穷之应用。借令略有加减修合，维难踰越矩度。”由此可知，金匱之学大有益于苍生矣。

文瑞教授厚积薄发，于临证之余，精研金匱，读书心得与平日诊病经验结合，再汇《论治》。

本书体例与《伤寒论汤证论治》大致相同，仍以方类证，面向临证，实为临证医者熟练运用经方之指南。

愿将《论治》再荐同仁，以开思路，是以序焉。

中华人民共和国卫生部副部长 胡熙明

一九九一年五月十日

金匱要略方论序

张仲景为《伤寒杂病论》合十六卷，今世但传《伤寒论》十卷，杂病未见其书，或于诸家方中载其一二矣。翰林学士王洙在馆阁日，于蠹简中得仲景《金匱玉函要略方》三卷：上则辨伤寒，中则论杂病，下则载其方，并疗妇人，乃录而传之士流，才数家耳。尝以对方证对者，施之于人，其效若神。然而或有证而无方，或有方而无证，救疾治病其有未备。国家诏儒臣校正医书，臣奇先校定《伤寒论》，次校定《金匱玉函经》，今又校成此书，仍以逐方次于证候之下，使仓卒之际，便于检用也。又采散在诸家之方，附于逐篇之末，以广其法。以其伤寒文多节略，故断自杂病以下，终于饮食禁忌，凡二十五篇，除重复合二百六十二方，勒成上、中、下三卷，依旧名曰：《金匱方论》。臣奇尝读《魏志·华佗传》云：出书一卷曰“此书可以活人”。每观华佗凡所疗病，多尚奇怪，不合圣人之经。臣奇谓活人者，必仲景之书也。大哉！炎农圣法，属我盛旦，恭惟主上，丕承大统，抚育元元，颁行方书，拯济疾苦，使和气盈溢，而万物莫不尽和矣。

太子右赞善大夫臣高保衡、尚书都官员外郎臣孙奇、尚书司封郎中充秘阁校理臣林亿等传上。

前　　言

《金匱要略》为东汉时期张仲景所著，是我国现存最早研究临证各科之证治专书。因为它有很高的临证实用价值，对祖国医学的发展起了巨大的推动作用，故被誉为中医四大经典著作之一。

《金匱要略》所载诸方，紧扣病机，法度严谨，用药精当，化裁灵活，疗效卓著，历代医家赞颂为医方之祖。梁·陶弘景《名医别录》序中曰：“惟仲景一部，最为众方之祖”；清·喻昌《尚论篇》序亦说仲景书为“众诀之宗，群方之祖”。

《金匱要略》诸方之汗、吐、下、和、温、清、消、补八法兼备；在剂型上有汤、丸、散、药酒等内服之剂，又有坐药、薰剂、洗剂等外治法，可谓丰富多彩，各尽其功；另外还有急救、禁食等杂疗方。

自古以来，对《金匱要略》注释甚多，以百部计之，但专门论方者尚少。因此，我们拟通过该书中之条文，病因病机与方药相为融通，互为印证，并结合现代有关文献，以及我们临证实践，逐一论述每张汤头，以供读者临证之需要。

本书拟以“原文”、“方组”、“临证参考用量”、“功效”、“主治”、“方论”、“转机”、“注意事项”、“禁忌”、“腹证”、“类方鉴别”、“应用范围”、“临证加减法”、“衍方”、“文献参考”、“治疗案例”等项，论述每张汤头。力求突出临证，应用于实践；内容全面，融通古今，详而不繁；开阔读者思路，了解古今中外医家对《金匱要略》诸方之正确应用，掌握各方之精髓，释疑解惑，藉以提高中医理论，指导临证实际。

本书与《伤寒论汤证论治》为姊妹作。我们自1985年春上即着手策划编著事宜，利用一切可以利用的时间，搜集资料，制作读书卡片和文献摘要。原拟将《伤寒论》、《金匱要略》诸方合编为《经方论治》，后经朋友和出版社建议，如将二书诸方合而编著，篇幅过大，宜分不宜合。我们欣然接受了，于1989年2月《伤寒论汤证论治》问世了。按原订计划，本书应于1989年冬出版。当时，因笔者忙于编译《日本汉方腹诊选编》而将本书撰稿工作搁置，延及今日方付梓。

我们不揣肤浅，编著本书，供中医师临证和研究方剂学者阅读参考。错误疏漏之处，请广大读者是正。

教授

北京医院 中医科 主任医师

李文瑞

1990年4月30日

体例说明

本书将《金匱要略方论》二百余方逐一论述。每张方剂按下列体例分述：

1. 原文：该方之原文或节录。
 2. 方组：原书之药味组成、分量、煎制方法、服法等。
 3. 临证参考用量：将原书之分量换算为法定计量单位“克”和临证经验用量。
 4. 功效：功用和效能。
 5. 主治：以脉证为主，并分主症和副症。
 主症：必见之适应症状；
 副症：或见症状(或然症)。
 6. 方论：分析和论证该方证之病因病机、各种证候之病理机制、药味作用和药味配伍关系、选引古今医家之论述、总括和评价，最后以“表解”形式小结该方病因病机、治则、主要脉证和配伍，以示一目了然。
 7. 转机、注意事项、禁忌：预示服该方后可能出现之病理转机和处置；服法、用量之斟酌，服药前后应注意事项；何种疾病和证应该禁忌等。
 8. 腹证：描述胸腹出现之体征，有者并绘图说明。
 9. 类方鉴别：与之相类似方剂之病因病机、主要脉证、治则、药味之相同或不相同和用量差别等。
 10. 应用范围：引述古今医家和现代临证对该方应用于何种疾病或证。
 11. 临证加减法：按辨证论治、理法方药原则，对该方之病证之局部变化，随机加减化裁用药以及药味分量之增减。
 12. 衍方：由该方衍生之古方和后世方。
 13. 文献参考：引用有关文献对该方之配伍、药理、药性、方论和临证应用经验等。
 14. 治验：精选有关古今方书和现代文献对该方之应用成功和失败或中毒等之典型案例。
- 注：引用之文献和方剂，均注有出处。其中加引号者为全文引用或段落引用；未加引号者，有删节或重新编辑。

目录

序

金匱要略方论序

前言

体例说明

痉湿喝病脉证治方

瓜蒌桂枝汤	(1)
葛根汤	(4)
大承气汤	(10)
麻黄加术汤	(20)
麻黄杏仁薏苡甘草汤	(25)
防己黄芪汤	(28)
桂枝附子汤	(33)
白术附子汤	(36)
甘草附子汤	(39)
白虎加人参汤	(43)
一物瓜蒂汤	(48)

百合狐惑阴阳毒病脉证治方

百合知母汤	(51)
滑石代赭汤	(54)
百合鸡子黄汤	(55)
百合地黄汤	(57)
百合洗方	(61)
瓜蒌牡蛎散	(63)
百合滑石散	(65)
甘草泻心汤	(66)
苦参汤	(71)
雄黄熏方	(75)
赤小豆当归散	(77)
升麻鳖甲汤	(81)

疟病脉证治方

鳖甲煎丸	(87)
白虎加桂枝汤	(91)
蜀漆散	(95)

附方

牡蛎汤	(98)
柴胡去半夏加瓜蒌根汤	(99)
柴胡桂姜汤	(101)

中风历节病脉证治方

侯氏黑散	(107)
风引汤	(112)
防己地黄汤	(117)
头风摩散	(120)
桂枝芍药知母汤	(121)
乌头汤	(128)
矾石汤	(132)

附方

《古今录验》续命汤	(135)
《千金》三黄汤	(138)
《近效方》术附汤	(140)
崔氏八味丸	(142)
《千金方》越婢加术汤	(143)

血痹虚劳病脉证治方

黄芪桂枝五物汤	(145)
桂枝加龙骨牡蛎汤	(149)

天雄散方	(155)
小建中汤	(157)
黄芪建中汤	(164)
肾气丸	(168)
薯蓣丸	(176)
酸枣仁汤	(180)
大黄䗪虫丸	(185)

附方

《千金翼》炙甘草汤	(190)
《肘后》獭肝散	(197)

肺痿肺痛咳嗽上气病脉证治方

甘草干姜汤	(200)
射干麻黄汤	(205)
皂荚丸	(210)
厚朴麻黄汤	(213)
泽漆汤	(216)
麦门冬汤	(219)
葶苈大枣泻肺汤	(224)
桔梗汤	(229)
越婢加半夏汤	(234)
小青龙加石膏汤	(237)

附方

《外台》炙甘草汤	(241)
《千金》甘草汤	(242)
《千金》生姜甘草汤	(244)
《千金》桂枝去芍药加皂荚汤	(246)
《外台》桔梗白散	(247)
《千金》苇茎汤	(252)

奔豚气病脉证治方

奔豚汤	(258)
桂枝加桂汤	(261)
茯苓桂枝甘草大枣汤	(266)

胸痹心痛短气病脉证治方

瓜蒌薤白白酒汤	(271)
瓜蒌薤白半夏汤	(276)
枳实薤白桂枝汤	(279)
人参汤	(282)
茯苓杏仁甘草汤	(289)
橘枳姜汤	(291)
薏苡附子散	(293)
桂枝生姜枳实汤	(296)
乌头赤石脂丸	(299)

附方

九痛丸	(302)
-----	-------

腹满寒疝宿食病脉证治方

厚朴七物汤	(305)
附子粳米汤	(309)
厚朴三物汤	(312)
大柴胡汤	(316)
大建中汤	(323)
大黄附子汤	(328)
赤丸	(333)
乌头煎	(336)
当归生姜羊肉汤	(339)
乌头桂枝汤	(343)

附方

《外台》乌头汤	(348)
《外台》柴胡桂枝汤	(349)
《外台》走马汤	(354)
瓜蒂散	(356)

五脏风寒积聚病脉证治方

旋覆花汤	(362)
麻子仁丸	(366)
甘草干姜茯苓白术汤	(371)

痰饮咳嗽病脉证治方	
苓桂术甘汤	(377)
甘遂半夏汤	(384)
十枣汤	(390)
大青龙汤	(398)
小青龙汤	(404)
木防己汤	(410)
木防己去石膏加茯苓芒硝汤	(414)
泽泻汤	(417)
厚朴大黄汤	(420)
小半夏汤	(422)
己椒苈黄丸	(425)
小半夏加茯苓汤	(429)
五苓散	(432)
桂苓五味甘草汤	(440)
苓甘五味姜辛汤	(443)
桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤	(446)
苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤	(448)
苓甘五味加姜辛半杏大黄汤	(450)
附方	
《外台》茯苓饮	(452)
消渴小便利淋病脉证治方	
文蛤散	(455)
瓜蒌瞿麦丸	(456)
蒲灰散	(459)
滑石白鱼散	(461)
茯苓戎盐汤	(462)
猪苓汤	(464)
水气病脉证治方	
越婢汤	(470)
防己茯苓汤	(474)
甘草麻黄汤	(476)
麻黄附子汤	(479)
黄芪芍桂苦酒汤	(481)
桂枝加黄芪汤	(484)
桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤	(488)
枳术汤	(492)
黄疸病脉证治方	
茵陈蒿汤	(496)
硝石矾石散	(503)
栀子大黄汤	(506)
猪膏发煎	(508)
茵陈五苓散	(511)
大黄硝石汤	(514)
附方	
《千金》麻黄醇酒汤	(517)
惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治方	
桂枝救逆汤	(519)
半夏麻黄丸	(522)
柏叶汤	(526)
黄土汤	(529)
泻心汤	(534)
呕吐哕下利病脉证治方	
吴茱萸汤	(542)
半夏泻心汤	(547)
黄芩加半夏生姜汤	(553)
猪苓散	(556)
四逆汤	(558)
小柴胡汤	(566)
大半夏汤	(578)
大黄甘草汤	(581)
茯苓泽泻汤	(584)
文蛤汤	(588)
半夏干姜散	(590)
生姜半夏汤	(592)
橘皮汤	(595)
橘皮竹茹汤	(598)

桂枝汤	(601)
小承气汤	(613)
桃花汤	(618)
白头翁汤	(623)
梔子豉汤	(627)
通脉四逆汤	(633)
紫参汤	(637)
诃梨勒散	(638)

附方

《外台》黄芩汤	(640)
---------	-------

疮痈肠痈浸淫病脉证治方

薏苡附子败酱散	(643)
大黄牡丹皮汤	(647)
王不留行散	(654)
排脓散	(656)
排脓汤	(658)
黄连粉	(661)

跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝虫病脉证治方

藜芦甘草汤	(665)
鸡屎白散	(666)
蜘蛛散	(668)
甘草粉蜜汤	(671)
乌梅丸	(675)

妇人妊娠病脉证治方

桂枝茯苓丸	(683)
附子汤	(692)
芎归胶艾汤	(697)
当归芍药散	(703)
干姜人参半夏丸	(713)
当归贝母苦参丸	(716)
葵子茯苓散	(719)
当归散	(722)
白术散	(725)

妇人产后病脉证治方

枳实芍药散	(729)
下瘀血汤	(731)
阳旦汤	(736)
竹叶汤	(736)
竹皮大丸	(740)
白头翁加甘草阿胶汤	(742)

附方

《千金》三物黄芩汤	(744)
《千金》内补当归建中汤	(747)

妇人杂病脉证治方

半夏厚朴汤	(750)
甘麦大枣汤	(754)
温经汤	(758)
土瓜根散	(764)
胶姜汤	(766)
大黄甘遂汤	(768)
抵当汤	(771)
矾石丸	(777)
红蓝花酒	(779)
蛇床子散	(781)
狼牙汤	(783)
小儿疳虫蚀齿方	(785)

杂疗方

四时加减柴胡饮子	(786)
长服诃梨勒丸	(787)
三物备急丸	(787)
紫石寒食散	(789)
救卒死方(共五方)	(789)
救卒死而壮热者方	(791)
救卒死而目闭者方	(791)
救卒死而张口反折者方	(791)
救卒死而四肢不收失便者方	(792)

救小儿卒死而吐利不知是何病方	(792)	治食鱼后食毒两种烦乱方	(810)
治尸厥方(共二方)	(792)	治食鯙鯢鱼中毒方	(810)
救卒死客忤方(共二方)	(793)	治食蟹中毒方(共二方)	(811)
救自缢死方	(794)		
疗中渴方	(794)	果实菜谷禁忌治方	
救溺死方	(795)	治食诸果中毒方	(814)
治马坠及一切筋骨损方	(795)	治食诸菌中毒闷乱欲死方	(814)
禽兽鱼虫禁忌治方		治食枫柱菌而哭不止方	(815)
治自死六畜肉中毒方	(798)	治误食野芋中毒欲死方	(815)
治食郁肉漏脯中毒方	(798)	治误食蜀椒闭口者方	(815)
治黍米中藏干脯，食之中毒方	(799)	食躁或躁方	(819)
治食生肉中毒方	(799)	治误食钩吻杀人解之方	(819)
治六畜乌兽肝中毒方	(800)	治误食水莨菪中毒方	(819)
治马肝毒中人未死方(共二方)	(801)	治食芹菜中龙精毒方	(819)
治食马肉中毒欲死方(共二方)	(802)	治食苦瓠中毒方	(820)
治噉蛇牛肉食之欲死方(共三方)	(803)	治凡饮食中毒方(共二方)	(822)
治食牛肉中毒方	(803)	贪食食多不消心腹坚满治之方	(823)
治食犬肉不消成病方	(805)	通除诸毒药	(824)
治食鸟兽中箭肉毒方	(807)		
治食鲙不化成癥病方(共二方)	(809)	主要参考文献	(825)
		方剂索引	(828)

——痉湿喝病脉证治方

瓜蒌桂枝汤

【原文节录】 太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟，此为痉，瓜蒌桂枝汤主之。

【方组】 瓜蒌根二两 桂枝三两(去皮) 白芍三两 甘草二两(炙) 生姜三两(切) 大枣十二枚(擘)。

上六味，以水九升，煮取三升，分温三服，微取汗。汗不出，食顷，啜热粥发之。

【临证参考用量】 瓜蒌根 15 克 桂枝 9 克 白芍 9 克 生姜 9 克 大枣 4 枚 甘草 6 克。

上 6 味，以水 900 毫升，煮取 300 毫升，分温三服，微取汗，不汗者，食热粥。

【功效】 解肌祛邪，舒缓筋脉。

【主治】 柔痉。症见项背强直，肢体拘急，发热不恶寒，头痛汗出，苔薄白，脉沉细而迟或兼弦。

【方论】 本方为风寒表虚之柔痉证治。

表虚之体，腠理不固，外感风寒之邪，卫气浮盛于外，与邪相争则发热；卫失固外，营不内守则汗出；太阳经脉循头下项，风寒外袭，经气不利，故项背强直；风寒犯表，表虚汗出，肌腠疏开，当见浮缓之脉，今反见沉迟者，并非里寒证，而是在里之津液已伤，既不能濡养筋脉，又营卫之行亦复不利，故脉象如此。此与《伤寒论》所云：“太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。”之证情不同。本方证为里津早虚，而彼证里未虚，故可用葛根发汗解肌生津。正如尤在泾所云：“沉本痉之脉，迟非内寒，乃津液少而营卫之行不利也。伤寒项背强几几汗出恶风者，脉必浮数，为邪风盛于表。此证身体强几几然，脉反沉迟者，为风淫于外而津伤于内，故用桂枝则同，而一加葛根以助其散，一加瓜蒌根兼滋其内，则不同也。”沉、迟、弦、紧之脉象为痉病常见脉象，不可误以为属里寒证，而是表虚痉证，即所谓“柔痉”是也。

本方证之病因，由于太阳桂枝证误治，以致阳证见阴脉，而成恶候。然桂枝证尚未罢，故仍用桂枝汤加瓜蒌根以治痉之燥，而非痉病之正方也。

方中瓜蒌根(天花粉)味苦寒入阴，清热生津，滋润筋脉；桂枝汤调和营卫，疏泄风邪，以使经气畅通，风邪自解，筋不燥则痉亦随愈。进而言之，本方以瓜蒌根、桂枝、甘草，辛甘化阳；白芍、大枣，酸甘化阴；啜粥以助胃气，阴阳得以调和，正气充足以微汗而解矣。

《金匮要略论注》曰：此为痉证有汗不恶寒者之方。太阳病其证备者，身热头痛汗出

也。身体强，即背反张之互辞。几几然，即颈项强之形状。脉反沉迟，谓阳证得阴，此痉脉之异于正伤寒也。(徐忠可)

《金匮玉函经二注》曰：脉沉迟，汗必不出，不出则亦不恶风，则是病在表之营血分。营血，阴也，其体沉，其行迟，所以脉应其象，外息于寸口，内不养于筋径，故痉强之病作焉。所以瓜蒌根味苦入阴，用以生营血，益阴分津液，养其筋经者为君；桂枝之辛以散，芍药酸以收，一阴一阳，在里在表者为臣；甘草姜枣合辛甘之味，行脾之津液和营卫者为使。立方之旨，其在斯欤。(赵以德)

总之，本方为太阳病有汗表虚之柔痉。其病理机制为风淫于外，津伤于内，筋脉失于濡养。故治之以解肌生津为法，从解肌祛邪，舒缓筋脉，驱风寒而存阴。

表解

病因病机	太阳病有汗表虚之柔痉
治则	和营生津
主要脉证	症状：项背强，发热不恶寒，头痛无汗 脉象：沉迟兼弦
配伍	瓜蒌根：清热生津，柔润筋脉 桂枝汤：调和营卫、疏风散邪

【类方鉴别】

1. 与《伤寒论》太阳病桂枝加葛根汤之别：二方证颇为类似，但有轻重不同，彼方为项背强几几；本方证则为身体强几几；彼为邪盛于表，故加葛根，重在解肌，此则津伤于里，故加瓜蒌根，重在滋液以柔筋脉。

2. 与葛根汤之别：本方证头痛，身体强痛，发热恶寒等表证，即本方证为痉病有汗表虚证；而葛根汤所主为痉病无汗表实证。

【应用范围】

1. 风邪滞太阳经俞，日久不愈，经脉并病而见本方证者亦可用之。
2. 治柔痉，身体强几几然，脉反沉迟，自汗。(《三因方》)
3. 治桂枝汤证而渴者。(《方极》)
4. 小儿急惊风。(《经方发挥》)

现代临证，本方可用于外感病出现头痛项强，发热恶风，汗出，咽干口渴等外有表虚兼内伤津者。

【临证加减法】

1. 痉病，发热汗出，恶风身痛，身体强，背反张，脉象涩或沉迟等。若兼血虚加当归；若身痛较重加秦艽、防风；若渴重，加重瓜蒌根之量至30克。

2. 小儿“慢惊风”气虚加党参；脾虚加白术；血虚加当归；阴虚加石斛。

【衍方】

1. 瓜蒌根汤：天花粉(瓜蒌根) 麦门冬 知母 石膏 甘草。水煎服。治燥火烁

肺，口渴身热，二便赤涩，喘咳气逆，面赤唇焦，吐痰难出。（《症因脉治》卷二方）

2. 瓜蒌根散：瓜蒌根 胡黄连 黄芩各七钱半炒僵蚕 白癣皮 炒大黄各五钱 牛黄 滑石各二钱半。为细末。每服二钱，不拘时竹叶煎汤调下。治风热口中干燥，舌烈生疮。（《证治准绳·类方》）

【文献参考】本方治小儿抽搐症 60 例：呈“慢惊风”临床表现患者，热性病后遗症 25 例，不明原因 35 例。结果，用药 15 天内治愈者 40 例，1 个月治愈 18 例，无效 2 例。随访半年以上未见复发。（《陕西中医》1985；6：304）

【治验】

1. 柔痉

患者丁××，男，半岁。某年夏。症状：身热，汗出，口渴，目斜，项强，角弓反张，手足搐搦，指尖发冷，指纹浮紫，舌苔薄黄。诊断：伤湿兼风，袭入太阳卫分，表虚液竭，筋脉失荣。治疗：拟用调和阴阳，滋养营液法，以瓜蒌桂枝汤主之。瓜蒌根 6 克 桂枝 3 克 白芍 3 克 甘草 2.4 克 生姜二片 红枣二枚。水煎服。

三剂诸症减轻，改投：当归 3 克 生地 6 克 白芍 6 克 瓜蒌根 6 克 川贝 3 克 秦艽 3 克 忍冬藤 6 克。水煎服，四剂而愈。（《蒲园医案》）

2. 急惊风

金××，男，4 岁。发烧头疼，频繁呕吐，儿科以流脑收入院治疗，给予磺胺、抗生素及对症疗法。10 余天后呈昏睡状态，神志不清，不吃不喝，并出现频频抽风。每日约抽 10 余次，抽时两眼上吊，角弓反张，牙关紧闭，四肢抽搐，每次约数分钟即自行缓解。给予输液打针用各种镇静剂 40 多天效果不佳。一直处于昏迷状态，遂停西药，改用中药治疗。患儿发烧比前有所好转，但如不用退烧药时，体温仍然上升，易汗，唇干裂，舌上少津，脉数。治以银翘散加花粉，因舌咽困难，用鼻饲灌入。每日一剂，并送下安宫牛黄丸半粒。经服上药 3 剂后，抽风逐渐减少，持续时间缩短，神志渐清，会哭，并能稍进食。继以上药加减化裁，减去安宫牛黄丸，每日 1 剂，体温降至正常，四肢抽搐虽减，但仍未痊愈。家属再三要求出院调治疗养。时过 2 个月，患儿复未就诊治疗。抽风与出院时无甚差别。据家属叙述，2 月以来，在外一直未停止过治疗。多以寒凉生津之品或以羚羊钩藤息风解痉之类治疗，少有效验。患儿面色㿠白，唇舌色淡，精神疲惫，大便溏，手足不温。据此，为过用寒凉，挫伤阳气，不仅脾胃损伤，而且气阴皆虚，不能濡养经脉，抽风终难治愈。遂以瓜蒌桂枝汤治疗，连服 5 剂。十数日后复诊，抽搐次数显著减少，程度也轻。宗此方加白术、当归、党参等调治一月痊愈。（《医方发挥》山西人民出版社，1982）

3. 血热

一妇人，年 40。时时发血热，肩背强急，发齿痛，与小柴胡汤加地黄、瓜蒌根而痊愈。余于小柴胡汤加瓜蒌根者，非去半夏加瓜蒌根之意也。是本瓜蒌桂枝汤之意也。凡热者之宗筋，为之干燥强息，故以清热剂加瓜蒌，地黄滋润之品时，奏效颇速。千金独活汤之地黄，亦此意也。（《橘窗书影》）

4. 席汉氏综合病感受风寒

潘××，女，53岁。1981年12月23日初诊。患者曾患席汉氏综合病十余年。最近几天受风项背部强痉，曾用发汗治疗，汗出过多，痉痛不减，无有恶寒发热现象，其脉细弱，苔少质红。辨证认为风邪侵犯太阳经脉，汗不得法，邪仍不去，复伤津液，故予以瓜蒌桂枝汤加葛根：瓜蒌根12克 桂枝6克 白芍10克 葛根15克。水煎服，两剂而愈。（摘自《张仲景药法研究》649页，科学技术文献出版社，1984）

葛根汤

【原文节录】 太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痉，葛根汤主之。

【方组】 葛根四两 麻黄三两（去节）桂枝二两（去皮） 生姜三两（切） 甘草二两（炙） 白芍二两 大枣十二枚（擘）。

上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根减六升，去白沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，复取微似汗，不须啜粥，余如桂枝汤法将息及禁忌。

【临证参考用量】 葛根12克 麻黄9克 桂枝6克 生姜9克 炙甘草6克 苓药6克 大枣12枚。

上7味，以水1000毫升，先煮麻黄、葛根，减200毫升，去白沫，再下诸药，煮取300毫升，去滓，温服100毫升。复被似汗。

注：临证本方用量宜尊仲景师之原意，即葛根之用量大于麻黄，麻黄略大于桂枝。

【功效】 解表发汗，升津舒筋。

【主治】

1. 主症：发热无汗，恶风，身痛，项背强几几，口噤不得语，小便少，苔薄白，脉浮紧。

2. 副症：或喘，或下利，或呕吐。

【方论】 本方证为太阳病表邪未解，津液不能上润，筋脉失养，伤寒表实证之欲作刚痉；亦为太阳阳明合病。

风寒之邪外束肌表，卫气闭塞无汗；小便反少，是在里之津液未伤，小便少则里气不宣；寒邪外束，肌腠无汗出，则邪气不能外达，既不能下行，又不能外达，气机壅塞，势必逆而上冲，故有“气上冲胸”之症出现；“口禁不得语”为邪阻筋脉，口肌失荣而拘急，为将要发生项背强直、角弓反张之痉病征兆，故曰“欲作刚痉”。所以，外感风寒表实无汗，见口噤不语，小便反少者，当预防发生痉病，在此欲痉未痉之机，当投葛根汤，以发表升津，舒缓筋脉而治之。

风寒束表，腠理闭塞，故无汗恶风，“恶风”乃恶寒之互词；风邪滞于经脉，筋脉失于濡养，则项背强几几，外邪不解，内迫阳明，下走大肠，故必为下利之太阳阳明合病。

方中葛根为主药，轻升解肌，输津舒脉；以麻黄桂枝发汗；芍药甘草治挛急；姜枣和表里。