



FUCHANKEXUE
DUOXUANTI

妇产科学多选题

• 主编 张惜阴




1-44
XY

上海医科大学出版社

R71-44
· ZXY

妇产科学多选题

主 编 张惜阴
编 者 黄敏丽
王德芬



A0278162

上海医科大学出版社



(沪)新登字 207 号

责任编辑 王晓萍

封面设计 朱振东

责任校对 袁 庆

妇产科学多选题

主编 张惜阴

上海医科大学出版社出版发行

上海市医学院路 138 号

邮政编码 200032

新华书店上海发行所经销

江苏句容排印厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3.75 字数 84,000

1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月第 1 次印刷

印数 1-7,000

ISBN 7-5627-0229-2/R·214

定价: 3.80 元

前 言

受上海医科大学出版社之委托,我们组织了 30 余位临床各科专家编写了这套多选题(multiple choice question, MCQ)汇编集。本套多选题收集了近几年来我校临床医学各科本科生和研究生考试题,故可供临床医学专业、预防医学专业、口腔医学专业本科生复习,研究生入学考试和临床医师晋升考试参考之用。

本套多选题包括《内科学》、《外科学》、《妇产科学》、《儿科学》、《传染病学》、《神经病学和精神医学》、《眼科学》、《耳鼻咽喉科学》和《影像诊断学》等分册;《内科学》的心电图部分和《影像诊断学》的影像部分则制作成计算机软件出版。

多选法考试题具有覆盖知识面广,评分标准客观,方法简便,考试和评分易应用计算机操作等优点,故仍为目前各类医学考试的重要方法之一。

本套多选题的撰编和答案主要依据卫生部高等医学院校统一教材和我校自编教材。为制作计算机软件,在每道试题的题序前均冠以学科的英文名称第一个字母为代号,如内科学试题的题序前冠以 M;外科学试题的题序前冠以 S 等。

本套多选题的命题范围较广,试题深浅跨度较大,以满足各个层次读者的需求。书中难免存在不足和错误,敬请读者和同道们批评指正。

上海医科大学 王申生

答 题 说 明

本试题类型分为 A、B、C、K 四种。

A 型题：为最佳回答题。每一道试题下面都有 A、B、C、D、E 五种备选答案，其中只有一个答案是完全正确的。

B 型题：为配伍选择题。A、B、C、D、E 五个备选答案在前，试题在后，若干道试题共用这五个备选答案。每题只能选择一个正确答案，若选择两个或两个以上，视为无效。每个备选答案可以被选择一次或一次以上，也可以一次也不被选用。

C 型题：为比较选择题。A、B、C、D 四个备选答案在前，试题在后，若干道试题共用这四个备选答案。每题只能选择一个正确答案。

K 型题：为编码多项组合题。每一道试题下面都提供了 ① ② ③ ④ 四个选用答案，答题时要将这四个选用答案按下述规定的顺序组合成 A、B、C、D、E 五组答案：A：① + ② + ③，B：① + ③，C：② + ④，D：④，E：① + ② + ③ + ④。每道试题只许在答卷相应位置上涂黑 A B C D E 五个字母中的一个。

目 录

前言

答题说明

第一章 妇科学

G1. A型题(1~98)	1
G2. B型题(99~131)	19
G3. C型题(132~149)	21
G4. K型题(150~215)	23
答案	31

第二章 产科学

G5. A型题(1~243)	33
G6. B型题(244~289)	84
G7. C型题(290~320)	88
G8. K型题(321~425)	90
答案	104

第一章 妇 科 学

G1. A 型题(1~98)

G1-1. 下列哪种外阴白色病变是外阴癌的癌前期病变:

- A. 增生型营养不良(障碍)
- B. 硬化苔癣型营养不良(硬化性萎缩性苔癣)
- C. 混合型营养不良
- D. 增生型或混合型伴上皮不典型增生
- E. 外阴白斑

G1-2. 下列哪项是指白塞综合征:

- A. 多毛、闭经及卵巢肿大
- B. 卵巢实性肿瘤合并腹水
- C. 眼炎、口腔及生殖器粘膜溃疡
- D. 人流刮宫后闭经
- E. 闭经,持续性分泌乳汁,生殖器萎缩

G1-3. 关于滴虫性阴道炎的治疗,下列哪项是错误的:

- A. 滴维净是常用的局部药物之一
- B. 灭滴灵口服吸收好,疗效高
- C. 为提高疗效,治疗前先用肥皂水擦洗阴道壁,继用酸性溶液冲洗
- D. 男方不需检查和治疗
- E. 灭滴灵局部用药效果亦好

G1-4. 关于淋病,下列哪项是错误的:

- A. 在多核白细胞内找到肾形革兰阴性双球菌 6 对以上可确诊
- B. 青霉素是治疗淋病的首选药物
- C. 淋病的好发部位是尿道旁腺、前庭大腺、子宫颈管等
- D. 淋病首先出现的症状是尿痛、尿频、排尿困难
- E. 淋病不是一种性病

G1-5. 关于淋病的治疗,下列哪项是错误的:

- A. 青霉素为首选药物

- B. 大剂量氟嗟酸(泰利必妥)400 mg, 每日2次, 7天为一疗程
- C. 对产生青霉素酶的淋菌感染, 可用壮观霉素肌注, 一次用量2g
- D. 急性淋病治疗后4~7天重复作颈管分泌物涂片, 若转为阴性则不必再复查
- E. 夫妻双方应同时治疗

G1-6. 关于前庭大腺囊肿, 下列哪项是正确的:

- A. 发生于中肾管(wolffian duct)
- B. 由于腺管堵塞分泌物积聚而成
- C. 易发生癌变
- D. 好发于绝经前后
- E. 多为双侧性

G1-7. 下列哪项是错误的:

- A. 外阴不典型增生需病理诊断肉眼无法辨认
- B. 先天性卵巢发育不全系常染色体异常所致
- C. 艾滋病由人类免疫缺陷病毒引起
- D. 宫颈癌的发生与人体乳头状瘤病毒感染有关
- E. 白塞综合征往往有骨质疏松表现

G1-8. 关于病毒性宫颈炎, 下列哪项是错误的:

- A. 由单纯疱疹病毒(HSV)引起
- B. 有生殖道 HSV 感染者宫颈上皮呈不典型增生及原位癌发生率增高
- C. 孕妇感染后可能引起胎儿畸形
- D. 胎儿可在阴道分娩过程中被感染
- E. 不属于性传播性疾病

G1-9. 关于生殖道感染的病原体, 下列哪项是错误的:

- A. 沙眼衣原体
- B. 流行性腮腺炎病毒
- C. 淋菌
- D. 厌氧菌不引起盆腔炎症
- E. 盆腔炎常为需氧及厌氧菌感染所致

G1-10. 非特异性阴道炎最多见的病原体是:

- A. 葡萄球菌
- B. 链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. Gardnerella 菌(加脱纳菌)
- E. 加脱纳菌合并厌氧菌

G1-11. 宫颈糜烂患者,其宫颈活检病理报告为鳞状上皮化生,提示:

- A. 宫颈癌变
- B. 宫颈不典型增生
- C. 宫颈糜烂愈合过程
- D. 宫颈息肉形成
- E. 宫颈糜烂继续发展

G1-12. 慢性宫颈炎最常见的病变是:

- A. 宫颈肥大
- B. 宫颈纳氏囊肿
- C. 宫颈息肉
- D. 宫颈不典型增生
- E. 宫颈糜烂

G1-13. 下列哪项表现为宫颈糜烂:

- A. 宫颈的鳞状上皮脱落,由柱状上皮覆盖
- B. 宫颈上皮缺如
- C. 宫颈溃疡
- D. 宫颈先天发育不良
- E. 宫颈旧裂伤外翻

G1-14. 宫颈糜烂面积在 $1/3$ 以内,表面较光滑者属:

- A. 中度,单纯型
- B. 中度,颗粒型
- C. 轻度,单纯型
- D. 轻度,颗粒型
- E. 重度,单纯型

G1-15. 宫颈鳞状上皮化生,下列哪项是错误的:

- A. 鳞状上皮化生是宫颈糜烂愈合的过程
- B. 鳞状上皮不仅代替了糜烂的柱状上皮,而且代替了腺上皮
- C. 化生的鳞状上皮在排列、形态上有异常时,应诊断为不典型增生
- D. 化生的鳞状上皮来自柱状上皮下的基底细胞(储备细胞)
- E. 化生后的鳞状上皮具有可逆性,再成为糜烂面

G1-16. 目前治疗宫颈炎,疗效较好、疗程最短的方法是:

- A. 物理治疗
- B. 口服抗生素
- C. 肌肉注射消炎药
- D. 局部上药
- E. 手术截除

G1-17. 宫颈息肉的治疗,下列哪项最合适:

- A. 电熨
- B. 电挖
- C. 息肉摘除术
- D. 息肉摘除并送病理检查

E. 宫颈锥形切除

*G1-18. 病例 30 岁, 患慢性宫颈炎有重度糜烂, 需作电熨或激光治疗, 下列注意事项, 哪些是错误的:

- A. 月经净后 15 天可作电熨或激光治疗
- B. 急性生殖器炎症时不能作电熨或激光治疗
- C. 术后应避免盆浴及性生活 1 个月
- D. 术后阴道流出大量黄水
- E. 术后 2 周结痂脱落, 阴道分泌物减少

*G1-19. 病例 34 岁, 7 天前因慢性宫颈炎作电熨治疗, 治疗后 2 天阴道有大量黄色排液伴低热体温 37.8°C 左右, 5 天后感下腹坠痛, 腰酸难忍, 体温上升达 39°C 。妇科检查: 宫颈肥大盖有灰色白膜, 宫体中位, 大小正常, 可活动, 两侧附件明显增厚并有压痛, 首先应考虑的诊断是:

- A. 宫颈电熨后组织反应
- B. 宫颈电熨后宫颈炎急性发作
- C. 宫颈电熨后引起急性盆腔炎
- D. 宫颈电熨后合并上呼吸道感染
- E. 宫颈电熨后发热待查

*G1-20. 病例 25 岁, 于 3 个月前正常足月分娩, 产后哺乳未来月经。主诉自 2 天前开始有下腹痛及血性分泌物而来院就诊, 妇科检查: 子宫前屈, 稍大, 轻压痛, 右侧附件明显增厚伴压痛, 左侧附件也有压痛。体温 38°C , 尿妊娠试验阴性, 血红蛋白 120g/L , 白细胞 $12 \times 10^9/\text{L}$, 应诊断为:

- A. 输卵管积水
- B. 输卵管妊娠
- C. 输卵管囊肿扭转
- D. 急性输卵管炎
- E. 子宫内膜异位症

*G1-21. 有关输卵管积水, 下列哪项是错误的:

- A. 输卵管粘连, 闭锁, 渗出物积聚形成
- B. 输卵管积脓, 脓液逐渐被吸收形成
- C. 肿物囊性, 常与周围组织粘连
- D. 常为双侧性腊肠形, 壁较薄而光滑
- E. 由盆腔结缔组织增生, 子宫固定而形成

G1-22. 慢性盆腔炎患者,在下列哪种情况下可考虑手术治疗:

- A. 月经过多
- B. 两侧输卵管增粗
- C. 不孕
- D. 炎性包块,久治无效
- E. 痛经

G1-23. 输卵管结核的主要传播途径是:

- A. 上行性感染
- B. 血行扩散
- C. 盆腔腹膜结核直接蔓延扩散
- D. 淋巴传播
- E. 病灶种植

G1-24. 生殖器结核最先侵犯的部位是:

- A. 外阴,其次阴道
- B. 阴道,其次宫颈
- C. 卵巢,其次输卵管
- D. 子宫内膜,其次输卵管
- E. 输卵管,其次子宫内膜

G1-25. 下列哪种疾病与输卵管堵塞无关:

- A. 输卵管炎
- B. 子宫内膜异位症
- C. 输卵管积水
- D. 生殖器结核
- E. 卵巢囊肿

G1-26. 严重的急性盆腔炎,应取下列哪种体位:

- A. 平卧
- B. 右侧卧位
- C. 半卧位
- D. 头低位
- E. 胸膝卧位

G1-27. 停经 2 个月,腹痛,阴道出血比月经多,子宫增大如孕 2 个月大小,宫口有胎囊膨出,应诊断为:

- A. 宫外孕
- B. 先兆流产
- C. 不全流产
- D. 难免流产
- E. 过期流产

G1-28. 病例 28 岁,不孕 3 年。停经 56 天后阴道少量流血 1 周,突觉少腹剧痛,面色苍白。检查:BP 9.5/6kPa,脉搏 120 次/分,腹部有压痛、反跳痛,移动性浊音(阳性)。妇科检查:阴道后穹窿膨隆,宫颈举痛,宫体中位,正常大小,右侧扪及 5cm × 6cm × 6cm 大小质地中等包块,并有触痛,最恰当处理为:

- A. 作气腹造影
- B. 腹腔镜检查

C. 静脉滴注血管收缩药升高血压

D. 即行剖腹探查术

E. 输血纠正休克与手术同时进行

G1-29. 先兆流产的处理, 下列哪项是错误的:

A. 卧床休息

B. 给予维生素 E 治疗

C. 应用镇静药物

D. 定期阴道检查

E. 定期 HCG 测定

G1-30. 为确诊宫颈癌, 下列哪项是正确的:

A. 宫颈荧光检查

B. 阴道镜检查

C. 碘试验

D. 宫颈刮片细胞学检查

E. 宫颈和颈管活组织检查

G1-31. 宫颈癌普查, 最常用的方法是:

A. 宫颈活检

B. 碘试验

C. 细胞学检查

D. 阴道镜检查

E. 血清学检查

G1-32. 宫颈刮片巴氏染色 II 级提示:

A. 炎症

B. 可疑癌

C. 癌

D. 高度可疑癌

E. 正常

G1-33. 已确诊为宫颈原位癌, 其治疗原则为:

A. 全子宫切除术

B. 全子宫及双侧附件切除术

C. 次广泛全子宫切除术

D. 广泛性全子宫切除术加盆腔淋巴结清除术

E. 放射治疗

G1-34. 宫颈癌的淋巴转移首先侵犯:

A. 锁骨上淋巴结

B. 腹股沟淋巴结

C. 髂前淋巴结

D. 盆腔淋巴结

E. 腹主动脉旁淋巴结

G1-35. 病例 50 岁, 确诊宫颈鳞癌 I₂ 期, 应选择下列哪项治疗:

A. 宫颈锥形切除术

B. 经腹子宫大部切除及双侧附件切除术


- C. 广泛性全子宫切除术
- D. 广泛性全子宫切除及盆腔淋巴结清扫术
- E. 次广泛性全子宫切除术

G1-36. 病例绝经 3 年，阴道流血 3 个月，阴道细胞学检查巴氏Ⅳ级，进一步处理是：

- A. 切除子宫
- B. 广泛性全子宫切除术
- C. 广泛性全子宫切除及盆腔淋巴结清除术
- D. 诊断性刮宫及宫颈活组织检查
- E. 宫颈锥形切除术

G1-37. 宫颈癌患者妇科检查结果如下图，应诊断为：

- A. I 期
- B. I_a 期
- C. I_b 期
- D. II_a 期
- E. II_b 期




G1-38. 宫颈癌的临床分期是根据：

- A. 有无淋巴结转移
- B. 术后所见修订分期
- C. 病理分级
- D. 病灶侵犯范围
- E. 临床症状严重程度

G1-39. 病例 42 岁，不规则阴道流液及流血半年。妇科检查：宫颈均为菜花状癌组织替代，子宫前位，大小正常欠活动，两侧浸润硬，未达盆壁。宫颈活检为鳞形细胞癌Ⅱ级，其最恰当的治疗是：

- A. 放射治疗
- B. 广泛性全子宫切除及双侧盆腔淋巴结清除术
- C. 化疗
- D. 全子宫切除术
- E. 化疗后全子宫切除术

G1-40. 病例 34 岁，普查时发现防癌涂片Ⅳ级，宫颈多点活检，病理切片结果见右图，应诊断为：



- A. 慢性宫颈炎
- B. 轻度宫颈不典型增生
- C. 中度宫颈不典型增生
- D. 宫颈原位癌
- E. 宫颈浸润癌

G1-41. 关于宫颈原位癌，下列哪项是正确的：

- A. 病变局限于子宫颈而无淋巴结转移
- B. 病变局限于宫颈上皮层内而无间质浸润
- C. 可藉细胞学及阴道镜检查与浸润癌鉴别
- D. 临床分期为Ⅰ期
- E. 应首选广泛性全子宫切除术

G1-42. 关于子宫内膜癌，下列哪项是错误的：

- A. 多见于绝经后妇女
- B. 较突出的症状是不规则阴道流血
- C. 最有效的诊断方法是分段诊刮
- D. 晚期应用大剂量雌激素治疗有效
- E. 晚期用孕酮治疗有一定效果

G1-43. 女性生殖道最常见的良性肿瘤是：

- A. 子宫肌瘤
- B. 卵巢皮样囊肿
- C. 卵巢浆液性囊腺瘤
- D. 卵巢粘液性囊腺瘤
- E. 以上都不是

G1-44. 下列哪种疾病是引起月经过多的原因：

- A. 浆膜下子宫肌瘤
- B. 粘膜下子宫肌瘤
- C. Asherman 综合征
- D. 卵巢畸胎瘤

E. 输卵管妊娠

G1-45. 下列哪种疾病不属于不孕症的原因:

- A. 生殖器结核
- B. 子宫粘膜下肌瘤
- C. 宫颈糜烂
- D. 子宫内膜异位症
- E. 多囊卵巢综合征

G1-46. 有关子宫肌瘤的治疗, 下列哪项是正确的:

- A. 月经量多, 肌瘤不大者可用雌激素治疗
- B. 已绝经子宫如 10 周妊娠大小, 不必再检查
- C. 1 年内肌瘤由 6 周妊娠大小增长到 12 周妊娠大小应定期随访
- D. 粘膜下肌瘤 3 cm 直径, 不需手术治疗
- E. 子宫肌瘤超过 3 个月妊娠大小, 需手术治疗

G1-47. 下列哪项是指子宫体腺癌:

- A. 子宫内膜腺体与间质都有癌变
- B. 子宫内膜腺体有癌变, 而间质是良性的
- C. 子宫内膜腺体是良性的, 而间质有癌变
- D. 子宫平滑肌层有恶变
- E. 子宫内膜腺细胞呈化生性改变

G1-48. 子宫内膜癌的癌前期病变是指:

- A. 子宫内膜增生期
- B. 子宫内膜萎缩型
- C. 子宫内膜腺囊型增生过长
- D. 子宫内膜不典型增生过长
- E. 以上都不是

G1-49. 子宫内膜癌 I_a 期, 最好的治疗方法是:

- A. 放射治疗, 盆腔外照射
- B. 全子宫切除术, 保留双侧卵巢
- C. 全子宫及双侧输卵管卵巢切除术
- D. 广泛性全子宫切除术
- E. 广泛性全子宫切除及盆腔淋巴结清除术

G1-50. 下列哪种性激素对子宫内膜癌治疗有效:

- A. 雌激素
- B. 孕激素

C. 雄激素

D. 肾上腺皮质激素

E. 甲状腺素

G1-51. 下列哪种情况与子宫内膜增生过长关系密切:

A. 宫内节育器

B. 口服避孕药

C. 多次人工流产

D. 卵巢颗粒细胞瘤

E. 卵巢胚胎性瘤

G1-52. 下列哪种肿瘤与麦格综合征有关:

A. 子宫肌瘤

B. 子宫体癌

C. 卵巢纤维瘤

D. 输卵管癌

E. 库根勃瘤

G1-53. 下列卵巢肿瘤中,哪种肿瘤不产生性激素:

A. 粘液性囊腺瘤

B. 原发性绒毛膜癌

C. 畸胎瘤

D. 浆液性囊腺瘤

E. 颗粒细胞瘤

G1-54. 双侧性卵巢肿瘤,腹水中找到癌细胞,有肝实质转移,为下列哪项:

A. I_a期

B. I_b期

C. I_c期

D. II期

E. IV期

G1-55. 卵巢癌临床Ic期病变范围为:

A. 一侧卵巢癌灶包膜已破

B. 双侧卵巢癌灶,包膜未破

C. 一侧或双侧卵巢癌,腹水中找到癌细胞

D. 一侧卵巢癌肿侵及同侧输卵管

E. 两侧卵巢癌侵及子宫体

G1-56. 卵巢肿瘤最常见的并发症,是下列哪项:

A. 恶变

B. 感染

C. 出血

D. 破裂

E. 蒂扭转

G1-57. 抗癌药物(化疗)对下列哪种女性生殖器恶性肿瘤疗效最好:

A. 卵巢癌

B. 子宫体癌

C. 子宫颈癌

D. 子宫肉瘤

E. 绒毛膜癌

G1-58. 卵巢肿瘤手术治疗, 下列哪项是错误的:

- A. 凡良性病变的年青患者, 均应保留一侧卵巢
- B. 凡恶性病变的年青患者, 均应行双侧附件切除
- C. 卵巢实质性肿块均应手术切除
- D. 大于 6 cm 的卵巢囊性肿瘤应手术切除
- E. 长期服用避孕药的妇女卵巢增大, 可手术治疗

G1-59. 鉴别巨大卵巢囊肿与腹水, 下列哪种方法是禁忌的:

- A. 超声检查
- B. 腹部 X 线平片
- C. 胃肠道造影
- D. 腹腔镜检查
- E. 检测腹部移动性浊音

G1-60. 病例 32 岁, 已婚, 未育。半年前妇科检查子宫右侧有一直径 10 cm 囊性肿块, 活动, 诊断为卵巢皮样囊肿。现停经 8 周, 恶心、食欲减退, 宫颈着色, 子宫 2 个月妊娠大小, 软、前倾, 右侧可触及 10 cm 直径大小囊肿, 活动, 无压痛。左侧阴性。诊断为早期妊娠合并卵巢皮样囊肿。正确处理的方法是:

- A. 人工流产
- B. 立即剖腹囊肿切除并剖视对侧卵巢
- C. 人工流产后切除附件囊肿
- D. 妊娠 3 个月后剖腹, 行囊肿切除术及对侧卵巢详细检查
- E. 足月妊娠剖宫产及囊肿摘除术

G1-61. 病例 40 岁, 急性右下腹疼痛, 阵发性加剧 6 小时, 伴恶心呕吐。妇科检查: 子宫颈光滑, 子宫正常大小; 右侧附件可触及直径 10 cm 大小肿物, 部分囊性, 部分实性, 活动受限, 压痛剧。半年前普查曾发现右侧卵巢囊肿。现诊断为卵巢囊肿蒂扭转, 行剖腹探查, 下列处理中哪项是不恰当的:

- A. 清洁阴道做切除子宫的准备
- B. 有腹水应涂片找癌细胞
- C. 先将扭转的卵巢肿瘤蒂部复位后再切除
- D. 应探查对侧卵巢
- E. 怀疑恶变者应送冰冻切片作病理检查

G1-62. 病例 58 岁, 绝经 5 年, 半年来阴道出血 3 次, 每次持续 8~10 天, 量多, 伴两乳胀痛。妇科检查: 阴道未萎缩, 宫颈光滑, 外口见有较