

1835/1004
冷廬醫話

清 桐鄉 陸以湜定圃氏著

卷四

吐血

吳球治一少年吐血。來如泉湧。諸藥不效。虛羸病危。乃取病者吐出之血。瓦器盛之。候凝入鍋。炒血黑色。以紙盛放地上。出火毒。細研爲末。每服五分。麥門冬湯下。二三服。其血遂止。此蓋血導血歸法也。余接近人傳治暴起吐血方。以絲棉蘸吐出血。火焙存性。研末服之。甚效。今觀吳案。則不獨初起者可用此法矣。

方書法吐血有用苦寒者。有戒用苦寒者。觀顧曉澗治案。可以得其要矣。治案云。徐氏婦吐血傾盆。數日不止。目閉神昏。面赤肢軟。息羸難臥。危如累卵。脈左沉右洪。重按幸尙有根。此鬱火久蒸肺胃。復緣暑熱外逼。傷及陽絡。致血海不止。危在

頃刻。諸藥皆苦寒。是以投之卽嘔。借用八汁飲意。冀其甘寒可以入胃清上。血止再商治法。用甘蔗汁。藕汁。蘆根汁。各一酒杯。白果汁二匙。白蘿蔔汁半酒杯。梨汁一酒杯。西瓜汁一酒杯。生冲。鮮荷葉汁三匙。七汁和勻。隔水燉熱。冲入瓜汁。不住口緩緩灌之。服後夜間得寐。血止神清。惟神倦懶言。奄奄一息。脈雖稍平。右愈浮大無力。此血去過多。將有虛脫之患。經云。血脫者益其氣。當遵用之。人參七分。秋石水拌。黃耆七分。黃芩水炙黑。歸身一錢炒黑。懷山藥錢半。茯苓三錢。大麥冬錢半。去心。蒸北五味七粒。和入甘蔗汁。梨汁。藕汁。服後食進神健而痊。門人問血冒一證。諸方皆以苦寒折之。今以甘寒得效。何也。曰。丹溪云。虛火宜補。此婦孺居多。年憂思鬱積。心脾久傷。復緣暑熱外蒸。胃血大溢。苦寒到口卽吐。其爲虛火可知。故得甘寒而止。若果實熱上逆。仲景曾有用大黃法。或血脫益氣。東垣原有獨參湯法。不能執一也。觀此知實火吐血。原當用苦寒。然除實火之外。則概不宜用苦寒矣。今人吐血挾虛者多。而醫者動手輒用苦寒。宜乎得愈者少也。吐血戒用苦寒。更有治案可法。吳孚先治何氏女患吐血咳嗽。食減便澀。六脈兼實。左部尤甚。醫用四物湯加黃芩知母。吳曰。歸芎辛竄。吐血在所不宜。芩知苦寒傷脾。在所禁

用。乃與米仁、玉竹、白芍、枸杞、麥冬、沙參、川斷、建蓮、百合。二十劑。脈稍緩。五十劑而瘳。此方治陰虛咳嗽吐血最良。然必收效於數十劑後。謂非王道無近功乎。又程氏式醫穀。治李氏子吐血喘促。咳嗽浮腫。脚輒不能行。診脈浮濇微疾。此房勞所致也。用茯苓、白芍、苡仁、木瓜、丹皮、芡實、牛膝、貝母、百合、甘草。服十餘劑。喘促稍定。浮退血止。前方加朮。服二十餘劑而愈。夫此病以涼止血。則浮喘必劇。以溫止浮喘。則吐血必甚。總歸不起。第於平淡中寓巧法。故能生耳。治吐血者知此。庶不爲藥所誤。方書每言童便治吐血之神。然須擇強健之童而不食腥濁物者。有力者猶可購求。竄人安能。傳有一方。丹參飯鍋蒸熟。泡湯代茶。日飲之甚效。

諸血

肌衄卽內經之血汗。古無驗方。近人方案有極驗者。錄以備用。毛達可便易經驗集云。一人左臂毛竅如鍼孔。驟濺出血。積有一面盆許。晝夜常流。面白無氣。余用

炒山甲片研細粉。罯之以帕紮住。卽止。隨服補血湯數劑而愈。後治一老農腎囊上有一鍼孔流血。盈至脚盆。諸藥不效。自謂必死。余投以前法。立時痊愈。真神方也。顧曉瀾吳門治驗錄云。余同事楊君。腦後髮際忽出血不止。衆皆駭然。余知其爲肌紐也。令用一味黃芩。漬水塗之。立愈。後竟未發。又見有胸前背心兩證。亦以前法治之。立效。此方余友范董書所傳。治鼻梁血出者。移治他處亦效。而準繩未見及此。可見著書之難也。

許辛木部曹之室人。自幼患鼻紐。于歸後。無歲不發。甚者耳目口鼻俱溢出。至淡黃色始止。凡外治內治之法。無不歷試。每發必先額上發熱。鼻中氣亦甚熱。近二十年來。每覺鼻熱。辛木以喻嘉言清燥救肺湯投之。二三劑後。卽覺鼻中熱退。不紐。或投之少遲。亦不過略見微紅。蓋此方最清肺胃之熱。惟人參改用西洋參。或加鮮生地。勢已定。則用乾生地。喻氏此方自言不用一苦藥。恐苦從火化也。此製方妙處。醫者不可妄加也。

汗

方書皆謂自汗屬陽虛。盜汗屬陰虛。余按何西池醫碭云。傷寒始無汗。後傳陽明即自汗。豈前則表實。後則表虛乎。又云。人寤則氣行於陽。寐則氣行於陰。若其人表陽虛者。遇寐而氣行於裏之時。則表更失所護而益疏。即使內火不盛。而陽氣團聚於裏。與其微火相觸發。亦必汗出。是則自汗不第屬陽虛。盜汗不第屬陰虛矣。

疸

常州楊蕉隱參軍振藩。能詩善畫。兼諳醫學。傳一治黃疸病。方用活鯽魚數枚。剪取其尾。貼臍之四圍。當貼臍須臾。黃水自臍出。魚尾漸乾。更易貼之。常有病黃疸甚劇。他人以手熨其身。手亦染黃色。用此治之。自朝至夕。貼魚尾數次。水流盡即愈。曾目擊其效。又言有草名並蒂珊瑚。葉似桂。高不及尺。每顆冬間結子二枚。色紅如南天竺子。取子煎服。亦治黃病甚效。

腫

海寧許珊林觀察。煉精醫理。官平度州時。幕友杜某之戚王某。山陰人。夏秋間忽患腫脹。自頂至踵。大倍常時。氣喘聲嘶。大小便不通。危在旦夕。因求觀察診之。令用生黃耆四兩。糯米一酒鍾。煎一大碗。用小匙逐漸呷服。服至盡許。氣喘稍平。卽於一時間服盡。移時小便大通。溺器更易三次。腫亦隨消。惟脚面消不及半。自後仍服此方。黃耆自四兩至一兩。隨服隨減。佐以祛濕平胃之品。兩月復元。獨脚面有錢大一塊不消。恐次年復發。力勸其歸。屆期果患前症。延紹城醫士診治。痛詆前方。以爲不死乃是大幸。遂用除濕猛劑。十數服而氣絕。次日將及蓋棺。其妻見死者兩目微動。呼集衆人環視。連動數次。試用耆米湯灌救。灌至滿口不能下。少頃眼忽一睜。湯俱下咽。從此便出聲矣。服黃耆至數觔。並脚面之腫全消而愈。觀察之弟辛木部曹楣。謂此方治驗多人。先是嫂吳氏。患子死腹中。渾身腫脹。氣喘身直。危在頃刻。余兄徧檢名人醫案。得此方遵服。便通腫消。旋即生產。因係夏日。孩屍已爛成十數塊。逐漸而下。一無苦楚。後在平度有姬顧姓。患腫脹脫胎。此方數服而愈。繼又治愈數人。王某更在後矣。蓋黃耆實表。表虛則水聚皮裏膜外而成腫脹。得黃耆以開通隧道。水被祛逐。脹自消矣。

消

治消渴證。每用涼藥。然觀孫文垣治消渴。小便色清而長。其味甘。脈細數。以腎氣丸加桂心、五味子、鹿角膠、益智仁服之而愈。陸養思治消渴。喜飲熱而惡涼。大便秘。小便極多。夜尤甚。脈浮按數大而虛。沉按更無力。以八味丸加益智仁煎人參膠糊丸服之而愈。其法本於金匱。由火虛不能化水。故飲一斗小便亦一斗。凡見渴而水不消。小便多者。即當合參脈證。以此法治之。

傷食

中食之證。往往狀似中風。非詳問病因。必難奏效。明醫雜著有案可法。錄之一壯年人忽得暴疾。如中風。口不能言。目不識人。四肢不舉。急投蘇合香丸不效。余偶過聞之。因詢其由。曰。適方陪客。飲食後忽得此證。遂教以煎生薑淡鹽湯。多飲探吐之。吐出飲食數盃。後服白朮陳皮半夏麥芽湯而愈。湖州某紳老而矍鑠。食量兼人。暑月有餽盛饌者。快意加餐。次日蒸豚味變。不忍

捨棄。復飽啖焉。遂得河魚疾以卒。觀此知高年胃強不足持。且以見聖人肉敗不食。誠養生之道也。

少壯時飯後作書。未嘗有滯食之病。中歲以來。遂膈斯患。丁巳年假。得祕書數種。剋期約還。又不敢假手於人。親自鈔錄。日無暇晷。飽食後即倚案揮毫。因患腹痛。大便秘。數日不食。服保和丸及米灰等不效。投陸氏潤字丸。大黃一兩酒浸晒乾蒸半熟製半夏前胡山查肉天花粉陳皮白朮枳實檳榔各錢二分五釐每始愈。自是飯後不敢作書。藥須略炒。或晒乾。爲末。薑汁打神。糊爲丸。梧子大。余服潤字丸時適陳載庵來告以所患問宜何藥載庵曰三世醫驗中潤字丸最穩最靈余曰鄙意正同已服二錢許矣載庵曰不妨再服一次如其言大便遂通傷食者。往往發熱口渴。有似外感。辨之之法。以皮硝二錢。用紙紙須厚包固。縛置胃脘。靜臥數刻。啓紙視之。皮硝若濕。便是傷食。傷之輕者。此亦可以消化。傷之重者。其濕必更甚。乃服消食藥可也。

邪祟

杭州陳茂才福年。形狀豐碩。氣體素健。一日爲其父詣市購藥。忽仆於藥肆門前。肆主爲僱輿送歸之。醫救治不效。口鼻出血。未及半日遂卒。年僅三旬。按沈從先

野暴證知要云。凡遇尸喪。翫古廟。入無人所居之室。及造天地鬼神壇場。歸來暴絕。面赤無語者。名曰鬼疰。卽中祟也。進藥便死。宜移患人東首。使主人北面焚香禮拜之。便行火醋熏鼻法。則可復甦。否則七竅迸血而死。聞陳生是日。曾至人家弔喪。其所患。豈卽此耶。業醫者遇此等症。慎勿猛浪投藥。

袁隨園子不語。謂東醫寶鑑有法治狐。而不述其方。按是書邪祟門中有辟邪丹。治邪祟邪疾。及山谷間九尾狐精爲患。方用人參、赤茯苓、遠志、鬼箭羽、石菖蒲、白朮、蒼朮、當歸各一兩、桃奴五錢、雄黃、硃砂各三錢、牛黃、麝香各一錢爲末。酒糊丸。如龍眼大。金箔爲衣。每一丸臨臥以木香湯化下。諸邪不敢近體。更以絳囊盛五七丸。懸牀帳中尤妙。隨園所云。殆卽此歟。此方程杏軒醫從探載無牛黃有甘草赤茯苓改用茯苓

癩

癩卽大風。又作癩。論語伯牛有疾。注。先儒以爲癩也。毛西河四書臆言云。包注。牛有惡疾。按古以惡疾爲癩。禮婦人有惡疾。去以其癩也。故韓詩解菜菔之詩。謂蔡人之妻傷夫惡疾。雖遇癩而不忍絕。而劉孝標作辨命論。遂謂歌其菜菔。正指是

也。又淮南子曰。伯牛癘。又茱萸草可療癘也。見列子注。余按茱萸卽車前。本草不著其治癘功用。明沈之問解園元數一書。專治癘風。方藥甚多。而用車前者絕少。其所常用之藥。乃大風子、蒼耳子、草麻子、稀蘇草、苦參、花蛇等是也。鮑雲韶驗方新編載治麻風白花蛇丸方云。丹陽荆上舍得麻風疾一僧療之而愈。以數百金求方不肯傳。館賓袁某窺藏納衣領中。因醉竊錄焉。用者多效。此與蕭翼賺蘭亭相似。皆以酒爲餌者也。方用白花蛇一條。烏梢蛇一條。並去尾生肌防風、蟬蛻、草鞋打土生地、川芎、苦參、枸杞、槐花、銀花、以二兩上各白蒺藜、去醋浸一日北細辛、蔓荊子、威靈仙、何首烏、胡麻仁、炒金毛狗脊、川牛膝、烏藥、天花粉、川連、黃芩、梔子、黃柏、連翹、牛蒡子、以上各漏蘆半觔。去節先荆芥穗一兩五錢。上頭面者。加白芷一兩。肌膚潰爛者。加大皂角一兩。共研末。米糊爲丸。桐子大。每服五六十丸。茶送下。午後臨臥各一服。一僧加風藤一兩

越郡有患癘風者。因至外祖家食鷄而得。其外祖乃患此症者也。後其人死。所畜之鷄。肥大異常。鄰人購食之。亦患此症而死。蓋雞食癘風者之痰。能染人也。諺曰。寧娶瘋子妻。不食瘋子鷄。良有以也。

耳

乾隆時杭州金民以耳科致富。止恃一秘方。今其家已式微。有人傳得其方。用之甚效。取大蚌殼全箇。中裝人糞。千年石灰。野豬腳爪。中鳥糞。店以鐵絲匝緊蚌殼。外用泥塗。炭火煨至青煙起。置地上去火性。研細末。入磁瓶祕藏。凡患耳中爛。及耳聾流水等症。以此滲之立愈。此方天台余以庠傳序所述云。不獨可治耳疾。凡外症潰爛者皆可用之。曾有人治裙邊瘡。年久者亦效。

凡人於薙髮之後。必取耳以快意。此由少時習慣。遂成自然。往往有取之過深。傷而出血者。素圃醫案。鄭著一則。尤堪警目。錄之。貢武弁年二十餘。取耳時爲同輩所戲。銅挖刺通耳底。流血不止。延外科治之。初不以爲楚。旬日間忽頭痛。又延內科治之。益甚。迎余往治。則頭痛如破。體僵面赤。煩躁。脈弦緊。口流膿血。檢所服藥。皆石膏。梔子。芩。連等味。病人自言膿血不自喉出。余曰。此腦中膿血。流入鼻內。滲於口中的。係破傷風矣。項強已屬不治。幸未再見厥冷。用小續命湯。重加桂枝。附子。乾薑。去黃芩。一劑微汗。頭痛減半。再劑頸柔。十數劑後。耳內結疤。腦涎亦不流。

但其耳竟無聞矣。

目

目中起星。宜初起卽治。石室秘錄方最妙。白蒺藜三錢。水煎洗。日四五次。余二次皆用此獲效。又一次以新橘子皮塞鼻中。不半日卽退。又舊傳一方。用山茱萸、人乳磨汁。入冰片末少許點之。并治翳障甚效。

人有患肝病者。重酒柴胡。服之肝病愈而目瞽。以其竭肝陰也。大抵溫散之品皆損目。友人某嗜飲燒酒。後竟失明。至如韭、蒜、椒、芥等耗目光。並宜遠之。

一人患頭風痛。兩目失明。徧求醫治無效。偶過茶肆。小憩。有鄉人教以用十字路口及鄉村屋旁野莧菜煎湯。入沙壺中乘熱熏之。日行數次。如是半月復明。許辛木說。

明目之方。可久服者。枸菊丸第一。專用二味。丸內勿入六味。黑小豆次之。壽親養老新書云。李愚取黑豆緊小而圓者。侵晨以井花水吞二七粒。謂之五臟穀。到老視聽不衰。近人相傳服法。晨用生小黑豆四十九粒。以滾水送下。久服勿間。則眼到老常明。

余二十九歲患風火赤眼。愈後閱文攻苦。用目過早。遂至昏澀羞明。不能作字。又爲眼科以赤藥點之。轉益增劇。於是謝去生徒。閉門靜養。專服小黑豆。又每晨用明礬末擦齒。後以洗面水漱口。卽將其水洗目。洗後閉目片時。俟其自乾。如是半年。目乃復初。因服小黑豆勿輟。凡二十餘年。迄今目光如舊。燈下可作細字。未始非此方之力。凡人至中年而目昏花。卽當服此。或因其性涼。不宜於寒體。則服枸菊丸可也。丁巳秋見欽縣吳端甫撰花易簡良方載服黑料豆法并健功效附錄王予年入會闈年僅四十二而上燈後幾不見卷格南旋卽得此方無間服之今歷五稔目力倍於幼時真奇方也

明周定王懋普濟方四百二十六卷。爲方六萬一千七百三十九首。余在杭州時欲借鈔是書。需錢百餘萬。因而不果。咸豐九年。從坊友邱春生鉞。覓得刊本眼科書一冊。卽普濟方之第三十一卷。計一百頁。凡分類十有三。曰內外障眼。曰內障眼。曰外障眼。曰將變內障眼。曰內障眼。鉞後用藥。曰目生膚翳。曰目生丁翳。曰目生花翳。曰卒生翳膜。曰遠年障翳。曰目昏暗。曰目見黑花飛蠅。曰目暈。類各有論。共五百八十八方。其內外障眼類中有去翳生血止痛方。出家藏方用蟬蟾汁滴目中。及飴炙食之。下引陳氏經驗方云。晉書盛彥母氏失明。躬自侍養。母食必自哺。

之母既病久。至於婢使。數見捶撻。婢忿恨。伺彥暫行。取蟬蟪炙給之。母食以爲美。然疑是異物。密藏以示彥。彥見之。抱母慟哭。絕而復蘇。母目豁然。從此遂愈。孟子曰。陳仲子豈不誠廉士哉。居於陵三日不食耳。無聞目無見也。井上有李。蟪食實者過半矣。匍匐往將食之。三咽然後耳有聞。目有見。本草云。蟬蟪汁滴目中。去翳障。余在曲江有將官以瞽離軍。因閱晉書見此。參以孟子之言。證以本草之說。呼其子俾羞事而供。勿令父知。旬日後目明。趨庭伸謝。因錄以濟衆。按此方他書罕見。特載於此。俾患障失明者採用焉。

鈕蘭畹說。湖城某嫗。年四十餘。目昏不能拈鍼。齋得一方。七月七日。採旱蓮草搗汁入食鹽拌勻。日晒夜露。每日早起洗沐。以汁少許點目中。初微痛。後乃如常。目光遂漸明。嗣後至七十餘歲。猶能於燈下縫紉。

喉

門人歙縣吳子嘉茂才鴻勳。傳治喉症方。名咽喉急症異功散。云得自蘇州。靈驗異常。歷試不爽。用斑貓四錢。去翅足糯米炒黃去米血竭六分。沒藥六分。乳香六分。全蠍六

分。元參六分。真麝香三分。共爲細末。收藏磁瓶封口。切勿走氣。不論爛喉風。喉閉。雙單喉蛾。用尋常膏藥一張。取此散如黃豆大。貼項間。患左貼左。患右貼右。患中貼中。貼三四時。卽起泡。用銀鍼挑破。卽愈。凡陰症起泡更速。此方見

金匱翼爛喉痧方。最爲神妙。藥用西牛黃五釐。冰片三釐。象牙屑三分。焙。人指甲

五釐。男病用女。女病用男。真珠三分。青黛六分。去灰。壁錢三十個。焙。卽用木板上者。不可用。

共爲極細末。吹患處。凡屬外淫喉患。無不應手而瘳。不特爛喉痧。奉爲神丹也。惟

藥品修製不易。猝難卽得。有力者宜預製備用。如一時不及修合。別有簡便之法。

用壁錢五六箇。瓦焙爲末。加人指甲末五釐。西牛黃三釐。亦效。又治喉蛾方。斷燈

草數莖。纏指甲。就火熏灼。俟黃燥。將二物研細。更用火逼壁虱。卽臭十箇。共搗爲

末。置銀管。向患處吹之神效。見黃霽青太守安瀾賢已編。

舌

臨症視舌。最爲可憑。然亦未可執一。正義云。凡見黑舌。問其曾食酸甜鹹物。則能染成黑色。非因病而生也。然染成之黑。必潤而不燥。刮之卽退爲異。又惟虛寒舌

潤能染。若實熱舌胎乾燥。何能染及耶。凡臨症欲視病人舌胎燥潤。禁飲湯水。飲後則難辨矣。重慶堂隨筆云。淡舌白胎。亦有熱症。黃厚滿胎。亦有寒症。舌絳無津。亦有痰症。當以脈症便溺參勘。又白胎食橄欖即黑。凡酸物皆然食枇杷即黃。又如燈下看黃胎。每成白色。然則舌雖可憑。而亦未盡可憑。非細心審察。亦難免於誤治矣。

黑舌胎有寒熱之分。辨別不精。死生立判。汪苓友謂舌胎雖黑。必冷滑無芒刺。斯爲陰症無疑。誠扼要之言也。舒馳健傷寒集注謂黑胎乾刺爲二症。一爲陽明熱結。陰津立亡。法主大黃芒硝。急奪其陽。以救其陰。陰同則津同。一爲少陰中寒。真陽霾沒。不能熏騰津液。以致乾燥起刺。法主附子炮薑。急驅其陰。以同其陽。陽同則津同。據此則黑胎冷滑者。必無陽症。而黑胎乾刺者。有陽症復有陰症矣。臨症者可不慎歟。

舌現人字紋。多因誤投寒藥所致。楊乘六治沈姓感症危甚。舌黑而枯。滿舌偏裂人字紋。曰脈不必診也。此腎氣湊心。入味症也。誤用芩連。無救矣。踰日果歿。程杏軒治農人患傷寒數日。寒熱交作。自汗如雨。脈虛神倦。舌胎白滑。分開兩歧。

宛如刀割。詢知誤服涼藥。與六味回陽飲。服之有效。繼進左右二歸飲數劑。舌胎漸退而安。又傷寒金鏡錄有裂紋如人字形者。因君火燔灼。熱毒炎上而發裂。宜用涼膈散。此則舌見紅色。又當細辨脈症。分別治之。
繆氏子年十六。舌上重生小舌。腫不能食。醫以刀割之。敷以藥。閱時又生。屢治不痊。精力日憊。向余求藥。檢方書用蛇蛻燒灰研末敷之。不用立愈。後不復發。

齒

秀水新塍鎮屠氏。人多耆壽。牙齒至老堅固不壞。有家傳祕訣。自幼大小便時。咬定牙齒。不令洩氣。法本張景岳即有人詢問。亦不答應。歷久勿間。故牙齒從無墮落之患。余友鄭拙言學博鳳鏘說。

江湖上女醫有捉牙蟲者。以箸尖向患處旋繞。投水盃中。似有蟲者無數。云蟲去齒痛當愈。顧往往不甚驗。比閱程學博瑤田通藝錄所載亡室徐孺人行略。始知其術皆僞。行略云。濠濠間婦人能爲齩齒醫。行而賣其藝。治一人齒。能出蟲多者以百數。孺人曰。吾生長和州。知之久矣。齒即生蟲。他醫莫能出。若乃能應手出乎。