

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明 良甫 編輯
明 古吳 薛 己 立齋 補註

鄞縣 曹赤電 炳章 圈校

卷八

婦人小便淋瀝不通方論第一

婦人淋瀝。由腎虛而膀胱熱也。蓋膀胱與腎爲表裏。主於水。行於腎者。爲小便也。若腎虛則小便頻數。膀胱熱則小便淋瀝。甚則不通。腹脹喘急。當速治之。
愚按前症若膀胱熱結。用五淋散。若脾肺虛熱。用補中益氣湯。加山藥、五味、麥冬。若脾經鬱熱。用加味歸脾湯。若肺經鬱火。用黃芩清肺飲。若肝經濕熱。用龍膽瀉肝湯。血虛。用加味逍遙散。陰虛。用六味丸。加柴胡、山梔。大抵不渴而不利者。熱在下焦血分也。用滋腎丸。渴而不利者。熱在氣分也。用清肺飲。尺脈數而

無力者。陰火盛而陽不能化也。用六味丸。滋腎丸爲主。尺脈浮而無力者。陽氣虛而陰不能生也。用加減八味丸。滋腎丸爲主。

附治驗

一婦人素有前患。內熱體倦。余以爲肝火血少。脾氣虛弱。用八珍湯。逍遙散。兼服月餘而小便利。又用八珍湯而氣血復。

一婦人患前症。面青脇脹。諸藥不應。予以爲肝經氣滯而血傷。用山梔。川芎煎服而愈。

一婦人小便不利。小腹并水道秘悶。或時腹脇脹痛。余以爲肝火。用加味逍遙散。加龍膽草四劑。稍愈。乃去膽草。佐以八珍散。加炒黑山梔。兼服而瘥。

石葦湯 治小便實熱。氣滯淋瀝。

石 葦

黃 芩 炒

木 通

榆白皮

葵 子

瞿 麥

甘 草 各五

右薑水煎服。

雞蘇散 治血熱淋瀝。

鷄蘇葉

木 通各二兩

生地黃

滑 石各三兩

刺薊根 一兩

右每服半兩。淡竹葉三七片。水煎。

桃仁煎

治血癥。小便如淋。臍腹脹痛。

方見血癥門第七卷第九論

火府丹

治心經積熱。小便澀及五淋。

加甘草名導赤散

生地黃二兩

木 通爲末

黃 芩炒各一兩

右加蜜丸。桐子大。每服三十丸。木通煎湯下。

許學士云。一卒病渴。日飲水斗許。不食者三月。心中煩悶。時已十月。余謂心經有熱。伏與火府丹數服。越二日。來謝云。當日三服渴止。又三服。飲食如故。此本

治淋。用以治渴。可謂通變也。

一方。牛膝一合。水煎。入麝香少許服之。鄭縣耿武尉夢得。其內患淋。下砂石剝剝有聲。甚爲苦楚。一服而愈。

附方

滋腎丸

治熱在血分不渴。而小便不利。或腎虛足熱。腿膝無力。不能履地。又下

焦陰虛。小便不利。肚腹腫脹。或皮膚脹裂。眼睛突出。此神劑也。

知母酒炒 黃柏酒炒各 肉桂二錢

右各另爲末。水丸。桐子大。每服二百丸。空心白湯下。

黃芩分清飲。治肺熱小便不利。宜用此藥清之。

黃芩炒 山梔炒各

右水煎。腹不利。加鹽豉二十粒。

五淋散。治膀胱有熱。水道不通。淋瀝不出。或尿血如豆汁。或成砂石。或如膏汁。

或熱拂便血。

赤茯苓一錢五分

赤芍藥

山梔各一錢

當歸

甘草各一錢五分

右入燈心。水煎服。

補中益氣湯方見二十四卷第六論 八珍湯

加味歸脾湯

加味逍遙散三方見二十四卷第四論 龍膽瀉肝湯方見二十四卷第八論 加減八味丸

六味丸二方見二十四卷第十一論

婦人轉脬小便不利方論第二

婦人轉脬。或內熱傳搏於胞。或忍小便。氣逆於內。以致小腹急痛。不得小便。甚至死。

愚按前症不問男女。孕婦轉筋。小便不利。命在反掌。非八味丸不能救。餘參前後論主治。

附治驗

餘見第十五卷

一婦人小便淋瀝。小腹脹悶。胸滿喘急。諸藥不應。余視爲轉筋之症。用八味丸一服。小便如湧而出。

一婦人因鬱怒。小便滴澁。漸至小腹腫脹。痰咳喘促。余用八味丸煎服。小便卽利而痊。

一婦人素善怒。小便淋瀝不利。月經不調半載矣。或兩脇脹悶。或小腹作痛。或寒熱往來。或胸乳作痛。或咽喉噎塞。或兩脚筋攣。或肢節結核。面色青黃不澤。形氣日瘦。左關弦洪。右關弦數。此鬱怒傷肝脾。血虛氣滯爲患。朝用加味歸脾湯。

以補脾氣。解脾鬱。祛肝火。夕用滋腎丸。生肝散。滋腎水以生肝血。抑肝火。舒筋膜。兼服月餘而愈。

滋腎生肝飲

山藥

山茱萸

肉各一錢

熟地黃

自製二錢

澤瀉

瀉

茯苓

牡丹皮

各七分

五味子

杵炒五分

柴胡

三分

白朮

當歸

甘草

右水煎服。

葱白湯

治氣滯小便不通。腹脹欲死。

橘

皮三兩

葵

子一兩

葱

白一莖

右水煎。分三服。

八味丸

治脬轉小便不通。殊有神效。但世所不用。以致誤人多矣。方見二十四論

滑石散

治脬轉小便數日不通。

滑

石一兩

寒水石

葵

子一合

右爲末。以水一斗。煮至五升。時服一升卽利。

又方

亂髮燒灰 葵子

車前子各等分

右爲末。每服二錢。酒調服。

石葦湯

治轉脬小便不通。方見前

治強忍小便。致脬轉尿不利。困篤欲死。

滑石二兩 亂髮灰一兩

右爲末。每服三錢。桃白皮一觔。細切熟杵。入水三盞。絞取汁調服。千金翼用杏仁二十粒去尖皮。麩炒黃嚼細。水送下立通。

一方。皂角爲末。吹鼻內取嚏。

婦人小便數方論第三

小便乃腎與膀胱主之。蓋腎氣通於陰。若二經虛而熱乘之。則小便澀滯。虛則頻數也。

愚按。前症若肝經火動。用逍遙散。加龍膽草。車前子。膀胱火動。六味丸。加麥門。

五味。肝腎濕熱。龍膽瀉肝湯。鬱傷肝脾。加味道遙散。加味歸脾湯。肝脾肺氣虛。補中益氣。加麥門。五味。肝經血虛。加味道遙散。腎氣虛敗。鹿茸散。如不應。用八味丸。

附治驗

一、婦人患前症。小便頻數。日晡熱甚。此肝脾血虛。氣滯而兼溼熱也。用加味道遙散。加車前子而愈。

一、婦人患前症。發熱煩躁。面目赤色。脈洪大而虛。余謂此血虛發躁。用當歸補血湯數劑而痊。

一、婦人久患前症。泥屬於火。雜用寒涼止血之劑。虛症悉具。余曰。此脾胃虧損而諸經病也。當補中氣爲主。遂以六君。補中二湯。兼服兩月餘。尋愈。

桑螵蛸散 治腎氣虛寒。小便數少。或時頻數。或夜間尤數。

桑螵蛸 三十枚 炒

鹿茸 炙

牡蠣 煨

甘草 二兩 炒

黃耆 炒

右爲末。每服二三錢。食前空心。用薑湯調下。日二服。

縮泉丸 治脬氣虛寒。小便頻數。或遺尿不止。小兒尤效。

烏藥

益智仁等分

右爲末。酒煎山藥末爲糊。丸桐子大。每服七十丸。鹽酒或米飲下。

鹿茸散 治腎氣虛寒。便溺數甚。或夜間頻數遺溺。

鹿茸炙

烏賊魚骨

桑寄生

當歸

龍骨煅各二兩

白芍藥炒

附子炮各三錢

桑螵蛸炙各五錢

右爲末。每服二錢。空心并食前。用溫酒調下。作丸服亦可。凡用附子。重一兩三四錢。底平頂圓。周圍有瓣者方是。

附方

當歸補血湯

八味丸

六味丸

加減八味丸

四方見二十四卷第十一論

逍遙散

加味逍遙散

加味歸脾湯

三方見二十四卷第四論六君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

婦人遺尿失禁方論第四

經云。膀胱不利爲癰。不約爲遺溺。乃心腎之氣。失其常度也。故有水道澀而遺者。有失禁而不知自遺者。亦有生產傷膀胱。不時而遺者。有脢寒臟冷。遺而不知者。愚按內經曰。胞移熱於膀胱。則癰溺血。膀胱不利爲癰。不約爲遺溺。注曰。膀胱爲津液之府。水注由之。然足三焦脈實。約下焦而不通。則不得小便。足三焦脈虛。不約下焦。則遺溺也。靈樞經曰。足三焦者。太陽之別也。並太陽之正。入絡膀胱。約下焦。實則閉癰。虛則遺溺。竊謂前症。若肝腎虛熱。挺孔痿痺。用六味丸。如不應。用加味八味丸。陽氣虛憊。膀胱積冷。用鹿茸丸。如不應。用八味丸。若脾氣虛弱。不能禁止。用補中益氣湯。加山藥、山茱、五味。若肺氣虛寒。前湯加附、桂。此症屬虛熱者多。真寒者少。治宜審察。

附治驗附卜便

一婦小便自遺。或時不利。日晡益甚。此肝熱陰挺不能約制。用六味丸料。加白朮酒炒黑、黃柏七分。知母五分。數劑。諸症悉愈。若誤用分利之劑。愈損真陰。必致不起。

一老婦患前症。惡寒體倦。四肢逆冷。余以爲陽氣虛。先用補中益氣加附子。三劑。

不應。遂以參附湯四劑。稍應。仍以前藥而安。附子計用四枚。人參三觔許。一婦人病愈後。小便出尿。此陰陽失於傳送。名大小腸交也。先用五苓散二劑而愈。又用補中益氣而安。

鹿茸丸 治陽氣虛寒。小便白濁。滑數不禁。或臍腹陰冷。大便不實。

鹿茸炙

椒紅

桂心

附子炮

牡蠣煨

補骨脂炒

石斛

肉苁蓉酒浸

雞脰脰炙

沉香各一兩

桑螵蛸錢二

右爲末。酒糊丸。桐子大。每服三十丸。空心溫酒下。

秘元丹 治陽氣虛。小便不禁。或夜多小便頻數。

白龍骨兩三

訶子十枚

縮砂去皮

右爲末。糯米丸。桐子大。每服五十丸。空心鹽酒下。

又方。鹿角鎔炒爲末。每服三五錢。空心熱酒調下。

又方。雞脰脰炙爲末。每服二三錢。空心酒調下。日二三服。

又方。桑螵蛸扶神。遠志。菖蒲。人參。當歸。龍骨。龜板爲末。臥時。人參湯下三錢。

又方。桑螵蛸酒炒爲末。每服二錢。空心薑湯調下。

附方

六君子湯

補中益氣湯二方見二十六卷第六論六味丸

八味丸

加減八味丸三方見二十四卷第十一論

參附湯方見十六卷第六論

五苓散方見二十九卷第九論

婦人小便出血方論第五

心主於血。通行經絡。循環臟腑。若得寒則凝澀。得熱則妄行。失其常道。則溢滲於脬。則小便出血也。

愚按前症肝經血熱者。加味逍遙散。怒氣血傷者。加味逍遙散調髮灰。若肝經風熱者。加味逍遙散。送子芩丸。氣血俱虛者。八珍湯送髮灰膏粱積熱者。清胃散加槐花甘草。風熱腹痛者。四君子加防風枳殼。胃氣不能攝血者。補中益氣湯。鬱結傷脾。不能攝血者。濟生歸脾湯。

附治驗

一婦人尿血面黃體倦飲食不甘。晡熱作渴。此脾胃氣虛不能攝血歸經。用補中益氣以補胃氣。用歸脾湯以解鬱結。更用加味逍遙散以調養肝血而痊。

鹿茸散 治勞損尿血發熱內熱或寒熱往來口乾作渴。

葵子炒

續斷等酒炒各

髮灰散 治起居所傷。小便尿血。或忍尿。脬轉。臍下急痛。小便不通。又治肺疽心
蚶內崩吐血。舌上出血。用亂髮燒灰。本草云能療瘰癧腫狐疝刺痛症難瘡瘻瘵轉通大小便。

鈕內崩吐血。舌上出血。用亂髮燒灰。

本草云能療瘀血通關隔利水道破癥瘕
癰腫狐疝刺痛疰雜瘡癢浮轉通大小便

止咳散
鼻衄

右爲末二錢。以米醋湯調服。

生地黄散 治血熱小便出血。

生地黄二錢

黃芩錢五

阿膠炒

柏葉炒各錢

水煎服。

當歸散 治血分有熱。小便出血。或時尿血。

當歸

羚羊角鎊

赤芍藥各錢

生地黄

刺薊葉錢各一

右水煎服。

又方。治血分有熱。用生地黄杵取汁。每用一小盞。日三服。

又方。治血分有熱。小便尿血。用炒蒲黃末。每服二錢。溫酒調下。滾湯亦下。

又方。腎虛。鹿角膠二兩。炙黃爲末。作二服。長流水調。

附方

八珍散

加味逍遙散

歸脾湯四卷見二十四

子芩丸

方見十二卷第六論

清胃散

方見二十四卷第一論

四君子湯

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

婦人大便不通方論第六

夫大便不通者。由臟腑不調。寒熱之氣結於腸胃。或經水過多。內亡津液。宜用三脘散。或四物加青皮。或七宣丸。麻仁丸。選而用之。

愚按前症。或大腸津液乾涸。或血虛火燥。不可計其日期。飲食數多。必待腹滿。脹自欲去而不能者。乃用猪膽汁潤之。若妄服苦寒辛散之劑。元氣愈傷。或通而不止。或成中痞之症。大抵血虛火燥。用加味逍遙散。氣血俱虛。用八珍湯。燥藥傷血。用四物。連翹。甘草。剋伐傷氣。用四君。川芎。當歸。內熱作渴。飲湯脈實。用竹葉黃耆湯。內熱作渴。飲冷脈瀯。用四物送潤腸丸。肝膽剋脾土。而不能輸送。用小柴胡。加山梔。郁李仁。腸胃氣虛。而不能傳送。用補中益氣。加芍藥。厚朴。積熱而秘結。用清胃散。加芍藥。其有熱燥風燥。陽結陰結。皆不宜損中氣。治者審之。

附治驗

一婦人痰喘內熱。大便不通。兩月不寐。脈洪大。重按微細。此屬肝肺腎虧損。朝用六味丸。夕用逍遙散。各三十餘劑。計所進飲食百餘碗。腹始痞悶。正前所謂血虛火燥也。以猪膽汁導而通之。用十全大補湯調理而安。

附方

通神散 治大便實熱不通。其證心腹脹痛。手不得近。心胸煩悶。而欲飲食者。

大黃炒

芒硝

檳榔

桃仁荊

郁李仁

湯浸去皮酒炒各一兩

右爲末。每服二錢。粥飲調。

大麻仁丸 治腸胃風結。大便常秘。而欲飲食者。

大麻仁

別研如膏

大黃炒各二兩

檳榔

木香

枳殼熟炒各一兩

右爲末。入麻仁。煉蜜丸。桐子大。每服二十丸。溫水下。

皂角丸 治大腸經有風。大便秘結而不堅實者。

皂角妙去

枳殼鐵炒

右爲末。煉蜜丸。桐子大。每服七十丸。空心米飲下。

蘇麻粥 順氣滑腸。用紫蘇子、麻子仁。水研取汁。煮粥食之。

潤腸丸 治伏火風熱。大腸乾燥。若因失血。或因腎虛。當滋腎水。最忌此丸。

麻子仁

桃仁去皮尖另研各一兩 羌活

當歸尾

大黃煨

皂角仁 秦艽各五錢

右另研爲末。煉蜜丸。每服五十丸。空心白湯送下。如直腸乾澀。用猪膽汁導之。

亦忌前藥。

附方

加味逍遙散

八珍湯二方見二十四卷第四論

補中益氣湯

四物湯

四君子湯三方見二十四卷第六論

竹葉石膏湯方見二十四卷第三論

小柴胡湯

方見二十四卷第三論

清胃散方見二十四卷第一論

瘡科竹葉黃耆湯方見二十四卷第四論

婦人老弱風人便秘戒用利藥方論第七