

上海市中医文献研究馆丛刊

# 临床心得选集

第一輯

上海市中医文献研究馆 編著



样 本 库

上海市中医文献研究馆丛刊

# 临床心得选集

第一輯

上海市中医文献研究馆 編著

22164/28



53143

上海科学技术出版社

## 內 容 提 要

本书选集上海市中医文献研究館館員——老中医們的部分医案和医話，分为上下两卷。

医案計 100 篇，包括內、外、妇、儿、咽喉、五官諸科，都是老中医的临床記錄，虽經其門人整理，但未加潤飾，保存了原来面目，在字里行間，可以看出辨証立法之微旨。医話計 50 篇，或由老中医自撰，或由其門人笔录，涉及范围較广，有学理的钻研，有治驗的回忆，也有方药的探討。这些都是老中医們有关临床方面累积的心得。

本书可供临床医师参考，并可作医学生临床实习时的輔助讀物。

上海市中医文献研究館丛刊

临床心得选集（第一輯）

上海市中医文献研究館 編著

---

上海科学技术出版社出版（上海瑞金二路 450 号）

上海市书刊出版业营业許可証出 093 号

---

上海市印刷五厂印刷 新华书店上海发行所发行

---

开本 787×1092 1/32 印张 8 排版字数 174,000

1965年 1 月第 1 版 1965年 1 月第 1 次印刷

印数 1—23,000

统一书号 14119·1183 定价(科六) 0.65 元

## 前 言

我館全体老年中医,在党的正确領導之下,认真学习了党的中医政策,明确了工作方向。因此,几年来各位老年中医都以真心誠意的态度,献出了自己的經驗心得。

1961年根据我館工作规划,提出向老年中医征集点滴經驗的要求,即由各位老中医先后交来不少医案、医話。其中有通过临床的治案,有理論研究的著述,有药物应用的探討。虽为片断之作,然均为我館老年中医从多年实践中得来的宝贵經驗。茲經酌加整理,附以按語,編纂成册,以供同道参考。同时,亦可看出各人学有师承,但也不免有偏执之处,尙希海內賢达,給予批評和指正。

上海市中医文献研究館

1963年9月

# 目 录

## 上卷 医 案

|             |           |             |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 类中风·····    | 张贇臣( 1 )  | 血証治案·····   | 刘少方( 34 ) |
| 类中风·····    | 郭柏良( 2 )  | 咯血冲溢·····   | 葛养民( 35 ) |
| 风 痿·····    | 李卓英( 4 )  | 长期便血·····   | 沈梦廬( 36 ) |
| 春温挟食·····   | 尹仲选( 5 )  | 便 血·····    | 方行維( 37 ) |
| 秋 燥·····    | 刘鏡湖( 6 )  | 痰飲气喘治案····· | 尹仲选( 39 ) |
| 温病便血·····   | 顾渭川( 7 )  | 痰 飲·····    | 郭柏良( 40 ) |
| 温病下血·····   | 张慕岐( 7 )  | 支 飲·····    | 孙汉庭( 42 ) |
| 温病阻經·····   | 沈梦廬( 9 )  | 水 飲·····    | 韓紀臣( 42 ) |
| 风火阻經·····   | 郭柏良( 10 ) | 哮喘治案三例····· | 曹惕寅( 43 ) |
| 三阴瘧疾·····   | 高詠霓( 11 ) | 喘証三例·····   | 方行維( 48 ) |
| 虚阳头痛·····   | 葛养民( 12 ) | 虚 喘·····    | 郭柏良( 55 ) |
| 劳損失音·····   | 张贇臣( 13 ) | 痰喘治案·····   | 葛养民( 58 ) |
| 痰浊阻滯,心阳     |           | 肺 痛·····    | 高詠霓( 59 ) |
| 虚弱·····     | 郭柏良( 16 ) | 风寒痹症·····   | 刘少方( 60 ) |
| 阴虚挟痰·····   | 顾渭川( 19 ) | 风湿痹症·····   | 刘少方( 61 ) |
| 血虚肝逆·····   | 顾渭川( 20 ) | 痛 痹·····    | 卜培基( 62 ) |
| 腎損治案二例····· | 顾渭川( 21 ) | 心痹症治五例····· | 曹惕寅( 63 ) |
| 病后虚損·····   | 卜培基( 23 ) | 腎 痹·····    | 刘少方( 73 ) |
| 风痹虚劳症治····· | 张汝伟( 24 ) | 足 痿·····    | 郭柏良( 74 ) |
| 咳嗽同病异治      |           | 阳虚浮肿·····   | 郭柏良( 75 ) |
| 五例·····     | 张汝伟( 27 ) | 阳虚浮肿·····   | 刘少方( 77 ) |
| 喘嗽吐血·····   | 顾渭川( 30 ) | 周身浮肿·····   | 金翰章( 78 ) |
| 咳嗽吐血·····   | 刘少方( 31 ) | 肿 胀·····    | 刘少方( 79 ) |
| 肝旺吐血·····   | 曹惕寅( 32 ) | 单腹胀·····    | 郭柏良( 80 ) |
| 吐血治案·····   | 沈梦廬( 33 ) | 单腹胀·····    | 曹惕寅( 81 ) |

|          |          |            |          |
|----------|----------|------------|----------|
| 黃疸治驗二例…… | 曹惕寅(84)  | 血崩……       | 曾子明(120) |
| 陰黃症……    | 卜培基(87)  | 帶下如注……     | 張慕岐(121) |
| 怔忡……     | 劉少方(88)  | 惡露不行……     | 卜培基(121) |
| 失眠……     | 郭柏良(89)  | 產後血瘕……     | 張汝偉(122) |
| 失眠……     | 方行維(91)  | 前後陰脫……     | 張汝偉(123) |
| 失眠……     | 高詠霓(92)  | 麻疹治案……     | 高詠霓(124) |
| 高年好眠舍症从脉 |          | 麻疹后腫脹……    | 高詠霓(125) |
| 治案……     | 張汝偉(93)  | 頓咳治驗……     | 張贊臣(126) |
| 癲狂症治驗……  | 方行維(94)  | 急惊厥閉二例……   | 竇雄伯(127) |
| 肝郁胃痛昏厥   |          | 虫積腹痛……     | 劉少方(129) |
| 治案……     | 張贊臣(96)  | 疳痢……       | 竇雄伯(130) |
| 脘痛氣結……   | 張汝偉(101) | 小兒痿躄……     | 李卓英(131) |
| 胃氣……     | 卜培基(102) | 疳腮治例……     | 張汝偉(132) |
| 呃逆治驗……   | 曹惕寅(103) | 腦后發治案……    | 黃寶忠(133) |
| 連声呃逆……   | 李卓英(105) | 面顴疔走黃……    | 顧筱岩(135) |
| 嘔吐反胃……   | 陳樹修(105) | 乳癖治案……     | 顧筱岩(138) |
| 五更瀉……    | 高詠霓(107) | 乳癌治案……     | 黃寶忠(140) |
| 脾腎便泄兼感冒  |          | 流痰治驗二例……   | 黃寶忠(141) |
| 治案……     | 張贊臣(107) | 濕痰流注……     | 劉少方(145) |
| 痢疾……     | 劉少方(111) | 臍漏……       | 方行維(146) |
| 遺溺……     | 郭柏良(112) | 血風瘡……      | 倪文鼎(147) |
| 小便艰澀……   | 張慕岐(113) | 重舌症治……     | 張贊臣(148) |
| 虫積月經不調…… | 張慕岐(114) | 白喉后遺症——舌麻、 |          |
| 痛經……     | 郭柏良(115) | 声啞、項強……    | 張贊臣(150) |
| 經閉治案……   | 沈夢廬(116) | 耳痛流膿……     | 劉少方(152) |
| 肝郁經閉……   | 金翰章(117) | 目掣……       | 劉少方(153) |
| 室女經閉……   | 高詠霓(117) | 凝脂醫症治效……   | 劉少方(154) |
| 血崩治案……   | 高詠霓(119) | 瞳人散大症……    | 劉少方(155) |

## 下卷 医 話

阴阳五行学說在外科临床

上的运用…………… 张贊臣(157)

肠 痛…………… 张贊臣(162)

白蜡柿餅煎治久痢

脱肛…………… 张贊臣(164)

漫談大头瘟之

治疗…………… 顾筱岩(166)

疔腮証治…………… 顾筱岩(167)

乳部疾病談…………… 顾筱岩(168)

穿骨流疽…………… 顾筱岩(175)

委中毒的病因及

治疗…………… 顾筱岩(176)

治疗偏对口的家传

外用驗方…………… 杨光泽(177)

降药治疗梅毒性

流疽…………… 傅晋康(178)

环跳疽之症治…………… 黄宝忠(180)

鮮藕白果治足肿… 黄宝忠(182)

对于脉診中脏腑分配

的一点体会…………… 向迪琮(183)

論中风…………… 向迪琮(190)

阳虛伏飲…………… 曹惕寅(195)

呕吐治驗三例…………… 曹惕寅(196)

遍身浮肿治效方… 濮起元(198)

胃风与胃寒…………… 郭柏良(198)

回忆大头瘟治驗… 郭柏良(200)

流火风…………… 方行維(200)

产后瘰病治驗…………… 方行維(202)

羚羊、附子在临床上同时

并用的功效(附病案四

例)…………… 方行維(203)

伏气温病的治疗

经过…………… 张慕岐(207)

增液救津药治

心得…………… 张慕岐(209)

急 喘…………… 张慕岐(210)

芥喱鸡治愈虛

喘咳…………… 张慕岐(211)

水肿治例二則…………… 张慕岐(212)

胃痛临証一得…………… 张慕岐(213)

白崩之治…………… 张慕岐(215)

癥癖一方…………… 张慕岐(215)

咳嗽气郁治案…………… 张汝伟(216)

胃痛有积…………… 张汝伟(217)

泄泻論治…………… 张汝伟(218)

治疗經閉的体会… 张汝伟(219)

龙胆泻肝湯的

效用…………… 张汝伟(221)

肝胃痛…………… 葛养民(223)

产后阳明实症…………… 葛养民(223)

經閉病因談…………… 沈梦廬(225)

論妊娠恶阻…………… 崔灼三(225)

胎 漏…………… 高詠霓(230)

产后用白虎湯…………… 李卓英(231)

儿科辨証法…………… 李卓英(231)

耳病論…………… 刘少方(233)

热带盛产之胡椒、丁香、

檳榔、肉豆蔻的药用

价值…………… 肖范群(234)  
巴豆生猛熟緩,能行能止  
(說药之一)…… 赵景生(236)  
菖蒲(大叶菖蒲)与蒲黄  
有异曲同工之处 (說  
药之二)…………… 赵景生(239)  
穿山甲与地榆用于內  
治与外治发生两种  
不同的作用 (說药  
之三)…………… 赵景生(240)

植物食油——麻油、菜  
油、豆油、花生油、茶  
油同有清肠、解毒、  
散結、除虫的功用  
(說药之四)…… 赵景生(242)  
动物胆的功用(說药  
之五)…………… 赵景生(243)  
土茯苓治脑毒瘤有奇效  
(說药之六)…… 赵景生(246)



## 上卷 医 案

### 类 中 风

张 贊 臣

予之孀母徐氏霞玲，年近古稀，向患高血压病（血压最高曾至 240/120 毫米汞柱）。1961 年春季，曾昏仆一次，左侧手足不利，經針灸与中药治愈。1962 年 11 月 24 日，又突然暈倒，人事不省。及余至，见人已稍苏，但不能言語，口角流涎，手足微微掣动，以手按左額，似有头痛之状，面色潮紅。診脉弦滑而有促象；舌质紅，苔干黄。断为中风証，痰热蒙蔽清窍，遏阻于手足厥阴之經所致。患者年事已高，又复二次卒倒，病势重篤，幸尙无遺尿屎之现象。

〔方案〕 类中风突然昏仆，不省人事，头痛，左面頰麻痺，言語蹇澀不利，胸悶，口角流涎。脉象弦滑而促；舌质紅，苔干黄。痰热蒙蔽，遏于手足厥阴心肝两經。症情頗重，防其变端。

处方：明天麻錢半 炙僵蚕三錢 白蒺藜三錢（去刺）  
石决明一两 珍珠母一两五錢（以上二味先煎） 生白芍三錢  
鈎藤三錢 广郁金錢半 蝎尾八分 九节菖蒲一錢 丹皮三錢 天竺黄錢半

翌晨往視，神志尙未清晰，故于原方中加牛黄清心丸一粒化服。服后粘痰甚多。一夜后，神志轉清，知饥餓，略能言語而口齿未清。自訴左侧額部疼痛。脉来不靜，仍帶促象；舌质虽紅，但津液稍回。惟大便三日未解。仍从原意加生薑皮仁以潤肠。二剂后，腑气得通，手足掣动已定，言語亦清；但仍感头

目昏暈，肘肩痠麻，左面頰肌肉不仁，胸悶心慌，小溲灼熱。脈象較為平靜。故于前方中去蝎尾，加決明子、絲瓜絡以清熱祛風通絡。自后症狀日益輕減，調治旬余，眠食恢復正常，歸常州故里休養。臨行時勸她慎起居，調飲食，節喜怒，善自珍攝。此病二次卒倒，一般預后不良，今得轉危為安，亦云幸矣。

按 中風一証，有真中、類中之分，而類中之証，雖古人有火亢、痰濕、氣虛之說，但在臨証之時，主要須分虛實。如面色紅，舌質紅，苔干黃，脈來弦滑而搏指者，為實；面色白而無華，舌質如常或較淡，或苔渾膩，脈雖弦而重按無力，或帶細澀者，為虛。實者大都為肝陽旺，痰熱勝；虛者往往是腎陰虧，兼夾痰濕。實者來勢雖凶，如病者體質尚好，處理得當，尚可挽回；而虛者以本元已虧，往往卒倒之后，証見撒手遺尿，難于復生。治療方法，兩者亦不同：實者平肝清痰熱；虛者先宜益氣和血，繼以補益腎陰。在昏迷不醒時，實熱者用牛黃清心丸以清心開竅，閉者却用蘇合香丸芳香啟閉。家燦母之証，屬于實証範疇，因此重用平肝清鎮如石決明、珍珠母等；又因痰多語蹇，故用天竺黃、廣郁金、菖蒲化痰熱、開清竅；因其頭痛甚劇，故用天麻、鉤藤平熄上亢之肝陽；以其舌質紅，知血分內熱甚熾，故用白芍、丹皮清血益陰；手足掣動乃內風不潛，故又佐以蝎尾、僵蚕以熄風，此兩味一般僅知能熄外風，但在我臨床經驗中，對在風陽內動之証，往往輕者用僵蚕，重則用蝎尾，都有顯著療效。

本例主要是肝旺氣逆，痰熱蒙蔽心竅，風動而血上菴所致，故投平肝熄風、鎮逆清心、滌痰泄熱等法而挽回危局。

（陳之才、尹勝泉整理）

## 類 中 風

郭 柏 良

胡××，女，81歲。

〔初診〕 1961年4月4日。頭暈目眩，偏右手足麻木不仁，夜寐不安，惟語言尚清，舌苔白膩，脈象弦滑（收縮壓240

毫米汞柱)。此乃血不养肝，风阳上扰，痰火蕴伏所致。治与平肝熄风，益气安神。

处方：左金丸八分(开水另吞) 移山参錢半 炙黃芪三錢 土炒白朮三錢 云茯苓三錢 煨天麻錢半 煨決明五錢 煨牡蠣一兩 五味子八分 淮小麥一兩 干菖蒲錢半(后下) 淡萸蓉三錢 龍眼肉三錢 老鉤藤三錢(后下) 水煎服。

〔复診〕 4月10日。服藥后諸恙如前，右肢體麻木無力。舌白厚膩，脈象左關弦而有勁。足証肝陽上扰未熄，仍与前法治之。

处方：左金丸七分(开水吞) 移山参二錢 煨天麻錢半 干菖蒲錢半 炒白芍三錢 熟枣仁四錢 炒竹茹錢半 炙黃芪三錢 朱茯神三錢 煨決明五錢 煨牡蠣一兩 夜交藤四錢 龍眼肉三錢 水煎服。

〔三診〕 4月12日。連投平肝益氣，風陽上扰未平，心營衰弱，夜不安寐。舌仍白膩，脈象弦滑。高年氣血兩亏，慎防偏廢。拟与大剂益氣養營扶陽。

处方：移山参二錢 左金丸七分(开水吞) 炙黃芪三錢 制附塊錢半 淡干姜七分 熟地炭四錢 五味子一錢 東白芍錢半 夜交藤四錢 熟枣仁三錢 煨牡蠣一兩 老鉤藤四錢(后下) 朱茯神錢半 生白朮三錢 水煎服。

〔四診〕 4月14日。投大剂益氣養營扶陽之剂，風陽漸平(經西醫檢查血壓，收縮壓由240降至180毫米汞柱)，頭暈大減，右肢體麻木亦較輕；惟心營仍然衰弱，夜寐時有驚醒，乃陽不入于陰，而有此現象。拟与陰陽雙調。

处方：左金丸六分(开水吞) 炙黃芪三錢 移山参二錢 黃精三錢 制附塊二錢 熟地炭四錢 五味子一錢 東白芍

錢半 菟絲子三錢 夜交藤四錢 熟棗仁三錢 合欢皮四錢  
煨牡蠣一两 朱茯神二錢 水煎服。此方服后，囑常服九制  
豨薟丸，每日服四錢，開水送下。

按 高年氣營兩虧，木失涵養，致肝陽上擾清空而頭暈目眩；氣虛  
血行濡滯，致肢體麻木。治宗經旨，補不足而瀉有餘，使肝火平抑，陽入  
于陰，則頭暈自和，寐亦得安；氣旺營調，則血得行而風自滅，肢體不仁  
亦愈矣。

## 風 癱

李 卓 英

譚××，女，36歲，××醫院住院。

〔初診〕 新產失血，旬日乃發風癱。角弓反張，眩厥肢  
搐。脈弦緊數；舌淡紅，苔黃而白。經謂：“諸風掉眩，皆屬於  
肝”。病屬厥陰，為外風引動內風而發。宗《傷寒論》厥陰病治  
法，擬與寒熱并用之劑。

處方：羚羊角錢半 鉤藤三錢 桂枝尖錢半 青蝎梢四  
尾 當歸三錢 白芍二錢 川芎錢半 生地三錢 大黃酒炒  
二錢 木瓜三錢 紅花五分 牛膝二錢 制乳沒各一錢 姜  
汁竹瀝合一杯（沖服） 水煎服。

〔復診〕 前藥服二劑后，肢搐項強均減，神識較清。脈轉  
和平。更方再進。

處方：桂枝尖錢半 羚羊角錢半 炒荊芥錢半 當歸三  
錢 白芍三錢 炙甘草一錢 川芎錢半 桑枝酒炒四錢 秦  
艽三錢 黃芪三錢 蝎梢四尾 水煎服。連服數劑而愈。

按 風癱屬厥陰風木之病。蓋厥陰內寄相火，為半陰半陽之體，治  
法每以寒熱并用。故處方以桂枝、羚羊為主；用四物養血，木瓜柔筋；取  
紅花、制大黃、牛膝、乳沒，通瘀而引熱下行；蝎梢為驅風鎮癱要藥。綜合

全方，有养血平肝，驅風鎮痙，通瘀活血泄熱之功，故能奏效迅速。

## 春 溫 挾 食

尹 仲 選

儲××，男，17歲。

〔初診〕 壯熱形寒，嘔惡腹痛，大便欲下不下，已屆三天。此由初感春溫，又復襲寒，兼挾食滯，寒滯相搏，俗稱夾食傷寒，未可忽視。擬蔥白散加味。

處方：桂枝 枳實各一錢 蔥白尺許 大腹皮 炙雞金 赤苓各三錢 淡豆豉 六曲各四錢 台烏藥錢半 生姜三片 玉樞丹二分研末（開水沖服）

〔復診〕 服藥後，得汗不多，形寒減而身熱如昨，嘔惡止而腹痛較瘥，大便下而不暢，增有咳嗽，頭脹，胸次隱痛。表邪有宣達之機，治以疏解。

處方：大豆卷 白蒺藜 象貝母各四錢 熟牛蒡 萊菔子 大腹皮各三錢 前胡 白前 枳殼 台烏藥各錢半 蔓荊子二錢

〔三診〕 昨得汗頗暢，大便亦通，身熱已微，咳嗽增多，仍有頭脹胸痛。此中焦積滯未淨，風邪痰濁戀肺，再進宣化。

處方：前胡 白前 款冬花（炙） 炒枳殼各錢半 枯蕁仁 象貝母 白蒺藜各四錢 大杏仁 沉香曲（包）各三錢 蔓荊子二錢 焦大麥五錢

〔四診〕 身熱已退，咳嗽較爽，諸恙均減，胃思納食。苔薄白，溲黃短。務須慎食避風，以防復熱。

處方：桔梗 生甘草 川通草各一錢 象貝母 飛滑石 沉香曲各四錢 赤苓 大腹皮各三錢 絲瓜絡錢半 香谷芽五錢

服后又診二三次，即用此方加減而愈。

## 秋 燥

刘 鏡 湖

李××，男。

〔初診〕 素有肺病，近感秋燥，太陰肺經受邪，少陰心經蘊熱，致寒熱無度，口渴引飲，咳喘不已，胃呆納少，間時頭痛，氣機欠和，升多降少。脈細而數，舌色干絳。宜從太陰少陰二經論治。

處方：南沙參四錢 炙前胡二錢 薄橘紅錢半 蘇子霜三錢 桔蘘三錢 冬桑葉錢半 白杏仁三錢 象貝母三錢 炒麥冬三錢 干荷葉三錢 水煎服。

〔復診〕 脈數已減，漸覺弦緩；舌色干絳稍潤。肺經清肅將降，寒熱雖不甚作，納谷甚呆，咳喘有痰，頭痛未蠲，燥熱尚有逗留。再與理肺，佐以宣化。

處方：旋復花錢半(包) 蘇子霜三錢 白杏仁三錢 陳皮二錢 桔蘘三錢 炙前胡二錢 白扁豆四錢 象貝母三錢 焦谷芽五錢 冬桑葉錢半 干荷葉三錢 水煎服。

〔三診〕 知飢能餐，胃氣漸舒，痰出亦松。惟咳喘未已，舌色絳糙，脈尚弦。宜防太陰肺經余邪復燃灼液，仍擬前方加減。

處方：白杏仁三錢 蘇子霜三錢 青蛤散四錢(包) 北沙參三錢 紫菀肉三錢 炙前胡二錢 青防風二錢 象貝母三錢 化橘紅三錢 瓜蘘皮三錢 荷葉絡三錢 水煎服。

〔四診〕 疊進宣肺潤燥，因燥熱相逼，氣失宣降，咳喘頻仍。而今胃氣雖得漸和，痰略見少，奈脈形猶未平，舌絳較淡，太陰肺絡余邪未盡，仍從肺胃二經治之。

处方：叭杏仁三錢 广橘絡二錢 炙白前錢半 玉苏子三錢 紫菀肉三錢 知貝母各二錢 栝萸三錢 炒谷芽三錢 炒米仁四錢 枇杷叶二片(去毛,炙) 大地栗三枚 水煎服。

按 燥气化火,肺阴被伤,处方以桑杏湯为中心,佐以前胡、橘紅、苏子霜、栝萸等理肺化痰,連續三診,均守此法而略有增損;至第四診时酌用谷芽、米仁,扶胃土以养肺金之母,頗为得体。

## 温 病 便 血

顾 渭 川

潘××

〔初診〕 温病热度虽低,轉变肠出血,每日三四次,气喘,头汗冷粘,四肢厥逆,身倦乏力。舌质无营,惨淡晄白;脉象散大。阳随阴脱,勉拟救元为急务。

处方：别直参三錢 野于朮三錢 黄附块三分 清水炙甘草三錢 阿胶炭二錢(炮姜五分同炒成)

〔复診〕 便解溏薄,血少汗斂,四肢轉温。舌淡微紅,脉緩无力。阳随阴亡稍回,拟守原方加生黃芪五錢,北五味一錢。

按 此为温病便血坏症,有阳随阴脱之危,故以救阳为急务。次診仍用原方加五味、黃芪,陷者举之之义也。連服三剂,血止,喘平,胃甦。調理半月全愈。

## 温 病 下 血

张 慕 岐

曹××,女,17岁,中学生。

〔初診〕 高热便下紫血,脉数腹滿,小便尙畅。舌质絳,中黃膩。某医云:是肠出血,症情急。但参之脉症,乃属阳明蓄血,应攻下而不宜止血。盖血瘀內滯,則变生不測,拟桃核

承气法治之。

处方：生大黃三錢 制川朴一錢 炒枳壳二錢 芒硝三錢(冲服) 桃仁(打)三錢 丹皮錢半 赤芍三錢 杜紅花一錢 水煎服。

〔复診〕 便血有紫有鮮，腹滿漸舒。质弱热盛，不宜再攻，攻則血室空虛，邪乘虛入，反将延成热入血室之症。茲拟退热泄邪，冀外达少阳之枢机而轉出。

处方：葛根錢半 柴胡一錢 黃芩一錢 天花粉三錢 炒牛蒡子三錢 苦桔梗一錢 丹皮錢半 石膏五錢 連翹二錢 水煎服。

〔三診〕 前剂服后得汗甚多，胸次布滿白痞，色不甚明，但身热已有起伏，脉数中已有弦意，口仍渴，耳微聾，邪达少阳之象果见。病已旬余，气营有亏，正已虛而邪未尽，姑拟标本兼顾治之。

处方：炙柴胡八分 黃芩一錢 仙半夏二錢 炒党参二錢 鮮生地五錢 豆豉三錢(二味同打) 花粉片三錢 連翹三錢 熟牛蒡二錢 粉丹皮一錢 青蒿子一錢 水煎服。

〔四診〕 身热时作时止，热已不甚，痞布更多，色仍不潤，但未至于枯，总是正虛。脉細数，左略弦；舌膩已化。細酌症情，邪占其三，而虛占其七，治之当准此为例。

处方：鮮沙参三錢 金石斛三錢 炒知母三錢 黃芩一錢 炒党参三錢 柴胡八分 前胡一錢 青蒿子一錢 白薇二錢 生米仁四錢 生谷芽四錢 水煎服。

〔五診〕 昨方服后，頗见效益，身热仅有微发，痞色較潤。顾本达邪之法，已奏肤功，当循原意增損。

处方：鮮沙参三錢 炒党参三錢 当归身三錢 細生地三錢 花粉片三錢 白薇三錢 青蒿子一錢 知母三錢 丹



皮一錢 竹茹錢半 水煎服。

〔六診〕 兩進扶正，身熱尚有微發，虛而未致于衰弱，不必多慮。須知此症如熱退迅速，則正元之衰退可復，所謂逆流必須挽舟。再循原意，冀其早占勿藥。

處方：黨參三錢 北沙參三錢 當歸身三錢 炙鱉甲四錢 青蒿子一錢 黃芩一錢 知母三錢 天花粉三錢 茯苓三錢 遠志肉一錢 炒棗仁錢半 水煎服。連服三劑。

〔七診〕 身熱已退盡，痞已回隱。昨曾暢解大便一次，且得安寐甚酣。脈搏漸和，胃納亦可。症已向愈，今後只須調理。

處方：黨參三錢 炒于朮錢半 茯苓三錢 當歸身三錢 大生地四錢 制首烏三錢 金毛脊三錢 炙甘草五分 鮮佛手一錢 香谷芽三錢 水煎服。此方間日服一劑，可連服十劑。

按 熱病至便血，病家每多恐慌。醫家遇此，亦當詳細診察，有瘀當攻，有熱當清。此症腹滿小便自利，蓄瘀已明，故用攻下。然下後熱不解，乃表症猶存，不可再攻，當從和解。和解後見痞色暗，是虛也。屢進扶正育陰以達邪，邪得正氣之助而外化。中途其家長以微熱不退，恐不宜再補，有所顧慮，經以扶正即所以退熱之理告之，仍循原法處方，得收全效。此症系虛實并見，處方用藥，自宜詳審明辨，勿為病家所惑。

## 溫病阻經

沈夢廬

王××，女，33歲。

〔初診〕 素患怔忡，體不甚健。近感外邪，形寒形熱而無汗，頭痛甚劇，煩躁不寐，神昏譫語。脈弦數，舌灰黃。症屬溫熱，邪不外達，將從內陷。且適當經事臨期，行而即止，深慮熱入血室。急宜宣邪退熱，佐以清心。