

婦科醫案



样 本 库

妇 科 医 案

刘洪祥 编著

YX158/03



山东科学技术出版社

一九八六年·济南

1152706

责任编辑 王道隐

妇 科 医 案

刘洪祥 编著

山东科学技术出版社出版

(济南市南郊宾馆西路中段)

山东省新华书店发行 山东人民印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 8.375印张 192千字

1986年4月第1版 1986年4月第1次印刷

印数: 1—10,600

书号 14195·229 定价 2.00 元

前 言

妇科，是祖国医学四大科之一。自明清以来，将妇人杂病科与产科合并为妇人科，统称为女科或妇科。历代医家有关妇科的著述颇多，如明代《女科撮要》、《女科准绳》；清代《傅青主女科》、《女科经纶》、《女科辑要》、《妇科玉尺》、《妇科心法》等等。但这些专著，多偏重于理、法、方、药之阐发，或对经、带、胎、产诸疾之诊疗大法的论述，而以临床医案为主要内容者却不多见。

为继承、发扬祖国医学遗产，笔者根据学习历代有关著述与临床实际相结合的心得体会，将1973~1979年所积累的临床资料，认真分析研究，筛选了疗效好、记录完整的典型病案230余例，编著了这本《妇科医案》。

本书所载病案，多为临床上常见的经、带、胎、产诸疾与一般妇科病变。但对妇女易患之疾并发妇科病，或在行经、妊娠、产后兼患之杂证的典型案例，亦适当选载。可供广大中医及西学中临床医生参考。

本书在编写过程中，得到山东省出版总社泰安分社的大力支持，蒙山东中医学院徐国仟教授、张珍玉教授及泰山医学院赵铭绅主治医师审阅，并提出宝贵意见，特此一并致谢。

由于水平所限，经验不足，书中定会存有缺点错误。希望同道批评指正。

刘洪祥

一九八四年十二月于山东省
泰安市儿童医院

目 录

一、月经病	1
(一) 经期不准 (13例)	2
1. 月经先期 (3例)	2
2. 月经后期 (6例)	5
3. 月经前后不定期 (4例)	13
(二) 闭经、血量过少 (5例)	17
(三) 经期鼻衄、肺胃火盛 (4例)	22
(四) 经前烦热 (经前期紧张综合征 5例)	27
(五) 绝经前后诸症 (更年期综合征 6例)	33
(六) 痛经 (32例)	40
1. 原发性痛经 (12例)	41
2. 继发性痛经 (20例)	53
(七) 崩漏 (38例)	77
1. 青春期崩漏 (6例)	78
2. 生育期及哺乳期崩漏 (6例)	84
3. 绝经前崩漏 (3例)	93
4. 产后崩漏 (11例)	97
5. 流产后漏下 (6例)	112
6. 避孕所引起的崩漏 (6例)	119
二、带下病	126
(一) 脾虚湿盛证 (4例)	127

(二) 湿兼血瘀证 (6 例)	130
(三) 湿热下注证 (6 例)	138
(四) 寒湿过盛证 (5 例)	145
(五) 肝脾郁热证 (4 例)	151
(六) 郁热伤阴证 (3 例)	155
三、妊娠病	162
(一) 妊娠呕吐 (6 例)	162
(二) 妊娠期鼻衄 (1 例)	169
(三) 连续早产死婴 (1 例)	170
(四) 妊娠早期胎漏 (1 例)	172
(五) 妊娠期胃脘痛 (2 例)	173
(六) 妊娠期腹痛 (3 例)	175
(七) 胎伤腹痛 (先兆流产 2 例)	178
(八) 早产、习惯性流产 (2 例)	180
(九) 晚期妊娠抽搐症 (1 例)	183
(十) 妊娠期舞蹈病 (1 例)	184
(十一) 妊娠肿满 (2 例)	185
(十二) 子嗽 (妊娠咳嗽 2 例)	186
(十三) 子淋 (妊娠期尿路感染 4 例)	188
(十四) 子烦 (妊娠期烦乱症 1 例)	192
四、产后病	195
(一) 产后眩晕 (1 例)	196
(二) 产后头痛 (4 例)	197
(三) 产后大便难 (1 例)	202
(四) 产后腹泻 (3 例)	203
(五) 产后发热 (1 例)	206

(六) 产后虚烦 (2 例)	209
(七) 产后咳嗽胸痛 (1 例)	210
(八) 产后腰痛 (3 例)	212
(九) 产后身痛 (3 例)	215
(十) 阴痔 (阴道壁膨出与子宫脱垂 2 例)	218
(十一) 产后癃闭 (1 例)	220
(十二) 流产后少腹痛 (3 例)	221
五、乳疾	226
(一) 乳汁不通 (3 例)	226
(二) 乳汁不足 (2 例)	229
(三) 产后乳痛 (急性乳腺炎 3 例)	231
(四) 乳痛手术后刀口不愈 (1 例)	234
(五) 乳痛肿痛不散 (1 例)	235
(六) 乳中结核 (囊性乳腺病 4 例)	236
六、不孕症	240
(一) 原发不孕 (5 例)	240
(二) 继发不孕 (2 例)	247
七、其他杂证	251
(一) 眩晕症与月经紊乱并发 (1 例)	251
(二) 肝火头痛 (高血压病 1 例)	252
(三) 风热头痛经期发作 (鼻渊 1 例)	254
(四) 痰厥后发热 (高烧 1 例)	255
(五) 妊娠后遗腰腿痛 (坐骨神经痛 1 例)	257
(六) 绝经后黄白带下 (1 例)	258
(七) 阴虚心烦 (植物性神经紊乱 1 例)	259
(八) 产后腹泻经年不止 (2 例)	260

(九) 流产后湿热痢反复发作 (1 例)	263
(十) 妊娠呕吐日久不愈后遗脾胃虚弱症	
(萎缩性胃炎 1 例)	264
(十一) 胃痛呕吐腹泻经久不愈	
(胃肠神经官能症 1 例)	267
(十二) 风疹块 (荨麻疹 2 例)	269
(十三) 皮肤瘙痒症 (1 例)	271
(十四) 经期感冒后遗耳聋	
(鼓膜塌陷症 1 例)	272

一、月 经 病

月经病之范围，极为广泛。所谓月经病，是指经期不准与经血在量、质、色等方面的改变，以及在行经期、经期前后所出现的一些异常现象与感觉。如月经期不准、痛经、崩漏、经闭与经期发生鼻衄，以及经前心烦与绝经前后（更年期）诸症等。

本类病变之病因，虽有内伤七情与外感六淫之别，但其发病，首先在于患者本身之阴阳失调。清·唐宗海在《血证论》中说：“人之一身，不外阴阳，而阴阳二字，即是水火，水火二字，即是气血，水即化气，火即化血。”清·江涵暾说：“妇女以血为主。”（《笔花医镜》）各种生理现象，都是由冲、任、督、带四脉联系到有关脏腑，在以阳统阴，气率血行的基础上所形成的。其中尤以冲、任二脉最为重要。任脉隶少阴，冲脉隶阳明，这两脉直接联络着先天（肾）与后天（脾胃），能调和阴阳、宣通气血，是女性生理活动的重点所在。《素问·上古天真论》说：“女子七岁，肾气盛……二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下。”此外还有“冲为血海，任主胞胎”与“肝主冲任”之说。

病理之形成，有气血失调，脏腑功能失常与冲任损伤三方面。而气血失调，是发病的主要环节；脏腑不和，是气血失调的原因所在。此二者，实有标本相连之关系。冲任损伤则多属病久、积损而成，它既能因虚致病，也能因病致虚。这是月经

病的病理，也是一切妇科病的病理要点。

月经病之治疗，由于各种月经病变有单发者，也有相互兼见者。《女科经纶》说：“妇人有先病而后经不调，当先治病，病去则经自调。若因经不行而后生病者，当先调经，经调则病自除。”所以对月经病的辨证施治，要想取得满意的效果，必须在辨证时，按照各种失常现象与感觉，旁参互证，抓住主要矛盾，以调气血、理寒热（燮理阴阳）为主要法则；在选用方药时，又要结合现症，予以随症加减。

下面所选各种月经病之医案，即以不同病变，在辨证求因的原则指导下，按其主次，依照“治病必求其本”与“药随症转”相结合的方法，运用调气血和阴阳的方药，进行调理。但因脾胃为气血生化之源、冲任二脉隶属于肝肾。所以扶脾益胃、调理肝肾之法，尤为重要。

（一）经期不准（13例）

1. 月经先期（3例）

【病例1】孙××，女，28岁，职工。1978年7月17日初诊。

病史：月经先期，经期腹痛，面部色素沉着三年余。近来上述症状逐渐加重，并伴有腰痛，少腹有下坠感，大便干，小便黄。

月经史：17 $\frac{4}{15\sim 20}$ 天，量一般，血块多。

检查：舌质红，苔薄白，脉滑数。

辨证：肝郁侮脾，疏泄无常而致冲任不固。

治则：泻肝扶脾，生津养血，调理冲任。

方药：以芍药甘草汤加味：生白芍24克，生甘草9克，黄芪15克，丹皮、川楝子各12克，坤草30克，天花粉15克。水煎服。

7月23日二诊：上方连服6剂。月经已23天未行。余同前。舌尖有瘀点，脉滑。调方：坤草30克，泽兰12克，白芍15克，甘草9克，川楝子、丹皮各12克，桑叶、天花粉各9克，丹参24克。水煎服。

9月22日三诊：上方服3剂，此次月经28天来潮，现已血止2天，血量多，腰腹痛较前减轻。舌苔薄白，脉弦数。改用丹栀逍遥散加减：柴胡、芥穗各9克，当归12克，生白芍18克，焦白术15克，生甘草、黄芩各9克，丹皮12克，薄荷9克，连翘24克，土茯苓30克，草薢24克。水煎服。

10月20日四诊：上方连服6剂。面部色素沉着已显著减退，但面部有发胀感。血压140/90毫米汞柱。这可能与甘草之滋补有关，故遵9月22日方去甘草加茯苓15克。服药3剂，药后一切正常。

【按语】此属肝气郁滞之证，日久失治而致肝肾阴虚，脾不统摄，形成疏泄失常、冲任不固。治疗自应从养血育阴以扶脾泻肝着手。

上方中之丹参、白芍、天花粉、丹皮敛阴养血，生津解郁；黄芪、甘草扶脾气；川楝子泻肝气；坤草活血化瘀，以调理冲任。气血调和则冲任固而经血自调。其面部色素沉着，因其与月经先期并见，故以养血疏肝、清热之法而取效。二诊，因其脾气已复而瘀热症状较显，故去芪减芍，又加泽兰、丹参、桑叶以活血散热。三、四诊，则属药随症转，整复肝脾之生理功

能。

【病例2】董××，女，20岁，工人。1975年3月27日初诊。

病史：月经先期，血量多，已三、四年。

月经史： $16\frac{6\sim7}{15\sim20}$ 天，血量多，色黑，行经时伴有少腹疼痛。

近来又加全身酸困无力，故来就诊。

检查：舌红少苔，脉濡数。

辨证：肾气虚热，冲任不固。

治则：滋阴补肾，清热理冲。

方药：知柏地黄汤加减：生地24克，山药18克，丹皮12克，泽泻24克，茯苓、知母各12克，天花粉18克，麦冬12克，台参18克，黄柏12克，五味子9克，焦白术15克。水煎服。

4月15日二诊：服药3剂后，此次月经流血量较少，腹痛消失。继服上方5剂。

5月3日三诊：现已三周未见月经，除觉少腹坠胀、食欲稍差外，余无不适。取六味地黄丸2盒，早晚各服1丸。此后病愈。

【按语】此属先天不足，肾气未充，而致阴虚气弱，冲任不固。今用知柏地黄汤合生脉散加味，有肺肾双补之功。并用六味地黄丸滋补肾阴以善其后。

【病例3】周××，女，25岁，职工。1974年5月7日初诊。

病史：月经先期，面部色素沉着已三年。

月经史： $14\frac{3\sim4}{15\sim22}$ 天，血量一般。自1971年结婚后，经期

不准，尤以夏天为重，经前有腰痛，白带甚多。伴有头晕，四肢不温，食欲差。××医院诊为子宫发育不良（子宫较正常小1/3）。婚后三年未孕。

检查：舌苔薄白，脉细数。

辨证：肾气虚弱，冲任不固。

治则：滋阴益肾，调补冲任。

方药：左归饮随证加减：生地18克，山药24克，五味子12克，丹皮9克，当归12克，川芎9克，生甘草12克，台参24克，枸杞、川断、菟丝子各12克。水煎服。

6月25日二诊：上方连服5剂，此次月经30天来潮，血量较前多，面部色素沉着减轻。按上方加炒枣仁18克（因酸枣仁有滋养心肝之功）。水煎服。

8月24日三诊：上方连服13剂，现已按期（30天左右）行经2次，面部色素沉着已消失。行经时仍有少腹滞痛。近来又因患痢疾而致身体较弱，给调健脾益肾方（从略）5剂。

【按语】上述三例月经先期，例1、例3有面部色素沉着，前者因肝郁，后者因肾虚。肝郁则侮脾，而致脾虚不能统摄；肾虚则不能固藏，而冲任失调。在调理时，一重疏肝，兼以健脾；一重滋肾益气，兼以活血理冲。二者均在经调之后，面部色素沉着也同时消失。可知此症之出现，多与肝肾有关。调治之法，也应从调肝益肾着手。古人有乙（肝木）癸（肾水）同源之说。近代医家谢利恒指出：“治肝病者，必兼滋肾水以培其本，方能奏效。”这些观点对本类病变的调理，确有启发作用。

2. 月经后期（6例）

【病例1】霍××，女，26岁，工人。1974年2月28日初

诊。

病史：结婚四个月，行经一直延后。

月经史：18 $\frac{4\sim 5}{30\sim 31}$ 天，经色略淡，挟有血块。现在每二

个月行经1次，血量与血块均较前多。伴有腰腿酸软无力，食欲差。

检查：舌红少苔，脉细弱。

辨证：肾气虚弱，冲任失调。

治则：滋肾阴，补肾气，调理冲任。

方药：六味地黄汤加减：生地24克，山药30克，丹皮12克，泽泻18克，五味子12克，茯苓15克，台参18克，生甘草15克，炒枣仁18克。水煎服。

3月20日二诊：上方连服6剂，效果显著，月经26天来潮，量较少，色正，持续3天，腹痛轻微。上方缺枣仁加枸杞12克。连服3剂。后又进6剂，停药。

1975年2月14日又诊：自述上病药后即愈，近一年来，月经均正常。今又发现经前乳房胀痛，经期腹痛，血紫块多，量较少。又因久未受孕，经妇科检查为子宫小于正常，且前屈偏左。舌暗淡，脉弦。证属木郁克土，气血失调。拟调肝扶脾方：当归15克，川芎9克，白芍18克，五味子12克，茯苓15克，百合30克，台参24克，焦白术15克，枳壳6克，泽泻18克。连服3剂。

此后又复诊3次，取药9剂，服后病愈受孕。

【按语】月经后期病，除胞宫虚寒与阴虚血滞者外。大都属于肾气不足。此方即六味地黄汤去萸肉加五味子，又加参、草、枣仁，有调补肾气兼理肝脾之功。也是治疗本症常能取效

的方法之一。

【病例2】邢××，女，25岁，工人。1978年6月18日初诊。

病史：月经后期，量少，自觉烦热、全身不舒已年余。自结婚第二年始（去年），全身酸困无力，心烦内热，月经50～90天1次。伴有失眠、食欲差、身瘦，体重自去年至昨天，降低7.25公斤。近半月来，又有低烧，经常在37.5℃左右。

月经史：15 $\frac{7}{28\sim31}$ 天，血量一般，近来逐渐减少，色黑，

现已二月未见。体温37.4℃。

检查：舌红、苔薄黄，脉弦细。

辨证：气阴两伤，虚劳发热。

治则：益气养阴为主。先调脾胃以增进饮食，再退邪热。

方药：六君子、生脉散、增液汤等，随症加减：台参、茯苓、焦白术、橘红、丹参各12克，半夏、甘草、麦冬各9克，元参、生地各30克。水煎服。

6月24日二诊：上药已服6剂。食欲好转，再拟养阴退热方：葛根、元参各24克，土茯苓、党参、黄精各30克，苦参、黄芩、天花粉各15克，白术、麦冬、茯苓、甘草、佛手各9克。水煎服。

7月1日三诊：上方已服6剂，自觉症状均有好转。舌红少苔，脉弦细。调方：葛根、生地、元参、土茯苓、黄精各30克，苦参、丹参、生白芍各15克，麦冬、黄芩各12克，甘松9克。连服3剂。

7月5日四诊：低烧退约一周。当前体力好，食欲增，自觉已有行经前症状。舌红少苔。再予养血调经方：台参、黄精、

黄芪、元参各30克，丹参、生地各15克，半夏、橘红、麦冬、甘草、茯苓各9克，坤草15克。连服3剂。此后又服药6剂，月经按期而症状消失。

【按语】此即古人所谓之“虚劳证”。当以阴虚发热者为多见，气阴两伤而发热者，较为少见。此例患者之形体消瘦，面色㿔白，月经稀发、量少，以至月经闭止。又加身热不退，原因不明已半月多。再结合舌诊与脉象，审系气阴两伤无疑。给服六君子汤合增液汤6剂，食欲好转；又加苦寒甘凉之解热生津剂，连服6剂后烧退。再随症加减，予调补气血之剂，连服9剂，经血行而诸症消失。综此治疗过程，有补有泻，也有补泻兼用，总以增进饮食，促进气血生化之源为要务。因为气血得复则经血自调。

【病例3】刘××，女，27岁，工人。1975年11月1日初诊。

病史：经行后期，量少。伴有身倦无力，已二月余。发病于1973年因分娩时羊水栓塞，流血过多之后，逐渐后期。今又间隔七个月才行经1次，血量少，色淡质稀。伴有恶心不欲食，精神不振，脱发，畏寒，睡眠多梦等。

月经史： $18\frac{3}{27\sim30}$ 天，自分娩大流血后，月经一直不正

常。末次月经于9月22日干净。

检查：舌淡、苔薄黄，脉沉细而弱。

辨证：脾肾不足，元阳衰微。

治则：温补脾肾，扶阳益气。

方药：四君子汤加味：台参30克，熟地18克，山药24克，茯苓15克，焦白术12克，生甘草15克，肉桂9克，炮附子12克，

益智仁9克。水煎服。

11月10日二诊：服上药3剂后，自觉症状良好。原方继服6剂。

11月16日三诊：服完上药后，面目、四肢轻度肿胀，体力较好。原方加泽泻24克。取5剂，隔日服1剂，低盐饮食。此后又来取药5剂，服后月经正常。

【按语】此例以经血的量、质、色至症状脉象，均说明是脾肾两虚之症。四君子汤加熟地、山药补脾肾之阴；附子、益智仁补脾肾之阳；更有肉桂温经助阳以通调血脉。此外，重用甘草，大有调补三焦元气之功。但据古人多以炙甘草入温补剂，今则生用，取其平补而协调诸药。又据外地经验，对因产后失血而导致肾阳衰微，月经稀发量少，以至闭经者，用较大量的生甘草配合人参（常以台参代替）煎服，确有效益。唯有引起浮肿者，当配茯苓、泽泻以佐之。或适当减轻生甘草之用量（能潴钠、升压）。

对此例之调理，即按补后天，养先天，脾肾双补之法。张景岳在《妇人规》中说：“调经之要，贵在补脾以资养生血之源，养肾气以安血之室。知斯二者，则尽善矣。”由此即可验证。

【病例4】曹××，女，30岁，工人。1974年3月29日初诊。

病史：月经后期，量少，自第三胎（双胞胎）产后，已有年余。

月经史： $14\frac{4\sim5}{29\sim31}$ 天，血量一般，前两胎产后即按月行经。

现在每40~50天行经1次，量甚少，色淡。经后全身疲乏无力，