

續名醫類案



样 本 库

清·魏之琇 編著

續
名
醫
類
案

1072111

人民衛生出版社影印

yh150/15



内 容 提 要

《续名医类案》是清代魏之琇编著，是为续补明代江瓘及其子所编《名医类案》而作。

本书共三十六卷，分三百四十五门，主要内容是集录清初以前历代名医治病的验案，包括伤寒、温病、虚损、癆瘵、癰疽、肿胀、淋浊、癲狂、惊痫以及妇儿、五官等类病证，书中所载病案，往往一病数例，使读者更能明了各病的变证以及相应的治疗方法，所以本书对学习研究古代医学家治病经验，颇有阅读价值。

本书的另一特点是关于温热病的病案记载十分丰富。

今据信述堂藏板影印。

续 名 医 类 案

清·魏之琇 编 著

人民卫生出版社影印

(北京市崇文区天坛西里10号)

中国建筑工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本 59印张 4插页

1957年4月第1版第1次印刷

1982年2月第1版第2次印刷

印数：5,901-20,300

统一书号：14048·1017 定价：9.00元

出版者的话

中国医药学是一个伟大的宝库。为了继承发扬这份文化遗产，过去我社影印、排印出版了一批历代中医典籍。由于当时发行数量较少，以后又很少重印，许多书在社会上早已很难看到了。

随着我国卫生事业的发展，临床、教学、科研人员要求阅读历代医学原著的呼声越来越高。为了满足国内外广大读者的需要，遵照卫生部关于有计划地整理出版中医药古代书籍的指示精神，我社特选择历代有代表性的中医名著，进行校勘、句读，出版发行。

应该指出，历代中医古书中，有些现代科学尚不能解释的问题，或因受历史条件的限制夹杂了一些不当的内容，希望读者以辩证唯物主义的观点，正确对待，认真研究它的理论和经验，用科学方法进行整理和提高，发掘宝藏，吸取精华，推动中医这门科学的进一步发展。

人民卫生出版社

重刻續名醫彙纂序

醫之有書如史之有傳不僅為醫者傳也攷諸史有方術傳醫列其中注詳叙其人而方術願昭焉體例宜尔也自宋張果作醫說十卷始論列古今諸醫考其得失矣有明江瓘父子撰名醫類案十二卷凡二百五門往古治驗方論多所摭拾每附評隲於下辨謬亦頗允

洽故得薛氏醫案石山醫案同為國朝子部所收乾隆中浙人魏玉衡以醫名病其未備也廣為續名醫類案六十卷江書所漏補載不少而明以來事為尤悉難採摭繁富不免蕪穢而援摭既多變證咸備堪資考核條下附注詳正尤詳實之稱黃岐之功臣青囊之盛業初得徵歛以文刊行之不

胥而走者百餘年兵火後版不存藏是書者且罕矣 茲以舉觀察耽書史善校讐心精力果雅與知不足齋主人埒自來粵東所藏訖既士林輝光治諸之書靡不精刻而廣布茲更以活人壽世書重付剞劂其宏濟為何如哉書將成特以後序見謏猷不文何足敘是書願於醫則當從事焉竊謂史以

祐始濟醫以壽死生皆用以治人而非徒記姓名之學也取精華弃糟粕審擇而善學之醫何為獨不然若第論醫之為道則杭堇浦余秋室兩先生固言之詳且盡矣

光緒十二年歲在丙戌皖汪潘駿猷并書於嶺西官廨



重刻續名醫案序

醫之有書也。其有傳不傳。為醫者傳也。攷諸史。有方術傳。醫列其中。詳敘其人。而方術。則略焉。體例宜也。自宋張果作醫說十卷。始論列古今諸醫。考其得失。有明江瓘父子撰名醫類案十二卷。凡二百五門。往古治驗。方論。多所摭拾。每附評議。於下。辨謬。亦頗允洽。故得。薛氏醫案。石山醫案。同為國朝。子部所收。乾隆中。浙人魏玉衡。以醫名。病其未備也。廣為續名醫類案六十卷。江書所漏。補載不少。而明以來。事為尤甚。難採摭繁富。不免蕪穢。而摭既多。變證咸備。堪資考核。條下附注。詳正。尤詳實。足稱黃岐之功。臣青囊之盛業。初得徵歛。能以文刊行之。不

胥而走者百餘年。兵火後。板不存。藏是書者且罕矣。彭小舉觀察。耽書史。善校讐。心精力果。雅與知不足齋主人。埒自來。粵東所藏。沾溉士林。輝光治譜之書。靡不精刻。而廣布。若更以活人壽世。書重付剞劂。其宏濟為何如哉。書將成。特以後序見諒。獻不文何足敘。是書願於醫。則當從事焉。竊謂史以

祐始濟。醫以壽死生。皆用以治人。而非徒記姓名之學也。取精華。棄糟粕。審擇而善學之。醫何為獨不然。若第論醫之為道。則杭堃浦。余秋室。兩先生固言之詳且盡矣。

光緒十二年歲在丙戌。皖涇潘駿猷并書於嶺西官廨。



續名醫類案目錄

錢塘魏之琇撰 後學豫章張用賓麗軒重校

第一卷

傷寒

第二卷

中寒

第三卷

瘧

溫病

第四卷

傷風

熱病

第五卷

疫

第六卷

惡寒

瘧

第七卷

泄瀉

第八卷

痢

第九卷

飲食傷

赤丹

第十卷

癰疽

內傷

第十一卷

虛損

第十二卷

吐血

溺血

第十三卷

癰瘰

腫脹

第十四卷

膈

喘

第十五卷

汗

瘰癧

消

黃疸

痞

鬱症

勞瘵

衄血

下血

痿

痛痺

諸氣

呃逆

咳嗽

第十六卷

痰 飲 吞酸餒雜

頭 眉髮鬚 面

第十七卷

目 耳 鼻

口 唇 齒

第十八卷

舌 咽喉 瘡

心胃痛 脇痛

第十九卷

腹痛 腰痛 前陰古今醫案陽痿入此門

鶴膝風 腳氣 足跟腫痛

第二十卷

遺精 淋濁 疝

小便秘 小便不禁附類數遺溺 大便不通

第二十一卷

驚悸 顛狂 癇

哭笑 不眠 跌撲

鯁刺

第二十二卷

蠱 諸蟲 虺證

中毒 丹石毒 邪祟

奇疾 飛尸 詐病

鍼灸刺砭 色診

第二十三卷婦人症

經水 熱入血室 崩漏

帶下 交腸 求子

第二十四卷胎前

妊娠 胎動 子懸

子腫 轉胎 胎墜

胎死 異胎 鬼胎

傷寒 感寒 傷暑

喘逆 咳嗽 煩熱

嘔吐 泄瀉 秘結

瘧疾 下痢 瘡痢

內傷 悲傷 心腹痛

虛損 瘡 乳痛

惡阻 下血 子癇

第二十五卷產後

產難	胞衣不下	隱疾	痛	癢	疥癬
瘀滯	癥瘕	血崩	疔	水泡	大斑
血迷	血虛	肉線出	夾疹	夾丹 附夾瘡	失血
惡露多	感證	感冒	傷食	寒戰咬牙	寒折
火熱	惡寒	喘	厥逆	昏冒	驚搐
咳嗽	嘔	泄瀉	煩躁	譫妄	喘急
小便不禁	大便秘結	瘡	咳嗽	嘔吐噦	吐瀉及蛔
下痢	孕產痘	類風	泄瀉	痢	便秘
瘰	痛痺	頭痛	疫癘	目	唇口
瘡	病乳	腰脇痛	口疳	咽痛	瘡
腹痛	浮腫	虛汗	發核	腹痛	腰痛
虛損	驚悸	顛狂	手足	膿期	膿期 附痂後
見鬼			伏陷 附倒	痘毒	腫脹
第二十六卷 痘證	諸家痘瘡方論	小兒痘	倦怠嗜臥	羸瘦	
黑痘	白痘	嬌紅痘	第二十八卷 小兒科	瘡疹	初生
第二十七卷 痘症	氣虛	鼻毒	瘡疹	赤丹	牙疳
順證	血熱	諸熱	乳病	變蒸	胎毒
毒壅	中暑	渴	瘡	傷寒	感證
汗			傷風	暑	傷食

第二十九卷 小兒科

受驚 驚風 慢驚

風癇 發熱 嘔吐

泄瀉 吐瀉 瘧

痢 瘧痢

第三十卷 小兒科

嗽 喘 哮

虛損 疳 腫脹

癖積 蟲 吐衄

心腹痛 黃疸 附啼哭 語遲行遲

胎疾 鬼病 相思

跌撲損傷 發背 結核

下疳 疔 便血

疳瘡 瘍證

第三十一卷 外科

癰疽 腦疽 鬚疽

頤疽 項癰 肩癰

臂癰 乳癰乳巖 胸癰

脇癰 腋癰 胃脘癰

第三十二卷 外科

發背 肺癰肺痿 腹癰

腰疽

第三十三卷 外科

腸癰 腸風臟毒 痔 附脫肛

漏瘡 臂癰 囊癰

懸癰 疔瘡 腮癰

臙瘡 脫疽 多骨疽

附骨疽

第三十四卷 外科

時毒 疔 疣

結核 癰癧 流注

第三十五卷 外科

膿疥 癬 疥瘡

血風癰疹 瘰癧 瘡癤

瘍症 瘍症便秘 腎臟風

癰風 下疳 梅毒

第三十六卷 外科

白癰風 附紫 斑瘡 天泡瘡

瘀血腹痛 脾傷腹痛 血虛煩躁

涇痰作痛 骨傷作痛 氣虛壅腫

肺火衄血

陰虛作喘

陽氣脫陷

痛傷胃嘔

涼血過經

杖瘡

分症三十條

金瘡

湯火傷

竹木刺傷

蟲獸傷

破傷風

續名醫類案卷一

錢塘魏之琇編集

後學

鐵嶺李定源本之

重校

昆明完 瑣少衡

傷寒

許叔微云。有病傷寒。身熱頭疼。余視之曰。邪在表。此表實症也。當汗之以麻黃湯。或問曰。傷寒大抵因虛。故邪得以入。之邪在表。何以云表實也。予曰。古人稱邪之所湊。其氣則虛。留而不去。其病則實。蓋邪之入人也。始因虛入。邪居中反為實矣。大抵調治傷寒。先要明表裏虛實。能明此四字。

則仲景三百九十七法。可立而定也。何以言之。有表實有表虛。有裏實有裏虛。有表裏俱實。有表裏俱虛。仲景麻黃湯之類。為表實而設也。桂枝湯之類。為表虛而設也。裏實則承氣之類是也。裏虛則四逆之類是也。表裏俱實。所謂陽盛陰虛。下之則愈也。表裏俱虛。所謂陽虛陰盛。汗之則愈也。常讀華佗傳。有府吏倪尋李延。其症俱頭痛身熱。所苦正同。佗曰。尋當下之。延當發汗。或難其異。佗曰。尋外實。延內實。故治之異耳。外實內實。汗下倒施。疑有誤。此可當傷寒總論。一人初得病。四肢逆冷。臍下築痛。身痛如被杖。蓋陰症也。急服金液破陰來復等丹。其脉遂沉而滑。沉者陰也。滑者陽

也陰病得陽脉者生仍灸氣海丹田百壯手足俱溫陽回得微汗而解或問滑沉之脉如何便有生理曰仲景云翕奄沈名曰滑何謂也沉爲純陰翕爲正陽陰陽和合故名曰滑古人論脉滑雖曰往來前却流利旋轉替替然與數相似仲景三語而足也此三字極難曉翕合也言張而復合也故曰翕爲正陽沈言忽降而下也故曰沈爲正陰方翕而合俄降而沈奄爲忽忽間仲景論滑脉可謂諦當矣其言皆有法故讀者難曉宜細思之可作傷寒論讀治陰症指南

一人病傷寒下利神昏多困譫語不得眠或者見下利便以譫語爲陰虛症許曰此亦小承氣症衆駭曰下利而服小

承氣仲景之法乎許曰此仲景之法也仲景曰下利而譫語者有燥糞也屬小承氣湯而得解予嘗讀素問云微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從多從少視其事也帝曰何謂反治岐伯曰塞因塞用通因通用王冰注云大熱內結注瀉不止熱宜寒療結熱須除以寒下之結散利止則通因通用也正合於此又何疑焉引經論治了如指掌治裏症法一人患傷寒五六日頭汗自出自頸以下無汗手足冷心下痞悶大便秘結或者見四肢冷又汗出滿悶以爲陰症診其脉沈而緊爲少陽症多是自利未有秘結也此症半在表半在裏投以小柴胡湯得愈仲景謂四肢冷脉沉緊腹

滿全似少陰然大便鞭頭汗出不得爲少陰蓋頭者三陽同聚若三陰止胸而還有頭汗出自是陽虛故曰汗出爲陽微是陰不得有汗也若少陰頭有汗則死矣故仲景平脉法云心者火也明少陰則無頭汗者可治有汗者死心爲手少陰腎爲足少陰相與爲上下惟以意逆志者斯可得之治半表半裏法

一人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脉弦數心不得甯眞勞復也診之曰勞心之所致神之舍未復其初而又勞傷其神營衛所以失度也當補其子益其脾解其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之而愈補脾湯人參白朮

甘草橘皮青皮乾薑各等分傷寒之後防有餘熱乾薑白朮尚宜斟酌

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沉弦欲厥陰脉也服溫藥數日不已又以薑附等藥覺陽微回脉漸生因渴私飲水一杯脉退又見頭不舉目不開問之則犯陰陽易只與燒裊散連進二服出大汗兩晝夜而愈陽易治法

衍義治傷寒汗不出摘腳法用海蛤粉烏頭各二兩川山甲三兩爲末酒糊爲丸大一寸許捏匾置患人足心下簞蔥白蓋藥以帛纏足坐于暖室取熱湯浸腳至膝下久則水溫又添熱水候遍身汗出爲度凡一二日一次浸腳以和爲度外治取汗法

以上俱醫學綱目

張子和曰：予之常然，雪中冒寒入浴，重感風寒，遂病不起。但使煎通聖散單服之，一二日不食，惟渴飲水，亦不多飲。時使人搥其股，按其腹，凡三四日不食，日飲水一二十度。至六日有譫語妄見，以調胃承氣湯下之，汗出而愈。常謂人曰：傷寒勿妄用藥，惟飲水最為妙藥。但不可使之傷常，令揉散乃大佳耳。至六七日見有下證，方可下之。豈有變異哉？奈何醫者禁人飲水，至有渴死者。病人若不渴，強與水飲，亦不肯飲也。予初病時，鼻塞聲重，頭痛，小便如灰淋汁，及服調胃承氣一兩半，覺欲嘔狀，探而出之，汗出熱熱

然，須臾下五六行，大汗一日乃瘳。當日飲水下，則痰出約一二碗，痰即是病也。痰去則病去矣。予時年六十一歲。傷寒初起在表時，速以麻黃湯解之，則不至成下證。否則二三日後便入裏，不得不用承氣矣。予和此案，俱得法，惟解表畧緩，故須繼以承氣耳。

焦百善偶感風寒，壯熱頭痛，其巷人點蜜茶一碗使啜之。焦因熱服之訖，偶思張語曰：凡苦味皆能涌，今兼頭痛，是病在上，試以箸探之，吐畢其痛立解。

孫珪治俞伯道，忽患微熱，心下滿，頭痛，汗不能解。眾醫以為溫病，用表有謂。食在膈者，治之不愈。召孫至，用半夏茯苓湯問其故，曰：頭有汗，心下滿，非濕症，乃水結胸也。小便既

去，其病乃愈。且如濕氣心下滿，自當遍身有汗，有食心下滿，豈得有汗？若言是表，身又不惡寒疼痛，表症何在？故凡水結胸，頭必有汗。出傷寒口訣。

寶材治一人患肺傷寒，各頭痛發熱，惡寒咳嗽，肢節疼，脉七緊，服華蓋散，黃芪建中湯畧解。至五日昏睡，譫語，四肢微厥，乃腎氣虛也。灸關元百壯，服薑附湯始汗出愈。作虛治。

一人傷寒昏睡妄語，六脉弦大，寶曰：脉大而昏睡，定非實熱，乃脉隨氣奔也。強為之治，用烈火灸關元穴。初灸病人覺痛，至七十壯遂昏睡不痛。灸至三鼓，病人開眼思飲食，令服薑附湯至三日後，方得元氣來復，大汗而解。

一人患傷寒至八日，脉大而緊，發黃生紫斑，噫氣，足指冷至脚面，此太陰症也。最重難治。為灸命關五十壯，關元二百壯，服金液丹鍾乳粉，四日汗出而愈。

一人患傷寒至六日，脉弦緊，身發熱自汗，太陰症也。先服金液丹灸命關穴。病人不肯灸，傷寒惟太陰少陰二症，死人最速，若不早灸，雖服藥無功。不信，至九日瀉血而死。

一人傷寒至六日微發黃，一醫與茵陳湯，次日更深黃色，遍身如卮子，此太陰症。誤服涼藥，而致肝木侮脾，為灸命關五十壯，服金液丹而愈。

一人患傷寒初起即厥逆，脉一息八九至，諸醫以為必死，寶

曰乃陰毒也。厥逆脈數斷為陰毒必與薑附湯一盞至半夜汗出而愈。若有爪青吐利躁臥等症。下涼藥必死無疑。

張子和之僕嘗與隣人同病傷寒俱至六七日下之不通隣人已死僕發熱極投於井中撈出以汲水貯之檻使坐其中適張遊他方家人偶記張治法曰傷寒三下不通不可再攻便當涌之。試服瓜蒂散良久吐膠痰三碗許與宿食相雜在地狀如一帚頓快乃知世醫殺人多矣。又一吏吐訖使服太白散甘露散以調之。邪結陽明發為狂熱吐之猶是宿食非若燥糞便難可下而愈也。

萬密齋治縣尹唐肖峯二月間患傷寒醫進九味羌活湯不

效又云內傷挾外感進補中益氣湯不效又進柴苓湯去人參病畧減四日復發熱頭苦痛醫欲下之未決萬脈之陽明少陽洪長而弦曰此元氣素虛因起早感寒得之今病在少陽陽明併病乍熱乍涼者少陽也頭苦痛者陽明也宜小柴胡合葛根葱白湯唐曰吾素多痰火病勿用人參萬曰元氣不足乃虛火也實火宜瀉虛火宜補幸勿疑一劑而病愈

胡晏年五十病傷寒十六日不解其症乍寒時即以衣被厚覆蒙頭而卧不勝其寒乍熱時即撤去衣被暴露其身更用扇不勝其熱如此一日夜十餘次醫皆不識萬至告以

病狀可怪邀診其脉曰不必診此易知耳夫惡寒病在表也何以無頭痛症惡熱病在裏也何以無渴及便溺不利症此病在半表半裏陰陽混亂也陰氣乘陽則惡寒陽氣乘陰則惡熱宜用小柴胡以治其半表半裏之邪。后子豆豉以治其陰陽錯雜之邪服之寒熱不再作而愈

李養晦患傷寒苦右脇痛醫用陶節庵法以小柴胡加枳殼桔梗服之無效已十七日萬脈之沉弦且急曰此畜水症也經云沉潛為水支飲脈弦急必得之飲水過多問會服何方以前藥對萬曰只用此方再加牡蠣以洩其畜水可耳一服而痛止

一門子病傷寒醫與發汗七日後不愈小腹滿而痛欲下之未敢萬脈之沉弦而急問會渴飲水乎答曰甚渴雖飲水渴不止曰此畜水似疝症不可下也乃用五苓散以利其水加川練子小茴香以止小腹之痛一服洞泄四五行皆清水次日再求診曰不必再藥水盡泄自止矣三日後果安

沈天祿病傷寒汗下後病不解身無大熱不惺惺醫者但云譫語以症論之乃錯語也。譫語錯語極宜細辨緣汗下之後元氣未復神識不清耳。與補中益氣湯去升柴加麥冬生地熟附子一服而愈

孫文垣治張二官發熱頭痛口渴大便秘結三日未行脈洪大曰此陽明少陽二經之症用大柴胡湯行三五次所下皆黑糞夜出臭汗次日清爽惟額上仍熱陽明部位用白虎湯加葛根天花粉因食粥太早復發熱咳嗽口渴殊甚且惡心食復用小柴胡加枳實山梔麥芽次日渴不可當半夏枳實麥芽皆能耗陽改以白虎湯加麥冬花粉外與辰砂益元散以井水調服五錢熱始退渴始定不虞夜睡失益復受寒邪天明又大發熱人事不知急復用小柴胡湯加升麻葛根前胡薄荷汗出熱退神思大瘳四肢皆冷語言懶倦且咳嗽以生脈散加石斛百合大棗白芍服後咳嗽尋止精神日加飲食進而愈

繆仲醇治姚平子傷寒頭疼身熱舌上黃胎胸膈飽悶三四日熱不解奄奄氣似不屬者邪熱甚則正氣餒一醫以其體素弱病久虛其意欲投參少許繆叱曰一片入口死矣亟以大黃一兩瓜蒌二枚連子切片黃連枳實下之胸膈小陷大主人驚疑不得已減大黃之半二劑便通熱立解遂愈高存之一家人婦傷寒來乞方繆已疏方與之矣見其人少年曰若曾病此否曰然曰愈幾日而妻病曰八九日曰曾有房慾否曰無之繆故曰若有房慾此方能殺人也其人即置方不取遂以禪福雄鼠糞麥冬韭白柴胡二劑勢定

更用竹皮湯二三劑全愈觀此則傷寒初愈臟腑猶多熱毒時師不察驟投參者尤附溫補其遺患可勝言哉

一奴傷寒熱解後復下血不止主人以痢藥投之更甚繆曰此傷寒失汗之餘症也用地榆麥冬知母竹葉以代仲景諸血症藥遂愈

翁具茨感冒壯熱舌生黑胎煩渴陽明症勢甚劇諸昆仲環視

揮淚羣醫束手繆以大劑白虎湯加人參三錢一劑立甦或問繆治傷寒有秘方乎繆曰熟讀仲景書即秘方也按此係溫病故以人參白虎湯取效

常熟吳見田在京邸時有小青衣患傷寒愈而復復而愈愈

而再復不知其幾謂繆曰非兄不能救診之病人面色黃白有胃色六脈微弱有胃色大便不通胸中不快亦不思食曰

此為傷寒百合無經絡百脈一齊壞症正氣已虛邪氣留後或虛羸少氣致病謂之百合病之餘邪且退矣以色脈斷胸中不快虛而氣壅皆謂之壞病

非實邪不大便者久病津液枯氣弱不能送也投以人參

五錢麥冬一兩枳殼炒八錢盡劑立解而瘥文田案用百合病非也此直是傷寒壞症耳

梁溪一男子素虛春中感冒頭痛肌痛發熱羌活二錢麥冬

三錢炙甘草一錢紫蘇一錢五分北細辛七分前胡一錢五分次日頭痛止熱未退口渴繆用白芍五味子人曰風

未退遽用酸飲何也。曰：因人而施爾。一杯即愈。麥冬三錢、甘草一錢、括蕞根二錢五分、乾薑一錢五分、桑皮三錢、桔梗一錢、白芍一錢、五味五分。

四明虞吉卿因三十外出疹，不忌豬肉，兼之好飲，作泄八載矣。忽患傷寒，頭疼如裂，滿面發赤，汗出不徹，舌生黑胎，煩燥口渴，時發譫語，兩眼不合者七日。皆屬陽明，洞泄如注，較前益無度也。協熱，脈之洪大而數，實為疏竹葉石膏湯方，因其有腹瀉之病，石膏止用一兩，病初不減。此兄素不謹，一友疑其虛也，云宜用肉桂附子。凡診病淺見者反若深慮多令病者無所適從，或以其言來告，繆曰：誠有是理，但前者按脈似非此症，豈不數日而

脈頓變耶？復往視，仍洪大而數。曰：此時一投桂附，即發狂登屋，必不抹矣。一照前方，但加石膏至二兩，或曰得毋與瀉有妨乎？曰：邪熱作祟，此客病也，不治立殆。渠泄瀉已八年，非暴病也，治病須先太甚，急治其邪，徐并其風，悉除之。急進一劑，夜臥遂安，即省人事。再劑而前惡症頓去。數日霍然，但瀉未止耳。為疏脾腎雙補丸，更加黃連乾薑葛升麻，以痧痢法治之。不一月瀉竟止，八載沉痾一旦若失。按此亦溫熱症，非傷寒也。

莊欽之一莊僕，因受寒發熱，頭痛如裂，太陽兩目俱痛，陽明渾身骨內疼痛，下元尤甚。勞狀如刀割，不可忍耐。傷寒口渴甚

大便日解一次，胸膈飽脹，下不解已待斃矣。為疏一方：乾葛三錢、石膏一兩五錢、麥冬八錢、知母三錢五分、羌活二錢五分、大瓜蕞半個、連子打碎、枳殼一錢、桔梗一錢、竹葉一百片、河水煎服，四劑而平。此太陽陽明病也。貧人素多作勞，故下體疼痛尤甚，以羌活去太陽之邪，石膏竹葉乾葛麥冬知母解陽明之熱，括蕞桔梗枳殼疏利胸膈之留邪，故遂愈。

又莊一僕，因傷寒後勞復發，熱頭痛，腹中作瀉，勢甚危急，為疏一方：山梔仁四錢、枳實二錢、豆豉一兩、川黃連二錢、乾葛三錢、調六一散五錢，服二劑，熱退瀉止，頭痛亦愈，但不思飲食，為去山梔枳實黃連，加黨參四錢、炙甘草二錢五分、麥冬五錢，不數劑而愈。

朱遠齊治從祖近湖公少年，因房勞食犬肉傷寒，諸醫以其虛也，攻補兼施，至發狂登屋，奔走號呼。陽明府症實熱，日夜令壯夫看守，幾月餘矣。急走使延朱，朱先令煎人參膏二斤，以待用，潤字號丸藥數錢下之，去黑糞無算，熱遂定，奄奄一息，鄰於死矣。徐以參膏灌之，至一百二十日全瘳。以上廣筆記。龔子才治一人，頭疼發熱，憎寒身痛，發渴譫語，日久不出汗，以大梨一枚、生薑一塊，同搗取汁，入童便一碗，重湯煮熟，食之，汗出如水即愈。製方甚佳，愈于甘露，且免地黃之忌。

太守劉雲亭患傷寒發熱面紅唇赤面壁踞身而臥諸醫以小柴胡湯解毒湯之類數劑弗效診之六脉浮大無力此命門無火也。合脉與症即是戴陽以人參附子沉香服之立愈三服全安

一嫗年七旬傷寒初起頭痛身疼發熱憎寒醫以發散數劑不效淹延旬日漸不飲食昏沉口不能言眼不能開氣微欲絕。純見陰證凡實證而見此亦宜獨參猛進貧者以重劑犯地少入乾薑與人參五錢煎湯徐徐灌之須臾稍省欲飲水煎渣服之頓愈又十年乃卒
當與疫症內蘇
韜光一案同參

李士材治一人傷寒九日以來口不能言目不能視體不能動四肢俱冷咸謂陰症診之六脉皆無以手按腹兩手護之。拒按是也肩腋作楚。實邪按其趺陽大而有力乃知腹有燥矢也欲與大承氣湯病家惶懼不敢進李曰吾郡能辨是症者惟施笠澤耳。此等症人便稀識可為浩歎延診之若合符節遂下之得燥矢六七枚口能言體能動矣故按手不及足者何以救此垂絕之症耶

一人傷寒煩燥面赤亂悶欲絕時索冷水手揚足踢難以候脉五六人製之方得就診洪大無倫按之如絲李曰浮大沉小陰症似陽也與附子理中湯當有生理其弟駭曰醫者十輩至不曰柴胡承氣則曰竹葉石膏今反用此熱劑

烏乎敢李曰溫劑猶生涼劑立斃矣卜之吉遂用理中湯加人參四錢附子一錢煎成人井水冷與飲甫及一時狂燥定矣再劑而神爽服參至五斤而安。得力在入井水冷服

凡遇此等傷寒能以全料六味減苓瀉加麥冬杞子用大砂礮濃煎與之必數杯而後酣寢汗出而愈于時此法未開惟倚仗人參之力取効本陰竭之症乃峻補其陽復生陰而愈故用參每多至數斤使在今時非倚頓之家不可為矣

一人傷寒至五日下利不止懊憹目脹諸藥不効有以山藥伏苓與之慮其瀉脫也李診之六脉沉數按其臍則痛此協熱自利中有結糞小承氣倍大黃服之果下結糞數枚遂利止懊憹亦痊

一人傷寒第二日頭痛發熱李曰方今正月時令猶寒必服麻黃湯兩日愈矣若服冲和湯不惟不得汗即使得汗必致傳經遂以麻黃湯熱飲之更以滾水入浴桶置牀下熏之得汗如雨密覆半晌易被神已爽矣晚索粥家人不與李曰邪已解矣必不傳裏食粥何妨明日果愈不以麻黃汗之傳變深重非半月不安也。黎按用麻黃取汗須防太過

吳光祿患傷寒頭痛腹脹身重不能轉側口內不和語言謔妄有云表裏俱有邪宜以大柴胡下之李曰此三陽合病