

慎柔上人

慎柔。明時僧。從周慎齋習醫。得其心傳。石震爲之傳。著有慎柔五書。首卷述師訓。次卷述治病歷例。三四兩卷。述虛損勞瘵。末卷爲醫案。凡治諸證。皆以保護脾胃爲主。淵源本於東垣。而化裁宗諸薛氏。其於虛勞兩證。截然分治。尤發前人所未發。全書凡五卷。行於世。

胡慎柔醫案目錄

風例	一
痢例	五
脾胃例	九
虛勞例	三
頭痛例	三
胃脘痛例	三
眼痛例	三
齒痛例	三
難症例	六

胡慎柔醫案

武進徐衡之編纂
嘉定姚若琴

皖南建德周學海評注

風例

金壇孝廉蔡長卿令堂。年六十餘。六脈俱數八至。按之中沈則滑而實。惟肝腎二脈洪大而虛。經曰數則爲熱。滑則氣有餘而血不足。此陰虛陽陷也。

也。者外證則唇欠目劓。手搖身搖。面色紅白不時。徧身熱火攻刺。自言心中

昏悶。四肢浮腫硬堅。此皆風火搖動之象。陰虛陽亢之症。正經所謂熱勝則腫。風勝則動也。宜滋陰抑陽。用四物湯以養血爲君。加山藥以扶中氣爲臣。佐山萸以助陰養肝。使黑柏二分以引經。陳皮理胃氣爲俾佐。服二劑。診之數脈退去一至。又服四劑。又退一至。而昔日之虛洪。稍收斂有神矣。外證四肢腫硬漸平。攻刺亦無。心中不言昏悶。又四劑。前之硬滑。俱已空輒。數亦更

減。然眞陽未復。邪火未盡退也。以六味丸料四兩作一劑。頓服之。腎經洪大脈全斂。而火退矣。復因夜間取涼太過。至下午覺身寒。唇昏紫黑。此邪火退。而陰陽俱虛。急用人參三錢。白朮一錢。甘草三分。白茯苓二錢。當歸二錢。附子一錢八分。官桂二分。服之一茶盞。愈前非全合此方更非針對其覺身大熱。口乾。時索水飲。發熱。此眞氣虛不相合。和不下故也。至初更診之。六脈俱細急短數。略無和氣。予甚危之。至明日再診。則有神氣。尙有六至。餘此陰陽未全克復。元氣未充耳。教以朝服六味一錢五分。日服補中湯數十劑而愈。

劉某夫人年及三十。稟體元弱。未病十日前。身如舟中行。後忽遍身痛。臍下痛。牙關緊。不言。目瞪。汗出。大小便不通。身熱。此下寒上衝。血隨氣逆。相搏而不得降也。延予視之。診其脈俱浮細。來往不定。一息十餘至。重按則無。退而思之外證。皆屬陽虛。脈又無神。臍下痛甚。目瞪至死而醒。陽和之氣欲絕。而胃氣虛。升降失司。故大小便不通。且東垣云。裏虛則急。以此思之。則內外俱虛。宜先建

中將四君去茯苓加歸芪各二錢熟附二分午時服一貼遍身痛稍緩而小便溺矣申時又進前劑汗止遍身痛已大便亦通但臍下痛不減及兩脅痛此陽虛也寒甚也又加附子五分臍痛止矣但大便秘了而不了有欲出而不出之狀正東垣所謂血虛加當歸身一貼而愈

李子才年四十餘素性暴忽因怒卒暈倒必怒未得泄脈浮中無沈按數六至此陽虛陷入陰中之證以補中益氣加六味丸料少許四貼而愈

一少年忽不思食惡心偶逢文期強作文一日晚即頭暈作嘔余脈之二寸洪緩以爲勞碌而動心火遂以加味逍遙散二劑嘔不食病亦不減其年正二三月淫雨此溼勝而然也此溼從上受過其清陽以太無神朮散一劑即不

嘔惡第頭暈未除二寸脈猶如故其脈狀有餒餒欲發之意用前劑加紫蘇防風取微汗頭暈除脈亦退第不思食耳六君子一劑飲食如常

周近菴令愛年十九左耳下紅腫發熱作痛脈之六部俱數八至無神

且素弱。經水不調。予曰。此運氣病也。以小柴胡合四物加牛蒡子。內黃芩用酒炒。四劑而愈。此病曾治之輕者此方恰合

近菴令子室年二十餘。兩耳下俱紅腫。痛甚發熱。其狀可畏。醫者以大黃行數次。又用敷藥。反覺坐臥不安。亦運氣病也。診之六脈俱細數少力。惡心不食。先以人參敗毒散一劑以發之。又用甘桔加牛蒡射干陳皮半夏合漱之。次將小柴胡湯內加牛蒡。六劑而腫消。飲食猶未貪。異功散加牛蒡四五劑。脾胃健而全愈。

馬山徐雲所。六月受熱受勞。又飲酒。忽上膈不寬如刺痛。頭暈且重。自以過食。曾以指探吐。卽枕不得。惟坐而已。予診之。二寸俱洪緩有力。關尺俱弱帶弦。此溼熱上干清陽之分。故頭暈重。胸膈痛。此時症耳。用平胃加半夏黃芩紫蘇木香。取微汗。此症卽退。就枕平復。

淮安客年三旬外。季夏患痺瘡。單熱不寒。連日發。於午後。熱躁譫語。至

痢例

痛脈皆屬血滯。似宜酌加桃仁丹參。

次日天明纔退。數日後忽腹痛。晝夜無間。勺水不進。呼號欲絕。遇瘧發時。卽厥去。延醫治之。投藥皆不效。求余診脈。絃細而濡。余謂絃細爲虛。爲暑。而濡爲溼。蓋暑邪爲瘧。溼熱乘虛內陷而腹痛。用酒炒白芍炙草五分。水煎。調下天水散五錢。服後腹痛如失。次日瘧亦不發。

此案看似尋常。實非老手不辦。論證用藥。均極堅實。第

甲辰閏九月間。天氣寒熱不時。痢者甚衆。予四弟永穆年二十七歲。忽患痢下紅。腹痛後重。已三日矣。來取藥。付以芍藥湯一貼。香連丸二服。不止。反增心口如刀劓。當臍腹痛。肛門痛亦劇。聲撼四鄰。自分必死。告母決別。因整囊往鄉視之。晝夜不得臥。次數難定。日下紅血一桶。痛不可忍。發熱流汗不食。脈之六部皆豁大。浮中沈無力。四至。予曰。雖痛。雖發熱。脈無力。已虛寒矣。古人云。脫血益氣。此症正宜。遂用異功散加升麻三分。木香五分。炒乾薑

五分。一劑。去後覺疎。痛亦可忍。至五更。腹痛如前。予曰。此藥力盡也。急煎一劑與之。比前愈疎。痛亦減七八。卽酣睡至日中方醒。云不甚好過。予又曰。此藥只能支持一覺。再煎與之。遂安寢至晚。痛止。後重亦可。還服前劑而愈。一二日後。因喫雞肉。仍前腹痛肛腫。穢下不止。第三日病勢篤極。復報予診之。脈三至餘。浮無。沈按之則大。脾命脈微。與補中益氣陽不應。此虛脫之甚。加御米殼一錢。亦不應。下如洞泄。流汗發躁。尺脈漸欲收斂。予亦慌急。令人二更後往城取參。至早歸。補中益氣加人參二錢服之。下咽覺憤。參能令人盛憤。溼熱內盛。試驗之。歷。此正氣欲復。邪氣欲退也。頃之精神頓增。痢稍緩。恐再作。又一劑。下注昏憤發熱躁諸症漸緩。脈亦有神。短脈退。尋思久之。古人云。久泄久痢。湯劑不如丸散。卽合參苓白朮散與服。覺疎下。至下午復躁熱。予再脈之。左尺洪如火射狀。此陰虛火動之象。與加減八味丸至六十九丸。精神覺爽。頃之。又下八九十九丸。睡至天明。病去十七。方信立齋師加減八味丸治水涸之。

症。卽令朝暮服此丸。復合參苓白朮散。漸愈。覺小便痛。想動色事故耳。服以逍遙散。門冬五味子而平。

夫痰生。痰伏下焦。尺脈洪射。當是下陽乍復。與痰相激也。

此病動色而不死。必體實而邪氣仍深。重者。前敘證似未協。細審尺脈收縮。當是深血

王春元二令郎年甫七歲。久患赤痢。消導削積之劑已服過多。後轉下白如涕。渾無糞。診之。浮中沈六脈俱虛無神。三五不調。外症手足俱冷且硬。面浮齒白懶語。此陽氣虛寒之症。宜溫補脾胃以生肺金。用補中益氣加炮薑官桂各二分。其間人參止用三分。且陳腐不堪。服四劑。手足略輟。言語亦健。第未溫耳。其下白仍不減。亦虛寒滑脫危症。宜補宜澀宜溫。復用前藥加好參五分。大附二分。半御米殼一分。服一劑。則足已溫。大便卽有糞。白退十八。自茲手足俱溫輟。泄自全止。還服前方。去御米殼附子二味。予歸。囑以如身中已溫暖。薑桂亦去。後服參苓白朮散以培中氣。使來歲乙巳厥陰風木之氣不能制。飲食尤宜慎之。

予友薛理還僕。遠行忍飢。又相毆脫力。時五月初。遂發熱詬語。以補中益氣及五苓數劑不效。延予診之。六脈俱無。乍有則甚細。其外症則面赤譫語口碎。一友曰。陽症見陰脈。證在死例。予曰。當以陽虛從脈捨症治之。遂下附子理中湯冷服二貼。脈稍見。四貼則脈有神。而口碎愈矣。六貼則脈如常。但譫語未已。予曰。脈氣已完復。而譫語不休者。胃有燥糞。宜以膽導導之。果下燥結。譫語遂平。此證若大便滑易者有瘀血也。以桃仁下黑糞。

馬見源精神素弱。且勞甚。餓時喫冷肉一塊。遂不快。發熱譫語作狂。乃飲食勞倦之症。鄉醫先汗一次。不退。又下三四次。便倦怠昏沈。不思飲食。吐痰。晝夜不寢。宜素無痰而忽吐痰者。肺胃筋膜內傷也。多由飲食勞倦。痰宜堅壓筋以復其力。痰發於筋膜者也。筋膜傷而溼困之。根則痰常多。筋膜傷而火激之。則痰暴涌。凡治痰欲除根本者。一在補血養筋而堅之。筋力堅強自液不外洩。下多亡陰。中氣大虛之故。迎予診六脈俱有四至。洪緩無力。文缺至半夜。反加吐痰不已。起復診之。六脈俱細。此邪氣已去。真陰欲還。陽虛反發躁之象。急用六君加薑桂

各三分。服卽成寢。至明午方喚醒之。又一劑。欲睡不醒。精神反覺懶怠。邪氣盡退。而正氣將復矣。至下午。喫米湯一鍾。口知穀味。再用補中加乾薑桂門冬五味而瘳。

脾胃例

孝廉王於鑾父年六十餘。六脈俱絃牢。右三關浮中沈甚豁大。左三略差。外症晚則作飽。且大便秘。此土受木制。脾胃不輸津液。中氣虧損之候也。宜補脾胃生肺金。乃用補中益氣湯加官桂以剋木之剋制。炮乾薑以溫脾胃徹沈寒。山藥山萸佐當歸以養陰。麥冬五味驟收肺金以生新水。服二劑。覺胸中稍寬。身中反有眩意。此正氣欲復。而邪漸退。故瞑眩耳。又服數劑。復診之。則牢堅已去。第二尺俱洪。此真陰眞陽並虛。當平補之。用八珍晚服六味丸。大腸漸潤。再數劑。全愈。

邱生年十八歲。正月間過食麪餅湯麵。遂不快。發熱頭痛。邀予診之。脈

略緊中沈洪滑曰當先除去風寒以九味羌活湯一貼寒熱頭痛悉失但覺不快耳予適他去彼延別醫用柴平湯一貼病不減晚歸診之脈洪汗出而腹痛甚不可按以元明粉泡湯下導滯丸二錢其痛減半尙有脹再用前丸一劑而飽脹如脫但腹痛耳復增瘧狀

諸症皆胃中有死血也何不重加桃仁於劑中

予又診之六脈俱細絃此脾土受木乘又被伐之過宜用溫補以理中湯二劑肚痛除又以過食復飽診之絃細如前仍以前湯但溫脾胃而食自消諸症去

脈俱細。絃此脾土受木乘。又被伐之過。宜用溫補。以理中湯二劑。肚痛除。又以過食復飽。診之。絃細如前。仍以前湯。但溫脾胃。而食自消。諸症去。

湯如玉母懷七月而生。後每大便甚艱。須二三時方安。百治不效。予謂

湯如玉母懷七月而生。後每大便甚艱。須二三時方安。百治不效。予謂肺腸氣血不能吹送。欲來不來。乃脾虛也。脾主信。欲來不來。無信也。當補脾肺。使各施其令。而吹噓之氣自如。調理數月而愈。

必是有人補物血之堅生筋。強以力腸固胃腸爲之最法後。隨七時月進而退生。與腸之力終未身全。

一婦年五旬。二寸浮洪。二尺小。右關弦。不思食。頭眩。余曰。二寸浮洪。病主頭眩。亦主上膈不清。此陽氣虛而越上。不能歸根復元。以致丹田氣虛寒。

不能養溫脾胃。是以右關脈弦。飲食不消而少飧也。理宜斂陽氣歸於下焦丹田之內。下焦溫暖。脾胃自健。水穀自化矣。用桂枝白芍六分五味子二分白茯苓一錢黑薑三分人參五分杜仲一錢破故紙五分炙草四分湯泡半夏一錢加煨姜十餘劑而愈。

蔣懷幼年六十。素吐白沫。已數十年矣。忽喉中有噎意。以白予曰。此脾胃虛寒也。宜用人參調補中氣。彼辭以貧窶。自將白糖薑汁熬化含吐。及六七日。則溏泄日五六。次神亦勞倦。食亦不貪。延視之。六脈皆二至。來三五至則止。如雀啄之狀。此元氣大虛。不能嚥吸周迴耳。用六君子加肉桂四分吳萸二分乾薑二分。二劑則脈連續而不止。又二劑。反加浮洪粗大。數七八至。發熱口碎舌碎。乃虛陽上越之證。予思之。脈已犯難治之例。且吐不沫止。腎水泛。脾虛失統也。用_{字缺}病亦稍退。稍勞即復。服數劑復減。再勞又如故。至兩三月後。藥亦不受。亦不效。五六日而歿。先賢云。粗大之脈難治。書此以證之。

虛勞例

曹桐江令堂年六十外。九月間發熱少食。余診之。六脈俱無神。有八至。右關浮則滿。沉則無。正經云脾虛浮似肺。亦火內鬱之症。脾弱宜矣。用補中益氣數劑。變瘧。此正氣復而邪氣欲出矣。用六君加五味乾薑。四貼痊復。合參苓白朮丸調理。康健如故。

三月間予六弟年九歲。先於二月十八日病。痧疹退。發熱不已。不食飯。食惟飲冷水。啜數口。少頃即出。延至三月來報。余思之曰。不思食。脾胃虛也。欲飲水。熱也。飲少頃即吐。中虛假熱也。且兼吐酸水。此木旺土衰之病。以六君加薑炒山梔。服二劑。熱住。少頃復熱。此中氣虛極。得藥力則退。藥衰復熱。此藥力少而病氣重也。往診之。脾胃脈細弦無神。五六至不定。見遲左三洪漫。看指上三關俱透。命關脈已黑。喘氣晝夜不休。徧身發熱。六日。十日餘不更衣矣。遂膽導一次。出糞不黑不硬而帶滯。非真元之熱。乃脾胃氣虛不能

升降耳小便赤澀欲便則叫呼痛楚之極。乃陽氣餒而下陷。升降失司。氣化失職所致。用補中合六味湯三貼。加麥冬五味子。喘氣即止。熱亦退。惟小便澀痛不已。仍用補中益氣加麥冬五味子牛膝車前乾薑炒黑。清肺生水。升陽益胃暖中。一劑小便出血并血塊若干。乃邪火煎熬。陰血乾枯而成也。又二劑痛止。飲食頓增全愈矣。予曰。用前劑而獲如此之效。豈非補脾養肺。金盛水生。氣化自出之謂乎。了吾先師云。無非清氣下陷。不升不降。此翁諄諄言之。治百病無不驗。識此以語後昆。

此肺熱氣陷脈陷。畜血於旁光。宜細看。

曹梧岡令愛年十七歲。七月間以勞倦發熱。不思飲食。六脈俱洪。用逍遙散四劑遂愈。自後飲食不甚貪。肌肉不生。此脾胃虛也。還宜服補中之劑。彼視爲泛常。不及調養。延至十一月間。忽氣喘咳嗽。此土不能生金也。且發寒熱復診之。六脈無倫次。無至數偶來。一如游絲。亦無定蹟。外症喘急吐痰。不食面紅遍身冰冷。兩目有時而左紅赤。有時而右紅赤。此脾胃久虛。真陰

漸亡。虛陽上越之危證。以六君加薑桂各三分。門冬五味黃芪二貼。嗽爲稍緩。四貼而寒熱止。飲食增。又診之。右三脈尙弦細。用補中加薑桂。晚煎八味丸一錢五分。十餘劑而痊。至來年正月間。復病如前。蓋因節下飲食過傷。亦緣前之元氣未復。脾胃未充故耳。其症比前更重。脈亦如前。日夜不睡。以歸脾湯如大附三片薑桂各二分。服一劑卽齁睡一晚。又三劑。更服補中加薑桂山藥故紙二十餘劑。復診之。右三比前覺定。但弦不和。仍服前湯。用八味丸四十餘粒同煎服之。又二十餘劑。身溫症退而平。

與劉夫
源案參看
馬見

錢心卓令愛五歲。先於十二月間患肛門腫痛。且碎且瘡。不思飲食。以翰示予。曰此脾胃虛弱。虛陽內鬱不伸。下溜侵肺。金受剋之故。宜六君加升柴吳萸製黃連炒黑色三分。二劑卽瘳。第未全復。延至正月盡。發熱不思食。眼割淚出而紅。泄瀉。服他醫黃肝治疳之藥不效。復語予。亦以四味肥兒之品與之。初覺有效。數日反益重。此元氣已虛。攻伐太過也。遂乘舟來就診之。