

许履和外科医案医话集

已如瘡瘡頭雅被膿腐
 未透之熱胸痞昨寒
 舌苔白膩微黃此濕熱
 苦辛合化內溫胃氣
 名和也治以
 以表清以連不製中夏
 搗艾利赤子之
 妙松安一氣佩蘭日夏
 枯草連高之
 二金二南刺二口以五生

江苏科学技术出版社

江苏中医集存

许履和外科医案医话集

江苏省中医院 徐福松 整理

江苏科学技术出版社

许履和外科医案医话集

徐福松 整理

出版：江苏科学技术出版社

发行：江苏省新华书店

印刷：南通韬奋印刷厂

开本787×1092毫米 1/32 印张15.75 插页2 字数284,000

1980年12月第1版 1980年12月第1次印刷

印数 1—14,500 册

书号 14196·057 定价 1.34 元

前 言

吾师许履和老中医，江苏江阴人。父锦昌医师，精外科，善治痈疽疔疮流痰流注等症；吾师少承家学，尽得其传。迨后至上海，从名医朱少鸿先生学内科，学成后悬壶故里，颇多治验。解放后，吾师先后担任南京中医学院外科教研组副组长，江苏省中医院外科主任等职。

吾师的主要学术思想是：强调“外科实从内出”，贯穿辨证论治精神。尝谓：“外科必本于内。外病与内病，每每同时并存或互为因果。只读外科学，虽能治一般外科疾病，但遇某些疑难杂证及危重病症，就会束手无策。必须打好内科基础，才能在复杂的病情面前，通权达变，应付裕如。”

吾师十分推崇高锦庭《疡科心得集》。他根据高氏“风性上行，湿性下趋，气火俱发于中”的理论，归纳中医外科的发病概况是“上风下湿中气火”，提出“审部求因”是外科辨证的一般规律。他非常重视经络学说，认为治病必先明辨经络，审经求治，按经用药，是外科治疗的基本法则。他极力主张运用温病学说于外科临床，尤其是“毒攻五脏”治法，用以指导全身性感染的抢救，可以开后人无数法门。对妇女患者及疑难杂证，多从气血论治，并在药物治疗的同时，不放松精神治疗。处方时轻清灵动，平中见奇；外用药则量体裁衣，对症下药；对选择剂型及给药方法等，也颇多斟酌。

吾师对医业精益求精；对后学则多方奖掖，他除从事临

床带教外，还参加编写了多种教材，如《中医学概论》、《简明中医内科学》、《简明中医外科学》、中医外科全国统一教材等。为培养中医外科人材，继承发扬祖国医学遗产，作出了一定的贡献。

《许履和外科医案医话集》，是在院领导的亲切关怀和吾师的直接指导下由本人执笔整理而成，并得有关同志的热情帮助和大力支持。由于水平有限，缺点错误在所难免，望读者批评指正。

徐 福 松

一九七九年十一月

整 理 说 明

一、本书的资料来源，摘录于许履和医师1958年以来的部分门诊、住院病历，少数系解放前的临床验案，亦有近年来的临床小结、医话等等。

二、本书编写体例，参照中医外科传统归类方法，按部位进行整理，分为头面、颈项、胸、腹、背腰、前后阴、四肢、不定位、其他等部；各部分列若干病种；有的单是医案，有的单是医话，有的兼而有之；临床小结资料，多以医话形式出现；案后的附论，系许老对该病病因病理或辨证论治的阐述。卷末附有方剂索引，以备读者查阅。

三、本书尽可能采用中医病名；中医没有病名的，则取西医病名；中西医均无病名的，则以主症命名。病种基本上为外科病，有的病内外科均看的，如梅核气、坐骨神经痛等，亦有收入。

四、治疗方法体现了中医中药、内治外治的特色；个别配合西药的，亦在案中如实反映，以存其真。方剂索引中，外用药均标明剂量，内服药则从略。

五、医案按语为整理者所加。内容则为许老口授的临床经验要点，或为整理者学习、继承许老临床经验的一得之见。

六、为了力求保持资料的完整性和真实性，凡有理化检查的，均予一一抄录。治疗过程尽可能逐诊介绍，如疗程长而复杂的，则归纳后介绍之。治疗效果，基本上是痊愈或有效的病例；对于始无效而后有效，或始有效而后死亡的病例，也选摘一二，以便进一步研讨。原始病历中的单位、职业、婚姻、就诊日期、门诊(住院)号等，整理时一律予以删节，以省篇幅。

目 录

头 面 部

疔..... 1	唇疮..... 38
白秃疮..... 2	木唇..... 39
脱发..... 2	口疳..... 40
粉刺..... 3	口臭..... 43
面部疔疮..... 4	上腭疼痛症..... 44
鬓疽..... 10	舌疳..... 45
大头瘟..... 11	重舌..... 46
炸腮..... 13	外悬痈搔舌..... 47
发颐..... 17	痰毒..... 48
耳疔..... 19	舌中痰核..... 50
耳疳..... 23	痰包..... 51
耳聋..... 24	牙齦痛..... 53
暴聋..... 26	牙龈痛..... 59
耳发疽..... 27	走马牙疳..... 60
两耳轮疼痛症..... 31	风热牙疳..... 62
鼻衄..... 31	牙菌..... 63
鼻渊..... 33	牙齿动摇..... 64
鼻痔..... 36	喉蛾..... 65
翻花疮..... 37	咽喉燥痛症..... 66
	马脾风..... 66
	音哑..... 67

悬壅垂血肿·····	69
梅核气·····	70
食道上端慢性溃疡·····	72
头皮血肿·····	77
瘀血头痛·····	77
太阳穴肿痛·····	78
耳、眉部硬结·····	79
纤维性骨瘤·····	80
下颌部肿瘤·····	81
腮腺混合瘤·····	82
颅顶部肿瘤·····	84
脑岩·····	84

颈 项 部

对口疽·····	87
发际疮·····	94
风池穴肿痛·····	97
项臂痛·····	98
风热痰·····	99
颈痈·····	102
夹喉痈·····	107
左颈静脉瘤破裂、血肿 形成·····	110
瘰癧·····	111
瘰瘤·····	115
甲状腺机能亢进·····	117
天突痈·····	120

上石疽·····	121
失荣·····	124

胸 部

乳痈·····	127
乳头疼痛·····	140
产后乳少·····	140
男子乳病·····	141
女子乳病·····	145
乳癖·····	147
乳衄·····	149
肋软骨炎·····	154
胸壁浅静脉炎·····	155
腋痈·····	156
肋痈·····	157
肺痈·····	159
外伤性张力性气胸·····	160

腹 部

捧心痛·····	162
胃脘痛·····	163
左肋外伤·····	167
脐痈·····	169
脐漏·····	171
少腹疽·····	171
缓疽·····	174
肠痈·····	177

肠结·····	185
肠粘连·····	186
症积·····	188
缩脚痛·····	199
膀胱痛·····	203

背 腰 部

背疽·····	205
背部疔·····	210
背痛·····	212
胸椎压缩性骨折后遗 症·····	213
腰痛·····	214
尾骶部外伤后遗症·····	217
尾骨疼痛·····	219
鹳口疽·····	220

前 后 阴 部

子痈·····	221
睾丸血肿·····	226
子痰·····	227
囊痈·····	230
脱囊·····	230
水疝·····	232
阴囊血痣·····	232
绣球风·····	233
精索静脉曲张·····	235

鸡豚疳·····	236
下疳·····	237
阴茎痰核·····	238
阴茧·····	241
阴户瘙痒症·····	243
精浊·····	244
滑精·····	246
前列腺癌手术后小便失 禁·····	248
血精·····	249
失精后会阴、下肢、脊柱 疼痛·····	251
房事后血尿·····	253
肛门痛·····	255
肛漏·····	256
肛门坠痛·····	257
海底悬痈·····	259
阴疮·····	259

四 肢 部

蛇头疔·····	263
沿爪疔·····	267
蛙节疔·····	268
螭螂蛙·····	268
托盘疔·····	270
红丝疔·····	271
连续性指端皮炎·····	273

手部红斑·····	275
紫云疯·····	275
指甲营养不良症·····	276
十指脱落·····	277
赘肉·····	278
兑疽·····	279
臂痛·····	281
血肿·····	282
结核·····	283
肉瘤·····	284
腋痛·····	286
臀痛·····	288
褥疮·····	289
环跳疽·····	291
坐板疮·····	292
坐骨神经痛·····	293
静脉栓塞·····	296
股白肿·····	301
静脉炎·····	303
横痃·····	305
体癣·····	309
腿痛·····	310
硬红斑·····	311
扁平苔癣·····	313
妊娠期腿痛·····	315
膝痛·····	316
鹤膝风·····	317

血鹤膝·····	319
委中毒·····	320
右膝半月板破裂·····	324
烂疔·····	325
黄鳅痛·····	326
膝疮·····	328
流火·····	329
大脚风·····	331
右小腿疼痛·····	333
腿肚痛·····	334
足踝滑膜炎·····	336
麻风·····	337
脚发背·····	340
足跟痛·····	341
脱疽·····	342
变应性脉管炎·····	348
肢端红痛症·····	350
冬令趾痛症·····	355
痛风·····	356
手足多汗症·····	356
结节性红斑·····	357
进行性对称性红斑角化 症·····	359
痼疮(掌跖脓疱病)·····	360
鹅掌风、脚湿气·····	362
脚湿气感染·····	362

不 定 位 部

流注·····	364
附骨疽·····	378
骨痹·····	389
痹症·····	399
急性湿疹·····	404
慢性湿疹·····	407
湿疹样皮炎·····	409
虫咬性皮炎·····	410
过敏性皮炎·····	412
接触性皮炎·····	414
皲皮疮·····	418
脓窠疮·····	421
天泡疮·····	423
风疹块·····	425
丘疹样荨麻疹·····	427
药物性皮炎·····	428
大疱型红斑·····	433
多形性红斑·····	434
远心性环状红斑·····	436
斑疹·····	437
日光性皮炎·····	438

夏季皮炎·····	440
神经性皮炎·····	442
风瘙痒·····	443
七窍发痒·····	444
蛇丹、缠腰火丹·····	445
枯筋箭·····	449
扁平疣、传染性软疣·····	450
玫瑰糠疹·····	450
汗斑·····	452
毛囊苔癣·····	452

其 他

白塞氏病·····	454
猪囊虫病·····	456
瘀血发热·····	458
误吞异物·····	461
川草乌中毒·····	461
吞服薄荷油·····	462
蟾蜍中毒·····	463
窦道、瘰管·····	463
烧伤·····	469
冻疮·····	471
方剂索引·····	472

头 面 部

疖

〔医话〕

疖子是由天时炎热，感受暑毒，蕴于皮肤所致；或先患痱子，因搔痒而感染毒气，亦可转成本病。

夏令痱子盛发，搔痒不止者，可用玉容粉扑之。此方清凉解毒，滑润皮肤，效果比一般痱子粉为佳。

疖子一般不须内治。可用青敷药外敷；破溃后用九一丹提脓，外贴加味太乙膏；或单用加味太乙膏亦效。软疖脓成而不易溃破者，宜切开排脓；若听其自溃，则必迁延时日。有全身症状或疖发较多者，可配服清解暑热之药，如解暑汤或银花露等。软疖不红不热，屡愈屡发，经年累月，面色少华，正虚毒恋者，又宜服四妙汤扶正化毒，才不致愈而复发。

此外，夏季小儿头发中生多发性疖子，此愈彼起，满头都有，所患之处，毛囊破坏，头发脱落，不能再生，现代医学称为“秃性毛囊炎”，致病菌是金黄色葡萄球菌，毒力最强，抗菌素一般不易见效。中

医认为亦是感受暑热而起，治宜清解暑热：内服紫花地丁15克 半边莲10克 连翘10克 银花12克 六一散包12克 竹叶10克 车前子10克 赤芍10克 蒲公英15克；局部用金黄散外敷。曾治数例，效果良好。

白 秃 疮

〔医话〕

白秃疮俗称痢痢头，相当于现代医学的“白癣”。多生于儿童时期，有传染性。

本病比较顽固。治法：先将头发剃光，再用淡盐汤或生矾水洗净、揩干，然后用药膏搽擦。下列两方，可供选用：

1. 楝子膏：川楝子或土楝树子，去核、放瓦上烘脆，研成细末，备用。用时将药末^{15克} 加熟猪油或凡士林^{30克} 调和，涂擦患处，一日一次。

2. 红腊烛油：放在锅内烊化，乘热用棉签蘸擦患处，一日一次，用时须防烫伤皮肤。

脱 发

〔医话〕

“脂溢性脱发”是由风热侵袭，逼液外溢，风性上行，毛窍开放，所以头部油脂甚多，抓痒不休，中医称为“油风毒”。

“糠状秃”，头皮飞起白屑，搔痒无度，习称“白屑风”，亦是风热袭于肌肤，毛发失养所致。

以上两种，每与肝肾亏损，精血枯燥互兼。均宜润燥祛风，方取祛风换肌丸加减。外用海艾散或单味藜芦^{30克}煎汤洗头，一日一次，每能奏效。近用玄明粉^{30克}，加冷开水200毫升溶化，每天搽头四、五次，疗效亦较满意。

“斑秃”又名蛀发癣、咬发癣，俗称鬼剃头。《全生集》所载活蜈蚣5条（如无，用干蜈蚣5条，研细末），浸入菜油30毫升内，五天后用此油搽患处。一日2~3次，重者配服养真丹，每服6克，一日两次。如系全秃，疗效较差。

粉 刺

〔医话〕

粉刺又名“肺风粉刺”，多发于青春期，俗称“青春颗”。相当于现代医学的“痤疮”。好发于颜面部，亦可延及胸背。余治此症，每从《金鉴》枇杷清肺饮去人参加黄芩、麦冬、赤芍、丹皮等味。青年人相火偏旺，方中黄柏一味，即为清泄相火而设，他如知母、山栀之类亦可加入。外治法，《金鉴》颠倒散（临睡前用冷开水调敷，清晨洗去）可以配合使用。

面 部 疔 疮

〔医案〕

案 1：敖某某，男性，30岁。

患者于四天前左颊部生一疔，挤压后肿胀益甚，且见发热，最近并有咳嗽胁痛、痰中带血等现象，故入某某医院治疗。体温40℃；白总分 30,200/立方毫米，中性79%，淋巴21%；血培养：金黄色葡萄球菌；胸部摄片：脓毒血症肺炎。诊断：1.左颊脓肿；2.脓毒血症。经各种抗菌素及液体疗法，病仍不减，故邀我院外科会诊。

会诊记录：此症先是左颊部生一疔肿，后因挤压而病势转重。今则面目颈项俱肿，身发高热。据此症状，的系疔疮无疑。考腮颊为少阳、阳明经循行之地，胃中火毒上升，是以左颊生疔；由于护理失当，以致疔毒走散。毒攻于肺，肺络损伤，故咳嗽胁痛、痰中带血；至于口臭喷人，不仅胃热有余，肺叶亦将腐败；脉滑数，苔黄腻。病情极重，神昏痉厥，亦意中事也。内治以清火解毒为主，肃肺和络为佐。药用银花藤30克 紫地丁30克 川连8克 炒赤芍10克 炒丹皮10克 黄芩10克 草河车12克 新鲜家园菊叶汁一杯(冲) 连翘10克 桃仁10克 冬瓜子15克 生苡仁15克 桑白皮10克 芦根30克 藕汁一杯(冲)用水煎服。外治：疮头掺黄升丹、贴黄连膏，肿胀处外敷金黄散，另于两侧委

中穴静脉上用三棱针刺出血，以泄营分之热毒。

翌日，该院病程日志谓：患者今日情况较昨日好转，局部肿胀亦较昨日为轻，下午体温 38.6°C ，白总分 $14,100/\text{立方毫米}$ ，中性 91% ，淋巴 9% 。仍继续服用中药。

本例仅会诊一次，自配合中药治疗后，症状逐渐好转，不久即痊愈出院。

按：疔疮初起，无论生于何部，皆忌挤压及过早切开，尤其面部疔疮，更是如此，否则毒气走散，每易造成走黄；清热解毒，固为治疗疔疮的基本大法，但用药还须随症加减，如此症咳嗽胁痛、痰中带血，病机侧重于肺，故用清解外，又佐以千金苇茎汤以肃肺和络。

案2：夏某某，男性，22岁。

患者于五天前右唇部生一疔，挤压后发生高烧，因而入某某医院住院治疗。临床诊断：唇痈败血症。后经血培养证实为金黄色葡萄球菌。用大剂量抗生素、输液、输血、物理降温仍无效；以后转入昏迷状态，各种反射均消失，腋下体温持续在 40°C 以上，故邀我院外科会诊。

会诊记录：先是右口角生一疔，经挤压后肿势逐渐扩大；今则面颊皆肿，壮热神昏，口噤不语如尸厥，两手握固，目赤如鸠，右眼球突出流血，上唇部亦腐烂出血。此疔疮走黄，毒陷心包之危候。夫阳明胃脉，挟口环唇，胃中火毒上升，是以口角生疔；热

毒过甚，内陷心包，心神被蒙，故神昏而口噤不语；舌干绛，脉洪数，一派炎炎之势，发痉即在目前。遂用大剂清热解毒、芳香开窍之法，紫花地丁60克 带心连翘15克 金银花30克 生甘草10克 川贝去心10克 丹皮6克 赤芍10克 黑山栀10克 钩藤后下10克 用水煎服；冲入菊叶汁一杯；并调下紫雪丹3克 犀黄0.6克 鼻饲给药；疮头上掺黄升丹，贴黄连膏，焮肿处用金黄散外敷；再在两侧委中穴静脉上放血。

第二次会诊：昨进清热解毒、芳香开窍之剂，壮热已退，两手亦不握固，目睛能稍稍转动，足底抓之亦渐有感觉，脉之洪数渐转缓和，面之焮肿显著消退，皆属转机之兆；无如神志尚昏迷，唇部仍焮肿燥裂，上唇内腐烂流血，右目珠仍赤肿流血，舌苔前半红绛，后半白而干燥；还系热毒充斥、心包被蒙之局。治法仍照原意扩充。药用安宫牛黄丸二粒(研) 西黄1克(研) 犀角粉1克 分作三次鼻饲，五小时一次；汤药则以鲜生地30克 丹皮10克 赤芍10克 银花30克 地丁30克 天竺黄10克 川贝10克 带子青蒿10克 甘菊花10克 草河车10克 鲜竹叶卅片 黛灯芯三扎 鲜菊叶汁一杯(冲)，煎汤鼻饲；上唇腐烂处用珠黄散和蜜调敷，其余外用药仍按原法。

第三次会诊：经中西医结合治疗两天，病情日有起色，神志转清，壮热告退，面目及颈部之焮肿已十去八九，目衄既止，唇内腐烂亦定；但上下唇余肿未消，口尚干渴，脉数未静，舌红苔黄。还系余邪未净