

魏筱泉醫話精華

魏筱泉（樹春）興化人博覽醫書不拘跡象而於疑難雜病能自別出機杼人競稱之著有

鶴山書屋筆記未傳

魏筱泉醫話次目

傷寒	一
濕病	一
癲亂	二
瘡	三
黃疸	四
頭痛	五
怔忡	五
腹脹	六
疝	七
二便	七
產後	八

魏箇泉醫話精華

上海秦伯未編纂

普甯方公溥參校

傷 寒

江北鹽阜一帶。地近海濱。居民感濕素重。若或受風寒。每發寒熱如瘡。兩
胯間必結核腫痛。或腹亦痛。俗呼爲發寒濕。實卽方書所謂類傷寒之一種。壬
子春阜甯李輔忠知事邀予診病。予留阜時。該處以症乞治者。日有數人。用柴
胡桂枝湯合五苓加味。以散寒利濕。服之無不立效。考四方水土不同。所患之
病亦各異。如江北之類傷寒。及江南之軟腳病。皆其明證。此近今西醫所以有
易地療養之說也。

溫 痘

表姪季景江溫病愈後。頑瘻壞塞心竅。瘡不能言。用密陀僧一錢。研細末。

茶清調服。入口即能言。去秋兒子安森治與夫某甲。因觀劇廟中小合。忽倒幾被壓傷。致驚氣入心。亦瘡不能言。仍服前方而愈。按密陀僧一物。能鎮驚祛痰。凡病痰迷心竅。及驚氣入心致瘡不能言者。服此無不立效。

東門外木齋黃姓。溫病誤表不得汗。邪熱鬱於肌表血分。周身遍發錦斑。繼起膿泡。破流膿水。燥煩大渴。舌乾紅無津。咽痛便祕。脈見洪數。此名陽毒。予進化斑湯合犀角地黃湯。加竹葉煎服。服二帖。諸症均減。膿泡亦漸次收斂。再加蓼皮三錢。大便亦通。繼用養陰調理之品。未旬日而愈。查此症患者甚少。先嚴百泉公臨症數十年。僅見陽毒一次。予年六十餘。亦始治黃姓陽毒病。此雖不經見之症。然治之稍不如法。輒有生命之虞。可不慎諸。

□ 霍亂

北門外黃姓。陽霍亂。服熱劑。周身遍發錦斑。其大如錢。疎密不一。煩渴利下。臭惡。舌黑無津。脈伏肢不溫。其家謂病將不治。而病者必欲邀予一診。予

倣陽症誤服熱藥發斑例。用化斑湯合竹葉石膏湯。加清絡之品。服二帖。諸症悉平。瘡亦退盡。予以霍亂發斑一症甚少。故特表而出之。

口瘡

癸丑冬。予應京師沈兩人侍郎之聘。爲其公子診病。道經白下時。有甯大張姓者。瘡以日作不熱。而但寒已。發數次。時以治瘡套方治之。不效。乃乞予爲擬一方。予謂此症由其人陽氣素虛。夏間又貪涼食冷過度。致陰氣益盛。陽氣益虛。故瘡來但寒不熱。而牝瘡以成。當用柴胡桂薑湯服一帖。瘡即止。再服醒脾化濕之劑數帖。而氣體復原。

泰縣黃丁。己春瘡後失調。邪入肝經。據於血痰濕結塊。脇下是屬瘡母。前由其友人介紹來絕。予令服鱉甲煎丸。陳皮湯下。彼不慣服丸。請改與湯藥。乃用石頭老人治瘡母方。即柴胡鱉甲桃仁三稜莪朮。俱用醋製合。二陳湯加砂糖及防己等味。以疏通血絡。兼祛痰濕。服數帖。瘡母全消。而氣體健強逾昔。

所以此方治瘧。每較鱉甲煎丸等方見功尤速。特濡筆而記之。

秦郵章書甫之夫人。患瘧經月不止。瘧來熱多寒少。心煩作嘯。口乾渴飲。脈弦且數。此症由陰氣先傷。陽氣獨發。名曰癲瘧。予用陳修園氏治瘧二方。卽柴胡粉草茯苓白朮橘皮鱉甲首烏當歸知母靈仙服兩帖。瘧卽未作。繼進清熱養陰之品。調理而痊。此後凡傷陰瘧病。用此法無不應驗。

■ 黃 痘

先嚴百泉公爲秦郵趙雙湖先生之入室弟子。醫學精深。宅心仁厚。曾傳治瘡驗方一則。凡溫鬱發黃。濕邪瀰漫三焦。胸脘閼塞難堪者。用加減宣清導濁湯治之。無不奏効。云方用赤芍。豬苓。杏仁。苡仁。茵陳。滑石。寒水石。粳米。仲冬丹徒李雨孫。患黃疸病。其見症與上述相同。延醫與藥無效。乃乞予爲之診治。予卽用前方加川貝。鬱金。通草。澤瀉等味。以滻濕邪。兼利氣。分服不過數帖。胸次已舒。小水暢利。黃亦盡退。旋身體強健如初。爰述此方。以補方書治法所未

及而爲海內患者之一助。

口頭痛

六合洋貨業劉某病頭痛數年前醫或清肝熄風或養陰滋腎均不應。其岳父柳某素信予促其來興就診予疑其諸法備嘗何以不效乃詢以曾患花柳症未伊云未病前一月曾在秦郵宿一妓此妓係患梅毒新愈者予曰病根基于此也卽用金鑑結毒紫金丹加銀花粉草苡仁木瓜滴乳石煎服以敗毒止痛服後痛卽大減後爲擬一丸令其回里調養伊叩謝而去。

予壻洪靜山秋間燥邪上擾清竅爲之不利頭痛耳鳴目赤口苦彼以微疾不敢來瀆予先延他醫診治服清肝熄風藥不應乃乞予爲調理予用吳氏治燥邪化火清竅不利之翹荷湯加菊花夏枯草苦丁茶服二帖其病卽痊此昔人所謂治病必先歲氣無伐天和者也。

■ 錢仲

阜甯縣署幕僚張君。因案牘煩勞。心營有損。性慄不寐。自汗健忘。深以爲苦。先延西醫診治。西醫謂爲心藏血脈亢進。令服藥水數瓶而卒無效。乃託其友人某轉懇予爲之調治。予用天王補心丹。以養心血爲主。服藥僅一月。而諸症悉除。是則中西醫之藥力。對於見症。但視施治之得當與否。固無從軒輊也。

口 痢 腹

甯國李雲門太守。患少腹脹大。肢體盡腫。兩脇刺痛。吐瘀多至盈碗。凡理氣行水之藥。均遍嘗不效。羣醫以此病難治。皆相率辭去。其幕僚趙君與予善。因薦予往診。予思昔賢論腫脹之因。有氣血寒熱痰濕蟲積之不同。若腫脹腹大。而又脇痛吐瘀者。其爲血臌無疑。予卽用歸尾桃紅乳沒旋覆鬱金之屬。以通絡消瘀。服兩帖。瘀止痛平。仍依前法增損。再服十餘帖。而腫脹盡消。夫醫者。如李太守血臌之類是也。臨症能辨明病因。則施治自可獲效。如辨因不確。則藥不中病。未見有能治愈者。如李太守血臌之類是也。

□ 痘

西城趙某。秋季因受外邪。引動痘氣舊患。寒熱似瘡。右睾墜大。牽引少腹而痛。凡解表及治瘡之藥。均遍嘗不效。特遠道求診於予。予用柴桂各半湯。加川棟茴木香吳萸。以和解少陽兼散寒行氣。服二帖。寒熱即退。痘痛亦輕。再服補中益氣湯加味。而瘡全除。按前方見溫病條辨。凡寒熱似瘡。而又痘痛者。用此無不應驗。是不可以不記。

□ 二便

寶應華少臣夫人。產後清濁混淆。大小便易位而出。病名交腸。言大小腸交之謂也。其家以新產體虛不便。出外就診。特遣人詢方於予。予用五苓散。每服三錢。溫酒調下。使清濁分利。則二便自可如常。後月餘致禮來謝矣。

丹徒楊雲甫。便祕帶血。脫肛腫痛。已歷年餘。時作時止。前醫不知爲大腸蘊熱。而謂爲氣虛下陷。誤進補中益氣湯。而脫肛腫痛益甚。乃求治於予。予用

黃連解毒湯加槐花柏葉。腫痛脫肛均愈。再進五仁法。而大便如常。此後遂永不復發。

■ 產後

丙辰夏。予往臨川。寓友人陳龍山處。其甥婦患病重。以予年老。不敢勞遠行。卽延兒子宏焱往診。旋歸以病狀及方治告予。謂產後發熱逾旬。少腹微痛。前醫用解表及補血之藥。而熱皆不減。乃詢以產後病行多少。瘀者云瘀行甚少。其爲停瘀發熱可知。當與以枳實芍藥散加澤蘭丹參桃紅青皮等味。以行瘀清熱。兼止其痛。不卜服後果能獲效否。予曰。凡產後惡露未淨。而致發熱者。願消瘀藥無不立解。此症效可必矣。次日又延復診。詢之果熱減痛平。卽依此法調理而瘥。