




古方医案选编

戴佛延 编著

上集



样 本 库

《古 方 医 案 选 编》

上 集

戴 佛 延

yx18019



成 都 中 医 学 院

一九七九年三月

1021636

前 言

时光好像流水，过得真快。回忆我于1956年奉调来蓉，参加成都中医学院伤寒课的辅导、教学、编写教材等工作，转瞬间已经度过二十二个年头，年龄也随着时间的增长，不觉已虚度六十五个寒暑了。经过这段较长时间的学习和研究，对古典医笈的探讨和古方的运用，深感兴趣。欣逢华主席为首的党中央，英明决策，一举粉碎了祸国殃民的“四人帮”，敬爱的周总理根据毛主席指示，在四届人大宣布的四个现代化的宏伟规划，即将实现，科学的春天，已经到来，举国上下，万象更新。学术领域，百家争鸣，真是一派昌盛繁荣景象，怎不令人精神振奋，干劲倍增。在我院党委领导的关怀和鼓励下，遵照伟大领袖毛主席“古为今用”的教导，草成《古方医案选编》一书，聊供教学、科研和临床工作的参考。由于时间仓卒和认识所限，遗漏和错误的地方一定不少，希望同志们和读者提出宝贵意见，以便作进一步的改正和提高。

戴佛延

一九七八年九月于成都中医学院

几 点 说 明

1、为了在学习古典医笈论中能够紧密结合临床实践，特选录古今医家治验，作《古方医案选编》。（以下简称本编）

2、本编共分上、中、下三集，上集为《伤寒》方医案。中集为《金匱》方医案。下集为《千金》、《外台》方医案。

3、本编用以方统证办法，例如桂枝汤治某某证，麻黄汤治某某证等。与其它医案，以证候分类者不同。

4、本编所选录医案，一概注明出处，以便查阅。

5、原案中所引古典医笈，多未具体指出篇章条文，如在内、难经、伤寒、金匱何篇何条，均一一注明，以便参阅。

6、原案中所引有明显错误处，依经据证酌于改正。

7、本编所引《伤寒论》条文编号，系依据全国中医学院教材重订本1964年版次序排列，与其它注本略有出入，查阅时请依该本为准。

8、本编所收医案，以运用古方为主，时方为辅，既不厚今薄古，也不厚古薄今，力求遵循“古为今用”之旨。

9、本编医案中有原编者按语，概为保存全貌；其有个人点滴体会处，概加：“延按”二字以别之。

《古方医案选编》上集

《伤寒论》方医案目录

桂枝汤证案 6 例·····	(1)
桂枝汤禁忌证案 2 例·····	(4)
桂枝加桂汤证案 2 例·····	(6)
桂枝甘草汤证案 1 例·····	(7)
桂枝加葛根汤证案 1 例·····	(8)
桂枝加朴杏汤证案 1 例·····	(8)
桂枝附子汤证案 1 例·····	(9)
桂枝加附子汤证案 2 例·····	(10)
桂麻各半汤证案 1 例·····	(11)
桂枝二麻黄一汤法证案 1 例·····	(12)
桂二麻一汤证案 1 例·····	(13)
桂枝新加汤增附子证案 1 例·····	(14)
桂枝人参汤证案 1 例·····	(15)
小建中汤证案 1 例·····	(15)
小建中汤加味证案 1 例·····	(16)
麻黄汤证案 4 例·····	(17)
麻杏石甘汤证案 2 例·····	(20)
麻杏石甘汤加味证案 2 例·····	(21)
麻附细辛汤证案 1 例·····	(22)

麻附细辛、附子泻心汤证案 1 例·····	(23)
葛根汤证案 1 例·····	(24)
葛根汤加味证案 1 例·····	(24)
葛根芩连汤证案 1 例·····	(25)
大青龙汤证案 1 例·····	(26)
小青龙汤证案 8 例·····	(26)
小青龙汤加減证案 1 例·····	(28)
小青龙汤加味证案 1 例·····	(29)
梔子豉汤证案 1 例·····	(30)
梔子生姜豉汤证案 1 例·····	(30)
梔子生姜豉汤加味证案 1 例·····	(31)
枳实梔豉汤加大黄证案 1 例·····	(32)
大陷胸汤证案 1 例·····	(32)
小陷胸汤加減证案 1 例·····	(33)
大黄黄连泻心汤证案 1 例·····	(34)
附子泻心汤证案 2 例·····	(35)
半夏泻心汤证案 1 例·····	(36)
半夏泻心汤加味证案 1 例·····	(37)
黄连汤证案 2 例·····	(38)
生姜泻心汤证案 2 例·····	(39)
減味旋复代赭石汤证案 1 例·····	(41)
五苓散证案 3 例·····	(42)
十枣汤证案 3 例·····	(44)
十枣汤变汤为丸证案 1 例·····	(46)
白虎汤证案 2 例·····	(47)

白虎汤加味证案 2 例·····	(48)
白虎加人参汤证案 5 例·····	(49)
人参白虎汤加加减证案 1 例·····	(52)
竹叶石膏汤加加减证案 1 例·····	(53)
调胃承气汤证案 1 例·····	(54)
小承气汤证案 2 例·····	(55)
大承气汤证案 3 例·····	(56)
大承气汤加味证案 1 例·····	(57)
桃仁承气汤证案 1 例·····	(58)
桃仁承气加味证案 2 例·····	(59)
抵当汤证案 2 例·····	(60)
抵当丸证案 3 例·····	(62)
伤寒治黄三方加味证案 1 例·····	(63)
小柴胡汤证案 2 例·····	(65)
小柴胡汤加味证案 3 例·····	(66)
柴胡桂枝汤加味证案 1 例·····	(68)
大柴胡汤证案 2 例·····	(69)
大柴胡汤加味证案 2 例·····	(70)
柴胡加龙骨牡蛎汤证案 1 例·····	(72)
柴胡加龙牡汤加加减证案 1 例·····	(73)
理中汤证案 3 例·····	(74)
理中汤加味证案 3 例·····	(77)
理中汤加附子证案 1 例·····	(78)
四逆汤证案 1 例·····	(81)
四逆加人参汤证案 4 例·····	(82)

四逆散证案 1 例	(86)
白通汤证案 1 例	(86)
通脉四逆汤加童便证案 1 例	(87)
茯苓四逆汤证案 1 例	(88)
真武汤证案 2 例	(90)
真武汤加味证案 1 例	(91)
猪肤汤证案 1 例	(92)
黄连阿胶汤证案 2 例	(93)
当归四逆汤证案 2 例	(95)
当归四逆加茱萸汤案 1 例	(96)
干姜苓连人参汤证案 1 例	(96)
麻黄升麻汤证案 2 例	(98)
白头翁汤加味案证 1 例	(100)
加减乌梅丸证案 1 例	(101)
吴茱萸汤证案 1 例	(102)

桂枝汤证案（六例）

1、 太 阳 中 风

许叔微治其乡人吴德甫，得伤寒，身热自汗，恶风，鼻出涕，关以上浮，关以下弱，此桂枝证也。……使服之，一啜而微汗解，翌日诸苦顿除。（录自《本事方》）

延接： 本案先叙证，后述脉，再下诊断并处方，简明扼要。其具体脉证，见于《伤寒论》太阳上篇2、12、13各条。本证既有自汗，如何还须微汗始解呢？因中风证自汗是邪汗，虽汗而不透，出而不畅，证状并不因汗出而缓解，必待服桂枝汤后，荣卫调和，则诸证自除。

2、 太阳中风

许叔微治里间张太医家一女子，病伤寒，发热，恶风，自汗，脉浮而弱。许曰：当服桂枝，（当为桂枝汤），彼云：家有自合者，许令三啜之，而病不除，予询其药中用肉桂耳。许自制以桂枝汤，一啜而解。论曰：仲景论用桂枝者，盖取桂枝轻薄者耳，非肉桂之肉厚也。盖肉桂厚实，治五脏用之，取其镇重。桂枝清轻，治伤寒用之，取其发散。今人一例，是以无功。（录自《伤寒论类方汇参，桂枝汤案例》）

延接： 本案既具桂枝汤典型证状，用本方何以不效？

通过详询，始知方中主药桂枝，是代以肉桂，以致三啜而病不除，后改用桂枝，即一啜而解。案中说明桂枝与肉桂功能，值得注意。从这个案例看来，充分说明药物的作用各有其特性，在临床应用时是应该仔细考虑的。

3、表未解似里实

儒者吴君明，伤寒六日，谵语狂笑，头痛有汗，大便不通，小便自利。众议承气汤下之，士材诊其脉浮而大。因思仲景曰：“伤寒不大便六七日，头痛有热，小便清者，知不在里，仍在表也。”方今仲冬，宜与桂枝汤。众皆咋舌，以谵狂为阳盛，桂枝入口必毙矣。李曰：汗多神昏，故发谵妄，虽不大便，腹无所苦，和其荣卫，必自愈耳。遂违众用之。及夜而笑语皆止，明日大便自通……。〈录自《古今医案按，李士材案》〉

延按：本案引仲景语，见《伤寒论，太阳中篇》56条。此证用桂枝汤的着眼点，在于外证虽有谵语狂笑，大便不通的假实证，但无潮热腹满拒按脉实可攻的依据，而有头痛有汗，脉浮大的表证表脉可凭，故一用桂枝汤而谵语止，大便通，正所谓“外疏通，内畅遂也”。辨证之精，足资启发。

4、误下表邪尚在

张隐庵治一少年，伤寒三四日，头痛发热，胸痛不可忍。病家曰：三日前因食而而致病。张曰：不然，面饭粮食，何日不食，盖因外感风寒，以致内停饮食，非因食面而

为头痛发热也。故凡停食感寒，只宜解表，不可推食，如里气一松，外邪即陷入矣。且食停于内，在胸下胃脘间，按之而痛；今胸上痛不可按，此必误下而成结胸。病家云：昨延某师，告以食而，故用消食之药，以致胸中大痛。因诊其外证尚在，仍用桂枝汤加减，一服而愈。

按：从此案可以充分说明表证误下之害。但误下之后，表邪尚未全陷，还有外出之机的，即宜乘势使用汗法，使邪仍从汗解，否则错过时机，邪气内陷，待结胸、下利、痞证等变证出现之后，再行救误，那就更增麻烦。此案之治病用药，目光敏锐，当机立断，是非常重要的。（录自《伤寒论译释》）

延按：凡外感风寒致内停饮食，在表邪未解，里证不急的情况下，就应当先解表，表解而里自和，此伤寒通例。

5、太阳中风

头项强痛而恶寒，脉缓有汗，太阳中风，主以桂枝汤。

桂枝9克 白芍6克 炙草6克 生姜9克 大枣二枚
水五杯，煮二杯，第一杯服后，即食稀热粥，令微汗佳，有汗，二杯不必食粥，无汗仍然。（录自伤寒论译释·吴鞠通医案）

延按：风寒之邪，本相因而至，故不应截然划分，所以《伤寒论》太阳上篇12条有“啬啬恶寒，淅淅恶风”之语，本案不言恶风而言恶寒，当本此义。至桂枝汤本治有汗的中风证，其病是有汗出证的，此案后有“无汗仍然”句。揆其意，系指桂枝汤服后药力未达，未能蒸蒸微似汗出而言，并

非本证无汗。案中既具备了桂枝汤典型脉证，故用桂枝汤原方不增减，煮服亦悉遵仲景，可谓学古有获。

6、病常自汗出

一商人自汗证，达半年之久，延医服止涩收敛药如龙牡之类，约数十帖之多，毫无寸进，请中医王子政治疗，询知病者无发热恶风证状，汗出不温，精神觉得疲倦，脉象弱而不振，温剂收涩药已遍服无效。乃予桂枝汤，服五帖而愈。

按：桂枝汤调和荣卫，具发汗止汗之功，观此案可证。（录自《伤寒论译释》）

延按：余在蓉曾治一病员魏某，系绵阳修理收音机工人，年廿余，体瘦弱，面色青白，四肢欠温，夏月犹著毛线衣，诊之，脉缓弱，稍动即易出汗，屡感冒，常服西药并打针无效，余处以桂枝汤合玉屏风散，服廿余剂治愈，即师此案意立法。

桂枝汤禁忌证案（二例）

1、酒客患中风

富安钟表商人，殷利泉，患头疼发热，汗出恶风，脉浮之表证。同时其人嗜酒达数十年之久，每餐必饮，生平最不喜欢甜食。医按太阳中风证治疗，而给以桂枝汤与服，服后呕吐不已，表邪未解，反增喉痛咽寒，中医王子政以葛根芩

连汤加減，服三剂，咽肿消而身热退矣。

按：此案嗜酒数十年，且平素不喜甜食，则湿热内盛可知。（录自《伤寒论译释》）

延按：本案所述病情与《伤寒论，太阳上篇》18条相符。喻嘉言说：“酒客平素湿与热搏结胸中。才挟外邪，必增满逆，所以辛甘之法，遇此辈即不可用。则用辛凉以彻其热，辛苦以消其满，自不待言”。观案中所出治疗方剂，有解表清里之功，所以获效。至加減之法，《世补斋谓》：“芍、芷、羌、独、荆芥、藁本、蔓京、卜荷、桑叶、藜香、香薷、赤芍、丹皮、黑梔等药，皆可随证加入，”特录出以供临床参考。

2、内热素盛失血

周，三四，屡屡失血，饮食如故，形瘦面赤，禀质木火，阴不配阳。据说服桂枝汤治外感，即得此恙。……。徐灵胎批云：“风嗽夹火者，服桂枝汤必吐血，百试百验”。

按：叶氏之医案，及徐氏之批语，可作为本案经文《伤寒论、太阳上篇》20条有力的证实。（录自伤寒论译释临证指南医案）

延按：《伤寒论注释要编》（孙纯一编著）于本条下注云：“服桂枝汤，吐衄血者，可用一味茅根汤，或用阿胶鸡子黄汤……，至于口后吐衄血者，宜察其在肺在胃，依肺病胃病之法而治之。”可供临床参考。

桂枝加桂汤证案（二例）

奔 豚

例一：湖北张某，为书店帮伙，一日延诊，云近日得异疾，时有气痛，自脐下少腹起，渐冲痛到心，顷之止，已而复发，夜间尤甚，请医不能治，已一月有奇。审视舌苔白滑，脉沉迟，即与桂枝加桂汤，一剂知，二剂愈。

例二：周右，住浦东，初诊，气从少腹上冲心，一日四五度发，发则白津出，此作奔豚论。

肉桂心 8 克 川桂枝 大白芍各 6 克 炙甘草 6 克 生姜三片 大红枣八枚

二诊：投桂枝增桂汤后，气上冲减为日二三次发，白津之出亦渐稀，下泻矢气，此为邪之去路，佳。

按：以上两条之奔豚证状，均较典型，投以桂枝加桂汤后，都能迅速收到效果，足见运用经方，只要方证相对，疗效是确实可靠的。《金匱》亦有奔豚桂枝加桂汤证，证状大体相同，不过彼之病因为从惊恐而来，此之病因为针后受寒，但是其机转总不外心阳不足，下焦寒气上逆，与《金匱》奔豚汤证之气从少腹上冲心应有鉴别。一案中之舌苔白滑，脉沉迟。二案中之发则白津出（即发作时口中有清水流出），均为应用本方之重要眼目。（录自伤寒论译释·遯园医案和《经方实验录·姜佐景医案》）

延按：以上两案，桂枝加桂汤中之桂，均应以加肉桂为是，因两案均无表证，故不用桂枝，有阴寒水气之里证，

故须加肉桂也。参考桂枝汤证案二许叔微之分析，更加明确。

桂枝甘草汤证案（一例）

汗多义手冒心

马元仪治沈康生夫人，病经一月，两脉浮虚，自汗恶风，此卫虚而阳弱也。与黄芪建中汤一剂汗遂止。夫人身之表，卫气主之，所以“温分肉，肥腠理，司开合者”①，皆此卫气之用。故内经曰：“阳者卫外而为固也”②。今卫气一虚，则分肉不温，腠理不密，周身毛窍有开无合，由是风之外入，汗之内外，其孰从而拒之？故用黄芪建中汤以建立中气，而温卫实表也。越一日病者义手自冒心间，脉之虚濡特甚，此汗出过多而心阳受伤也。仲景云：“发汗过多，病人义手自冒心，心下悸者，桂枝甘草汤主之”。③与一剂良已。

按：①《灵枢·本脏篇》

②《素问·生气通天论》

③《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》64条。

按：从本条的效果上来看，桂枝甘草汤治汗后阳虚心悸的疗效是非常确实可靠的。脉虚濡与病经一月之自汗恶风，都是本案的辨证眼目。（录自《伤寒论译释》）

延按：本案前一阶段证状，得力于《金匱·血痹虚劳病脉证并治第六》之黄芪建中汤，后一阶段，才收效于桂枝甘草汤。两方的作用，均不能忽视，如在方中再加枣仁、柏

仁、地黄、枸杞、龙眼、红枣、小麦等以增强疗效、似更佳。

桂枝加葛根汤证案（一例）

太阳汗出恶风背强

庚戌，建康徐南强，得伤寒，背强，汗出，恶风，予曰：桂枝加葛根汤证。病家曰：他医用此方，尽二剂如旧，汗出愈加。予曰……是方有麻黄，服则愈见汗多……止于桂枝加葛根汤也（注）。予令服之，微汗而解。（《录自伤寒九十论》）

注：《伤寒论·太阳篇上》14条。

延按：考原方中有麻黄，林亿校正云：“恐是桂枝中但加葛根耳”。今观许案说明并通过临床实践，其应去麻黄绝无可疑，足见原方之错简，林亿校正之可信。

桂枝加朴杏汤证案（一例）

伤寒误下微喘

一武官为寇执，置舟中艤板，数日得脱，乘饥恣食，良久解衣扞虱，次日遂伤寒，自汗而喘不利。一医作伤食而下之，一医作解衣中邪而汗之。杂治数日，渐觉昏困，上喘息高。许诊之曰：“太阳下之，表未解，微喘者，桂枝加厚朴杏仁汤”（注），此仲景法也。指令医者治此药，一啜喘定，再啜热缓微汗，至晚身凉而脉已和矣。

注：《伤寒论·太阳篇上》43条。

按：本条证状病因与古方吻合，所以即用原方，并无加减，效果卓著，从而可证仲景立方的精纯。（录自伤寒论译释·本事方）

延按：考伤寒论用本方，一为43条，一为19条，前者系误下致喘，后者系新感引发宿疾致喘。本案病情与43条相符，因误治后上喘息高，表仍未解，故用桂枝汤解肌，加厚朴、杏仁下气定喘。

桂枝附子汤证案（一例）

伤寒变痹

张幼文，32岁。素因多湿，偶感风寒，发热恶寒，一身手足尽痛，不能自转侧，脉浮大而紧，风为阳邪，故脉浮大主病进，紧主寒凝，脉证合参，风寒湿三气合而成痹，桂枝附子汤主之。方中桂、附辛以散寒，草、枣奠安中土，生姜利诸气，宣通十二经络，使风寒湿若于肌表面作痛者，一并廓清矣。

处方：桂枝12克 附子4.5克 甘草6克 大枣六枚
生姜9克

一日二服，三日举动如常，继服平调之剂愈。

何廉臣按：伤寒变痹，必挟风湿。《伤寒论》曰：“伤寒八九日风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。”今有是证则用是药，确得仲景心法。（录自《全国名医验案类编·曾月根医案》）

延按：何按所引见《伤寒论·太阳篇下》179条，所