

儒門事親

金 睢州 張子和 著
明 新安 吳勉學 校

卷十五

瘡瘍癰腫第一

治螻蛄瘡

良薑

白芨

瀝青

已上各等分

右爲細末。嚼。芝麻水同熬爲膏。入冷水。共定用緋絹片。火熨斗作膏藥。貼瘡上。

又方 千年石灰

茜根燒灰

右爲細末。用水調雞翎塗上。

水沉金絲膏 貼一切惡瘡。

瀝青

白膠

已上各一兩。

春秋宜用油。

夏宜油蠟二錢半。

冬宜用油蠟四錢。

右件鎔開油蠟。下瀝青白膠。用槐枝攪勻。綿子濾過。入冷水中。扯一千餘遍。如瘡透了。喫數丸作劑。於瘡口填者亦妙。攤紙上貼。勿令火炙。

乳香散

治下疳。

乳香

沒藥

輕粉

黃丹

龍骨

烏魚骨

黃連

黃芩

銅綠

已上各等分。

麝香少許

右爲細末。先以溫漿水洗過。貼疳瘡上。

治蛇傷方

右用蒲公英科根。作堊。貼于傷處。用白麵膏藥貼之。大效。

紫金丹

治疔瘡。

白礬四兩

黃丹二兩

右用銀石器內鎔礬作汁。下丹。使銀釵子攪之。令紫色成也。用文武火。無令太

過不及。如有瘡。先以暹園挑破。上藥用唾津塗上數度着。無令瘡乾。其瘡潰動。取疔出也。兼瘡顏色紅赤爲效。如藥未成就。再杵碎。炒令紫色。

治疔瘡

生蜜與隔年葱一處研成膏。

右先將瘡週迴用竹鍼刺破。然後用瘡藥於瘡上攤之。用緋絹蓋覆。如人行二十里覺疔出。然後以熱醋湯洗之。

千金托裏散

治一切發背疔瘡。

連翹二錢

黃耆半兩

厚朴二兩

川芎一兩

防風一兩

桔梗一兩

白芷一兩

芍藥一兩

官桂一兩

木香三錢

乳香半兩

當歸半兩

沒藥三錢

甘草一兩

人參半兩

右爲細末。每服三錢。用酒一椀。盛煎三沸。和滓溫服。膏子貼之。

二聖散 治諸瘡腫。

黃丹二兩

白礬二兩

右為細末。每服乾摻瘡口上。後用保生錠子。捏作餅子貼之。

保生錠子
巴豆四十九個另研 金脚信二錢 雄黃三錢

輕粉半匣 硃砂二錢 麝香二錢

右件為末。用黃蠟一兩半化開。藥將和成錠子。冷水浸少時。取出。旋捏作餅子。如錢眼大。將瘡頭撥破。每用貼一餅子。次用神聖膏藥封貼。然後服托裏散。若瘡氣透裏。危者服破棺散。用神聖膏貼之。

神聖膏藥 貼治一切惡瘡。

當歸半兩 沒藥三錢 白芨半錢 乳香三錢

薑本半兩 琥珀半錢 黃丹四兩 木鱉子五個去皮

膽礬一錢 粉霜一錢 黃蠟二兩 白膠三兩

巴豆二十個去皮 槐柳枝各長一把 清油一斤

右件一處。先將槐柳枝下油內。煮焦取出。次後下其餘藥物。煮得極焦。亦撈出。却將油澄清。再熬成膏子。用緋絹上攤貼之。

破棺丹

大黃半兩

甘草二兩

荆三稜半兩

山梔子半兩

牽牛末二兩

右爲細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服半丸。食後酒半盞研化服之。忌冷水。

三聖散 治腫瘡疔瘡。搭手背疽等瘡。

葱白一斤

馬莧一斤

石灰一斤

右三味。濕搗爲團。陰乾爲細末。貼瘡。如有死肉者。宜先用潰死肉藥。

潰死肉藥方

炊飯尖_{半兩各}

一等半兩。入巴豆二個。

一等半兩。入巴豆_{三個}

一等半兩。入巴豆五個。_{各然作白錠子}

右先用二巴豆納瘡。如不潰。再用納三巴豆。又不潰。用五巴豆者。更用丹砂炒

紅色。搽瘡口。追出清水。其惡肉未盡至。追出赤水。是惡肉盡。更用三聖散貼之。

用膏藥傳之。

治廉瘡久不愈者

用川烏頭黃藥各等分爲末。用唾津調塗紙上貼之。大有效矣。
治一切惡瘡方

以天茄葉貼之。或爲細末貼之。亦妙。

又方 用臘月中白燒灰。油調塗瘡疥上。

又方 以瓦松不拘多少。陰乾爲末。先用槐枝葱白湯洗之。過摻之。立效。灸瘡久不斂者。更妙。

又方 以蒲公英搗之。貼一切惡瘡諸刺。

替鍼丸 治一切惡瘡。

川烏二錢

草烏二錢

五靈脂二錢

輕粉一分

粉霜一分

又方 加斑蝥

足二十個去

巴豆

去皮用

右將三件爲末。研令勻。次入輕粉粉霜研勻。又入斑蝥巴豆。以水調糊爲錠子。
如作散是謂針頭散

懸蔓散 治發背惡瘡。

懸 蔓 一個

大 黃 一兩

金 銀 花 一兩

當 歸 半兩

皂 角 刺 一兩

右剉碎。用酒一椀。煎至七分。去滓。溫服。如有頭者。加黍粘子。

治附骨癰。及一切惡瘡。

當 歸 半兩

甘 草 一兩

山 梔 子 個 十二

木 鱉 子 一個

右爲細末。每服三五錢。冷酒調服之。

治諸惡瘡

白 僵 蠶 直者

大 黃 二味 各等分。

右爲細末。生薑自然汁。與蜜同和爲劑。丸如彈子大。每服一丸。細嚼。

治惡瘡死肉銕子

巴 豆 一錢 去皮油

五 靈 脂 半兩

黃 丹 二錢

加 枯 白 礬 一錢

右爲細末。以糊和丸。銕子入瘡內用之。

當歸活血散 治瘡瘍未發出。內痛不可忍。及婦人產前後腹痛。

當 歸 二錢

沒 藥 半錢

乳 香 半錢

白 芍 藥 三錢

瘡瘍者。加人參。木香。婦人。加赤芍藥。

右爲細末。每服一錢。水一中盞。煎至七分。和滓溫服。日二服。婦人酒煎。瘡既發。不須用。

熏惡瘡方

紫花地丁一名米布袋收

右取根曬乾。用四個半頭。搗。壘成爐子。燒着地丁。用絡絪。搗一枚蓋了。使令壘眼內煙出。薰惡瘡。出黃水自愈。

治蛇瘡

用蒲公英科根作堊。貼于傷處。用白膏藥封之。

接骨散 并治惡瘡

金頭蜈蚣一個 金色自然銅半兩燒紅醋碎研爲細末用之

銅錢重半兩者取三文或五文燒紅醋研碎細

沒藥三錢研細

金絲水蛭一錢半每個作三截上煨去氣道爲度

乳香二錢爲細末用之

右爲細末。如瘡腫處。津調半錢。塗。立止痛。如見得出膿。先用粗藥末少許。小油

少半匙。同打勻。再入少半匙。再打勻。又入前藥接骨散半錢。再都用銀釵子打成膏子。用雞翎掃在瘡腫處。立止痛。天明一宿。自破便效。如打折骨頭并損傷。可用前項接骨散半錢。加馬兜鈴末半錢。同好酒一大盞。熱調連滓溫服。如骨折損立接定不疼。如不折了。喫了藥。立便止住疼痛。此方屢經效驗。不可具述。服藥覷可以食前服。食後服。又外用接骨藥。

陳爛麻根

兩把羊耳

對亂絲者更妙

右取肥松節劈碎。約量多少。先放三兩根於新瓦上。都於上外三味。在上燒着存性。就研爲末。如生。再燒研爲度。後入五靈脂或半兩。如疼入好乳香少許。和藥如茶褐色爲度。用布條子約纏一遭。先攤小黃米粥勻。上撒上藥末勻。纏定折處。上又用軟帛三五重。上又竹篾子纏。勒得緊慢得中。初三日換上一次。再後五日換一次。又七日再換上一次。無有不接者。

赤龍散 消散一切腫毒。

用野葡萄根。紅者去粗皮爲末。新水調塗腫上。頻掃新水。

便癰方

本名血疳

牡蠣

大黃

甘草似上各

懸菴一個

右酒浸。露一宿。服之。以利爲度。

又方 冬葵子爲末。酒調下三兩服。

又方 皂角不蛀者。燒過陰乾爲細末。酒調服之立效。又皂角子七個。水調服之亦效。

又方 胡桃七個。燒過陰乾。研爲末。酒調服之。不過三服。大效。

又方 生蜜米粉調服。休喫飯。利小便爲度。

治瘡無頭者

蛇退皮於腫處貼之。

又方 皂角刺。燒灰陰乾。

右爲末。每服三錢。酒調嚼葵菜子三五個。前藥送下大效。

生肌斂瘡藥

白蘞

定粉各等

黃丹少許

右同爲細末。洗淨瘡口。乾貼之。

治諸瘡水度腫者

生白礬末。水調塗之。自消。

接骨藥

銅

錢半兩醋浸碎
焦燒研爲末

麝

香少許

木

香一錢

自然銅一錢

右爲極細末。如在上。食後每服三匙頭。嚼丁香一枚。乳香一粒。無灰酒一小盞。在下。食前如不折。其藥反出。服罷。其痛不可當。勿疑。待一日。如骨未接。再服如前。老者十餘日。少者不過五七日。

萬聖神應丹。出箭頭。

萇蓉科

一名天仙子。取着中一科。本枝葉花實全者佳。

右於端午日前一日。持不語。尋見萇蓉科。言道。先生你却在這裏。那道罷。用柴灰自東南爲頭圍了。用木楔子。取了根。週迴土。次日端午日未出時。依前持不語。用鑊口一鑊。取出土。用淨水洗了。不令雞犬婦人見。於淨室中以石臼搗爲泥丸。如彈子大。黃丹爲衣。以紙袋封了。懸於高處陰乾。如有人着箭。不能出。

者。用緋絹盛此藥訖。放臍中。用綿裹肚繫了。先用象牙末於瘡口上貼之。後用前藥如瘡口生合。用刀子利開貼之。

治凍瘡

臘月雀腦子。燒灰研細。小油調。塗凍瘡口上。

又方 以正黃藥爲細末。用乳汁調。塗瘡口上。

又方 以山藥少許。生於新瓦上磨爲堊。塗瘡口上。治手足裂。

白芨。不以多少爲末。水調。塗裂處。

治面上瘡

用鐵子底黑煤。於小油中。以匙打成膏子。攤在紙上。貼瘡神效。

治金瘡血不止

用白薇末貼之。立止。

善應膏藥

黃丹二斤

南乳香另研

沒藥另研

當歸

木鱉子生用

白欽生用

白礬生用

官桂三寸

杏仁生

白芷以上各一兩 新柳枝各長一斤

右除黃丹乳沒等外。八件用芝麻油五斤。浸一宿。用鐵鍋內煎令黃色。藥不用。次入黃丹鍋內。柳條攪令黃色。方可掇下。用柳枝攪出大煙。入乳沒勻。令冷。傾在瓷盆內。候藥硬。用刀子切作塊。油紙裹。

接骨丹

五靈脂一兩 茴香一錢

右二味為細末。另研乳香為細末。於極痛處搽上。用小黃米粥塗了。後用二味藥末搽於上。再用帛子裹了。用木片子纏了。少壯人二日效。老者五六日見效矣。

治癰如聖丸

黃藥

黃芩

黃連

防風以上各半兩

白僵蠶一兩

全蝎三分

輕粉半錢

右為細末。羊蹄根汁浸。蒸餅為丸。如梧桐子大。每服二三十九。嚼羊蹄根汁送下。隨病人上下。分食前後。又羊蹄汁塗癰。

治小兒癬雜瘡

白膠香

黃藥

輕粉

右爲細末。羊骨髓調塗癬上。

治瘰癧方

斑

蝨翅足

赤小豆

白僵蠶

苦丁香

白丁香

磨刀泥

右各等分爲細末。十歲已上服一錢。二十已上服二錢。五更用新汲水一盞調下。比至辰時見效。女人小便見赤白色。三兩次。男子於大便中見赤色白色爲效。當日服白粘粥。不得喫別物。大忌油膩。患三四年者只一服。七八年者再一服。

玉餅子 治瘰癧。一切惡瘡軟癰。

右用白膠一兩。瓷器內溶開去滓。再於溶開後。以葶麻子六十四個。作泥。入膠內攪勻。入小油半匙。頭柱點水中。試硬軟。添減膠油。如得所。量瘡大小。以緋帛攤膏藥貼之。一膏藥可治三五癰。

又方治瘰癧

小龍肚腸炮乾

驚殼裙欄炮

川棟子五個

牡蠣

大黃

牛蒡子燒存性

皂角子五十個

右爲細末。蒸餅爲丸。如菉豆大。每服十五丸。食後艾湯下。日三服。

又方。將臘月貓糞。用新瓦兩個。合在內。外用鹽泥固濟。燒成灰。以小油調。塗瘡口上。

又方。取小左盤龍。不以多少爲末。陳米飯搜和得所。丸如梧桐子大。每服三五丸。却用陳米湯送下。

治眉煉頭瘡

小麥不以多少。燒令黑色。存性爲末。以小油調。塗瘡上。

治小兒瘡瘡

羊糞熬湯。洗去痂。用屋懸燥。炒羅爲末。以小油塗瘡上。

聖靈丹。治打撲胸損。痛不可忍者。

乳

香三錢

梅

切五個去枝細焙乾爲末

白蒿苳子二兩入錢炒黃搗爲末

白米研細末

右再入乳鉢內。研數百下。煉蜜爲丸如粟大。細嚼。熱湯下。病在上。食後。在下。食前。

出醫方

右用蕎麥稽一擔。不爛者燒灰存性。入石灰半斤。同灰一齊過。令火滅。然後以熱水淋灰窩。淋下灰水。用鐵器內煮。以撩起攪成膏子。於罨上點自出。或先以草莖刺破亦可。

又方 桑柴灰石灰。淋汁熬成膏。草莖刺破點。以新水沃之。忌油膩等物。燒燙火方。

多年廟上蚰。與走獸爲末。小油調。塗燒湯火瘡效。

又方 生地黃汁。入小油蠟。同熬成膏。瓷器內盛。用雞翎掃燙處。

又方 培上青苔燒灰。小油調。塗燒燙處。

治燒燙方

生地黃。旋取新者爛搗。取自然汁。入小油黃蠟少許。銀石器中熬成膏子。用雞

翎掃瘡上。

又方 血餘灰。用臘猪脂調塗。

又方 寒水石。燒過為細末。水調塗之。

枯瘤方

砒

硃砂

黃丹

雄黃

粉霜

輕粉

以上各等一錢

斑蝥二十個
生用

硃砂一錢

乳香三錢

沒藥一錢

同研為末。粥糊為丸。捏作基子樣。爆乾。先灸破瘤頂。三炷為則。上以瘡藥餅蓋

上。用黃蘗末。以水調貼之。數日。自然乾枯落下。

又方 以銅綠為末。草刺破瘤。摻在上。以膏藥塗之。

治頭面生瘤子。用蛛絲勒瘤子根。三二日。自然退落。

乳香散 貼杖瘡腫痛。

大黃

黃連

黃蘗

黃芩

以上各三錢

乳香另研

沒藥另研以上腦

子少許