

陳良夫醫案精華

上海秦伯未編纂

■ 腫 脹

土貫五行。發育萬物。東垣專主治脾。以培後天根本。誠以人之真氣。出於中焦。若脾土餒弱。則食易滯。濕易聚。分利無權。而中州之關鍵。爲之不利。故治之者。首在運中升陽。以培根抵據。述偶因停食。便下先溏。腹脹洩少。似屬脾運偶乖。濕邪偏滲之象。惟便時裏急後重。或坐圈不便。小溲滯濇。肢疲納減。已是脾虛氣陷。濕邪內勝。爲本原見證。脈來濡細帶滑。苔膩根糙。夜分不能安寐。恐內蘊之濕久則化熱生痰。而心肝之陽爲之浮露。陰病及陽。亦意中之事。其變端殊難逆料。不過目前證象。脾濕尙盛。中氣下陷。致膀胱之氣化無權。當宗東垣治法。投以升陽運中。俾水道通利。不致一傳而爲腫。再傳而爲脹。庶得遞臻康泰。經有云。脾屬陰土。喜剛燥而惡卑濕。膀胱者。水液藏焉。氣化則能出。爰擬

培養脾土助其氣化。參以升陽滲濕主治。其虛陽之浮露與否姑置緩圖。卽本內經標急治標。本急治本之意。未識高明以爲然否。錄候指正。

於朮 益智 遠志 辰茯神 新會皮 淮藥 防風炭 炒薏仁 赤苓 澤瀉 穀芽
車前

■ 痰熱

伏邪內發。須分有形無形。濕熱爲無形之邪。宜從表達。痰食爲有形之物。可從裏化。始起腑氣祕結。進疎化法。而腹痛卽定。有形之邪已得下奪。繼進宣化。又見疹點。無形之邪亦得外解。均屬佳兆。頃又咳嗆氣逆。脈滑苔膩。肺胃尙有痰熱。治宜清降。再得應手則吉。

鮮斛 杏仁 川貝 紫苑 鐘金 桑皮 海石 花粉 磬石 冬瓜子 黃燈心 絲瓜絡

■ 少寐

心主一身之火。腎主一身之水。心與腎爲對待之臟。心火欲其下降。腎水

欲其上升。斯寤寐如常矣。寤多寐少。悸動不甯。甚則驚惕。是心之亢。亦腎水之虧也。且操勞則傷心。思慮則傷脾。二經專司陰血。而腎尤爲陰液之主。今陰液極虧。則五志之火無制。而君火更亢。致有陽不入陰之候。脈象細弱而數。舌本脫液。皆陰弱陽亢之徵。欲降其火。宜滋其水。俾真陰遞復。水火庶得相濟。拙擬養心陰滋腎水合清降治之。望其陰得下交。陽得上交。庶得陰陽相戀。而悸動驚惕由漸而減。然尤在靜攝心神。見效較速。未識是否。錄方請方家教正。

首烏

阿膠
辰神

棗仁

遠志

辰燈心
生地

龍齒

丹參

磁石

牡蠣

又 人生陰陽。本互相爲用。陰不足。則陽上升而致病。陽不足。則陰內勝而致病。故內經有陰平陽祕。精神乃治之說。素體陰弱。陽浮。過服滋降之劑。遂致陽不勝陰。迭生寒象。得食脹而腹鳴。氣梗作痛。便下或溏或水。肢疲體軟。脈來細緩而滑。此陽氣餒弱。脾運乖而分利無權。亦即火不生土之候。考脾爲陰土。喜剛燥而惡寒濕。東垣治脾。專主溫升。蓋脾得溫則運。脾氣升則水液滲入膀胱。

自不致偏滲大腸。而爲五洩。今脾陽不升。食下易瀉。挾擬溫運中土。參滲濕爲治。望其健運如常。再商治法。未識是否。候正。

於朮 滋藥 益智 遠志 新會 蔡壳 米仁 香附 茯苓 赤苓 穀芽 車前

又 便下易溏。脾濕勝也。過瀉則脾土必傷。於是肝木從而侮之。瀉後仍有腹痛。木氣之未和可知。惟每瀉必在食後。脾運先乖。治宜疎補中土。參抑木主治。

於朮 益智 遠志 新會 六曲 蔡壳 香附 木香 赤苓 佛手 穀芽

■ 瘰 痈

人生右半屬肺。咳不離肺。病肺有邪則必傳於胃。故葉氏謂溫邪上蒸肺胃爲必犯之地。且肺易貯痰。胃易蘊熱。肺經留痰。得熱則膠結而不豁。胃經伏熱。得痰則遏抑而不宣。此理有必然也。據述始起右脇刺痛。繼轉寒熱咳嗽。經五六日。而痰不能豁。引痛脇右。自汗。濶濶。胸次又見疹瘡。頃按脈滑數。苔黃膩根厚。此爲濕溫夾痰。鬱遏於肺胃之經。欲達未達。顯然可見。考昔人謂伏氣爲

病以出表爲輕。下行爲順。治之者不外汗下清三者而已。今遠不易咯。便下又祕結。計維官化上焦合清濁中州。參通腑爲治。分達其蘊結之邪。庶無傳變。必得熱退豁痰爲吉。

黃卷 杏仁 鮮斛 川貝 鐘金 山梔 枯芩 薑皮 霜葉 桂實 連翹 竹瀝

■ 内 脫

豐盛之體。必有留痰。平素嗜酒。必有濕熱。而要必由中氣陰液之先虛。據述驟然便薄。色紅似醬。隨卽氣促。神昧且煩。頭汗肢清。目或上視。脈象六部沈細。舌絳苔黃。口噴穢氣。此必濕熱夾痰。阻遏中宮。邪不達而肝陽暗動。成爲外閉內脫證。雖發於倉猝。而吾恐氣脫於上。陰脫於下。卽在轉瞬間矣。

西洋參 犀角尖 冬青 辰神 澤瀉 竹瀝 吉林參 金石斛 石決明 山梔 辰燈心

■ 痰 涼

經有云。衛氣者。所以溫分肉。充皮膚。肥腠理者也。人生臟腑之愈。皆在於

背而肺脈行於肩臂厥陰之脈挾胃貫膈環繞於腹不耐風寒大都是陽氣之餒弱上升之氣自肝而出自覺感冒肩背先有痠疼腹痛陣作氣升及脘此爲肝俞受邪木氣被鬱可知或頻吐痰沫納食不化其肺脾氣弱濕復生痰顯然也脈來細而弦舌苔薄膩尤屬裏有濕痰肺脾氣滯之徵考肺喜宣降脾喜健運肝喜條達皆以氣用事外受之邪先傷氣分是自然之理素體雖屬氣陰兩虧而見症皆在氣分且肝病較甚當宗本鬱達之之法參以理肺運脾祛除痰濕先治其標俟其氣機流利再商治本爲是錄候裁正

藿梗 法夏 楠紅 蔽壳 六曲 米仁 砂壳 雲苓 佛手 香附 絲瓜絡

經有云營衛皆出於中焦營衛不和斯寒熱交作其得汗而解者營衛原有通達之機汗出過多胃津受損於是口乾喜飲此固自然之理也據述形寒身熱有時間斷便下溏薄如痰自汗溱溱納不思而口乾燥脈象濡滑數舌苔薄膩此爲裏有濕痰中氣先滯致營衛互相乘侮遂轉寒熱久之而氣機稍調

自汗便溏。痰與濕亦因之分達。惟瘧家之汗必出於胃。汗多則胃液之傷不言可喻。脾爲積濕之所。濕盛則生痰。便下既有痰沫。而脾運又乖矣。考胃喜潤降。脾喜溫運。土性既判陰陽。斯治法遂分潤燥。今脾運未復。胃陰已損。而營衛未盡和諧。拙擬潤養陽明。溫運太陰。相輔而治。未識有當否。錄請教正。

霍斛

花粉

全芍

仙夏

橘白

雲苓

米仁

川貝

六曲

澤瀉

穀芽

車前

■ 瘰 痘

中州濕熱。其傳化本無一定。薰蒸出表。則爲瘧。急迫下達。則爲痢。此固必然之勢也。前進宣表疎裏之法。表熱遞去。而便薄轉痢。其色粘白。腹痛裏急。或登園而反不能解。脈沉弦。苔花膩。納食杳然。此屬中宮濕熱。阻遏氣機。欲達而未克速達。使然惟痢症以能納爲吉。今納食不旺。拙擬清疎中宮。參醒胃爲治。望其納增庶無反覆。

金斛

新會白

蔻殼

六軸

枳殼

青皮

滑石

楂榔

赤苓

佛手

佩蘭

車前

喘 脿

肺氣以下行爲順。經有謂氣從上逆者。謂之喘。喘證之因。在肺爲實。在腎爲虛。昔人又謂有腫後喘者。治在脾。據述瘡癥之後。偏體浮腫。又復囊大洩濁。原屬脾經積濕。下注厥陰。泛溢肌表之候。近日腫勢不退。更增喘逆。喉間有聲如鋸。坐臥均覺不適。小洩不行。按脈沉細滑苔花膩。拙見是積濕成水。脾氣先滯。而肺氣又被衝動。失其宣降之常。昔人所謂水氣乘肺。卽此候也。此爲肺喘。而非腎喘。亦屬實證。而非虛證。惟喘症雖分虛實。見之均爲重候。考下流之水上出高源。今洩濁不行。則水從何去。而肺氣何由而降。目前證象。總期氣順爲吉。內經本有急則治標之旨。爰擬瀉肺湯主治。參以通利水道。望其氣降。洩通方爲佳兆。未識能如願否。候商。

甜葶苈 川貝 杏仁 腹絃 川膝 青鉛 煅礞石 蕤梗 薑石 檳榔 赤芍 車前
又 咳不離肺病。肺氣以下行爲順。腫喘之後。咳嗆不淨。氣易逆而脈仍滑。瘡

癆頻發。此氣分濕痰。肺失順降。宜理氣以化濕痰。

藿梗 薺石 貝母 紫苑 蛤殼 橘紅 法夏 紫荳 米仁 猪苓 姜茹 冬瓜子

■ 瘰 疾

癆疾原理。雖有數因。要不離肝木爲病。迨至癆復轉痢。爲表病及裏。昔人謂爲重候。據述初起癆疾間作。近日便頻似痢。腹鳴如有水聲。臨圓腹痛。牽連右肋。納食不思。舌光有糜。脈象弦滑。拙見是氣分雖有餘邪。而肝木橫逆。乘侮中土。致胃失和。降脾失健。運加以陰液內耗。致成溫潤兩難之候。殊非佳兆。古云。土虛不能裁木。則木強從而侮土。卽此候也。東垣專主溫脾。葉氏專主潤胃。二家爲醫中聖手。然皆謂胃能納受。脾能輸化。則中土之升降有權。而肝木不致橫決。今納運兩乖。木邪遂侮其所勝。且素體氣陰不足。其何以堪。此土木爲仇乎。措方不易。勉擬扶脾養胃。參以抑木之法。望其穀納遞增。痢象漸減。俾得土能載木。或可轉危爲安。未識能如愿否。候高明教正。

甜桔白 桔白 薏仁 青皮 淳瀉 長燈心 奎芍 金斛 穀芽 木蝴蝶

又進培中抑木之法。便次略少。腰脇引痛。脈象帶弦。苔花如塵。神疲力乏。此爲氣陰未復。木來侮土。再宜前法增減之。

冬朮 白芍 霍斛 雲苓 桔白 青皮 川斷 砂壳 川通 穀芽 佛手

■虛欬

經有謂肝生於左。肺生於右。咳喻雖不離肺病。而內經論咳有十二經之分。今咳甚。面紅。身體燔灼。左右脇均有吊疼。脈來弦數。此爲肝火內燔。肺金受尅。顯然也。苔膩中黃。唇燥欲裂。咯痰粘而不爽。尤屬內火偏旺之徵。考肺喜潤降。最畏者火。肺金既燥。則胃熱又熾。而口欲作乾矣。古云寒之不寒。責之無水。又云水不足則火上炎。前進甘寒滋水之劑。咳如故。而火仍未降也。當屬陰水虧乏。不能制火。肺金受其刑尅。可知。爰再以潤肺清胃。仍合滋水降火爲治。冀其咳緩火平。庶無反覆。

北沙參 鮮金斛 元參 冬青 石決 川貝 花粉 紫苑 黃蛤 知母 機心

■脾泄

脾屬土。喜燥而惡濕。肝屬木。喜溫而惡寒。脾主一身之肌肉。肝主一身之筋絡。素患脾泄。昨因食冷。便又溏薄。次數頻而少腹隱痛。形瘦神疲。肢凌喫氣。泛泛欲嘔。診得脈形濡細。苔膩舌淡。此爲暑濕內蘊。又復食冷。抑制其蘊結之邪。遂致脾運又乖。木氣侮其所勝。當以運中泄木主治。覘其進止。

冬朮 小朴 六曲 滑石 赤苓 佛手 米仁 法夏 陳皮 木香 澤瀉 車前

■厥症

內經論厥。不離乎氣并血并兩。因氣又爲血之主。氣行則血行。氣滯則血滯。據述昨因動怒。猝然暈厥。腹部依然脹痛。信事不行。身熱不從汗解。脈弦苔糙。中宮雖有暑濕。而肝氣鬱結。肝血復瘀。營衛互相乘侮。姑以疏氣逐瘀主治。應手爲吉。

柴胡 錦尾 青皮 川芎 香附 川棟 赤芍 桃仁 紅花 濚瀉 佛手 攻瑰

自覺感寒。隨卽嘔惡。咯去清水甚多。形寒肌熱。診得脈象濡數。舌厚苔膩。色黃。此由內蘊暑濕。未經發透。着寒則裏邪被鬱。陽明之和降頓乖。先宜和中宣表之法。覘其傳化。

藿香 川斛 豆卷 六曲 滑石 山梔 仙夏 連翹 枳壳 赤芍 姜茹

身熱畏寒。經一月餘。而證象無甚增減。自汗不澈。咳痰見紅。脈弦滑苔膩。黃論其內容。本屬暑濕合邪。薰蒸出表。惟詢得原因。係由甫經身熱。卽被電扇迎涼。遂致淹縗匝月。此必內熱外寒。格拒於表裏所致。姑從宣表清裏並主之。

陳香薷 豆卷 滑石 霜葉 杏仁 山梔 枳壳 紫苑 法夏 檬紅 竹茹 元胡粉

■ 痰 热

肺胃之陰津液是也。非用清潤。無以復其已耗之陰。痰與熱相合。卽成燥

熱之氣。又易內劫其陰液。前診用清潤化降之法。於養正之中。參入化邪。即於化邪之品。參入養正之意。求其利。防其弊。却合此證治法。頃診脈象弦細滑。驗舌邊糙中剥。咳嗽雖間。而咯痰未豁。納食未克。如常良由津液遞傷。痰熱餘邪留戀不淨。肺胃之肅降仍乖。爰再以清養爲主。佐以化痰泄熱。扶其本。祛其邪。望其再得應手爲佳。

珠兒參 元參 金斛 冬青 辰神 花粉 桑皮 紫苑 蛤壳 瓜子 燈心

又 肺胃之陰。謂之津液。內經謂陰精所奉其人。壽飲食入胃。游溢精氣。上歸於肺。於是諸臟皆資其灌漑。心主火。居於肺中。必待肺陰充足。則心陽乃足。充展。昔人是以有心肺同居上焦之說。疊進潤養陰液。以祛痰降火爲治。邈日咳嗆遞減。咯痰亦少。惟寐時多語。大都是記念之談。納食未旺。診得脈尚弦細數。苔薄糙。陰液未能盡復。心陽失藏。顯然也。其疲乏不支者。亦卽邪去正虛所致。當易滋養爲主。化降爲佐。望其陰液之徐復爲佳。

珠兒參 麥冬 地炭 金斛 冬青 辰神 納冬 百合 地骨 瓜萎 燈心 穀米

□ 暈厥

經云氣併於陽。血併於陰。則爲痙厥。腹係肝胃部位。初時腹部堅痛。二便失達。旋增量厥。醒後臍以右仍有脹痛。不能轉側。形寒身熱。不思納食。診脈弦滑兼數。驗舌苔糙膩根厚。此爲內蘊濕熱。肝脾之氣被阻。肝失疏泄。脾失健運。於是表裏三焦窒塞不通。成爲氣併血併。而見厥象。嗣以氣機稍調。濕熱蘊邪。薰蒸出表。又轉寒熱。惟腹痛未和。二便尙失通利。其肝之疏泄。脾之健運。未復其常。度證情恐多遷變也。殊欠穩妥。姑先以疎肝運脾主治。調其氣機。祛其濕熱。再覘傳化而施治法。然必得痛勢遞和。不再厥逆爲吉。

柴胡 青皮 川鬱金 陳皮 豆卷 桂枝 製朴 腹絃 枳實 赤苓 佛手

□ 痙厥

人生之氣。呼出心與肺。吸入腎與肝。肝藏魂。心藏神。心主血。而不能藏。夜

則復歸於肝。肝藏血而不能主晝。則聽命於心。此則自然之理也。據述合目之後。必然氣逆如喘。語言錯亂。如有鬼祟。甚則痙厥。醒後自汗淋漓。頭眩耳鳴。至日中則又似平人。脈象濡細滑。苔薄黃。拙意營陰先虧。虛陽內亢。呼氣多於吸氣。神魂爲之不安。擬滋養爲主。熄降爲佐。

生地炭

磁石粉拌炒

阿膠珠

女貞

潼藜

龍齒

辰神

丹參

牡蠣

懷膝

石英

貝齒

秫米

■ 痢疾

痢爲濕蘊飲食雜感之故。氣分受傷者其色白。血分受傷者其色赤。深秋痢疾。以能納者爲吉。不納者爲凶。若熱而不化。證名疫氣。較前症爲尤劇。此先哲言之也。據述初起便薄。旋轉便泄。日夜數十次。腹痛裏急。本元先受傷。大腸不和也。已非輕候。況又粒食不進。頻頻嘔惡。肝氣逆而失降。恐增呃忒。脈來弦細數。舌乾苔黃。陰液極虧。濁邪盛而衝擾。有正不伏邪之慮也。勉擬清濁之法。

廉手爲吉。

左金丸 金石斛 奎白芍 銀花 緒芩 猪苓 桔白 益元散 赤苓 穀芽 姜茹

五色痢下爲濁陰傷而邪內盛最爲險惡。宜進潤養清化並顧標本。診得脈轉滑數並無浮大之脈。身熱和而遞能納穀均屬佳兆。惟利次雖少而其症仍然雜見赤黑。據治以論證情其將爲腎之陰大傷。餘邪稽留顯然也。舌苔起刺尤屬陰傷之據。仍宜前法增減之。

霍石斛 生地炭 白芍炭 荆芥炭 地榆炭 歸身炭 製冬青 辰神 新會白 砂仁壳
焦穀芽 鮮佛手 鮮荷葉 車前

■溼溫

濕邪化熱證名濕溫。其爲邪也輕則傳癟重則傳疹。治之之法葉氏論之最詳。一則曰濕溫初起須宣表裏三焦。再則曰溫邪不從外達必致裏結。吳又可治濕溫爲邪專主汗下清三法。大旨不外宣通表裏主治三焦以引邪外出。

王氏孟英又有陽明伏邪。須假大腸爲去路之說。王清任復有溫邪內發。先營後氣之論。皆所以發明溫證原因。而爲後人所取法也。據述初起形寒身熱。後遂不寒而熱。致七八日而熱勢不甚。亦不解汗。微苔灰稀。見疹點。又得汗解。咯痰帶粘。正屬溫熱伏邪。分從表裏。均是佳兆。惟疹不透而身熱依然。神倦嗜臥。幸得脈象左滑數。右手弦數。驗舌底苔中糙。上脣微灰。胸次仍見斑點。拙見是濕溫之邪。尙未透達。鬱遏於陽明營分。不得速化。表裏之氣未得宣通。三焦仍然阻滯。伏邪雖有外出之象。究未能盡從外出。所幸津液未傷。熱邪不致內結。輕清透達。尙易爲力。不過濕溫傳疹。譬如抽蕉剝繭。層出不窮。此證邪伏營分。又必假道於氣分。而出表更需時日。王氏所謂先營後氣者是也。爰宗吳氏汗清二法。投以宣通清泄之品。引邪外出。望其疹透苔薄。庶無遷變。至下法則非所宜矣。未識是否錄方於左。以備采擇。

大豆卷 黑山梔 紫草茸 廣鬱金 滑石 金石斛 連翹 桑葉 枳壳 甘中黃 蘆根