

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明良甫編輯
明 古吳 薛 己立齋補註

鄞縣 曹赤電炳章圈校

卷十七

產難門

產難論第一

婦人以血爲主。惟氣順則血和。胎安則產順。今富貴之家。過於安逸。以致氣滯而胎不轉動。或爲交合。使精血聚於胞中。皆致產難。若腹或痛或止。名曰弄胎。穩婆不悟。入手試水。致胞破漿乾。兒難轉身。亦難生矣。凡產直候痛極。兒逼產門。方可坐草。時當盛暑。倘或血運血溢。當飲清水解之。冬末春初。產室用火和煖下部。衣

服尤當溫厚。方免胎寒血結。若臨月洗頭濯足。亦致產難。

愚按丹溪先生曰。余族妹苦於難產。遇胎則驅之。予甚憫焉。蓋其形肥而勤女工。形肥則氣虛。久坐則氣不運。而兒在胞胎。因亦不能自運耳。當補其母之氣。則兒健易產。故後有孕。至五六月。遂以紫蘇飲加補氣藥。與之數十貼。而產甚快。大要在隨母之稟性。若胎胞破早。血水先乾。或難產勞傷氣血者。煎八珍湯。或十全大補湯。加益母草。不時與服。以協濟之。或以黃耆數觔。芎歸四五觔許。大釜水煎。藥氣氤氳滿室。使產婦口鼻俱受其氣。臍帶以油紙撚燒斷。補接其陽氣。穩婆須擇老練者。當先施惠。預說與知。倘有生息不順。只說是未產。或是雙胎。只說胎衣未下。恐驚則氣散。愈難生息。

附治驗

荆婦孟冬分。娩艱難。勞傷元氣。生子已死。用油紙撚燒斷臍帶。藉其氣以煖之。俄頃忽作聲。此兒後無傷食作瀉之症。可見前法之功不誣。世用刀器斷臍帶。子母致危者。竟不知其由矣。且穩婆又喜平日常施小惠。得其用心。兼以安慰母懷。故無虞耳。一穩婆云。我止有一女。正分娩時。適當巡街侍御行。牌取我視其

室分娩。女因驚嚇。未產而死。後見侍御更以威顏分付。迨視產母。胎雖順而頭偏在一邊。以致難產。因畏其威。不敢施手。由是其母子俱不能救。

紫蘇飲方見十二卷第八論

十全大補湯

八珍湯方見二十四卷第四論

楊子建十產論第二

凡生產。先知此十症。庶免子母之命。折於無辜也。世之救生者。少有精良妙手。多致傾命。予因傷痛而備言之。

一曰正產

正產者。言懷胎十月。陰陽氣足。忽然作陣疼痛。胎至穀道。漿破血下。兒卽正產。

二曰傷產

傷產者。言懷胎未足月。有所傷動。以致忽然臍腹疼痛。或服催藥過早。或產母努力太早。逼兒錯路。不能正生。凡分娩須待兒身轉順。頭到產門。努力一送。兒卽正生。

三曰催生

催生者。言欲產時兒頭至產門。方服藥催之。或經日久產。母困倦難生。宜服藥以助其血氣。令兒速生。

四曰凍產

凍產者。言天氣寒冷。產母血氣遲滯。兒不能速生。故衣裳宜厚。產室宜煖。背心宜溫和。庶兒易生。

五曰熱產

熱產者。言盛暑之月。產婦當溫涼得宜。熱甚。產母則頭疼。面赤昏暈。若產室人衆。熱氣蒸逼。亦致前患。名曰血暈。若夏月風涼陰雨。亦當謹避。

六曰橫產

橫產者。言兒方轉身。產母用力逼之故也。凡產母當令安然仰臥。穩婆先推兒身順直。頭對產門。以中指探其肩。不令臍帶羈扳。方用藥催之。繼以產母努力。兒卽生。

七曰倒產

倒產者。言兒未能轉身。產母努力故也。當令產母仰臥。穩婆推入。候兒自順。若良

久不生。令穩婆手入產戶一邊。撥兒轉順。近產門。却服催藥。并努力卽下。

八曰偏產

偏產者。言兒回身未順生路。產母努力逼兒。頭偏一邊。產雖露頂。非也。乃額角耳。當令產母仰臥。穩婆輕手正其頭向產門。却令產母努力。子卽下。若兒頂後骨。偏拄穀道露額。令穩婆以綿衣炙煖。裹手於穀道外傍。輕手推正。令產母努力。兒卽生。

九曰礙產

礙產者。言兒身已順。門路已正。兒頭已露。因兒轉身。臍帶絆其肩。以致不能生。令產母仰臥。穩婆輕推兒向上。以中指按兒肩。脫臍帶。仍令兒身正順。產母努力。兒卽生。

十曰坐產

坐產者。言兒之欲生。當從高處牢繫手巾一條。令產母以手攀之。輕輕屈坐。令兒生下。不可坐。抵兒生路。

十一曰盤腸產

趙都運恭人。每臨產則子腸先出。然後產子。其腸不收。名曰盤腸。穩婆以醋水各半盞。默然嚥產婦面背。才收不可不知。

愚按前症古方以草麻子仁四十九粒。研塗產母頭頂。腸收上。卽洗去。其腸若乾。以磨刀水少許溫潤之。以用磁石煎湯服之。卽收上。磁石須陰陽家用有驗者。若以水嚥母面背。恐驚則氣散。

治盤腸產。以半夏爲末。搐鼻中。腸自上。

又方大紙撚以麻油潤。燈吹滅。以烟熏產婦鼻中。腸卽上。

又方腸出。盛以潔淨漆器。濃煎黃耆湯浸之。腸卽上。

催生方論第二

五行論命。以年月日時。支干五行相生相值。以推其貴賤。其間最切要者時也。得其時則終身富貴。失其時則一世貧賤。然則命稟於有生之初。豈可催乎。世之催生之說。蓋爲產難而設也。今開歷驗數方於後。

催生柞木飲子 治產難。或胎爛腹中腹悶。其效如神。

生柞木一尺

甘草大者五寸

右用水三鍾。紙封罐口。煎一鍾半。候胎順產門。徐徐溫服。即時分娩。更無諸苦。切不可早於坐草及穩婆下手催逼。

催生如神散 治逆產橫生。其功甚大。

百草霜

白

芷不見火各為末等分

右每服三錢。至胎順產門。以童便米醋和如膏。加沸湯調下。或童便酒煎。進二服。然血得黑則止。此藥大能固血。又免血乾甚妙。

如聖散。用黃蜀葵花。焙為末。熱湯調下二錢。若漏血。胎乾。乾澀難產。併進三服。即產。如無花。用葵子末半兩。吞調溫酒服。尤妙。若打撲胎死。紅花酒調下。

順生丹 治症同上。

兔腦髓去皮膜

明乳香細研

母丁香末一兩

麝香一錢

右以兔腦髓丸。雞頭大。陰乾。每服一丸。溫水下。男左女右。手握出。兔腦臘月者尤佳。

又方。通明乳香一塊。如棗子大。爲末。腰痛時。用冷水醋少許調服。扶立。令兩手拿石燕二個。念醫靈藥聖三遍。行數步。坐草便生。更無痛楚。神效。
愚按。前法觀之。似迂遠。用者云甚驗。

治產不順。

蛇 蛻 全一條。 蠶 蛻 紙則一張無

右入新瓦瓶內。鹽泥固濟。存性爲末。煎榆白皮湯下一錢。三服。覺痛便生。
又方。用伏龍肝研末。每服一錢。酒調下。兒頭戴土而下。
又方。吞槐子十四粒卽下。

又方。當歸爲末。酒調一錢服。良久再服。

一方。用魚膠一尺許。新瓦上煨灰。陳醋調服立下。

又方。大硃砂於端午日晒起。以百日爲度。研爲細末。用臘月兔腦髓丸。綠豆大。欲產時。粥飲下一丸。良久便生。其藥男左女右。手中握出。晒硃砂不得着雨。

又方。臘月兔頭煨爲末。葱白煎湯調二錢。立生。或臘月兔血。紙袋盛掛。當風處陰乾爲末。煎乳香湯調下二錢。或兔皮和毛燒爲末。酒調下二錢。卽下。如胎衣未

下再服。

神妙乳砂丹。用明乳香爲末。以猪心血丸。桐子大。硃砂爲衣。陰乾。每服二九。嚼碎。冷酒下。良久。未生再服。難產以蓮葉蒂七個。水煎。化服二九。良久。未生再服。胞漿先乾。胎不得下。急服大料四物湯。滋其血氣。并濃煎慈湯。熏洗產戶。更用油燭塗產戶內。却服前藥。胎死不下。用朴硝五錢。滾湯調下。或平胃散一服。胞衣未下。酒水服一九。橫逆不順。先用如神散。方見產門不開。用加味芎歸湯。仍服二九。須月初上辰日修合。鹽塗兒足底。急強摩之。卽產。急應方。好墨新汲水濃磨服之。墨水裹兒出。又方。清油同蜜等分。入滾湯少許。調服。或油煎一盞服之。或路傍破草鞋一隻。取鼻絡小耳繩燒灰。酒調服。

交骨不開產門不開方論第四

新附

竊謂交骨不開。產門不開。皆由元氣素弱。胎前失於調攝。以致血氣不能運達而然也。交骨不開。陰氣虛也。用加味芎歸湯。補中益氣湯。產門不開。氣血虛也。用十全大補湯。

附治驗

地官李孟卿娶三十五歲女爲繼室。妊娠慮其難產。索加味芎歸湯四劑備用。果產門不開。止服一劑。頓然分娩。

上舍懷德之室。產門不開。兩日未生。服前藥一劑。卽時而產。懷德傳服此方。用者無有不驗。

一婦人分娩最易。至四十。妊娠下血甚多。產門不開。與前湯一劑。又以無憂散。勦許煎熟。時時飲之。以助其血而產。

一產婦陰門不閉。發熱惡寒。用十全大補加五味子。數劑而寒熱退。後用補中益氣加五味子。數劑而陰戶斂。若初產腫脹。或㴔痛而不閉者。用加味逍遙散。若腫既消而不閉者。用補中益氣湯。切忌寒涼之劑。

一婦人脾胃素弱。無有肝火。產後陰門腫痛。寒熱作渴。嘔吐不食。數大黃等藥。服驅利之劑。腫及於臀。虛症蠱起。此真氣虛也。先用六君子以固脾胃。乃以補中益氣湯。升舉而消。

一產婦失治。腫潰不已。形體消瘦。飲食少思。朝寒暮熱。自汗盜汗。半年矣。余用補

中益氣。加茯苓、半夏以健脾胃。膿水漸少。飲食漸進。用歸脾湯以解脾鬱。共五十餘劑。元氣復而瘡亦愈矣。

一產婦陰門不閉。小便淋瀝。腹內一物。攻動脇下。或脹或痛。用加味逍遙散。加車前子而愈。

一婦人子宮腫大。二日方入。損落一片。殊類猪肝。面黃體倦。飲入無味。內熱肺熱。自汗盜汗。用十全大補湯。二十餘劑。諸症悉愈。仍復生育。

加味芎歸湯 治交骨不開不能生產

川芎

當歸 各一

自死龜板一個 婦人頭髮一握 燒

右爲散。每服五錢。水煎服。約人行五里。卽生。如胎死亦下。灼過龜板亦可。

附方

十全大補湯

方見二十四卷第四論

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

郭稽中產難方論第五

論曰。產難者。因兒轉身。將兒枕血塊破碎。與胞中敗血壅滯。兒身不能便利。是以

難產。急服勝金散。消散其血。使兒自易生。陳無擇云。多因兒未轉身。坐草太早。或努力太過。以致胞衣破而血水乾。產路濇而兒難下。宜先服催生如神散。以固其血。設或逆生橫產。當用前法針刺之。

勝金散

麝

香錢末一

豆

豉一兩

右每服一錢。用秤錘燒赤淬酒。下催生如神散。亦可用。

產難子死腹中方論第六

產難子死腹中。多因驚動太早。或觸犯禁忌。其血先下。胎乾涸而然也。須視產母舌若青黑。其胎死矣。當下之。故產室坐臥須順四時方向。并遵五行禁忌則吉。

附治驗

一穩婆之女。勤苦負動。妊娠腹中陰冷重墜。口中甚穢。余意其胎已死。令視其舌青黑。與朴硝半兩許服之。化下穢水而安。

一婦人胎死。服朴硝下穢水。肢體倦怠。氣息奄奄。用四君子爲主。佐以四物、薑、桂。

調補而愈。

又方。水銀半兩。桂末一錢。作一服。溫酒調下。粥飲亦可。

又方。以利斧煨赤。置酒中。待溫飲之。其子便下。

又方。用錫粉。水銀各一錢。棗肉丸。大豆許。水吞下。立出。

又方。朴硝三錢。溫童便調下。貓犬牛畜。用之皆驗。

又方。平胃散五錢。酒水各一盞。煎至一盞。投朴硝五錢。再煎三五沸。溫服。其胎卽

化水而出。

寶慶方云。凡欲斷臍帶。先以繫物墜下。後可斷之。否則胞衣上。卽衝心而死。

附方

四君子湯

四物湯方見二十四卷第六論

產難生死訣第七

欲產之婦脈離經。

難經云。一呼三至曰離經。此是陽加於陰一倍也。一呼一至。亦曰離經。此是陰

加陽四倍也。注云。經者常也。胃脈離常絡之處。周卽言之。一呼脈再至。一吸脈再至。曰脾和之脈。故一呼脈行三寸。一吸脈行三寸。呼吸定息。脈行六寸。一日一夜。一萬三千五百息。脈行八百一十丈。乃千一周。復從始之。經再行。今一呼脈三至。一吸脈三至。呼吸定息。脈行九寸。一日一夜。脈行通計一千二百一十五丈。過於平脈之數。不在所起之經再起。故曰離經。若一呼一至。脈行寸半。一吸一至。脈行寸半。呼吸定息。脈行三寸。一日一夜。通計脈行得四百單五丈。乃謂一周。是及平脈之數。周而復始。亦不在所起之經再起。亦曰離經也。沉細而滑也同名。

臨產之婦。脈見沉細而滑者。乃腎臟本脈之形。然腎繫胞胎。見此脈者。亦與離經之脈同名也。

夜半覺痛應分誕。來日日午定知生。

若妊婦夜半時覺腹痛。定知來日日午時當分娩也。聖惠方云。夜半子時覺腹痛。來日日午時必定生。產謂子午相半日觀數也。

身重體熱寒又頻。舌下之脈黑復青。反舌下冷子當死。腹中須遣子歸冥。

凡妊婦身有沉重者。胃氣絕也。又體熱寒慄頭併者。正氣衰。陰氣盛也。若舌捲下。脈青黑色者。及舌反捲上。冰冷不溫者。子母俱死之候。

面赤舌青細尋看。母活子死定應難。

凡妊婦面色赤。是榮氣流通。母活之候。舌上青色。是妊脈絡絕。胎死之候。

脣口俱青沫又出。子母俱死總高判。

若妊婦脣口俱青色者。榮衛氣絕也。又口中吐出痰沫者。是脾胃之氣俱絕。此是子母俱死之候也。

面青舌青沫出頻。母死子活是知真。不信若能看應驗。尋之賢哲不虛陳。

凡妊婦面與舌皆青色。又吐痰沫者。是產婦榮衛俱絕。胎氣衝上之候。此是子活母死之候。產下子母必死也。此古哲應驗之文。不虛妄陳其說也。

新產之脈緩滑吉。實大弦急死來侵。

凡婦人新產之後。其脈來緩滑者。爲氣血通利調和。是生活安吉之兆也。若見牢大弦急之脈。則凶。必死之脈也。若得沉重小者吉。忽若堅牢命不停。

若產婦診得沉重微小者。此是形虛相應。故云吉兆之脈。忽然診得堅硬牢實之脈。是脈盛形衰相反。性命不可停留。必死也。

寸口澀疾不調死。

若產後寸口脈澀疾。大小不調勻者。此是血氣衰絕之脈。故云死也。

沉細附骨不絕生。

若重手按之。乃得六脈沉細。附着於骨。不斷絕有力者。此生活之兆也。

審看此候分明記。長須念此向心經。

凡爲醫者。宜隨時審取。言分明記於心胸也。

愚按前論與脈訣刊誤所云不同。觀者審之。