

儒門事親

金 睢州 張子和 著
明 新安 吳勉學 校

卷五

瘡癰瘤腫五十一

夫大人瘡癰。小兒赤瘤。腫發之時。疼痛不止。內經曰。夫諸痛癢瘡瘍。皆生於心火。可用一呪法禁之。法者是心法。呪曰。

龍鬼流兮諸毒腫。癰瘡膿血甚被痛。忘心稱念大悲呪。三唾毒腫隨手消。

右一氣念呪三遍。望日月燈火取氣一口。吹在瘡腫丹瘤之上。右手在瘡上。虛收虛撮三次。左手不動。每一氣念三遍。虛收虛撮三次。百無禁忌。如用之時。心正爲

是此法得於祖母韓氏相傳一百餘年。用之救人百發百中。若不食葷酒之人。其法更靈。病瘡腫者。大忌雞豬魚兔酒醋濕麵等物。此法不得輕侮。無藥處可用之。

瘡腫丹毒五十一

夫大人小兒瘡腫丹毒發熱疼痛不止。又有一法。面北端想北海雪浪滔天。冰山無際。大寒嚴冷之氣。取此氣一口吹在瘡腫處立止。用法之人。大忌五辛之菜。五厭之肉。所病之人。切忌雞豬魚兔酒醋濕麵等物。無藥之處可用此法救之。

凍瘡五十二

夫凍瘡者。因寒月行於冰雪中而得之。有經年不愈。用陂野中淨土曝乾。以大蒜搗如泥。和土捏作餅子。如大觀錢厚薄。量瘡口大小而貼之。泥餅子上以火艾灸之。不計艾壯多少。以泥乾爲度。去乾餅。以換濕餅。貼定灸之。不問灸數多少。有灸一二日者。直至瘡痂內覺癢微痛。是凍瘡活也。然後不含漿水澄清。用雞翎一二十莖縛作刷子。於瘡口上洗淨。以此而洗之後。肌膚損痛也。用軟帛拭乾。次用木

香檳榔散傳之。夏月醫之大妙。

金瘡五十四

夫一切刀箭所傷。有刀箭藥。用風化石灰一斤。龍骨四兩。二味爲細末。先於端四日。採下刺薊菜。於端午日五更。合杵臼內。搗和得所。團作餅子。若酒麴。中心穿眼。懸於背陰處。乾陰搗羅爲細末。於瘡口上摻貼。亦治裏外膿。并諸瘡腫大效。又有呪法。呪曰。

今日不祥。正被物傷。一禁不疼。二禁不痛。三禁不膿不作血。急急如律令。奉勅攝。

又每念一遍。以右手收一遍。收在左手中。如此七遍。則放手吹去。却望太陽取氣一口。吹在所傷處。如陰晦夜間。望北斗取氣亦得。所傷之人。大忌雞猪魚兔酒醋熱麵動風之物。如食之。則瘡必發。

又一法。默想東方日出。始取氣一口。日出一半。取氣一口。日大圓滿。取氣一口。吹在所傷之處。如此三次則止。用法之人。並無所忌。所傷之人。禁忌同前。可於無

藥之處用之。

誤吞銅鐵五十五

夫誤吞銅鐵。以至羸瘦者。宜用肥猪豚。與葵菜羹同煑數頓。則銅鐵自然下也。神驗。如不食葷腥者。宜以調胃承氣湯大作其劑。下之亦可也。

魚刺麥芒五十六

夫魚刺麥芒。一切竹木籤刺咽喉。及鬚髮惹伴。在咽喉中不能下者。內經曰。不因氣動而病生於外。可用道藏經一呪法治之。

呪曰。吾請老君東流順。老君奉勅攝攝。攝法毒水。吾託大帝尊。不到稱吾者。各各現帝身。急急如律令。奉勅攝。一氣念遍。又以左手屈中指無名指。作三山印。印上坐淨水一盞。右手掐卯文作金鎗印。左手在下。右手在上。左手象地。右手象天。虛挽虛卓。九次爲定。左足橫。右足豎。作丁字立。如作法時。望日月燈火。取氣一口。吹在盞內。此法百無禁忌用法之時。以正神氣是也。如所傷物下。不可便與

米湯米飯喫。恐米粒誤入瘡口中。潰作膿也。姑以拌麵羹。養之數日可也。

蛇蟲所傷五十七

夫犬咬蛇傷。不可便貼膏藥。及生肌散之類。謂毒氣不出也。內經曰。先治內而後治外。可也。當先用導水丸。禹功散。或通經。瀉十餘行。即時痛減腫消。然後用膏藥生肌散。傳貼愈。此是先治內而後治外之法也。

杖瘡五十八

夫一切蟲獸所傷。及背瘡腫毒。杖瘡歟發。或透入裏者。可服木香檳榔丸。七八十丸至百丸。或百五十九至二百丸。生薑湯下。瀉五七行。量虛實加減則可矣。

禁蠟五十九

夫禁蠟有一呪法。呪曰。

玉女傳仙攝。勅斬蚺蜥滅。

右如有蠍螫之人來求治者。於蠍螫處望而取氣一口。默念七遍。怒着作法。吹在蠍螫處。內經曰。蜂蠶之毒。皆屬於火。可用新水一盆浸之。如浸不得處。速以手帛蘸水搭之。則痛止也。用法之人。大忌五厥肉。

落馬墜井六十一

夫一切男子婦人。落馬墜井。因而打撲。便生心恙。是痰涎發於上也。內經曰。不因氣動而病生於外。可用三聖散。空心吐訖。如本人虛弱疲瘁。可用獨聖散吐之。吐訖。可服安魂寧魄之藥。定志丸。酸棗仁。茯神之類是也。

婦人月事沉滯六十一

夫婦人月事沉滯。數月不行。肌肉不減。內經曰。此名爲癥。爲沉也。沉者。月事沉滯不行也。急宜服桃仁承氣湯。加當歸。大作劑料服。不過三服立愈。後用四物湯補之。更可用宣明方。檳榔丸。

血崩六十一

夫婦人年及四十以上。或悲哀太甚。內經曰。悲哀太甚則心系急。心系急則肺布葉舉。而上焦不通。熱氣在中。故經血崩下。心系者。血山也。如久不愈。則面黃肌瘦。慎不可與燥熱之藥治之。豈不聞血得熱而流散。先以黃連解毒湯。次以涼膈散。四物湯等藥治之而愈。四物者是涼血也。乃婦人之仙藥也。量虛實加減。以意消息用之。

腰膝疼痛六十二

夫婦人腰膝疼痛。兩脚麻木。惡寒喜暖者。內經曰。乃是風寒濕痺。先可服除濕丹。七八十丸。量虛實以意加減。次以禹功散投之。瀉十餘行。清冷積水。青黃涎沫爲驗。後以長流水。同生薑棗煎五苓散服之。風濕散而血氣和也。

頭風眩暈六十四

夫婦人頭風眩暈。登車乘船亦眩暈眼澁。手麻髮退。健忘喜怒。皆胸中有宿痰之使然也。可用瓜蒂散吐之。吐訖。可用長流水煎五苓散。大人參半夏丸。兼常服愈。

風餅子則愈矣。

經血暴下六十五

夫婦人年及五十以上。經血暴下者。婦人經血。終于七七之數。數外暴下。內經曰。火主暴速。亦因暴喜暴怒。憂結驚恐之致然也。慎不可作冷病治之。如下峻熱之藥則死。止可用黃連解毒湯。以清於上。更用蓮殼灰糲毛以滲於下。然後用四物湯加玄胡散。涼血和經之藥是也。

赤白帶下六十六

夫婦人赤白帶下。或出白物如脂。可服導水丸。禹功散。或單用無憂散。量虛實加減。瀉訖。次用桂苓丸。五苓散。葶藶木香散。同治濕治瀉法治之。或用獨聖散上涌亦可也。室女亦可。

月事不來六十七

夫婦人月事不來。室女亦同。內經曰。月事不來者。是胞脈閉也。胞脈者。屬火而絡於脰中。令氣上迫肺。心氣不得下通。故月事不來也。可用茶調散吐之。吐訖。可用玉燭散。當歸散。或三和湯。桂苓白朮散。柴胡飲子。量虛實選而用之。降心火。益腎水。開胃進食。分陰陽。利水道之藥是也。慎勿服峻熱之藥。若服之。則變成肺痿。骨蒸。潮熱。咳嗽。咯膿。嘔血而喘。小便澀滯。寢汗不已。漸至形瘦。脈大。雖遇良醫。亦成不救。嗚呼。人之死者。豈爲命耶。

婦人無子六十八

夫婦人年及二三十者。雖無病而無子。經血如常。或經血不調。乃陰不升。陽不降之故也。可獨聖散。上吐訖。冷痰三二升。後用導水丸。禹功散。瀉訖三五行。及十餘行。或用無憂散。瀉十餘行。次後喫葱醋白粥三五日。胃氣既通。腸中得實。可服玉燭散。更助以桂苓白朮丸散。二藥是降心火。益腎水。既濟之道。不數月而必有孕也。

若婦人有癰閉遺溺。噎乾之諸證。雖服藥針灸。亦不能孕也。蓋衝任督三脈之病。

故不治也。表證見內證及熱論中。

小產六十九

夫婦人半產。俗呼曰小產也。或三月。或四五月。皆爲半產。已成男女故也。或因憂恐暴怒。悲勞太甚。或因勞力。打撲傷損。及觸風寒。或着暴熱。不可用黑神散。烏金散之類。內犯乾薑之故。止可用玉燭散。和經散湯之類是也。

大產七十

夫婦人大產。十月滿足降誕者是也。或臍腰痛。乃敗血惡物之致然也。舉世便作虛寒。以燥熱治之。誤人多矣。難經曰。諸痛爲實。實者熱也。可用導水丸。禹功散。瀉五七行。慎不可便服黑神散。烏金散燥之。同一產治之則可矣。

產後心風七十一

夫婦人產後心風者。則用調胃承氣湯一二兩。加當歸半兩。細剉。用水三四盞。同

煎去滓。分作二服。大下三五行則愈。如不愈。三聖散吐之。

乳汁不下七十一

夫婦人有本生無乳者不治。或因啼哭悲怒鬱結。氣溢閉塞。以致乳脈不行。用精猪肉清湯調和美食。於食後調益元散五七錢。連服三五服。更用木梳梳乳。周回百餘遍。則乳汁自下也。

又一法。用猪蹄湯調和美味服之。乳汁亦下。合用熟猪蹄四枚食之。亦效。
又一法。針肩井二穴。亦效。

產後潮熱七十二

夫婦人產後一二日。潮熱口乾。可用新汲水調玉露散。或冰水調服之。亦可。或服小柴胡湯。加當歸。及柴胡飲子亦可。慎不可作虛寒治之。

乳癰七十四

夫乳癰發痛者。亦生於心也。俗呼曰吹乳是也。吹者。風也。風熱結薄於乳房之間。血脈凝注。久而不散。潰腐爲膿也。可用一法禁之。

呪曰。謹請東方護司族吹妳。是灰妳子。

右用之時。當先問病人曰。甚病。病人答曰。吹妳。取此氣一口。但吹在兩手坎字文上。用大拇指緊捏定。面北立一氣念七遍。吹在北方。如此者三遍。若作法時。以左右二婦人。面病人立。於病乳上痛揉一二百數。如此亦三次則愈。

雙身大小便不利七十五

夫婦人雙身。大小便不利者。可用八正散。大作劑料。除滑石加葵菜子煎服。內經曰。膀胱不利爲癰。癰者。小便閉而不通也。如八正散加木香。取效更捷。經曰。膀胱氣化則能出。然後服五苓散。三五服則愈矣。

雙身病瘡七十六

夫雙身婦人病瘡。可煎白虎湯。小柴胡。柴胡飲子等藥。如大便結硬。可用大柴胡。

散。微瀉過。不可大吐瀉。恐傷其孕也。內經曰。夏傷於暑。秋必病瘧。

雙身傷寒七十七

夫雙身婦人。傷寒。時氣。溫疫。頭痛身熱。可用升麻散一兩。水半碗。大煎劑料。去滓。分作二服。先一服吐了。後一服不吐。次以長流水加生薑棗。煎五苓散熱啜之。汗出盡。頭痛立止。

身重瘖啞七十八

夫婦人身重。九月而瘖啞不言者。是腠之絡脈不相接也。則不能言。經曰。無治也。雖有此論。可煎玉燭散二兩。水一椀。同煎至七分。去滓。放冷。入蜜少許。時時呷之。則心火下降。而肺金自清。故能作聲也。

懷身入難七十九

夫婦人懷身入難月。可用長流水調益元散。日三服。欲其易產也。產後自無一切

虛熱。血氣不和之疾。如未入月則不宜服也。以滑石滑胎故也。

眉煉八十

夫小兒眉煉。在面曰眉煉。在耳曰軛耳。在足曰靴癰。此三者皆謬名也。內經曰。諸痛癢瘡瘍。皆屬心火。乃心火熱盛之致然也。可用銚針刺之出血。一刺不愈。當再刺之。二刺則必愈矣。內經云。血實者宜決之。決者。破其血也。眉煉者。不可用藥傅之。其瘡多癢。則必爬。若藥入眼。則眼必損矣。

牙疳八十一

夫小兒牙疳。牙疳者。齒齲也。齲者。是牙斷腐爛也。上下牙者。是手足陽明二經也。或積熱於內。或服銀粉巴豆大毒之藥。入於腸胃。乳食不能勝其毒。毒氣循經而上。至於齒斷。齒斷牙縫。爲嫩薄之分。反爲害也。可以麝香玉線子治之。乳母臨臥。當服黃連解毒湯一服。疳病則愈。

夜啼八十二

夫小兒夜啼不止者。當用燈花一枚。研細。隨乳汁下。併三服。則每服用燈花一枚。服罷此藥。於淨室中臥一兩日。則止也。

丹瘤入十三

夫小兒丹瘤。浮赤走引。或遍身者。乃邪熱之毒。在於皮膚。以磁片撒出血。則愈。如不愈。則以拔毒散。掃三二十度。必愈矣。內經曰。丹慄赤瘤。火之色也。相火之病是也。

疳眼入十四

夫小兒疳澀眼。數日不開者。乃肝木風熱之致然也。可調服涼膈散數服。眼開而愈。

身瘦肌熱入十五

夫小兒身瘦肌熱。面黃腹大。或吐瀉。腹有青筋。兩脇結硬如碗之狀。名乳癰癖。俗

呼曰妳脾是也。乳癰得之綿帛太厚。乳食傷多。太熱則病生肌。太飽則必傷於腸胃。生於肌表者。赤眼丹瘤。疥癬癰癤。眉煉赤白。口瘡牙疳。宣爛及寒熱往來。此乳母抱不下懷。積熱熏蒸之故。兩手脈浮而數也。傷於腸胃者。吐瀉驚疳。哽氣腹脹。肌瘦面黃。肚大筋青。喜食泥土。揉鼻竅。頭髮作穗。乳辦不化。此皆太飽之致然也。久而不愈。則成乳癰。兩手脈沉而緊也。此其辦也已上諸症。皆乳母懷抱奉養過度之罪。癖之疾。可以丁香化癖散。取過數服。牛黃通膈丸。甘露散。益黃散等藥磨之。如不愈者。有揉脾一法。

呪曰。日精月華。助吾手法。勅斬滅消。驅毒勅攝。

右用法之人。每念一遍。望日取氣一口。吹在手心。自揉之。如小兒病在左臂上。用法之人亦左手揉之。在右臂。以右手揉之。亦吹在乳脾上。令母揉之。男孩兒用單日。女孩兒用雙日。大忌風雨陰晦產婦孝子見之。用法之時。宜於日中前。晴明好日。色則可矣。

大小便不利八十六

夫小兒大小便不通利者。內經曰。三焦約也。約者。不行也。可用長流水煎入正散。時時灌之。候大小便利卽止也。

久瀉不止入十七

夫小兒久瀉不止者。至八九月間。變爲秋深冷痢。泄瀉清白。時復撮痛。乳瓣不化。可用養脾丸。丸如黍米大。每服二三十丸。米飲下。日三服。則愈。若治葛藟之兒。萬舉萬全。富家且宜消息。

通身浮腫入十八

夫小兒通身浮腫。是水氣腫也。小便不利者。通小便則愈。內經曰。三焦閉隘。水道不行。水滿皮膚。身體否腫。是風乘濕之症也。可用長流水加燈心。煎五苓散。時時灌之。更於不透風暖處。頻治。汗出則腫消。腫消則自愈。內外兼治故也。

發驚潮搐入十九