

样 本 库

G4P
582

中医妇科验案验方集

山西省中医学校暨附属门诊部编

YX159/30



山西人民出版社

一九五九年·太原

42794



前 言

祖国正在掀起了轰轰烈烈的社会主义建设运动，占全国人口二分之一的妇女同胞，担负着极为重要的生产建设任务，因此，她们的身体健康关系着社会主义建设，也关系着民族生命的延续。

在旧社会，妇女在经济上、政治上处于被压迫的地位，以致影响她们的身体健康，而使疾病成为妇女的最大威胁。解放后，全国妇女在党的领导下，已经基本上从政治、经济压迫中解放出来。一九五八年全国各地人民公社成立后，这就特别使得几千年来屈伏在锅灶旁边的妇女得到了彻底的解放而笑逐颜开。在党的八届六中全会关于人民公社若干问题的决议中并指出了“一定要保证妇女在产前产后的充分休息，在月经期内也一定要让妇女得到必要的休息；不做重活，不下冷水，不熬夜。”这就充分证明了党对妇女同胞的关心是无微不至。她们由于心情愉快，生活提高，在身体健康上也较前大有好转。

但是妇女的疾病仍有不同程度的存在，影响着她们的工作、劳动和学习。祖国医学，它是医药上的一个伟大宝库，它有极其丰富的宝贵经验，对治疗妇女病的经验，也是丰富多彩。因此，党号召我们发扬祖国医学、进一步保证妇女同胞的健康，而使她们更愉快地参加生产和学习。这样，就大大地鼓舞了我校及门诊部的大夫积极地贡献出宝贵的治疗经

驗，并从訪賢采風中整理出有實用价值的部分驗方，这本婦女病驗案驗方集，就是这样輯成的。不过，这仅是我們的一些片斷經驗，缺点在所难免，尙希讀者指正。

山西省中医学校及附屬門診部

1959年四月

目 录

妇 女 病 驗 案

一、調 經

少腹逐瘀湯在妇女病应用上的几点体会……亢子和 (1)

新訂丹参四物湯治愈血亏 (貧血性) 經閉

……………李清印 曹棟軒 張崇泉 (4)

折冲飲治疗痛經, 效果显著……………亢子和 (6)

桂枝茯苓丸治疗子宫附属器炎症……………亢子和 (7)

二、不 孕 症

新訂烏药湯治愈七年痛經及續发性不孕症

……………曹棟軒 張崇泉 李清印 (8)

以桂枝茯苓丸、四物湯、异功散加味治疗妇女

不孕症……………亢子和 (9)

三、崩 漏

胶艾四物湯加減治愈子宫出血……………王 佐 (12)

四、帶 下

針灸治疗白帶……………馬孝忱 (13)

五、胎 前

- 千金青竹茹湯治疗妊娠恶阻（即妊娠呕吐）
..... 亢子和（14）
- 固胎飲治愈习惯性（曾經流产七胎的）流产
..... 李生华（16）
- 当归芍药散治疗妊娠腹痛..... 亢子和（17）
- 新訂清腸飲治愈妊娠兰尾炎，不用开刀
..... 胡翰文 曹棣軒 李清印 張崇泉（18）
- 治愈妊娠期蟯虫及蛔虫病的經驗..... 李生华（18）

六、产 后

- 治疗外伤性流产因胎盘残存的子宫大出血，
免于刮宫手术..... 李生华（20）
- 升阳除湿湯治疗产后飧泄
..... 曹棣軒 張崇泉 李清印（22）

七、症 瘕

- 治疗症瘕病的几点体会..... 亢子和（23）

八、乳 病

- 以小金丹、阳和湯治愈乳房纖維瘤，不开刀... 次廷弼（27）
- 乳痛（乳腺炎）的預防及中医治疗
——不用开刀，效果快..... 張敬武（28）

九、妇女杂症

- 吳茱萸湯加减治愈妇女六年之久的厥阴头痛
（并以蛇床子合剂外洗治愈滴虫病）
..... 胡翰文 亢子和（31）

中藥很快治愈大发作性癇病一例

.....張敬武 王 佐 亢子和 曹隸軒 (33)

中医不开刀治疗妇女痔瘡.....王鑾生 (34)

婦 女 病 驗 方

一、調 經

經血不調 (四方) (38)

痛經 (十方) (39)

月經過多 (二方) (42)

經閉 (二方) (43)

二、崩漏帶下

崩漏 (三十四方) (43)

赤帶 (一方) (52)

白帶 (八方) (52)

赤白帶下 (三方) (54)

三、胎 前

惡阻 (三方) (55)

妊娠腹痛 (一方) (56)

子嗽 (一方) (56)

胎動不安 (三方) (57)

胎兒不動 (一方) (57)

習慣性流產 (二方) (58)

胎前雜症 (五方) (59)

四、临 产

催生 (一方)	(60)
胎衣不下 (二方)	(61)

五、产 后

产后血暈 (五方)	(61)
产后头痛 (一方)	(63)
产后腹痛 (二方)	(63)
产后腰腿痛 (二方)	(64)
产后全身痛 (一方)	(65)
产后麻木 (二方)	(65)
产后痙攣 (三方)	(66)
产后失眠 (一方)	(67)
产后咳喘 (一方)	(67)
产后吐泻 (三方)	(67)
产后小便不禁 (一方)	(68)

六、乳 病

吹乳 (二方)	(69)
乳痈 (五方)	(70)
乳汁不通 (十方)	(71)
奶汁不足 (五方)	(74)

七、妇女杂症

咳嗽喘息 (二方)	(75)
胃病吐酸 (二方)	(76)

水肿 (一方)	(76)
便秘、便血 (二方)	(77)
阴疮、阴痔 (二方)	(78)
阴痒、阴虱 (四方)	(78)
淋症 (一方)	(79)
软骨病 (二方)	(80)
麻木 (四方)	(80)
鸡爪风 (十方)	(81)
腰腿痛 (四方)	(84)

婦女病驗案

一、調 經

少腹逐瘀湯在婦女病应用上的几点体会

亢子和

少腹逐瘀湯載于清代王清任所著之“醫林改錯”中，并有歌括詳述其藥味組成、分量、療效。其应用范围如下：

此方治小腹積塊疼痛，或疼痛而無積塊，或少腹脹滿，或經血見時先腰酸少腹脹，或經血一月見三、五次，接連不斷，斷而又來，其色或紫，或黑，或塊，或崩漏兼少腹疼痛，或粉紅兼白帶皆能治之，并有安胎種子的作用。

我認為此方之所以有調經鎮痛，種子安胎作用者，因其有調經祛寒逐瘀、理氣、鎮痛之功效。數年來我對此方在種子安胎方面尙無体会，茲不贅叙。但對於調經鎮痛方面確有顯著的療效。少腹逐瘀湯，不僅是調經鎮痛有卓效，而對於因月經病引起的胃病，如消化不良、腹部脹痛、嘔逆、吞酸、頭昏、氣短等病療效尤為顯著。茲將我一年來在治療中的幾個典型病例簡介如下：

舉例一：李××(女)五十歲，昔陽縣人，現住新民二條七號，于1957年十月二十九日，初次門診(病歷號15997號)。主訴：經來量多，頭痛，心煩，已經數年了，以後月經就不正常，半月二十天一次，持續時間長，因出血過多，致腰困腿痠，四肢無力，心跳頭眩暈的不能起床。

于本年五月間因出血不止，曾用小蘗一两半，熬水碗許頓服后血虽止，随則发现腹胀、气短、心悸、胃部胀滿、不能食、失眠等証状。現病史是胃部胀滿，气短心跳，头眩暈，噯腐吞酸，不思飲食，全身乾燥，四肢无力，睡眠不安，二便正常。脉象沉細而涩，舌无苔。初步診斷为肝郁气滯血虛之症，拟先服柴桂龙牡湯加減，以舒肝降逆，鎮冲。服葯后无反应，繼用归脾湯加減以治心脏，但仍无效。因充分考虑可能是因出血驟补，引起以上諸症，遂改用上病下治法。用少腹逐瘀湯加減，并用大黃蠱虫丸每次一粒。

处 方：归尾四錢 赤芍二錢 川芎二錢 沒葯二錢 官桂錢半 灵脂二錢 生蒲黃錢半 炒干姜一錢 元胡一錢 制香附三錢 桃仁二錢 紅花二錢 炒小茴三錢 水煎服。服葯后即覺胃部胸膈舒适，气短心跳，头暈均大減輕。根据“效不更方”的定論，以此方連服十三剂，病遂全愈。

体 会：該患者年已五旬，已屆絕經期，但在更年期，易有月經异常現象，因出血过多而驟补，即滯于下而塞于上，瘀血为害，变症多端，以此方化瘀活血，而气短出血諸症如失矣。因年龄已过，月經亦不再行。

举 例 二：李××（女）二十二岁，山西省繁峙县人，現住市郊小店区皇陵庄，于十一月二十二日，初来門診（病历号16320号）。主訴：五十二天未来月經，自覺上腹部膨脹，气短而腹疼，半声咳嗽，曾經中医診斷为受孕。但服葯无效，而来求診是病，是孕？現病史为胃滿悶，不思食，有停水感觉上腹部胀疼，气短、咳嗽，結婚二年未生育，舌无胎，二便正常。脉象沉細，左尺尤

弱。根据脉象症状不似受孕，通过青蛙試驗再决定，先以溫胆湯以化痰散滿，除煩。

处 方：陈皮三錢 半夏三錢 茯苓四錢 甘草一錢 枳实二錢 竹茹三錢水煎服，服藥后无效果，妊娠試驗（一），遂改用少腹逐瘀湯，連服两剂，症若失。

举 例 三：楊××(女)二十一岁，平定县人，現住本市北肖墙13号，山西机器厂第九宿舍，于1955年六月即来門診。

（病历号1171）。主訴：月經錯后，少腹空疼，有陣发性白帶已二年多了，結婚数年未生育。当时根据症状曾服艾附暖宮丸多次，后已漸愈，但仍未生育，不时发现腹疼。于1957年一月份因月經过期未来，又到本市某中医联合医院診療前后共三次，最后大夫囑咐不必吃藥，可能是受孕。当时仅四十天未来月經，少腹微痛，亦未进行其它診斷，患者疑信參半。于本年二月初，又来本部治疗。此时已五十天未来月經。由王大夫診斷患者脉沉細澀微数，不似受孕，复用青蛙試驗（一）。拟方用四物湯加香附桃仁紅花元胡等藥。但患者仍疑是胎不敢服用。后又經張某大夫診斷为确是受孕，大用溫热保胎藥品，服藥数剂后，腹痛益劇，伴有发烧，咳嗽症状，体溫漸高，两颧发赤，肌肤消瘦。忽于六月二日晚十时又来請求出診。因患者腹疼剧烈，經我診斷仍非妊娠，未与处方，令其次日来門診（此时疼已止）。次日經我科会診，又用青蛙試驗，还是（一）。建議她到山大检查。此时已經四月未来月經了。經山大医院检查仍不是胎，兼有肺浸潤。患者此刻才真知无胎，但已四个多月，不見經，兼有肺病，咳嗽发热，少腹胀疼拒按，病日加重，精神已有极大負担。于六月一日复来本部治疗。現病史为四

个多月未来月經，少腹胀疼，咳嗽发烧，两颧发赤，下午尤重。脉象沉細微数。诊断为肺病发烧咳嗽，由月經病引起，当先調經，兼治肺病。

处 方：以少腹逐瘀湯冲服大黃廬虫丸，兼服百合固金湯，以治肺病，前后共服藥六剂，咳止热退，腹疼已減。于本月二十七日晚上来經，腹微疼，經量不多，色黑有块，持續四天經止，經期中經過良好，患者非常高兴，病基本已愈。

体 会：經病与妊娠疑似之間診斷检查必須詳慎，否則經閉疑孕，妊娠疑是經閉，不但要出医疗事故，同时与患者貽害无穷。如此例因經病致成肺病，是很危险的。王清任名医所說“血化下行不作勞”，是至理名言，可謂此案之借照。原方附后以作参考：

小茴香炒七粒 干姜炒二錢 元胡一錢 沒藥研一錢
当归三錢 川芎一錢 官桂一錢 赤芍二錢 蒲黃三錢
灵脂炒二錢水煎服。

新訂丹參四物湯治愈血亏(貧血性)經閉

李清印 曹棟軒 張崇泉

古書云：女子一七而腎氣動，二七而天癸至。根据現代生理學，女子一般在十四岁即有月經初潮，此即古人所說二七而天癸至也。古書云：女子七七天癸竭。一般來說婦女四十九岁就到了閉經期。但有不到七七天癸竭的时期，而出現了无月經的状态，除在怀孕期內以及哺乳期間一部或全部

經閉属于生理現象外，一般系属于月經閉塞症。

按經閉的种类：不外乎实性（即血滯的經閉、一般少腹及臍边有块）和虛性的（即血亏和血枯的經閉）两种。在治法上亦有所不同，实性者宜三和湯等以攻之，虛性者宜地黄湯等以养之。

虛性經閉：

按內經阴阳別論云：“二阳之病发心脾，有不得隱曲，在女子为不月”此为血亏經閉的原因。金鑑云：“脱血过淫产乳众，血枯漸少不行經”。此亦为血枯經閉的原因。

关于血亏的經閉，我們根据一物丹参飲，功兼四物湯的藥理，而使丹参与四物湯合用，新訂为丹参四物湯，在临床应用上十有余例，一般都有显著效果。茲举例如下：

患者：潘××(女)廿一岁(病历7号)。

主要症状：自十五岁起有月經，每月正常，近三个多月沒来月經，有时腹痛，近来腰痛，飲食欠佳，有时腹胀，有时头痛，自觉精神疲乏。

检查：发育营养欠佳，有貧血現象，心、肺經透視正常、肝脾不能触知，只有腹部膨胀，扣診是鼓音。脉象弦細而迟，一分鐘六十次。

化验：血色素60%，白血球4500，紅血球372万。

诊断：血亏（貧血性）經閉。

处方：新訂丹参四物湯

丹参五錢 大熟地五錢 酒当归五錢 酒白芍四錢 川芎錢半 芫蔚子三錢 香附三錢 广木香錢半 川断四錢 炒杜仲五錢 枳实三錢 焦白朮四錢 云茯苓四錢 官桂二錢 川牛膝錢半水煎服。

治疗經過：服上方加減三付后，头已不疼，腰痛及复脹痛均

減輕，消化漸好，飲食增加。當經化驗血色素已由60%增漲到80%，白血球5000，紅血球395萬，均較前增高。又續服上方四付後，月經已到，諸病悉退而恢復健康。

體會：經閉由於血虧者，這是因為患者的心脾之氣郁而不舒，以致發生了胃病，則脘腹膨脹，飲食漸少，血無從生，而精神疲乏，於是因血虧而經閉。四物湯本為補血要藥，加丹參則功效更好，此為直接補血調經之藥，配合蒼桂朮枳香附之類，則能舒郁健脾，使消化恢復。飲食增加，就能補益氣血，使身體逐漸復原。再加杜仲菟蘆牛膝之品，調經通經，故能使血虧經閉得以早獲痊愈。

折冲飲治療痛經，效果顯著

亢子和

處方：折冲飲加減。

藥味及加減：當歸四錢 赤芍三錢 川芎二錢 桃仁二錢 紅花二錢 丹皮錢半 元胡三錢 川牛夕三錢 官桂錢半。必加香附四錢 乳香二錢 沒藥二錢。酌加藥品：錯後加鹽吳萸錢半 烏藥二錢。趕前去官桂加酒生地二錢。氣滯加柴胡錢半 沉香錢 通草錢。水煎服。

效果：此方根據病的不同情況加減，一年多的時間內，治療了五十個痛經患者，其中全愈者三十人，減輕者二十一人，不明者二人，總計治愈率為57%，有效率為

96.2%。

体会：总观此方组成的药味，功能通经逐瘀、活血、理气、止痛，是以治痛经功效非常显著。

典型病例：刘树芝（女）二十二岁，河南林县人。现住太原市普光路，病历号2062号。

主要症状：经期不准，两胁胀满，经来腹痛。

治疗经过：根据脉象沉弦，行经后期，即用此方加吴茱萸半 沉香钱 历时两周，共服药十剂全愈。

桂枝茯苓丸治疗子宫附属器炎症

亢子和

处方：桂枝茯苓丸（金匱方），改为汤剂加味。

桂枝二钱 茯苓五钱 桃仁二钱半 杭白芍四钱 粉丹皮三钱

加減法：加制香附三钱，酒当归三钱，元胡二钱。

煎服法：用水两杯以漫过药为度，煎取多半杯，空心温服，渣再煎服，服药后宜静息片时。

效果：一年内用此方治疗十个病例，其中全愈者七例，并有一患者结婚后十年未育，经过治疗病愈后，现已受孕。其中三例均皆减轻。

体会：此方功用能斂阴镇痛，逐瘀生新，活血理气止痛，故对于一般的子宫附属器炎症，均有良好效果。我根据（金匱）妇人妊娠篇和近代名医叶橘泉“古方临床之应用”，提出而扩大了治疗范围，又结合自己的日

常臨床經驗才肯定它的療效。

舉例：陳英照（女）二十六歲，洪趙縣人，因來太原治病，暫住五一路玉華客棧，於1956年八月來診（病歷號7808號）。

主要症狀：脈象沉弦略數，月經趕前，少腹左側有壓痛點，久不孕，經醫院檢查為子宮周圍炎症。

治療經過：根據脈象症狀及主訴情況，用此方治療，共服藥八劑，為期兩周全愈，欣然返原籍。

二、不 孕 症

新訂烏藥湯治愈七年痛經及

續發性不孕症

曹棟軒 張崇泉 李清印

祖國醫學在治療婦女的痛經上，它是可以分出寒熱虛實的不同，如腹痛拒按者屬實屬熱，腹痛喜按者屬虛屬寒。金鑑云：經后腹痛或去血過多乃血虛也，經前腹脹痛乃血氣凝滯也。同時，在腹脹腹痛的孰輕孰重，又有細致的區分，若脹過于痛是氣滯其血，痛過于脹是血凝碍氣。中云一向是針對辨証而提出不同的治法，如經后腹痛屬虛者宜當歸建中湯以補之，經前腹脹痛而疼過于脹者宜琥珀散以破其血，脹過于痛者宜加味烏藥湯以調其氣。

經行腹痛，由於氣滯其血，根據金鑑加味烏藥湯的化裁而新訂烏藥湯，在臨床應用上二十余例，不僅能夠治愈了痛經，而且還能夠解決了因痛經所引起的不孕症。茲將治愈七

年痛經及續发性不孕症的典型病例列下：

患 者：祁××（女）二十四岁，机关干部。

病 历 号：10304。

主要症状：月經期及經色正常，来四天即完，但每月行經腹胀痛，經完即好，曾生产一胎，現已七年未怀孕，伴有胃口疼，食欲不振的症状。脉象迟細。

处 方：新訂烏药湯。

烏药三錢 香附三錢 广木香二錢 元胡三錢 青皮三錢 荒蔚子三錢 当归五錢 川芎三錢 生姜三錢 白芍四錢 肉桂一錢水煎服。

治疗經過：先以香砂六君子湯加減服藥一付后，胃疼已止，飲食漸增。續服新訂烏药湯四付后，来經一次已不腹痛，下月即受孕。至1957年十月生一女孩。

以桂枝茯苓丸、四物湯、異功散加味

治疗妇女不孕症

亢子和

一般妇女結婚后二年內是要受孕的，如果二年內不 受孕，我們称为不孕症。如不是先天生理上的关系，属于病理方面的，經過治疗，即可受孕。但病理方面的类型，从三年来临床所見，择其主要者，根据脉症，初步分为三种。

1. 属于附属器炎症的，如卵巢炎、輸卵管炎等，脉象沉細数，症状少腹兩側或一側痛，如針刺，行經时痛尤严重，