

样 本 库

王

氏

醫

案

繹


7/15/18

商務印書館

注

石

王孟英
祖
注



42685

出版說明

医案是医家在臨床實踐中，把有关病証發展的情況，詳細地記錄下來，加以總結。从現代的医学观点來看，医案也就是典型的病历。研究医学的人們，可以从这些具体的医案里，丰富臨床的經驗。所以历来医家都非常重視医案，並把它看作是研究医学的宝貴材料。

王氏医案是清代名医王士雄（孟英）医学論著的一部分。全書十卷，附录一卷，詳細地記載王氏在溫熱暑濕病証方面的病例；不分門類，每証自成一条，說明患者的病因、病象，分析病情，隨証處方，按方施藥。

本書採用医案的体例，根据具体事实，在論証、論治、和处方几方面，都有詳明的記述。

首先，在論証方面，作者說明辨証是医家的第一要務。辨別証候要从患者的整体来考察；而且气候的轉變，飲食是否勻調和精神上的感动等因素，都和病原有着密切的关系。再从人体生理上分成營、衛、血、气四个阶段，來說明溫熱病的發展規律。如果人体營、衛、

血、气得其協調、平衡，身体自然健康，感染疾病的机会就会減少；相反地身体虛弱的人，就容易受到疾病的侵襲。所以說「伤寒偏死下虛人」。

其次，在診斷方面，作者在診治病証時应用了中医診斷的望、聞、問、切四法，而且臨証主張應該處以「審問慎思而明辨之，庶免顛預貽誤之弊」的態度。从脈象的實、弱、弦、滑、數、亂來斷定病証的屬於急性或慢性。特別是善用舌診，从舌本的絳色、紫色、藍色和舌苔的白、黃、黑來決定是屬於寒証或熱証和表証或里証。對於熱性病患者的內熱未清，即使表面上看來是寒，也不能驟下虛寒的決斷。所以說「故治之道，最忌補瀉壅滯之品；設誤用之，則邪得補而愈熾，濁被壅而愈塞；耗其真液之灌溉，阻其正氣之流行。液耗則出艱，氣阻則覺冷；大凡有形之邪，皆能阻氣機之周流。」並且有重病輕取之法，在臨証治療時，充分地運用了隨証治療的原則。

最后，在處方方面，作者很注意用藥，曾說患者「死於病者十之三，死於藥者十之七。」除了尽力地運用隨証治療的原則，而且不拘泥成方，所以說「病同体異，難執成方，」又說「執一方以療百病，無此治法。」遇到特殊病証的患者，也必須出以特別療法，所以有「既患駭人之病，必服駭人之藥」的說法。這樣在處方施藥上除了說明藥物配伍的君、臣、佐、使

的关系，特別注意靈活地使用藥物。

在這一部書里，作者從每個具體的病例，闡明了中醫傳統的理論，積累了豐富的臨床的實踐經驗，並且在個別病例，提出了他獨到的見解。但究以時代的限制，對病理方面的說明，始終限於在寒熱虛實上推究病因，不能說明溫熱病還有一部分是由細菌傳染而來；所以書中有关病理的解釋，在今天看來，就有了局限性，這是讀者在閱讀這部書時，應該注意的第一點。

另外，過去中醫的辨証、診斷、處方，大部分是根據積累的經驗來作判斷；所以對病証的處理，難免有自以為是、主觀片面的地方。在醫案中我們隨時可以看到，作者總是对別醫的治法，提出批評；但對他自己未能治愈的個別患者，並未作深入的檢查。而且對病証處理的方法，也很自信，因此在本書中常見到「覆杯即安」，「一劑知，二劑已」，「投匕而痊」，「竟劑即康」，「下嚥即痊」這類語句。由此可見，作者他自己對病証的處理，未免太自信了一些，還缺乏深入研究的的精神，這是讀者在閱讀這部書時，應該注意的第二點。

作者王孟英名士雄，別字潛齋，半癡、夢影，清道光咸丰中浙江海鹽人，寄居杭州，從他祖父起，就以醫為業。幼時家貧，刻苦自勵，博覽羣書，尤精醫學，稍長，乃以醫為業。

咸丰年中，迁居上海，这时正值温疫流行，經孟英治疗的多全活，有名江南，是叶天士、吳鞠通以后温热派有名的医家。他对温热病用藥，反对驟下温补，而以涼潤清解为法。医学著述很多，有温热經緯、霍乱論、王氏医案、潛齋四科（內、女、外、兒科）簡效方、潛齋医話、飲食譜、归砚录，並輯有潛齋医学叢書等行世。

王氏医案正編二卷，原名回春录，周鏐輯录；續編八卷，原名仁术志，趙夢齡等輯录。二書經楊照藜合刊，題名王氏医案。另有三編三卷。今本是正續兩編合刊十卷，三編作为附录，曾經石念祖釋注。因为原案間或有脈証並敘，或敘証遺脈，或敘脈遺証；方藥中也有未載明分量的，都經釋注者斟酌补入，附注說明，對於閱讀，更加便利。原書出版於一九一九年，曾由謝觀校訂，文字間稍加刪減。王孟英是清代內科名医，本書記載的都是他对温热病的臨床經驗，所以我們把它重印出来，供作研究中医有关温热病的参考。

商務印書館 一九五六年十月

王氏医案釋注序

清道光朝浙医 王孟英先生名士雄。潛齋半癡夢影。皆研医后之別字。其字夢影者。示藥因証異。不執效方之义。著有溫熱經緯。卽王氏五種行世。就中医案。都凡十一卷。虽大旨爲救溫補而設。實則隨証制方。絲絲入扣。果得融會貫通。則古今医籍兼讀可。緩讀亦可。先生深得力於喻子嘉言。讀先生書。而后得門。原案或脈証方藥並敍。或敍証遺脈。或敍脈遺証。若方藥註銖兩者。則更千百首中一二。窺其編次苦心。殆欲人深思自得。中材而下。難覓金鍼。不敢忘得門所自。謹就原案箋釋其病情脈义。方藥之偶闕者。僭補之。銖兩之不注者。僭拟之。願於原案。显不脗合者。有二。勸病制方。本有得意疾書之樂。移時或銖兩皆忘。何況据案懸拟。元運衰薄。氣體漸就劣弱。拟注不得不故減銖兩。以便揣摩。若溫病中風升陽浮各案。潛陽重鎮之品。不得宗法。先生函診楊素園室人方案。一藥輒至數兩。匪獨偏証偏治。急証急治。非此不生。並取金所屢試屢效者。折中規定。不敢執死書以困活人。覽者慎勿疑信參半。致千慮一失。若用多。各少服法。分次徐投。藥效卽止。則無不可。稿成。顏曰。中医指掌。邑同學束子劬直。慨任印費。除續刊最簡單之本。草外。覽者手此一編。可以尋途轍。資事畜。謂保國粹。則吾豈敢。

王氏医案译注 序

丁巳季春江都蘭孙父石念祖自序

王氏医案釋注凡例

一原案概用單行，詮擬概用雙行。

一治病最忌不分在氣在血，各案註明在氣在血。

一治病以辨証為要，辨証以熟病情為要，是書於病情不厭詳注。

一切脈以沈脈為要，是書於沈脈之脗合病情者詳注之。

一切脈病者正坐，盡前兩手肘置案上，重按久按，方切得出沈脈脈情。

一病有正變，變病之要藥，卽正病之禁藥。

一見氣不治氣，此指氣病由於陽虛陰虛者而言，補陽補陰則氣自靜。

一見痰不治痰，此指陽虛陰虛之痰而言，補陽補陰則痰不作。

一見血不治血，此指氣實氣虛之血而言，氣實清之則血不上行，氣虛振之則經自下行。

一補陰難，補陽尤難，久病陽旺陰虛可治，陰陽兩虛不治，氣不運藥，良方何益。

一看舌胎，虽婦女宜令張口看到舌根，不可但看舌尖，胃脘有無痞滯，以舌根胎形為主，若医年老目昏。

王氏醫案釋注 凡例

看舌又在深房密室宜洋燭忌电灯洋灯並須啓窗細看

王氏医案釋注

海宁王士雄孟英医案
江都石念祖蘭孫釋注

武进謝 觀利恆校訂

卷一

夏令某登廁忽然体冷汗出。气怯神疲。孟英視之曰。陽氣欲脫也。猝不及得藥。适有三年女佩姜一塊。約重四五錢。急煎而灌之。卽安。后用培補藥。率以參芪朮草為主。蓋氣分偏虛也。辨陽虛在氣怯神疲三年及約重四五錢非閒字。陽虛宜溫補。原單為主藥。其另有佐使之藥可类推。宜用土炒潯芩五錢。土炒西芪四錢。土炒白朮三錢。土炒粉草一錢五分。參芪多於朮草者。參芪為行補之品。朮草則守補之品也。

范庆齋年踰五十。素患痰嗽。乙酉秋在婺。驟然吐血。勢頗可危。孟英診曰。氣虛而血無統攝也。虽向來咳嗽陰亏。陰藥切不可服。然非裕陽吐血。附桂更為禁劑。乃以潯參芪朮苓草山藥扁豆橘皮木瓜酒炒芍藥為方。五貼而安。紫虛痰嗽。病在氣分。不在血分。孟英診斷氣虛。必左右脈皆無力。右脈重按尤軟。氣虛忌用冬地。除藥固已。但非裕陽吐血。若用一毫附桂。便傷其兼証之陰方。宜用炒潯參五錢。炒西芪四錢。炒白朮三錢。云苓片三錢。炒粉草一錢五分。炒山藥三錢。炒扁豆三錢。陳橘皮一錢五分。陳木瓜一錢五分。酒炒白芍一錢五分。此証注氣虛。但補氣不可傷陰。方中甘草木瓜並用。於補氣中取酸甘化陰之義。亦即引陽入陰之法。但主要病情在氣虛。參芪少用不足補氣。全方一時全服。亦恐非重藥輕投之義。宜仿仲景計叔微成法。分次徐服。此必孟英當日所有。繼去甘草木瓜。加熟地阿膠紫石英麥冬五味。

子龙骨牡蠣熬膏服之全愈。更方系从陽引陰之義。除前方各加十倍外。去甘草木瓜。恐甘酸之性滯氣分。不能藥熱地。阿膠麥冬治陰虛。石英五味龍牡煎。為陰藥下行之使。

鄭德順春患急証。時已二鼓。丐孟英視之。見其扒牀拉席。口不能言。惟以兩手指心抓舌而已。孟英曰。中毒也。取藁豆二升。急火煎清湯。澄冷灌之。果即霍然。詰期詢其故。始言久患臂痛。因餌草頭藥。下咽後。即

心悶不可耐。舌麻不能言。藁豆為清涼解毒之品。用二升及急火煎清湯。澄冷灌之。各有深義。腸動陰靜。扒牀拉席。病急。急証急治。藁豆少用。則有杯水車薪之禍。煎藥文火藥性入下焦。武火藥性入上焦。故宜急火煎清湯。其澄冷灌之者。前項病情。熱毒在上焦氣分。然煎成熱服。則証熱湯熱。下咽後。藥與病勢并格。澄冷灌之。即用寒遠寒之義。

娶人羅元奎。夏令猝發寒熱。旋即嘔吐。不能自立。自言臂間痛不可當。孟英視其痛處。焮赤腫硬。形如肥皂。橫梗於毛際之左。乃曰。此証頗惡。然乘初起。可一。去之。用金銀花六兩。生甘草一兩。皂角刺五錢。

水煎和酒服之。一劑減其勢。再劑病若失。猝發寒熱三句。病在氣。臂痛難當四句。病在血。此証系血病及氣。本病在

鍵不合。此証頗惡三句。即急証急治。偏証偏治之義。暴病多熱証實証。銀花治血熱。血瘀君藥。凡病偏於陽者。必不足於陰。且也然。氣不降則氣不治。血亦不治。故用生草一兩以緩中顧陰。兼諸作汗基本。角刺少用。則發外証。多用則散外証。銀花生草緩上中。以入血分。角刺五錢。煎和酒服。引甘寒之銀花生草。上入氣分。逾年患傷寒。孟英切脈虛合之。為一升一降。且酒能引銀花入血分。涼血散瘀。陳酒和服。宜用一兩。高根減半。

細已極。曰。此不可徒攻其病者。以陰分太亏耳。予景岳法。以熟地當歸酒炒白芍炙甘草橘皮柴胡等藥。

一劑而瘳。此証陰中之陽亦虛。故方中參用當歸炒芍。喻氏嘉言醫門法律論治病三分內傷。七分外感。外感為重。七分

誤人無限。宜用炒熟地一兩。開水泡湯。去渣用湯煎藥。當歸身三錢。酒炒白芍一錢五分。炙甘草三錢。橘皮一錢五分。柴胡三錢。橘葉均次入。

某素患噫氣。凡体稍不適。其病卽至。既响且多。戊子冬發最甚。苦不可言。孟英曰。此陽氣式微而濁陰上逆也。先服理中湯一劑。隨以旋復代赭湯投之。遂愈。嗣后每發。如法服之。輒效。噫氣有二。一陽虛。一邪寒。最苦。肺如鐘。撞則鳴。言肺為邪賊。則聲音頓失其常。肺如鐘。空則鳴。言肺氣為寒邪所窒。則不能金聲玉振。噫氣如因肺阻。實邪。斷不能既响且多。冬發最苦。清陽虛則衛外之陽亦虛。表陽不充於皮毛。故冬寒易發。濁陰上逆。由於陽氣式微。當專治陽微。氣為陽。氣以虛而逆。補陽則氣納丹田。而上逆何有。先服理中者。陽虛致病。必脾陽腎陽兩足。而后中氣升降適當。隨以旋復代赭投之。經云。上病下取。濁陰上逆。必隔不下降。故以代赭引人參之力下行。以靖浮越。服理中宜用土炒潞黨五錢。炒白朮三錢。炒甘草二錢。炒厚附片三錢。炒干姜四錢。服旋復代赭。宜用土炒潞黨五錢。土炒甘草二錢。制半夏三錢。原方生薑改煨姜三錢。大棗一枚。醋煨精石三錢。旋復花一錢五分。大棗精石均先燉。牛夏旋復均次入。有患陰虛火炎者。面赤常如飲酒。孟英主一味元參湯。其效若神。屢試皆驗。辨証在面赤常用炒元參片一兩。百沸湯去渣分次燉溫服。

叶殿和秋患感冒。旬日后汗出昏替。醫皆束手。孟英勸之曰。此真陰素亏。過服升散。与伤寒誤發少陰汗同例。下竭則上厥。豈得引亡陽為比。而以附桂速其斃耶。以元參地黃知母甘草白芍黃連茯苓小麥龜板鱉甲牡蠣阿膠為大劑投之。得愈。旬日后汗出昏替。一語注意。旬日后汗出昏替。則非甫病汗出昏替可知。始虽升已竭。上見厥逆。至於昏替可知。急証急治。元參片一兩。大熟地八錢。開水同泡。去渣。用湯煎藥。炒知母一錢。川雅連五分。生甘草三錢。整白芍四錢。云苓片三錢。北小麥四錢。血龜板一兩。血鱉甲二兩。煨牡蠣四兩。三味皆杵。先阿膠二錢。燉和服。白芍小麥龜板鱉甲牡蠣同先燉六句鐘。汗為陰液。下竭則上厥。當專治下竭。元參地黃滋陰以止汗。知母黃連微瀉其傷陰之熱。下竭上厥。風火沸騰。生草白芍合用。暫緩其如火燎原之勢。陰傷者陽亦傷。陽傷則陰潤之藥不能孤立以自行。故以茯苓其中樞。北地土性甘寒。北小麥夜吐花。麦皮最能凉人肌膚。汗止則陰漸復。龜板鱉甲牡蠣名三甲。最能潛納虛陽。汗出然后昏替。陽愈升則陰愈竭。陽潛則汗止。何昏替之有。元參地黃泡煎去渣。避其滯膩。三甲多煎則藥色黑。取其沈斂。亦上病下取之義也。

赵子升夏病瘧急延孟英視之曰暑熱為患耳不可膠守小柴胡也予白虎湯一啜而瘧

此証必而亦大汗飲清膏亦脈數重

按有力生石膏一兩先煎酒炒知母三錢宜去原方甘草糯米加鮮竹

叶二錢黑糯米三錢

生冬瓜子四錢

鮮荷葉一尺五寸

范蘭門患溫瘧孟英用白虎加桂枝以瘥

之生石膏六錢先煎酒炒知母一錢五分川桂枝四分去草米加蘇瓜

三錢晚飯砂三錢

苦杏仁一錢

陳香薷五分

桂枝杏仁香薷同次入

盛少云夏病溫熱瘧孟英以白虎湯加

蒼朮湯而安此証浮濕化熱與濕未脫高寒生石膏五錢先煎酒炒知母一錢五分

生冬瓜子四錢

鮮荷葉一尺五寸

鮮蘇根三錢

生冬瓜子四錢

某夏患瘧服柴胡藥

二三貼后汗出昏厥安語遺溺孟英切其脈洪大滑數曰陽明暑瘧也與傷寒三陽合病同符處竹叶石

膏湯兩劑而瘳

此必陰虛之體柴胡湯劫汗傷陰汗出昏厥安語者胃腕部位與心相近胃熱擾心則妄語遺溺者

脾胃相近熱傷胃即傷脾肺司周身氣機升降肺陰為熱邪所傷則肺陽亦失其宣攝之用故遺溺

服

洪大為陰虛滑數為熱笑生石膏八錢先煎酒炒知母二錢生甘草三錢

北沙參四錢鮮竹叶二錢

無病皮三錢

晚麥砂三錢

炒苦杏仁各一錢五分

黃肖农患暑瘧孟

英投白虎湯加西洋參數貼始愈

暑能傷陰生石膏八錢先煎

酒炒知母二錢

西洋參三錢

晚麥砂三錢

英投白虎湯加西洋參數貼始愈

三錢苦杏仁一錢

陳香薷五分

願味吾妻病瘧瘧亦主是方而效

庄芝階妻年踰花甲痰熱甚熾孟英甫視再四亦予竹

叶石膏湯而安

人有陰虛陽盛之分藥醫者不可不知年踰花甲痰熱甚熾必系陽虛亦名虛陽之體生石膏一兩

母三錢姜竹茹三錢

先煎酒炒知母三錢

次入鮮竹叶二錢

去米草

加陳胆星一錢

嫩和服九節蒲六分研次入川貝

范蔚然八月患感旬余諸醫束手孟英治之見其氣促音微呃忒自汗飲水下嘔隨即傾吐無余曰伏暑

在肺必由溫散以致劇也

蓋肺氣受病治節不行一身之氣皆失其順降之機即水精四布亦賴清肅之

叔以主之氣既逆而上奔水亦泛而上溢矣但清其肺則蓄恙自安聞前服諸方始則柴葛羌防以升提

叔以主之氣既逆而上奔水亦泛而上溢矣但清其肺則蓄恙自安聞前服諸方始則柴葛羌防以升提

叔以主之氣既逆而上奔水亦泛而上溢矣但清其肺則蓄恙自安聞前服諸方始則柴葛羌防以升提

之火借風感吐逆不已。猶謂其胃中有寒。改用桂枝干姜以溫燥之。火上添油。肺津欲絕。自然氣促音微。疑其虛陽將脫也。徑予參歸蛤蚧柿蒂丁香以補而納之。愈。朴愈逆。邪愈不出。欲其愈也。難矣。亟屏前藥。以瀉白散合清燥救肺湯。數服而平。論証原案。生梨白皮三錢。地骨皮四錢。生甘草三錢。云梗米。加姜炒川連八分。北沙參八錢。花麥冬三錢。冬桑葉四錢。苦杏仁一錢五分。鮮枇杷叶三錢。剉包。清阿膠二錢。燉和服。

何叟年近八旬。冬月傷風。有面赤氣逆煩躁不安之象。孟英曰。此喻氏嘉言所謂傷風亦有戴陽証也。不

可忽視。以東洋參細辛炙甘草熟附片白芍茯苓干姜五味胡桃肉細茶葱白一劑而瘳。孟英曰。此真陽素虛。痰飲內動。衛陽不固。風邪外入。有根蒂欲拔之虞。誤投表散。一汗亡陽。故以真武四逆諸法。回陽鎮飲。攘外安內。以為劑。不可施之陽實邪突之傷寒。戴陽陽外陰內。外實內虛。面赤氣逆。煩躁不安。孟英診時。戴陽。必脈重按無力。不嗜冷飲。高麗參三錢。北細辛八分。次

入。炒甘草三錢。熟附片五錢。炒白朮三錢。酒炒白芍一錢五分。白茯苓干切三錢。炒干姜四錢。北五味子三錢。連衣胡桃肉五錢。先煎。陳細茶一錢。連鬚鮮葱白三錢。去蘆管次入。姜附分兩重於參苓朮草。則四君能動運於陽。而無滯不行之弊。細辛為藥入下焦之引導。干姜合四君坐鎮中焦。五味胡桃潤結浮陽。胡桃滋潤得陽中之陰。與病情有相悅以解之妙。白芍細茶反佐。葱白正治傷寒。

某秋患瘧。大為醫人所誤。初則表散。繼則滋補。延及月余。肌肉尽削。寒熱不休。且善嘔惡食。溺清畏冷。英診視曰。足太陰。溼。瘧也。以金不換正氣散三服而安。此病近因在誤於滋補。朴住寒邪。則肌肉尽削。寒熱不休。滋補則敗脾陽。故善嘔惡食。溺清畏冷。姜汁制茅

黃凡五錢。姜汁制樓朴去粗皮三錢。片薑連二錢。羅氏陳皮二錢。二味均次入。姜制半夏八錢。

鍾耀輝年踰花甲。在都患腫起。自腎囊氣逆便澀。諸治不效。孟英治之。切其脈微而弱。詢其溺清且長。五

苓八正腎氣五皮徧嘗之矣。孟英曰：此土虛不制水也。通利無功。滋陰亦謬。法宜補土。勝溼。予大劑參朮。

果卽向安。土炒潞黨五錢，土炒茅朮五錢，酒炒白芍一錢五分，土炒西芪三錢，土炒甘草二錢，土炒干姜五錢，炒枳殼五錢，熱附片五錢，北五味三錢，土炒陳木瓜三錢，腎為脾胃根，大凡脾陽極敗，如不挾風寒痰滯，非參補腎陽不可，木瓜不致入脾消腫，合參草

芪酸甘化陰，姜附虽多，絕無偏陽溫燥流弊。

金元章媳甲午新寡后患臌窠疥大抵溼熱之病。蕩醫連某疑為遺毒，竟作梅毒治。漸至上吐下利。不進

飲食。另从內科治。亦無寸效。延至次年春令。更兼腹痛自汗。汎愆肌削。諸醫望而却走。孟英視之曰：此胃

氣為苦寒所敗。肝陽為辛熱所煽。前此每服陽剛。卽如昏冒。稍投滋膩。泄瀉必增。遂謂不治之証。未免輕

棄。乃以四君子加左金椒梅蓮子木瓜余糧石脂等出入為方。百日而愈。第汎猶未轉也。諸親友環議通

經。孟英力辨此非經阻可通之証。惟有培養生化之源。使氣旺血生。則流行自裕。恪守其方。服至仲冬。天

癸至而肌肉充。上吐下利。不進飲食。此胃氣為苦寒所敗之証。肝陽逆上。則脾土受傷。陰精不能自秘。故腹痛自汗。肝統血。肝傷則汎。肝賊脾。則氣血不充而肌削。陽剛之藥愈傷肝。故如昏冒。滋膩之藥愈敗脾。故增泄瀉。此証用藥虽易相妨。然究以苦寒敗胃為主要。肝附於脾。脾治則肝治。宜先益其胃陽。使中氣有根。乃能循序施藥。炒潞黨五錢，白茯苓干切三錢，炒白朮三錢，炒甘草二錢，川椒紅二分次入，陳木瓜三錢，禹余糧炒赤石脂二味各一錢，研粗末冲和藥服。藥透左金丸六分，陳蓮子十粒，去心不去皮。四君合椒紅維持胃氣。左金合木瓜陳苦以泄肝陽。蓮子守朴斂滯。余糧石脂炒研和服。系遵喻氏法以瀉腸止瀉。孟英力辨此非經阻可通之証。蓋經阻可通。系陽實氣充。經期偶服生冷停瘀。病在血不在氣。且氣旺可受通經峻藥。此証氣虛不能生血。病在氣不在血。

朱恆山久患胸痞多痰。諸藥罔瘳。孟英診曰：清陽之氣不司旋運也。予參芪苓朮之劑。豁然頓愈。久病必實。中挾虛。

胸痞痞字注重。胸痞則氣虛短於升降。此証系陽虛非痰實。炒潞黨五錢，炒黃芪三錢，白茯苓干切三錢，姜汁制茅朮四錢，西薤白打次入三錢，制半夏三錢，賴氏陳皮一錢，炒干姜三錢，煨姜三片。

胸痞痞字注重。胸痞則氣虛短於升降。此証系陽虛非痰實。炒潞黨五錢，炒黃芪三錢，白茯苓干切三錢，姜汁制茅朮四錢，西薤白打次入三錢，制半夏三錢，賴氏陳皮一錢，炒干姜三錢，煨姜三片。

胸痞痞字注重。胸痞則氣虛短於升降。此証系陽虛非痰實。炒潞黨五錢，炒黃芪三錢，白茯苓干切三錢，姜汁制茅朮四錢，西薤白打次入三錢，制半夏三錢，賴氏陳皮一錢，炒干姜三錢，煨姜三片。

胸痞痞字注重。胸痞則氣虛短於升降。此証系陽虛非痰實。炒潞黨五錢，炒黃芪三錢，白茯苓干切三錢，姜汁制茅朮四錢，西薤白打次入三錢，制半夏三錢，賴氏陳皮一錢，炒干姜三錢，煨姜三片。

胸痞痞字注重。胸痞則氣虛短於升降。此証系陽虛非痰實。炒潞黨五錢，炒黃芪三錢，白茯苓干切三錢，姜汁制茅朮四錢，西薤白打次入三錢，制半夏三錢，賴氏陳皮一錢，炒干姜三錢，煨姜三片。

胸痞痞字注重。胸痞則氣虛短於升降。此証系陽虛非痰實。炒潞黨五錢，炒黃芪三錢，白茯苓干切三錢，姜汁制茅朮四錢，西薤白打次入三錢，制半夏三錢，賴氏陳皮一錢，炒干姜三錢，煨姜三片。

胸痞痞字注重。胸痞則氣虛短於升降。此証系陽虛非痰實。炒潞黨五錢，炒黃芪三錢，白茯苓干切三錢，姜汁制茅朮四錢，西薤白打次入三錢，制半夏三錢，賴氏陳皮一錢，炒干姜三錢，煨姜三片。

邦九經越医陳六順診治服藥后汗出昏狂精流欲脫孟英切其脈既數且乱沈取極細曰此証頗危生
机仅存一線亦斯人之陰分素亏不可尽謂附桂之罪也以元參知柏桑枝龙牡生地白芍甘草百合石
斛梔子鹽水炒淡豆豉為大剂灌之下嘔即安次日去梔鼓甘草加龟板鱉甲鹽水炒橘紅十余貼而康
陰分素亏何堪附桂劫陰孟英立言忠厚學医者不可自恕元參片一兩大生地八錢二味開水泡湯去渣用湯煎
藥炒知母一錢五分炒川黃柏一錢整白芍杵先煎一兩生龍骨枝四錢生甘草三錢百合鱉三錢鮮石斛杵先煎一
兩黑梔皮三錢淡鹽水炒豆豉一錢五分一味同次入煨龍骨杵一兩煨牡蠣八兩石斛三味炭先煨六句鐘取湯合
前元參生地湯代水煮藥此証險在精流欲脫龙牡瀉精急証急治不得不用大剂服法則分次徐徐灌次日去梔鼓甘草
則表解無汗可知甘草非入下焦之品故併去之宜加血龟板二兩血鱉甲四兩以助龙牡
而瀉精止汗煨時同煎淡鹽水炒橘紅一錢一派陰藥中不可無宣中降氣之品以為反佐

吳馥齋妹稟質素弱嗣失怙恃情怀悵悵汛事漸愆寢食皆廢肌瘦吞酸勢極可畏孟英以高麗參鹽水
炒黃連甘草小麦紅棗百合茯苓牡蠣白芍旋复花新絳等治之各恙漸已繼參归地滋陰康強竟胜於
昔情怀悵悵則心火不生脾土而脾敗寢食皆廢病在氣分脾敗則氣不生血故肌瘦吞酸為肝郁生熱脾敗不能滋
榮肝木則肝郁生熱高麗參切三錢淡鹽水炒黃連六分炒甘草一錢五分北小麦杵四錢紅棗三個百合鱉三
錢白茯苓干切三錢土炒白芍一錢此方用四君合仲景甘麥大棗湯方義強心脾且參參合黃連於補脾陽中瀉肝熱
兼取苦甘化陰之義白芍合黃連取酸苦泄肝之義此方接服大效后宜去甘草百合鱉加旋复花一錢五分絹包次
入醋煨牡蠣四錢先杵新絳屑四分引藥勢下行以靖肝陽而使肝
不賊脾繼加淨归身一錢五分炒大生地三錢原方去小麦旋复花

一男患喉痺專科治之甫愈而通身腫勢日甚医者惊走孟英診之曰病藥也投附子理中湯數剂而痊
喉痺治以寒涼法原不謬而藥過於病翻成溫補之証孟英嘗云死於病者十之三死於藥者十之七
腫水病也脾陽敗則腫曰去土炒附片五錢土炒白朮三錢
土炒甘草二錢土炒干姜三錢土炒熟附片五錢先杵后炒

朱氏妇产后惡露不行而宿嘔頓發專是科者不能下手孟英以丹參桃仁貝母茯苓滑石花粉桑枝通

草蛤壳苡仁紫苑山查絲瓜子莢蔚子旋復琥珀出入為方三日而愈因惡露停而發宿嘔是由血病及氣紫

四錢四琥珀研沖八分焦山查研一錢川貝母研三錢方通草三錢桑枝酒炒三錢旋覆花一錢五分續包次入此方

服二日去丹參苡仁莢蔚琥珀加白茯苓三錢西滑石包先四錢生蛤壳研先五錢生苡仁四錢紫苑茸一錢五分次

入絲瓜子三錢研先此方服一日宜先於治停瘀中兼治嘔續方則專治嘔

韓名諒兒妇重身患熱病諸醫皆慮胎隕率以補血為方旬日后勢已垂危孟英診之曰胎早腐矣宜急

下之或可冀幸若欲保胎則吾不知也其家力懸書方遂以調胃承氣合犀角地黃湯加西洋參麥冬知

母石斛牛膝投之萬病不外虛寒熱病系實邪誤補則助熱傷胎生大黃四錢元明粉二錢生甘草三錢大生地八錢

去犀角石斛錢西洋參三錢花麥冬四錢酒炒知母二錢鮮石斛研先一兩生牛膝二錢鈔犀角片磨沖五

分此方實者胎落果已臭爛而神氣即清熱亦漸緩次予西洋參元參生地知母麥冬丹參丹皮茯苓山

查石斛豆豉芫薸琥珀等藥調之粥食日加旬余而愈西洋參三錢元參片一兩大生地八錢二味開水泡湯

四錢云茯苓三錢焦山查研三錢鮮石斛研先一兩淡鹽水炒豆豉一錢莢蔚子研先五錢紫丹參三錢粉丹皮

八分此方大旨主育陰清熱行瘀安神茯苓莫中防陰藥敗陽焦查反佐行瘀豆豉入陰藥上行清熱

一少年驟患遺精數日后形肉大脫連服滋陰瀉精之藥如水投石孟英予桂枝湯加參芪龍牡服下即

效市月而瘳遺精數日形肉大脫是脾敗非陰亏炒粗桂木次入一錢煨姜三錢土炒甘草三錢

某秋間患感日治日劇漸至神昏譫妄肢振動惕施秦兩醫皆謂元虛欲脫議投峻補孟英診曰無恐也

通絡蠲痰可以即愈用石菖蒲羚羊角絲瓜絡冬瓜子苡仁桑枝橘絡葱鬚貝母鉤藤胆星為劑化服萬