



ERKEXUE
DUOXUANTI

儿科学多选题

● 孙道开 郭怡清

上海医科大学出版社

儿科学多选题

孙道开 郭怡清 编写

上海医科大学出版社

(沪)新登字207号

责任编辑 肖 英
封面设计 朱振东
责任校对 袁 庆

儿 科 学 多 选 题

孙道开 郭怡清 编写

上海医科大学出版社出版发行

上海市医学院路 138 号

邮政编码 200032

新华书店上海发行所经销

上海中行印刷厂常熟分厂印刷

开本787×1092 1/32 印张11.5 字数365.000

1994年7月第1版 1994年7月第1次印刷

印数 1—8000

ISBN 7-5627-0221-7/R·199

定价：8.80元

前 言

本书的编写目的是为了帮助医学院校学生、研究生及临床医师适应当前采用的多选题考试，更快地掌握和运用所学的儿科医学知识。

该书多选题的编写是根据儿科教学大纲，参考宋名通主编的《儿科学》及刘湘云主编《儿科学》等书，它不仅适用于医学生的复习和掌握儿科基本知识，也适合于临床医师和研究生的复习指导。

儿科学多选题共分二十章，每章均立题号，包括 A、B、C、K 四种类型，其后备有答案。由于水平有限，不当之处，欢迎指正。

编 者

1994年4月于上海医科大学儿科医院

多选题考试简介

考试历来是评定学生学习成绩、衡量教学效果和开展教学研究的重要手段。考试形式和考题类型较多，而国内外医学院校多年来逐渐采用多选题(Multiple Choice Question, M.C. Q)考试方法，它不仅应用于医学院校学生的基础和临床各学科的考试形式，亦应用于临床医师的知识自我评价。目前国内已统一采用我国卫生部 1982 年 11 月对全国部属高等医学院校毕业生的多选题：A 型题、B 型题、C 型题和 K 型题四种类型，分别介绍如下：

A 型题 为最佳选择题，是使用最广的多选题。常以叙述形式提出问题，然后列出 A、B、C、D、E 五种答案供选择，五个备选答案中只有一个是最佳、最适宜或最正确的(亦可能试题要求指出错误的一个)，称为正确答案或正确选择，其余四个称为干扰答案、迷惑答案或不正确的选择。干扰答案可以完全不正确，也可以部分正确，但不是最佳选择。应试者应仔细思考比较，从中选出最佳答案，并将答卷上相应的字母涂掉(如正确答案为 B，则将 A、B、C、D、E 五个字母中的 B 字涂掉)，以便阅卷和评分。

例题一：以下哪项是新生儿败血症的特征性表现：

- | | |
|------------|----------|
| A. 发热、拒奶 | B. 皮肤感染灶 |
| C. 白细胞计数增加 | D. 反应性差 |
| E. 无特征性表现 | |

本题正确答案应为 E。

B 型题 又称配伍题。本型试题首先列出五个备选答案,随后有几道考题。应试者应在五个备选答案中给每道试题选择一个能与之配伍的答案。B 型题不同于 A 型题之处是数道考题共用一组答案,每一个答案可被重复选择,也可不被选择, B 型题主要考核知识的密切相关性。

例题二: 问题 1—3

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 0.9%氯化钠溶液 | B. 1/2 张含钠溶液 |
| C. 2/3 张含钠溶液 | D. 1/3 张含钠溶液 |
| E. 1/5 张含钠溶液 | |

1. 等渗性脱水时,第一天补液用 (正确答案应为 B)
2. 低渗性脱水时,第一天补液用 (正确答案应为 C)
3. 高渗性脱水时,第一天补液用 (正确答案应为 D)

C 型题 C 型题与 B 型题相似,但备选答案只有四个,后随几道试题,要求应试者从备选答案中为每道试题选配一个正确答案,C 型题要应试者对两种现象或考察对象加以比较,从 4 个答案中选择。而 B 型题备选答案则为 5 个。

例题三: 问题 1—2

- | | |
|----------|----------|
| A. 房间隔缺损 | B. 室间隔缺损 |
| C. 两者均有 | D. 两者均无 |

1. 产生肺动脉高压 (正确答案为 C)
2. 肺动脉瓣区第二音亢进,固定分裂 (正确答案应为 A)

K 型题 又称复合是非题。由一个考题和四个叙述式答案的备选答案组合而成,组合方法固定不变,应选择其中一组作为正确答案。其现行的组合方式如下:

答案 A 指备选答案中①、②、③是正确的;

答案 B 指备选答案中①、③是正确的;

答案 C 指备选答案中②、④是正确的;

答案 D 指备选答案中④是正确的。

答案 E 指备选答案中①、②、③、④是正确的。

例题四：急性肾小球肾炎的血液生化改变是：

- ① ASO 升高 ② 血浆蛋白下降
- ③ 血清补体下降 ④ 胆固醇升高

正确答案应为 B，即备选答案①、③是正确的。

应用题：

实为 A 型题，为最佳选择题一种，先列出病例的病史、体征和必要化验结果，然后列出 A、B、C、D、E，让受试者选择出一个最佳答案。

例题五：生后 2 天小孩，出现黄疸，肝脾略肿大，血总胆红素 $255\mu\text{mol/L}$ (15mg/dl)，血型 A 型，Rh 阳性，直接抗人球蛋白试验阴性，抗体释放试验 IgG 抗 A 抗体阳性，此患者诊断是：

- A. 新生儿生理黄疸
- B. 新生儿 ABO 血型不合溶血症
- C. 新生儿 Rh 血型不合溶血症
- D. 新生儿肝炎早期
- E. 新生儿早期败血症

本题答案是 B。

目 录

一、绪论	1
A 型题	1
C 型题	2
K 型题	2
二、小儿生长发育	5
A 型题	5
B 型题	12
C 型题	12
K 型题	13
应用题	17
三、健康小儿的营养	20
A 型题	20
B 型题	25
C 型题	26
K 型题	26
应用题	30
四、小儿保健	33
A 型题	33
B 型题	34
K 型题	34
五、新生儿与新生儿疾病	37
A 型题	37
B 型题	47
C 型题	50
K 型题	51
应用题	61
六、营养缺乏性疾病	68
A 型题	68
B 型题	72
C 型题	73
K 型题	74
应用题	78
七、消化系统疾病	83
A 型题	83
B 型题	90
C 型题	92
K 型题	93
应用题	99

八、呼吸系统疾病	107	
A 型题	107	K 型题
B 型题	111	应用题
C 型题	112	
九、循环系统疾病	124	
A 型题	124	K 型题
B 型题	138	应用题
C 型题	141	
十、泌尿系统疾病	158	
A 型题	158	K 型题
B 型题	165	应用题
C 型题	168	
十一、造血系统疾病	183	
A 型题	183	K 型题
B 型题	193	应用题
C 型题	196	
十二、小儿结核病	210	
A 型题	210	K 型题
B 型题	213	应用题
C 型题	214	
十三、神经肌肉疾病	223	
A 型题	223	C 型题
B 型题	230	K 型题
十四、内分泌系统疾病	241	
A 型题	241	C 型题
B 型题	246	K 型题
十五、遗传性疾病	255	
A 型题	255	C 型题
B 型题	260	K 型题
十六、免疫和免疫缺陷病	267	
A 型题	267	C 型题
B 型题	270	K 型题

十七、急性传染病	277
A 型题	277
B 型题	286
C 型题	290
十八、小儿外科	308
A 型题	308
B 型题	315
C 型题	317
K 型题	319
十九、结缔组织病	324
A 型题	324
B 型题	329
C 型题	329
✓ 二十、儿科急诊	337
A 型题	337
B 型题	340
C 型题	342
K 型题	342
二十一、其他	349
A 型题	349
B 型题	351
C 型题	352
K 型题	352

一、绪 论

A 型题

1-1. 胎儿期下列哪种提法是不正确的

- A. 从卵细胞受精开始至小儿出生前
- B. 从孕妇末次月经第一天算起为 40 周
- C. 从真正受精开始算起 38 周
- D. 胎儿期含妊娠早期、中期和晚期
- E. 从受精后到分娩时 40 周

1-2. 胎儿期是指

- A. 受精后的 39 周
- B. 受精后的 38 周
- C. 受精后的 270 天
- ✓D. 从受精到分娩前约 40 周
- E. 受精后的 28 周

1-3. 围产期一般是指

- A. 从受孕到生后 10 天
- B. 孕期 10 周到生后 30 天
- C. 孕期 20 周到生后 10 天
- D. 孕期 24 周到生后 30 天
- ✓E. 孕期 28 周到生后 1 周

1-4. 新生儿期是指

- ✓A. 从脐带结扎到整 28 天
- B. 从脐带结扎到整 30 天
- C. 从脐带结扎到整 1 个月
- D. 从胎儿娩出到整 28 天
- E. 从胎儿娩出到整 1 个月

1-5. 下列年龄分期中哪一个是错误的?

- ✓A. 婴儿期是指出生到 12 个月
- B. 幼儿期是指 1~3 岁
- C. 学龄前期是指 3~6 岁
- D. 学龄期是指 7~12 岁
- E. 青春期女童 11~12 岁至 17~18 岁, 男童 13~14 岁至 18~20 岁

1-6. 在妊娠的哪一时期, 对母亲的不利因素最容易造成胎儿的先天畸形?

- ✓A. 妊娠早期
- B. 妊娠中期
- C. 妊娠晚期
- D. 妊娠早中期

E. 妊娠中晚期

1-7. 学龄前期儿童的特点中哪一点是错误的?

- A. 体格发育稳步增长, 但较前减慢
- B. 脑发育完全成熟
- C. 智力发育增快, 知识面迅速扩大, 可塑性大
- D. 应加强学前教育
- E. 共济运动发育良好

1-8. 小儿最易发生意外的年龄期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

1-9. 儿童时期哪个系统发育最早?

- A. 生殖系统
- B. 淋巴系统
- C. 神经系统
- D. 呼吸系统
- E. 循环系统

1-10. 青春期生长发育最大特点是

- A. 体格生长
- B. 神经发育成熟
- C. 内分泌调节稳定
- D. 生殖系统迅速发育, 并渐趋成熟
- E. 以上都不是

1-11. 小儿生长发育最快的时期是

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 新生儿期

C型题

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 两者均有
- D. 两者均无

1-12. 易患营养及消化紊乱疾病

1-13. 对疾病免疫力低, 易发生各种传染病

K型题

1-14. 影响胎儿生长发育的因素有

- ① 母亲的健康状况 ② 孕母的生活工作条件
- ③ 孕母的营养和卫生环境 ④ 孕期母亲的药物使用

1-15. 新生儿期的特点是

- ① 易发生适应环境不良综合征
- ② 常因分娩带来产伤窒息
- ③ 免疫功能差, 感染性疾病多见
- ④ 发病率高且死亡率也高

1-16. 新生儿期的保健特别强调

- ① 护理保暖 ② 喂养
- ③ 清洁卫生 ④ 消毒隔离

B 1-17. 学龄期的特点有

- ① 各系统器官都发育到接近成人的水平
- ② 智力发育较为成熟
- ③ 体格生长稳步增长
- ④ 一般发病率较低

X 1-18. 下列各年龄小儿每分钟呼吸脉搏次数及血压数值(kPa)中哪些是正确的?

	呼吸	脉搏	血压收缩压为(kPa)
① 新生儿	40~45	120~140	10.6/6
② 1岁	25~30	110~130	11/7
③ 5岁	20~25	80~100	12/8
④ 10岁	16~18	70~90	13.3/8.8

E 1-19. 小儿比成人较易患感染性疾病其原因为

- ① 新生儿的细胞免疫及体液免疫功能均比成人低
- ② 生后 1~3 个月为免疫球蛋白最低阶段
- ③ 免疫球蛋白至 10 岁才接近成人水平
- ④ 其他体液因子如补体、趋化因子, 调理素也均较低

1-20. 小儿受病因刺激时所出现的病理改变往往与成人不同, 可表现在

- ① 婴儿肺炎多为支气管肺炎, 年长儿与成人大多为大叶性肺炎
- ② 因维生素D及钙、磷代谢的障碍, 在小儿表现为佝偻病, 而成人表现为软骨病
- ③ 小儿肺结核的病变多为渗出浸润性, 成人肺结核的病变多为坏

死、液化、空洞

④ 小儿肺结核以吸收或钙化为结局,成人肺结核以纤维化为结局

1-21. 小儿各种惊厥与年龄的关系中哪项是不正确的?

① 新生儿期应考虑产伤、颅内出血或先天性异常

② 婴儿无热惊厥应想到手足搐搦症

③ 幼儿期有热惊厥最常见的是高热惊厥

④ 学龄前期学龄期儿童反复无热惊厥最常见为癫痫

1-22. 小儿疾病的治疗中,必须注意

① 同时治疗并存的营养缺乏症

② 及时发现与积极治疗并发症

③ 药物的代谢特点、给药方法和药物的剂量必须仔细计算

④ 应熟练掌握紧急抢救措施

答 案

1-1. E 1-2. D 1-3. E 1-4. A 1-5. A 1-6. A

1-7. B 1-8. C 1-9. C 1-10. D 1-11. A 1-12. C

1-13. C 1-14. E 1-15. E 1-16. E 1-17. B 1-18. E

1-19. E 1-20. D 1-21. E 1-22. E

二、小儿生长发育

A 型题

2-1. 小儿各系统器官发育最早的是

- ☐ A. 生殖系统
- ☒ B. 神经系统
- ☐ C. 淋巴系统
- ☐ D. 脂肪组织
- ☐ E. 肌肉组织

2-2. 小儿各系统器官发育最迟的是

- ☒ A. 生殖系统
- ☐ B. 神经系统
- ☐ C. 淋巴系统
- ☐ D. 脂肪组织
- ☐ E. 肌肉组织

2-3. 下列哪一点不是小儿生长发育的一般规律?

- ☐ A. 由上至下
- ☒ B. 由远到近
- ☐ C. 由粗到细
- ☐ D. 由低级到高级
- ☐ E. 由简单到复杂

2-4. 下列哪一点不符合生长发育的运动发育规律?

- ☐ A. 先抬头、后抬胸,再坐、立、行
- ☒ B. 从臂至手,从脚到腿
- ☐ C. 先用手掌握持,后用手指摘取
- ☐ D. 先会画直线,后能画圆,再画人
- ☐ E. 先学会观看和感觉事物,再发展到记忆、思维、分析判断

2-5. 小儿体重降低的异常标准

- ☐ A. 体重低于标准 5%
- ☐ B. 体重低于标准 10%
- ☒ C. 体重低于标准 15%
- ☐ D. 体重低于标准 20%
- ☐ E. 体重低于标准 25%

2-6. 身材矮小,但比例匀称的见于

- ☐ A. 营养不良
- ☒ B. 垂体性侏儒症
- ☐ C. 生殖腺功能不全
- ☐ D. 克汀病

E. 佝偻病

2-7. 小儿生长的标准中,哪一点是不符合一般正常发育的?

- A. 初生平均身长为 50 cm
- B. 1 岁内前半年每月平均长 2.5 cm
- C. 1 岁内后半年每月平均长 1.5 cm
- ✓ D. 2 岁时身长平均 80 cm
- E. 2 岁至 12 岁身长(cm) = 年龄 × 5 + 75

2-8. 正常小儿体重的粗略推算方法中哪一条是错误的?

- A. 1 岁内前半年体重(kg) = 出生体重(kg) + 月龄 × 0.6
- B. 1 岁内后半年体重(kg) = 出生体重(kg) + 6 × 0.6 + (月龄 - 6) × 0.5
- C. 1 岁时体重为初生体重的 3 倍(9 kg)
- D. 2 岁时体重为初生体重的 4 倍(12 kg)
- ✓ E. 3 岁至 15 岁体重(kg) = 年龄 × 2 + 8

2-9. 身长异常的标准是

- A. 比平均身长低 10%
- B. 比平均身长低 15%
- C. 比平均身长低 20%
- D. 比平均身长低 25%
- ✓ E. 比平均身长低 30% 以上

2-10. 2 岁以后影响小儿身长最明显的因素为

- A. 遗传
- B. 种族
- ✓ C. 内分泌
- D. 营养
- ✓ E. 锻炼

2-11. 身体的下部量指的是

- A. 坐骨结节到足底
- ✓ B. 耻骨联合上缘至足底
- C. 耻骨联合下缘至足底
- D. 脐部到足底
- E. 脐与耻骨联合中点到足底

2-12. 下部量特短见于

- A. 营养不良
- B. 垂体侏儒症
- C. 生殖腺功能不全
- ✓ D. 呆小病
- E. 佝偻病

2-13. 下部量过长见于

- A. 营养不良
- B. 巨人症

- C. 生殖腺功能不全 D. 佝偻病
E. 呆小病
- 2-14. 上部量等于下部量的年龄是
A. 9岁 B. 10岁
C. 11岁 ☒ D. 12岁
E. 13岁
- 2-15. 小儿身长的中点, 下列哪点不正确?
A. 新生儿中点在脐上
B. 1岁中点在脐下
C. 6岁中点在脐与耻骨联合之间
D. 12岁中点恰在耻骨联合上
☒ E. 以上都不是
- 2-16. 小儿坐高指的是
☒ A. 由头顶至坐骨结节的长度 B. 由头顶至尾骨的长度
C. 由头顶至耻骨联合上缘 D. 由头顶至耻骨联合下缘
E. 以上均不是
- 2-17. 最能反映骨骼发育的重要指标是
A. 头围 B. 胸围
C. 牙齿数 D. 坐高
☒ E. 身长
- 2-18. 出生时头的长度大约等于身长的
A. $1/3$ B. $1/4$
C. $1/5$ D. $1/6$
E. $1/8$
- 2-19. 最能反映婴儿营养状况的体格发育指标是
A. 头围、胸围 B. 牙齿数
C. 身长 ☒ D. 体重
E. 前囟的大小
- 2-20. 下列头围与胸围情况中, 哪一条适合小儿发育的平均水平?
☒ A. 初生时头围 34 cm, 胸围 32 cm
B. 初生时头围 32 cm, 胸围 34 cm
C. 6个月时头围 46 cm, 胸围等于头围