

吳鞠通醫案精華

上海秦伯未編纂

暑溫

世人悉以羌防柴葛治四時雜感。竟謂天地有冬而無夏。不亦冤哉。以致暑邪不解。深入血分成厥。衄血不止。夜間煩躁。勢已膠固難解。焉得速功。

飛滑石 犀角 冬桑葉 羚羊角 元參 鮮蘆根 細生地 丹皮 鮮荷葉邊 杏仁泥

小便短而赤甚。微咳。面微赤。尺脈仍有勁數之象。議甘潤益下。以治虛熱。少佐苦味。以治不盡之實邪。且甘苦合化陰氣而利小便也。按甘苦合化陰氣利小便法。舉世不知。在溫熱門中。誠爲利小便之上上妙法。蓋熱傷陰液。小便無由而生。故以甘潤益水之源。小腸火腑。非苦不通。爲邪熱所阻。故以苦藥瀉小腸而退邪熱。甘得苦則不呆滯。苦得甘則不剛燥。合而成功也。

生熟甲 元參 麥冬 生白芍 沙參 麻仁 古勇連 阿膠 丹皮 炙甘草

暑溫。舌苔滿佈。色微黃。脈洪弦而剛甚。左反大於右。不渴。初起卽現此等脈症。恐下焦精血之熱。遠甚於上焦氣分之熱也。且舊有血溢。故手心熱。又甚於手背。究竟初起。且清上焦。然不可不心知其所以然。

連翹 細生地 粉丹皮 銀花 苦桔梗 白茅根 麥冬 牛蒡子 香豆豉 薄荷

元參 霍香梗 生甘草

向有失血。又屆暑病之後。五心發熱。法當補陰以配陽。但脈雙弦而細。不惟陰不充足。卽真陽亦未見其旺也。議二甲復脈湯。仍用舊有之桂枝薑棗。

白芍 大生地 沙參 桂枝 生鱉甲 麥冬 麻仁 生牡蠣 生薑 阿膠 炙甘草

大棗

暑熱。本易傷陰。誤用消導攻伐。重傷陰氣。致令頭中耳中鳴無止時。此係肝風內動。若不急救肝腎之陰。痙癇熱厥立至矣。

大生地 麥冬 生牡蠣 炒白芍 丹皮 菊花炭 生鱉甲 桑葉 炙甘草 火麻仁

頭痛。左關獨高。責之少陽內風掀動。最有損一目之弊。若以爲外感寒則遠甚矣。議清少陽膽絡法。再此症除左關獨高。餘脈皆緩。所謂通體皆寒。一隅偏熱。故先清一隅之熱。金匱爲先治新病。病當後治也。

羚羊角 丹皮 茶菊花 苦桔梗 生甘草 薄荷 刺蒺藜 桑葉 鮮荷葉 鉤藤鉤

又 前日左關獨浮而弦。係少陽頭痛。因暑而發。用清膽絡法。茲左關已平。其半。但緩甚。舌苔白厚而滑。胸中痞悶。暑中之熱已解。而溼尙存也。議先宣上焦氣分之濕。

生苡仁 飛滑石 霍香梗 杏仁泥 半夏 廣鬱金 旋覆花 廣皮 白通草 茯苓皮 白蔻仁

六脈洪大之極。左手更甚。目邪視。怒氣可畏。兩臂兩手捲曲而痠癢。舌邪向。不語三四日。面赤身熱。舌苔中黃邊白。暑入心包膽絡。以清心膽之邪爲要。先與紫雪丹。

連翹 羚羊角 竹茹 金銀花 暹羅犀角 丹皮 麥冬 細生地 桑葉 天冬 鮮荷葉
暑溫誤表。致有譫語。邪侵心包。熱重面赤。脈洪數。手太陰症爲多。宜辛涼
芳香。以清肺熱。開心包。陽有汗。陰無汗。及頸而還。極大症也。

生石膏 連翹 丹皮 飛滑石 銀花 桑葉 細生地 知母 甘草 苦桔梗

暑兼濕熱。暑溫不比春溫之但熱無濕。可用酸甘化溫。鹹以補腎等法。且
無形無質之熱邪。每借有形有質之濕邪。以爲附依。此症一月有餘。僉用大劑
純柔補陰退熱法。熱總未減。而中宮痞塞。得食則痛脹。非抹不可。顯係暑中之
濕邪。蟠踞不解。再得柔膩膠固之陰藥。與邪相搏。業已喘滿。勢甚重大。勉與通
宣三焦法。仍以肺氣爲主。蓋肺主化氣。氣化則濕熱俱化。六脈弦細而沈洪。

苡仁 生石膏 厚朴 杏仁 雲苓皮 青蒿 連翹 藿香梗 白蔻 銀花 鮮荷葉邊

暑濕誤用陰柔藥。致月餘熱不退。胸膈痞悶。前與通宣三焦。今日熱減。脈
亦減。但痞滿如故。喘仍未定。舌有白苔。猶爲棘手。

生石膏 厚朴 藿香梗 飛滑石 連翹 小枳實 雲苓皮 廣皮 白蔻仁 生苡仁

■ 溼 溫

證似溫熱。但心下兩脇俱脹。舌白。渴不多飲。嘔惡噯氣。則非溫熱而從溼溫例矣。用生姜瀉心湯之苦辛通降法。

茯苓塊 生姜 古勇連 生苡仁 半夏 炒黃芩 生香附 乾姜

面赤目赤。舌苔滿佈。至重之溫熱病。脈反緩而弦。外熱反不盛。口反不渴。肢微厥。所謂陽症陰脈。乃本身陽氣不能十分充滿。不肯化解耳。茲與化邪法。

廣鬱金 杏仁 藿香 苦桔梗 荊芥穗 連翹心 銀花 青蒿 香豆豉

六脈弦細而勁。陰寒證脈也。咳嗽稀痰。陰濕咳也。舌苔刮白而滑。陰舌苔也。嘔吐泄瀉。陰濕症也。雖發熱。汗出而解。乃濕中兼風。病名濕溫。天下有如是之陰虛症乎。

茯苓塊 桂枝 炒白芍 姜半夏 於朮 廣皮炭 生苡仁 澤瀉 生姜汁

又痰飲兼風。誤治成壞症。前用溫平逐飲除風。諸惡症俱減。惟寒少熱多。熱後汗出未除。現在面赤口渴。暮夜譫語。有風化熱之象。但六脈尚弦。未盡轉陽也。再咳嗽則胸脇小腹俱微痛。又有金木相剋嫌。

桂枝 生石膏 青蒿 半夏 茯苓塊 生姜 杏仁 焦白芍 大棗 豬苓 炙甘草

六脈俱弦而細。左手沈取數而有力。面色淡黃。目白睛黃。自春分午後身熱至今不愈。曾經大瀉後。身軟不渴。現在雖不泄瀉。大便久未成條。午前小便清。午後小便赤濁。與濕中生熱之苦辛寒法。

飛滑石 茵陳 蒼朮炭 雲苓皮 杏仁 晚蠶沙 生苡仁 黃芩 白通草 海金沙

小川連

■ 燥 症

感受燥金之氣。腹痛泄瀉嘔吐。現在泄瀉雖止。而嘔不能食。腹痛仍然。舌苔白滑。肉色刮白。宜急溫之。兼與行太陰之溼。

雲苓塊 吳萸 川椒炭 姜半夏 良姜 益智仁 生苡仁 廣皮 公丁香

燥金感後。所傷者陽氣。何得以大劑熟地補陰。久久補之。胃陽困頓。無怪乎不能食而嘔矣。六脈弦緊。豈不知脈雙弦者寒乎。

半夏 雲苓塊 廣皮 苡仁 川椒炭 生姜 乾姜 公丁香

胃痛脇痛。或嘔酸水。多年不愈。現在六脈弦緊。皆起初感受燥金之氣。金來克木。木受病。未有不克土者。土受病之由來。則自金始也。此等由外感而延及內傷者。自唐以後無聞焉。議變胃而不受胃變法。即用火以克金也。又久病治絡法。

雲苓 生苡仁 枳實 半夏 川椒炭 生姜 廣皮 公丁香

感受燥金之氣。陽明之上。中見太陰。胸痛脇痛。腹脹泄瀉。飲咳。皆太陰病也。誤服寒涼。勢已重大。勉與開太陽。闔陽明法。

雲茯苓 豬苓 厚朴 姜半夏 澤瀉 乾薑 桂枝 川椒炭 廣皮 廣木香

六脈陽微之極。弦細而緊。內而飲聚。外而痠痛。兼之肉苛。飲食減少。得食嘔。乃內傷生冷。外感燥金之氣。而然。以急救三焦之陽。與陽明之陽爲要。

桂枝 薑半夏 乾薑 降香 雲苓塊 苡仁 吳萸 川椒炭 廣皮 薤白 公丁香 生薑

燥金克木。連少腹久痛不休。腿腳俱痛。兼有溢飲。與陽明從中治法。

薑半夏 雲苓 淡吳萸 川椒炭 益智仁 良薑 公丁香 廣皮

□ 瘧疾

但寒不熱。似乎牝瘧。然渴甚。皮膚捫之亦熱。乃伏暑內發。新涼外加。熱未透出之故。仍用苦辛寒法。加以升提。

飛滑石 花粉 藿香葉 杏仁泥 知母 廣鬱金 生苡仁 青蒿 白蔻仁 老厚朴 黃芩

姪娠七月。每日午後先寒後熱。到戌時微汗而解。已近十日。此上年伏暑

成瘧。由初春升發之氣而發。病在少陽。與小柴胡法。

柴胡 姜半夏 生姜 人參 炙甘草 大棗 黃芩

體厚本有小腸寒。溼糞後便血。舌苔灰白而厚。中黑滑。嘔惡不食。但寒不熱。此濕瘧也。與却法。

茯苓塊 生草果 熟附子 生蒼朮 杏仁 檳榔 黃芩炭 生苡仁

脈雙弦。伏暑成瘧。間三日至。舌苔白滑。熱多陰少。十月之久不止。邪已深入。急難速出。且與通宣三焦。使邪有出路。勿得驟補。

雲苓皮 知母 杏仁泥 生苡仁 炒黃芩 青蒿 藿香梗 姜半夏 白蔻仁

傷寒

昨服開肺與大腸痺法。濕滯已下。小便亦清。身熱已退。但大便與痰中微有血跡。症從寒濕化熱而來。未便即用柔藥以清血分。今日且與宣行腑腸。右脈仍見數大。可加苦藥。如明日血分未清。再清血分未遲。

飛滑石 半夏 生苡仁 杏仁泥 厚朴 黃柏炭 黃芩炭 廣皮 細蘇梗

中風漏汗。兼之腎水上凌。心悸腹痛。昨用桂枝加附子湯。諸症悉退。今左脈沈緩。右脈滑數。表雖清而濁陰未退。議苓桂伐腎邪。歸茴溫衝脈。吳萸半夏生薑兩和肝胃。白芍以收陰氣。合桂枝而調營衛。加黃芩一以清風化之熱。合諸藥爲苦辛通法。此外感之餘。兼有下焦裏症之治法也。

茯苓塊 桂枝 淡吳萸 薑半夏 青皮 全當歸 小茴香 生薑 黃芩炭 焦白芍

脈緩。濁陰久踞。兼有滯物續下。用藥仍不外苦辛通法。稍加推蕩之品。因其勢而利導之。大意通補陽明之陽。正以驅濁陰之陰。若其人陽明本旺。胃陰自能下降。六腑通調。濁陰何以能舉。再胃旺自能坐鎮中州。濁陰何能越胃而上攻心下。反覆推求。病情自現。

桂枝尖 厚朴 焦白芍 茯苓塊 青皮 小枳實 淡吳萸 烏藥 廣木香 小茴香

廣皮 黃芩炭 川棟子

凡痛脹滯下。必用苦辛通降。兼護陽明。固不待言。前法業已見效。細詢病情。已十有餘年。以半產後得之。誤用壅補而成。按久病在絡。再痛脹偏左。下至少腹。扳着其中。必有瘀滯。非純用湯藥所能成功。蓋湯者蕩也。滌蕩腸胃。通和百脈。固其所長。至於細雕密鏤。緩行攻絡。是其所短。非兼用化癥回生丹。緩通不可。且湯劑過重。有瘕散爲蟲之虞。不得不思預防也。

桂枝尖 半夏 廣木香 炒白芍 厚朴 地榆炭 降香末 紅花 炒桃仁 川棟子

小茴香 廣鬱金 全當歸 烏藥 兩頭尖 黃芩炭 黃連 廣皮 甘瀾水煎

今年風木司天。現在寒水客氣。故時近初夏。猶有太陽中風之症。按太陽中風。係傷寒門中第一關。最忌誤下。時人不讀晉唐以上之書。故不識症之所由來。仲景謂太陽至五六日。太陽症不罷者。仍從太陽驅去。宜桂枝湯。現在頭與身仍微痛。既身熱而又仍惡風寒。的是太陽未罷。理宜用桂枝湯。但其人素有濕熱。不喜甘。又有微咳。議於桂枝湯內去甘藥。加辛燥。服如桂枝湯法。

桂枝 半夏 廣皮 白芍 杏仁

太陽中風誤下。前日先與解外。昨日太陽症罷。卽瀉胸痞。今日胸痞解。惟自利不渴。舌灰白。脈沈數。經謂自利不渴者。屬太陰也。太陰宜溫。但理中之人。參甘草恐不合拍。議用其法而不用其方。

茯苓 蒼朮炭 乾姜 半夏 廣皮炭 生姜

太陽中風。先與解外。外解已。卽與瀉誤下之胸痞。痞解而現自利不渴之太陰症。今日口不渴而利止。是由陰出陽也。脈亦頓小其半。古云。脈小則病退。但仍沈數。身猶熱而氣粗不寐。陷下之餘邪不淨。仲景傷寒論。謂真陰已虛。陽邪尙盛之不寐。用阿膠雞子黃湯。按此湯重用黃芩黃連。議用甘草瀉心法。

半夏 黃芩 生姜 雲苓 川連 大棗 甘草

又脈沈數。陰經熱。陽經不熱。是陷下之餘邪在裏也。氣不伸而噦。噦者傷寒門中之大忌也。皆誤下之故。議少用丁香柿蒂湯法。加黃連以徹裏熱。疏逆氣。

公丁香 黃芩 柿蒂 真川連 廣皮 薑汁

又誤下成胸痞自利。兩用瀉心。胸痞自利俱止。但陷下之邪。與受傷之胃氣。搏而成噦。昨用丁香柿蒂湯。去人參。加芩連。方雖易。仍不外仲景先師苦辛通降之法。病者畏而不服。今日噦不止。而左脈加進。勉與仲景噦門中之橘皮竹茹湯。其力量減前方數等矣。所以如此用者。病多一日。則氣虛一日。仲景於小柴胡湯中。即用人參。況誤下中虛者乎。

廣皮 半夏 生姜 竹茹 炙甘草 人參 大棗

又誤下之陷症噦而喘。昨連與金匱橘皮竹茹湯。一面補中。一面宣邪。茲已邪潰。諸惡候如失。脈亦漸平。但其人宗氣受傷。不淺。議與小建中湯。加橘皮半夏。小小建立中氣。調和營衛。兼宣胃陽。令能進食安眠。

焦白芍 桂枝 生姜 新會皮 半夏 大棗 炙甘草 膠飴

太陽中風。軌延五日不解。衝氣上動。宛若奔豚。腹滿泄瀉而渴。兼有少陰

症矣。兩層兩感。太陽少陽並見。一兩感也。其人積怒內傷。又加外感。此二兩感也可畏之至。且先伐其衝氣。

桂枝 雲苓塊 川芎 當歸 川椒炭 生姜

又 太陽少陽兩感。衝氣上動如奔豚。與苓桂重伐腎邪。今日一齊俱解。脈靜身涼。衝氣寂然。可喜之至。微有痰飲咳嗽。當與和胃令能食。

雲苓塊 桂枝 生姜 姜半夏 廣皮 大棗 焦白芍

太陽中風汗多。誤與收瀉。引入少陽。寒熱往來。口苦脈弦。與小柴胡湯和法。其人向有痰飲喘症。加枳實橘皮去人參。

柴胡 姜半夏 生姜 廣皮 小枳實 大棗 炙甘草 黃芩炭

中風

左肢拘攣。舌厚而蹇不能言。上有白苔。滴水不能下咽。飲水則噎。此中風挾痰之實症。前醫誤與膩藥補陰。故隧道俱塞。先與開肺。

生石膏 杏仁 鮮桑枝 雲苓塊 防己 白通草 姜半夏 廣皮 煮三杯分三次服
中風神呆不語。前能語時。自云頭暈。左肢麻。口大歪。不食。六脈弦數。此痺中也。與柔肝法。

細生地 白芍 左牡蠣 生鱉甲 麥冬 炙甘草

■ 厥 症

肝陽上竄。因怒即發。十餘年矣。經云。久病在絡。豈經藥可效。再肝厥之症。亦有寒熱之不同。此證脈沈而弦細。其爲寒也無疑。大凡寒厥必死。今不死者。以其爲腑厥而非臟厥也。現脇下有塊有聲。經色紫黑。議先用溫通絡脈法。

新絳紗 半夏 降香末 川椒 旋覆花 生香附 桂枝尖 歸鬚 桃仁炭

除夕日亥時。先是產後受寒。痺痛。醫用桂附等極燥之品。服之大效。醫見其效也。以爲此人非此不可。用之一年有餘。不知溫燥與溫養不同。可以治病。不可以養生。以致少陰精液被劫無餘。厥陰頭痛。單巔頂一點痛不可忍。畏明。

至於窗間有豆大微光卽大叫。必室如漆黑。而後少安。一日厥去四五次。脈極細數。按之無力。危急已極。勉與定風珠潛陽育陰。以熄肝風。

大生地 麻仁 生白芍 生龜板 麥冬 生阿膠 生鱉甲 海參 生牡蠣 雞子黃

初因肝鬱脇痛。繼而肝厥犯胃。醫者不識病名。肝着與絡病治法。無非滋陰補虛。或用涼藥。以致十年之久。不能吃飯。飲粥湯止一口。食炒米粉止一酒杯。稍聞聲響卽瘳厥。終夜抽搐。二三日方漸平。六脈弦緊而長。經閉二年。周身疼痛。痰飲咳嗽。終年無已時。骨瘦如柴。奄奄一息。此症內犯陽明。故不食。木克脾土。故飲聚。陽明空虛。故無主。聞聲而驚。外犯太陽。故身痛而瘳。本臟自病。故厥。經謂治病必求其本。仍從肝絡論治。

新絲紗 旋覆花 降香末 麝香金 歸橫鬚 川椒炭 蘇子霜 桂枝 半夏 青皮

■ 脇痛

肝鬱脇痛。病名肝着。亦婦科之常症。無足怪者。奈醫者不識。見其有寒熱

也。誤以爲風寒而用風藥。夫肝主風。同氣相求。以風從風。致風鳴張。肝主筋。致令一身筋脹。肝開竅於目。致令晝夜目不合。不得臥者。七八日。肝主疏泄。肝病則有升無降。失其疏泄之職。故不大便。小洩僅通而短赤特甚。醫者又不識。誤以爲腸胃之病。而以大黃通之。麻仁潤之。故令不食不飢。不便不寐。六脈洪大。無倫身熱。且坐不得臥。時時欲嘔。煩躁欲怒。是兩犯逆也。金匱謂一逆尙引日。再逆促命期。不待智者而知其難愈也。議宣通絡脈法。肝藏血。絡主血故也。必加苦寒泄熱。脈沈洪有力。且膽居肝內。肝病膽亦相隨故也。

新絳紗 蘇子

歸橫鬚

桃仁

旋覆花

降香末

川棟皮

雲連

廣鬱金

又 昨日一味通絡。已得大便通利。腹中痛止。但不成寐。今日用胃不和則臥不安。飲以半夏湯。覆杯則寐。法仍兼宣絡。此仲景先師所謂衝脈累及陽明。先治衝脈。後治陽明法也。

新絳紗

半夏

降香末

旋覆花

秫米