

醫學衷中參西錄

第三冊

盐山張錫純壽甫著
河北省卫生工作者协会审訂

河北人民出版社

盐山張錫純壽甫著

河北省卫生工作者协会审訂

醫學家中參西錄

(原前四、七、六期)

河北人民出版社

医学衷中参西录

第三册

盐山 张錫純 寿甫著
河北省卫生工作者协会审訂

河北人民出版社出版(天津市河西区尖山路) 河北省书刊出版业营业許可証第三号

河北人民出版社印刷厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米1/25· 18印张· 343.000字 印数:49.801—61.300册 1957年9月第一版

1961年4月第七次印刷 纵一书号:T14086·21

定价: 2.20元

第一卷 目录（第四期）

石膏解	一
人参解（附人参形狀考）	一九
黃耆解	二六
西洋參解	三六

第二卷 目录

山萸肉解	三四
白朮解	三九
赭石解	四〇
山藥解	五一
地黃解	五五
甘草解	五六
朱砂解	五六
鴉胆子解	六〇
龍骨解（附龍齒）	六〇
牡蠣解	六一
石決明解	六三
玄參解	六四
當歸解	六四
大黃解	六九
朴硝硝石解	七一

第三卷 目录

芍藥解	六
芎藭解	六
大黃解	六九
朴硝硝石解	七一

目 录

二

厚朴解	三
麻黃解	七三
柴胡解	七五
桂枝解	七七
三七解	七九
滑石解	八〇
牛膝解	八一
远志解	八二
龙胆草解	八三
半夏解	八三
括蔞解	八四
白茅根解	九七
葦莖蘆根解	九八
鮮小薊根解	九九
大麥芽解	一〇〇
茵陳解	一〇〇
萊菔子解	一〇一
枸杞子解	一〇一
海螵蛸茜草解	一〇三

第四卷 目录

罂粟壳解	一〇四	柏子仁解	二七
竹茹解	一〇五	大棗解	二八
沙参解	一〇六	胡桃解	二九
連翹解	一〇六	五味子解	三〇
川棟子解	一〇七	華蘚解	三一
薄荷解	一〇七	鷄內金解	三二
茯苓茯神解	一〇八	穿山甲解	三三
木通解	一〇九	蜈蚣解	三四
蒲黃解	一一〇	水蛭解	三四
三棱莪朮解	一一一	蝎子解	三五
乳香沒藥解	一一二	蟬退解	三六
常山解	一一三	羚羊角解	三七
山楂解	一一四	血余炭解	三七
石榴解	一一五	指甲解	三八
龙眼肉解	一一六		

第一卷 目录（第七期）

六經總論.....	三九	太阳病大陷胸湯証（附自擬蕩胸湯方）.....	一五
太阳病桂枝湯証.....	一三	太阳病小陷胸湯証（附白散方）.....	一七
太阳病麻黃湯証（附太阳与阳明合病麻黃湯証）.....	一四	太阳病大黃黃連瀉心湯証.....	一九
太阳溫病麻杏甘石湯証.....	一五	太阳病附子瀉心湯証（附自擬变通方）.....	一七
太阳病大青龍湯証（附脉微弱汗出惡風及筋惕肉瞤治法）.....	一四	太阳病炙甘草湯証.....	一六
太阳病小青龍湯証（附自擬从龙湯方）.....	一四	太阳病桃核承氣湯証.....	一六
太阳病旋復花代赭石湯証.....	一四九		
 第二卷 目录			
太阳阳明合病桂枝加葛根湯証.....	一六三	阳明病三承氣湯証.....	一八〇
太阳阳明合病葛根湯証.....	一六四	阳明病茵陳蒿湯梔子糜皮湯麻黃連韜 赤小豆湯諸发黃証.....	一八六
阳明病葛根黃連黃芩湯証（附自擬滋陰宣解湯方）.....	一六五	阳明病猪苓湯証.....	一九一
深研白虎湯之功用.....	一六六		
續申白虎加人參湯之功用.....	一五五		

第三卷 目录

少阳病提綱及汗吐下三禁	一九四
論小柴胡湯証	一九六
論大柴胡湯証	二〇三
少阳篇三阳合病之治法	二〇六
太阴病提綱及意义	二〇八
太阴病桂枝湯証	二一〇
太阴病宜四逆輩諸寒証	二一〇
太阴病坏証桂枝加芍藥湯及桂枝加大黃湯証	二一一

第四卷 目录

少阴病提綱及意义	二二三
少阴病麻黃附子細辛湯証	二二七
少阴病黃連阿膠湯証（附自訂坎离互根湯方）	二二八
少阴病當灸及附子湯証	二二九
少阴病桃花湯証	二三三
少阴病吳茱萸湯証	二三四
少阴病苦酒湯証	二五五
少阴病白通湯証及白通加猪胆汁湯証	二五六
少阴病真武湯証	二五七
少阴病通脈四逆湯証	二五九
少阴病大承氣湯証	二六〇
厥阴病提綱及意义	二六一
厥阴病烏梅丸証（附厥阴溫病治驗案）	二六二
厥阴病白虎湯証	二六三
厥阴病當归四逆湯及加吳茱萸生姜湯証	二六五
厥阴病白头翁湯証	二六六
不分經之病燒棍散証理中丸証竹叶石膏湯証	二六七
附溫病遺方	二六八

第一卷 目录（第六期）

虛勞喘嗽門	
虛勞証阳亢阴亏.....	二四六
虛勞兼劳碌过度.....	二四七
肺勞咳嗽由于伏氣化熱所傷証.....	二四八
虛勞咳嗽兼外感实热証.....	二五〇
勞热咳嗽.....	二五三
肺勞喘嗽遺傳性証.....	二五五
肺勞痰喘.....	二五六
肺勞喘咳.....	二五七
肺勞喘嗽兼不寐証.....	二五九
肺病咳嗽吐血.....	二六〇
肺病咳吐膿血.....	二六一
肺病咳嗽吐痰血.....	二六三
氣病門	
大气下陷.....	二六七
大气下陷身冷.....	二六八
大气陷兼消食.....	二六九
冲气上冲兼奔豚.....	二七一
胃气不降.....	二七二
肝气郁兼胃气不降.....	二七四
胃气不降.....	二七六
血病門	
吐血証.....	二七七
咳血兼吐血証.....	二七八
吐血兼咳嗽.....	二九〇
吐血兼咳嗽.....	二九一
吐血証.....	二九二
吐血証.....	二九三
大气下陷兼小便不禁.....	二九四

第二卷 目录

血病門	腸結腹疼	二〇四
大便下血	腸結腹疼兼外感实热	三四四
瘀血短气	头部病門	
腦充血病門	头疼	二〇五
腦充血头疼	眼疾	二〇六
腦充血头疼	目病干疼	二〇七
腦充血头疼	牙疼	二〇八
腦充血兼腿痿弱	肢體疼痛門	
腦充血兼痰厥	胁疼	二〇九
腦充血兼偏枯	胁疼	二一〇
脣胃病門	胁下疼兼胃口疼	二一一
噎膈	胁疼	二一三
反胃吐食	腰疼	二一四
胃脘疼悶	腿疼	二一五
冷积腹疼	腫脹門	二一六
受风水腫		

阴虚水腫	三一八
风水有痰	三一九
黃疸	三三三
黃疸	三四四

黃疸門

第三卷 目錄

痢疾門

痢疾轉腸潰瘍	三一五
--------	-----

痢疾	三一七
----	-----

痢疾	三一八
----	-----

噤口痢	三一九
-----	-----

大小便病門

泄瀉兼發灼	三一〇
-------	-----

小便白濁	三一一
------	-----

小便因寒閉塞	三一二
--------	-----

不寐病門

心虛不寐	三三四
------	-----

不寐兼惊悸	三四六
-------	-----

癲痙顛狂門

癲風兼腦充血	三三七
--------	-----

受風癲癇	三三八
------	-----

慢脾風	三三九
-----	-----

慢脾風	三四一
-----	-----

將成慢脾風	三四二
-------	-----

顛狂失心	三四三
------	-----

神經錯亂	三四四
------	-----

傷寒門	三四五
-----	-----

傷寒兼腦膜炎	三四六
--------	-----

傷寒脉閉	三四七
------	-----

傷寒脈閉	三四八
------	-----

少阴伤寒	三九	溫病	三六三
伤寒兼有伏热証	三五	风温	三六四
温病門	三五	风温兼伏气化热	三六六
温病兼大气下陷	三五	温病兼痧疹	三六七
温病兼气虚气郁	三五	温病兼劳力过度	三六九
温病兼吐瀉腿抽	三五	温病兼下痢	三七一
温病少阴証	三五	温病兼腦膜炎	三七二
温病結胸	三五	温热泄瀉	三七三
温病門	三五		
温病兼虛热	三五		
温病体虛	三五		
温热腹疼兼下痢	三五		
温病兼下痢	三五		
暑溫兼泄瀉	三五		
温病兼虛熱	三五	溫病	三六四
温病兼項后作疼	三五	溫病	三六四
温病兼胁疼	三五	温病兼项后作疼	三六六
风温兼喘促	三五	温病兼胁疼	三六七
秋溫兼伏气化热	三五	风温兼喘促	三六八
温病兼嘔吐	三五	秋温兼伏气化热	三六九
温病兼嘔吐	三五	温病兼嘔吐	三七〇
温病兼嘔吐	三五		

第四卷 目录

溫病門

溫病兼衄血便血	三九四	霍亂吐瀉	四五五
溫疹	三九六	霍亂脫証	四五六
溫疹兼喉痧	三九六	霍亂暴脫証	四一七
溫病兼喉痧痰喘	三九九		
溫病兼喉疼	四一		
溫病兼阴虛	四二三	懷妊受溫病	四一九
溫病兼喘脹	四四四	受妊嘔吐	四二二
溫病兼虛熱	四五五	懷妊得溫病兼痰喘	四三三
溫病兼吐血	四〇六	懷妊受溫病兼下痢	四四四
溫病兼冲气上冲	四〇七	产后下血	四五六
		产后手足抽掣	四六八
		产后症瘕	四七八
		血閉成症瘕	四一〇
		产后溫病	四一二
瘡疾兼脾脹	四一〇	流产后滿悶	四一二
瘡疾兼暑熱	四二一	月閉兼溫疹醫急	四二四
瘡痢兼証	四二三	處女經閉	四二六
		血崩証	四二八
霍亂門	四三		
霍亂兼轉筋	四三		
附录 保赤良方			

医学衷中参西录第四期第一卷

石膏解

石膏之質，中含硫黃，是以涼而能散，有透表解肌之力。外感有實熱者，放胆用之直勝金丹。神农本經謂其微寒，則性非大寒可知。且謂其宜于產乳，其性尤純良可知。醫者多誤認為大寒而煅用之，則宣散之性变为收斂（点豆腐者必煅用，取其能收斂也），以治外感有實熱者，竟將其痰火斂住，凝結不散，用至一兩即足傷人，是变金丹为鳩毒也。迨至誤用煅石膏僥幸，流俗之見，不知其咎在煅不在石膏，轉謂石膏煅用之其猛烈，猶足傷人，而不煅者更可知矣。于是一倡百和，遂視用石膏為畏途，即有放胆用者，亦不過七八錢而止。夫石膏之質甚重，七八錢不過一大撮耳。以微寒之藥，欲用一大撮扑灭寒溫燎原之熱，又何能有大效。是以愚用生石膏以治外感實熱，輕証亦必至兩許；若實熱熾盛，又恒重用至四五兩，或七八兩，或單用，或與他藥同用，必煎湯三四茶杯，分四五次徐徐溫飲下，熱退不必盡劑。如此多煎徐服者，欲以免病家之疑惧，且欲其藥力常在上焦中焦，而寒涼不至下侵致滑瀉也。蓋石膏生用以治外感實熱，斷無傷人之理，且放胆用之，亦斷无不退熱之理；惟熱實脉虛者，其人必實熱兼有虛熱，仿白虎加人參湯之義，以人參佐石膏亦必能退熱。特是，藥房軋細之石膏多系煅者，即方中明开生石膏，亦恒以煅者充之，因煅者為其所素备，且又自覺慎重也。故凡用生石膏者，宜买其整塊明亮者，自監視軋細（凡石質之藥不軋，則煎不透）方的。若購自藥房中，難辨其煅与不煅，迨將藥煎成，石膏凝結藥壺之底，傾之不出者，必系煅石膏，其藥湯即斷不

可服。

【附案】長子蔭潮，七岁时，感冒风寒，四五日間，身大热，舌苔黄而帶黑。孺子苦服药，强与之即嘔吐不止。遂單用生石膏兩許，煎取清湯，分三次溫飲下，病稍愈。又煎生石膏二兩，亦徐徐溫飲下，病又見愈。又煎生石膏三兩，徐徐飲下如前，病遂全愈。夫以七岁孺子，約一晝夜間，共用生石膏六兩，病愈后飲食有加，毫无寒中之弊，則石膏果大寒乎？抑微寒乎？此系愚初次重用石膏也。故第一次只用一兩，且分三次服下，犹未可知石膏之性也。世之不敢重用石膏者，何妨若愚之試驗加多以尽石膏之能力乎？

同邑友人趙厚菴之夫人，年近六旬得溫病，脉数而洪实，舌苔黃而干，聞药气即嘔吐。俾單用生石膏細末六兩，以作飯小鍋(不用藥餽，恐有藥味復嘔吐)煎取清湯一大碗，恐其嘔吐，一次只溫飲一口，药下咽后，覺煩躁異常，病家疑药不对証。愚曰：「非也，病重药輕故也」，飲至三次，遂不煩躁，閱四点鐘尽剂而愈。

同邑友人毛仙閣之三哲嗣印棠，年三十二岁，素有痰飲，得伤寒証，服药調治而愈。后因飲食过度而复，服药又愈。后数日又因飲食过度而复，医治无效。四五日間，延愚診視，其脉洪長有力，而舌苔淡白，亦不燥渴，食梨一口即覺凉甚，食石榴子一粒，心亦覺凉。愚舍証从脉，为开大剂白虎湯方，因其素有痰飲，加清半夏數錢，其表兄高夷清在座，邑中之宿医也，疑而問曰：「此証心中不渴不熱，而畏食寒，涼如此，以余視之虽清解药亦不宜用，子何所據而用生石膏數兩乎？」答曰：「此脉之洪实，原是阳明實熱之証，其不覺渴与熱者，因其素有痰飲湿胜故也。其畏食寒涼者，因胃中痰飲与外感之熱互相膠滯，致胃府轉从其化与涼為敵也。」仙閣素曉医学，信用愚言，兩日夜間服药十余次，共用生石膏斤余，脉始和平，愚遂旋里。隔兩日復來相迎，言病人反復甚劇，形狀異常，有危在頃刻之慮。因思此証治愈甚的，何

至如此反覆。既至（相隔三里強），見其痰涎壅盛，連連咳吐不竭，精神恍惚，言語錯亂，身體顫動，診其脈平和無病，惟右關胃氣稍弱。愚恍然會悟，急謂其家人曰：「此証万无閃失，前因飲食過度而復，此次又因戒飲食過度而復也。」其家人果謂有鑒前失，數日之間，所與飲食甚少。愚曰：「此無須用藥，飽食即可愈矣。」其家人依愚言，時已屆晚八旬鐘，至黎明进食三次，每次撙節與之，其病遂愈。

西藥有安知歇貌林，又名退熱冰。究其退熱之效，實遠不如石膏。蓋石膏之涼，雖不如冰，而其退熱之力，實勝冰遠甚。鄰村龍潭莊張叟，年過七旬，于孟夏得溫病，四五日間煩熱燥渴，遣人于八十里外致冰一担，日夜放量食之，而煩渴如故。其脉洪滑而長，重按有力，舌苔白厚，中心微黃，投以白虎加人參湯，方中生石膏重用四兩，煎湯一大碗，分數次溫飲下，連進二劑，煩熱燥渴全愈。

又：沈阳县尹朱靄亭夫人，年過五旬，于戊午季秋得溫病甚劇。先延東醫治療，所服不知何藥，外用冰囊以解其熱。數日熱益盛，精神昏昏似睡，大声呼之亦无知覺，其脉洪大搏指。俾將冰囊撤去，用生石膏細末四兩、粳米八錢，煎取清汁四茶杯，約歷十旬鐘，將藥服盡，豁然頓醒。靄亭喜甚，命其公子良佐，從愚學醫。

又：友人毛仙閣夫人，年近七旬，于正月中旬，傷寒無汗。原是麻黃湯証，因誤服桂枝湯，汗未得出，上焦陡覺煩熱惡心，聞藥氣即嘔吐，但飲石膏所煮清水及白开水亦嘔吐。惟晝夜吞小冰块可以不吐，兩日之間，吞冰若干，而煩熱不減，其脉关前洪滑異常。俾用鮮梨片，蘸生石膏細末嚼咽之，遂受藥不吐，服盡二兩而病愈。

石膏之性，又善清瘍瘍之热。奉天友人朱貢九之哲嗣文治，年五岁，于庚申立夏后，周身壯热，出疹甚稠密，脉象洪数，舌苔白厚，知其疹而兼瘍也。欲用凉药清解之，因其素有心下作疼之病，出疹后食鲜果，前一日犹觉疼，又不敢投以重剂，遂勉用生石膏、玄参各六錢，薄荷叶、蝉退各一錢，連翹二錢。晚間服药，至翌日午后视之，气息甚粗，鼻翅煽动，咽喉作疼，且自鼻中出血少許，大有烦躁不安之象。愚不得已，重用生石膏三兩，玄参、麦冬(心帶)各六錢，仍少佐以薄荷、連翹諸药，俾煎湯三茶盃，分三次溫飲下。至翌日視之，則諸証皆輕減矣。然余熱猶熾，其大便雖行一次，仍系燥糞，其心中犹发热，脉仍有力。遂于清解药中，仍加生石膏一兩，連服二剂，壯熱始退，繼用涼潤清毒之药，調之全愈。

石膏之性，又善清咽喉之热。沧州友人董寿山，年三十余，初次感冒发颐，數日領下頸項皆腫，延至膺胸，復漸腫而下。其牙关紧閉，惟自齿縫可进稀湯，而咽喉腫疼，又艰于下咽。延医調治，服清火解毒之药数剂，腫热轉增。时当中秋节后，淋雨不止，因病勢危急，冒雨驅車三十里迎愚診治。見其領下連項，壅腫異常，狀类时毒(瘡家有時毒証)，撫之，硬而且热，色甚紅，純是一团火毒之气，下腫已至心口，自牙縫中迸水半口，必以手掩口，十分努力方能下咽。且痰涎壅滯胸中，上至咽喉，并无容水之处，进水少許，必換出痰涎一口。且覺有气自下上冲，时作呃逆，連連不止，診其脉洪滑而長，重按有力，兼有數象。愚曰：「此病俗所称蝦蟆瘍也，毒熱熾盛，盤踞陽明之府，若火之燎原，必重用生石膏清之，乃可緩其毒熱之勢。」从前医者在座，謂「曾用生石膏一兩，毫无功效。」愚曰：「石膏乃微寒之药，本經原有明文，如此热毒，仅用兩許，何能见效。」遂用生石膏四兩，金錢重樓(此藥須色黃、味甘、無辣味者，方可用，無此則不用亦可)、清半夏各三錢，連翹、蟬退各一錢(之藥不敢多用)，煎服后，覺药停胸間不下，其热与腫似有增之势，知其証