

謙益齋外科醫案下編

錫山高錦庭著

男上池輯

後學江陰楊道南校訂

內 部

▲肺癰

張

濕邪久鬱。化火刑金。咳吐膿血。痰濁臭穢。肺癰已成。險重險重。

鮮生地

杏仁

桃仁

瓜蒌仁

陳絲瓜子

桔梗

杜蘇子

蘆根

前胡

紫菀茸

陳

火逆刑金。咳嗽痰稠穢紅。肺癰之象也。

紫菀茸

杏仁

桃仁

冬瓜仁

牛蒡子

薏仁

桔梗

顧

溫邪蘊鬱肺胃。化火刑金。欬逆嘔痰臭穢。肺癰重症顯然。寒熱脈數。治以清化。

杏仁

紫苑

川貝

甘草

花粉

防風

鬱金

茅根

張

春間感受風溫。欬嗽見血。今及一載。痰覺臭穢。肺癰重症。脈形滑數。苔白口膩。和中運濁化痰。爲法。應手爲佳。

紫苑

半夏

川貝

生苡仁

豆卷

杏仁霜

桔梗

枳實

竹茹

濕蒸熱鬱。而成肺癰。癰者。壅也。壅則宜通宜洩。而醫者以五味斂之。邪無從出。欬吐穢痰。仲景癰成之戒。今已犯之。金匱葶藶湯加減一定之法。

桃仁

橘紅

真仁

銀花

石葦

冬瓜子

蘆根

枇杷露

葉

溫邪久鬱。化火刑金。欬逆痰濁臭穢。肺癰疑象。已見一斑。惟脈細便泄。邪不外達。內潰可虞。

牛蒡子

桔梗

紫苑

石斛

元參

忍冬藤

黃芩

絲瓜子

王

肺癰一年。欬吐膿血。發熱脈數。勢入損門。

南沙參

杏仁

川貝

丹皮

花粉

米仁

麥冬

薏仁

橘紅

蛤粉

吳

平素嗜酒。濕熱熏蒸肺胃。欬逆痰粘。帶穢膈脅作痛。肺癰之疑象已著。大便秘結者。是肺液乾枯。肺與大腸相表裏也。是以上見音啞。且咽喉結癰所由來也。症勢極重。用潤養肺陰。兼與開結化火。

桔梗

桑皮

川貝

瓜蒌仁

杏仁

阿膠

絲瓜子

▲外肺癰

去秋暑邪襲入肺絡。流於營分。發爲肺癰外症。今雖穿潰。延來一載。右餘脂液液枯。色奪神衰。欬促仍然。脈見左部微細。右部滑數。怯症之變象已著。險重險重。

張

伏暑三候已外。濕鬱化火之邪。從汗而出。不能化清。留於肺胃之絡。乳旁結腫。漸見紅色。勢必結膿外洩。此外肺癰也。所幸衛分之邪漸清。胃口尚健。可以收功。但絡間之瘍。必致曠日持久。慎無欲速。欲速則變生。

六君子湯

製蠶

蠟尾酒炒

二診

讀書人心營素虛。加以誦書傷氣。此肺絡本傷。病後所以餘邪入絡也。今既穿潰。膿色尚正。但欬吐俱闕。肺氣一動一作。膿必外洩。調理之難。概可見矣。是非用袖法。加意自攝。不可。惟明理者自揆之。庶幾可收功。

揀真條參

上黃芪

冬朮

炙草

製首烏

歸身

三診

前方十劑。飲食倍增。滋味之物。以養陰化氣。不獨藥之補氣也。瘍勢漸見膿稀。然不足恃也。此

病所忌外感風寒則生欬。內動肝火則亦欬。欬則傷必鳴張。須平心氣。慎風寒。以保內外。百日之內。可以無虞。今君固自識機宜。無須老夫饒舌也。

前方去

首烏

加淮山藥

白芍

炒熟地

四診

補氣養營。腰漸見乾洩。動作又覺有神。從此可望完復。然百日正引完滿之期。當局尤宜加意。慎調。慎無輕忽。

黃芪

四君

四物

海參

猪脊髓膠爲丸

此常熟張道臺少君也。病後肺癰外潰。成勞者十有八九。此病能愈。服藥百劑。半由調養有資。半由本人能自靜養。余曾隨家嚴同去兩次。見其祖母席太夫人。傳臚之姑也。八旬外康健倍常。越三年。道臺歸得類中病。樂山先生十日愈之。用附桂。

鼎汾註

肺痿

張
兩脈細數無神。形衰肉削。腕痺腹痛。骨蒸便澀。欬逆痰腥。肺痿重候也。姑以扶土生金。究恐無及。

北沙參

苘仁

紫苑

茯苓

蓮肉

茅根

瓜子

吳

欬逆百緣。脈見弦數無神。肺陰大傷。欬痰穢濁腥臭。不獨肺癰重候也。仲景不云乎。肺數虛者。爲肺痿。癰猶可也。痿則難治。

紫苑

桑皮

麥冬

桔梗

川貝

蕤仁

杏仁

知母

黃芪

百合

防已

茅根

忍冬藤

勇

久欬神衰。脈細數。舌光紅。內熱不靜。症屬肺痿。

石斛

麥冬

川貝

百合

杏仁

苘仁

沙參

蕤仁

竹茹

地骨皮

呂

肺受火刑。則衛氣不密。故多汗而咳嗽。若再淹纏。恐成肺痿。

元參

地骨皮

意苘仁

白薇

蛤壳

夏

杏仁

川貝母

蘆根

熱傷肺絡。嗽有紅痰。痰有穢氣。久延。衄。恐成肺痿。擬千金法。

冬瓜子

薏苡仁

蘆根

杏仁

丹皮

象貝母

絲瓜絡

白薇

盛

久嗽。舌白。痰有穢味。脈細且數。痞悶少納。都是伏熱傷肺。氣失宣化使然。正陰已虧。防成肺痿。擬理肺和中法。

枇杷葉

杏仁

苡仁

茯苓

白前

桑皮

葶藶

橘紅

藕豆

絲瓜絡

▲胃脘癰

蘇

胃脘癰。素有寒痛。橫逆。肝邪易充。冠脾戕胃。脾失運轉。則胃中之濕濁。不化。踞於胃絡之間。堅腫。結核。應其久延成膿。脈象左弦右細。木乘脾土。顯然。擬以溫通中下二焦。

導氣湯加

乾姜

桂枝

薏仁

青皮

白芥子

趙

肝橫犯胃。脾不運濁。脘悶嘔逆。胸高堅突。推而不移。防成胃脘癰症。勿得輕視。擬以苦辛爲治。

川連

吳萸

薤仁

半夏

鬱金

木香

蘇梗

茯苓

青皮

生姜

周

濕熱痰滯阻塞中宮。胃脘高突而痛。延綿逾月。陡起欬逆。吐膿痰蓋許。而胸脘痛減。此癰內潰。殊非輕象。較外潰之癰尤重。宜加謹攝爲安。

姜川朴

半夏

蘇子

前胡

川貝

橘紅

鬱金

杏仁

赤苓

范

胃脘癰硬偏於右。呼吸轉側不舒。已將一月。勢將外潰。宜理氣化痰。

延胡

赤芍

青皮

半夏

陳皮

茯苓

甲片

宣

脘下結腫。按之痛不可近。是痰氣交凝。阻塞脈絡所致。有癰膿之慮。擬和中化痰。攻逐絡中之

癰。

枳殼

半夏

杏仁

桃仁

瓜蒌仁

甲片

延胡

青皮

烏藥

趙

勞力傷中。中陽失運。濕濁居於胃脘。時覺腫痛。納食作脹。宜辛以通之。溫以和之。

乾姜

吳萸

半夏

瓜蒌皮

枳實

薏仁

薤白

檀香

金

初病脹痛無形。久則凝堅而硬。三年來右胸脘形高微突。是初為氣結在脘。久則阻傷入絡。考仲景於勞傷血痺諸法。其宣通經絡。每取蟲蟻迅速飛走諸靈俾飛者升。走者降。而無凝着氣。

可宣通。與攻積除堅。徒入臍者有間。錄方備商。

蜣螂虫

麝香

歸鬚

川芎

廣木香

香附

青皮

神麴糊丸

▲肝癰

李

肝癰潰久。肋骨傷損。不易完功。擬以內托。

生地

常歸

白芍

丹皮

茯苓

炙草

陳皮

山藥

陸

痰氣交阻。血滯肝絡。肝脹成癰。外潰兩月。肉腐色紫。胸背骨脹。內熱欬喘。氣短脈數。肝肺兩傷。

營陰大損。勢入損門。難以言治。

沙參

石斛

杏仁

麥冬

丹皮

茯苓

萆薢

山藥

陳

噤怒。助肝寒熱。旬日。左脅板痛。難以轉側。此絡脈瘀痺。防其醞癰外潰。

歸身

桃仁

鬱金

丹皮

川棟子

山梔

青皮

孫

虛體者邪。留戀不化。肺氣失清肅之令。胃津泛游溢之權。欬逆痰粘。納少。季脅腫痛。邪熱逗留。入絡矣。脈來弱而速。弱爲陰不足。數爲陽有餘。瘦人最有液涸之慮。戚先生同議。益氣生津。氣

壯則邪自却。津充則熱自除。惟日暮寒熱痛處加疼。乃成膿之象。日晚未易奏功。

人參

炒黃川貝

茯苓

川斛

炙草

麥冬

丹皮

橘紅

二診

病後餘邪留絡。而爲遺毒。昨議津氣兼顧。諸恙仍然。右脅腫痛。其勢更甚。此將潰必然之勢。膿泄自可向安。惟納穀無多。咯痰不已。後天生氣不振。最易成瘰。考古化痰埋嗽諸方。難施於胃虛少納之體。潰後安穀則昌。茲先和養胃氣。

人參

石斛

麥冬

橘紅

茯苓

炙草

半夏

谷芽

砂仁

三診

久嗽不得左臥。瘍潰以來。日暮猶然潮熱。胸痞不舒。胃氣未爲醒豁。肺陰日漸耗傷。刻下火令盛行。再怕煅煉辛金。而成痿症。經云。諸痿喘嘔。皆屬於肺。諸氣憤鬱不開。必致津虧液涸而後已。用喻西昌清燥法。意在生胃津以供肺。亦內經虛而補其母之義。

清燥救肺湯去石膏

四診 服甘涼之劑頗合。可與甘緩柔方。

炙甘草湯去姜桂

范

右脅腫痛已久。欬嗽痰粘。脈左滑數。右微細。是痰飲阻絡。痰久不散。亦有成膿之慮。從利痰肅肺。

旋覆花

海石

桔梗

白芥子

半夏

杏仁

絲瓜絡

蛤壳

枇杷葉

二診

從前法加減。

紫苑

桑皮

杏仁

川貝

橘紅

片草

茯苓

枇杷葉

三診

膿水不爽。欬不利。肺之氣化未宣。營衛未和。仍從清肅。

杏仁

川貝

橘紅

首烏

當歸

枇杷葉

▲腸癰

雷

癰凝濕阻。少腹痠而結腫。按之則痛。此爲有形之邪。久則愈結。將成腸癰重症。用宜通和解法。先化其寒熱。

豆卷

獨活

蘇葉

丹參

澤蘭

苡仁

大腹皮

二診

宜通和解後。痛勢已鬆。寒熱亦減。似有散意。仍從前法。參入通絡。

豆卷

香薷

苡仁

旋覆花

新絳

杏仁

絲瓜絡

尤

少腹腫如敦阜。其色鮮紅。已經三月。不能行動。而飲食如故。脈色不衰。問云。乃得於產後。此瘀也。痺於皮膜外。幸無勞傷六淫之感。故積久如斯。否則結成癰膿。而爲腸癰極重之症。當以仲景法調之。非久服不效。

抵當丸

每日三十粒。益母草湯送服。一月再看。

程

氣血凝滯。少腹硬痛。小溲不爽。寒熱日作。勢成腸癰。

歸尾

桃仁

延胡

查肉

烏藥

丹皮參

青皮

五靈脂

馮

少腹痛。按之板硬。脈象數。舌白膩。邪鬱氣阻。腑氣不通。有腸癰之慮。姑先通腑化邪。

桃仁

杏仁

延胡

川棟子

鬱金

赤苓

枳實

血珀

秦

腸癰外潰。穢從孔出。內膜已損。恐難完口。宜十全大補法。

黃芪

黨參

熟地

歸身

白芍

川芎

木香

茯苓

肉桂

炙草

周

努力傷營。寒邪阻絡。左腿裏股痠痛。屈曲難舒。少腹腫硬。寒熱交作。將爲縮脚腸癰重症。

蘇梗

老桂木

吳萸

小茴香

獨活

延胡

歸尾

半夏

絲瓜絡

沈

肝邪橫逆。阻絡傷營。少腹堅硬。胸痞噦噯。小溲混濁。用朱南陽以濁攻濁法。

川棟子

延胡

青皮

吳萸

橘紅

赤苓

兩頭尖

韭汁

焦

脈見左大於右。肝家鬱火可知。少腹結核未消。兼以左腿痠形。此縮脚腸痿之漸也。當以溫通

肝絡

肉桂

橘核

延胡

歸尾

桃仁

萸仁

小茴香

淡吳萸

李

絡阻傷營。少腹結塊作痛。左腿伸縮不舒。復加寒熱厭食。治以和營通絡。

旋覆花

青皮

新絳

查肉

瓜蒌仁

獨活

葛

努力傷營。損及血絡。少腹疼痛。不能轉側。防有腸癰之累。

延胡

青皮

丹皮

桃仁

鬱金

枳壳

木香

歸尾

赤芍

高

腸癰一年。內膜已傷。形衰脈弱。難治之症。

十全大補湯

琥珀臘礬丸

前陰部

▲下疳

陳

心火夾濕下注。玉莖腫腐成疳。年高症重。未易收功。

大生地

木通

草梢

川連

滑石

赤苓

連喬

黑梔

車前

竹葉

製軍

二診

玉莖陡然外腐。紫黑臭穢。是蠟燭疳險症也。花甲已外之年。而當此重恙。必須納穀日增。庶可

望愈。

龜板

知母

中生地

黃柏

兔絲子

陳皮

草稍

丹皮

赤苓

沈

下疳初起。莖頭腫亮如品。此乘肝家濕火。觸染穢濁而生。其勢必腐。理當解毒清火。

龍胆瀉肝湯

加川柏

草薢

二診

腫處漸形腐爛。大便尙結。重其制以清之。

前方加

川連

滑石

另當歸龍薢丸

三診

便溏屢下。火稍衰。而未退。切弗輕忽。

黃連解毒湯

滑石

龍胆草

製大黃

伍

口。袖口疽形穢乾腐。此非尋常之染毒。病屬根深蒂固。內通於臟。必須清徹其絡間之穢。方可收口。

結毒紫靈丹

金

傳染淫慾之毒。而見大便癢腐。小便腫赤。此暴病也。尙未服遏伏之藥。可從以下驅之。

製大黃

元明粉

黑梔

木通

龍胆草