

醫門普度溫疫論

上



中國醫學大成第六集

外感病類
瘟疫

增訂 醫門普度溫疫論 上



上海大東書局印行

重訂醫門普度瘟疫論提要泰和劉守仁山房珍藏

明吳又可原著清孔以立龔紹林評其例言云是編論瘟疫與傷寒不同上卷有原病及辨明傷寒時疫數條下卷有雜氣論及正名傷寒正誤諸家瘟疫論正誤又劉宏璧集補方及各家治案俱宜潛玩今卷葉較繁分劉宏璧以下爲末卷李硯莊云治疫以脈證爲憑大約證已頭暈足軟胸悶胎刺日晡病甚夜臥不安先凜凜惡寒後發熱不惡寒及兼三陽表證三陰裏證者是脈以數實有力右關更甚或初不甚顯迨投達原飲然後見數實者是蓋疫本熱邪猶賊膜原猶窩柅榔草葉猶捕手厚朴猶刑具知芩猶牽出若硝黃則驅之走矣白芍甘草一謹守門戶一作調人於此可見先生立方之妙惟龔君能洞悉淵微以方濟人以言闡理是編議論精詳治法大備黎水孔公評論多執己見易滋後學疑惑龔君育和力爲矯正頓使原書之聲價日高吳氏之作傳矣

重訂醫門普度瘟疫論 提要

原序

夫溫疫之爲病非風非寒非暑非濕乃天地間別有一種異氣所感其傳有九此治疫緊要關節奈何自古迄今從未有發明者仲景雖有傷寒論然其法始自太陽或傳陽明或傳少陽或三陽竟自傳裏蓋爲外感風寒而設故其傳法與溫疫自是迥別嗣後論之者紛紛不止數十家皆以傷寒爲辭其於溫疫證則甚略之是以業醫者所記所誦連篇累牘俱係傷寒及其臨證悉是溫疫求其真傷寒百無一二不知屠龍之藝雖成而無所施未免指鹿爲馬矣余初按諸家咸謂春夏秋皆是溫病而傷寒必在冬時然歷年較之溫疫四時皆有及究傷寒每至嚴寒雖有頭疼身痛惡寒無汗發熱總似太陽證至六七日失治未嘗傳經每用發散之劑一汗而解間有不藥亦自解者並未嘗因失汗以致發黃譫語狂亂胎刺等證此皆感冒膚淺之病非真傷寒也傷寒感冒均係風寒不無輕重之殊究竟感冒居多傷寒希有况溫疫與傷寒感受有霄壤之隔今鹿馬攸分益

見傷寒世所絕少仲景以傷寒爲急病倉卒失治多致傷生因立論以濟天下後世用心可謂仁矣然傷寒與溫疫均急病也以病之少者尙諄諄告世至於溫疫多於傷寒百倍安忍反置勿論或謂溫疫之症仲景原別有方論歷年既久兵火湮沒卽傷寒論乃稱散亡之餘王叔和立方造論謬稱全書溫疫之論未必不由散亡也明矣崇禎辛巳疫氣流行山東浙省南北兩直感者尤多至五六月益甚或至闔門傳染始發之際時師誤以傷寒法治之未嘗見其不殆也或病家誤聽七日當自愈不爾十四日必瘳因而失治有不及期而死者或有妄用峻劑攻補失敘而死者或遇醫家見解不到心疑膽怯以急病用緩藥雖不卽受其害然遷延而致死比比皆是感之輕者尙獲僥倖感之重者更加失治枉死不可勝紀嗟乎守古法不合今病以今病簡古書原無明論是以投劑不效醫者徬徨無措病者日近危篤病愈急投藥愈亂不死於病乃死於醫不死於醫乃死於聖經之遺亡也吁千載以來何生民不幸如此余雖固陋靜心窮理格其所感之氣所入之門所受之處及其傳變之體平日所用歷驗方法詳

述於左以俟高明者正之時
崇禎壬午仲秋洞庭吳有性書於淡漠齋

重訂醫門普度溫疫論 原序

重訂醫門普度溫疫論凡例

一是編議論精詳治法大備實發前人所未逮黎水孔公評語多執己見易滋後學疑惑敝友龔君育和力爲矯之遂使原文炳如日星洵吳先生功臣也

一是編論溫疫與治傷寒不同上卷有原病及辨明傷寒時疫數條下卷有雜氣論及正名傷寒正誤諸家溫疫論正誤又劉宏璧集補方及各家治案俱宜潛玩今卷帙較繁分劉宏璧以下爲末卷共三卷

一治疫以脈證爲憑大約證以頭暈足軟胸悶胎刺日哺病甚夜臥不安先凜凜惡寒後發熱不惡寒及兼三陽表證三陰裏證者是脈以數實有力右關更甚或初不甚顯迨投達原飲然後見數實者是蓋疫本熱邪猶賊膜原猶窩檳榔草菓猶捕快手厚朴猶刑具知苓猶牽出若硝黃則驅之走矣白芍甘草一謹守門戶一調停衆人此又可先生立方之妙惟龔君洞悉淵微故以方濟人卽以言闡理其言如布帛粟菽允

堪輔翼前賢

一、近人多誤讀傷寒脈緊句以緊爲數蓋緣傷寒論有云緊無常也卽誤以無常爲至數之多不知緊與弦類弦訓不移則有常緊訓無常則移動矣二三至而緊者是遲而緊七八至而緊者是數而緊知緊不可以混數斯知溫疫不可以混傷寒矣

一、傷寒論有云數則爲虛此語原未盡善今人一見病疫脈數卽妄拔音朮附桂害人不少未始非爲虛一語誤之也夫數未必卽虛也數而有力爲實數而無力乃虛耳知數之未卽虛斯不爲前人所誤

一、右尺脈與右關毗連右關洪數兼實右尺脈未有不洪數者今人一遇是脈卽疑火不歸原投桂附以引歸之抑思疫爲熱病桂附辛熱之劑是猶以火濟火勢甚燎原曷其有極達原飲之用知母實爲穩當讀者詳之

一、是書得龔論曲暢其旨毫無疑義其夾虛夾實之人又有攻補兼施之妙所謂百變而不失其宗者是也同人咸勸付梓以公諸世且樂輸資

焉

道光壬辰八月李硯莊謹識

重訂醫門普度溫疫論 凡例

三

重訂醫門普度溫疫論 凡例

重訂醫門普度溫疫論目錄

卷上

原病	一
溫疫初起	五
傳變不常	〇
急證急攻	二
表裏分傳	三
熱邪散漫	四
內壅不汗	六
下後脈浮	七
下後脈復沉	八
邪氣復聚	九
下後身反熱	九

下後脈反數	二〇
因證數攻	二一
病疫結存	二四
下格	二四
注意逐邪勿拘結糞	二六
畜血發黃	三〇
發黃疸是腑病非經病也	三二
邪在胸膈	三四
辨明傷寒時疫	三四
發斑戰汗	三七
戰汗	三七
自汗	三九
盜汗	四〇
狂汗	四二

發斑·····	四三
數下亡陰·····	四四
解後宜養陰忌投參朮·····	四四
用參宜忌有前利後害之不同·····	四六
下後間服劑·····	四八
下後反痞·····	四九
下後反嘔·····	五〇
奪液無汗·····	五一
補瀉兼施·····	五三
藥煩·····	五五
停藥·····	五六
虛煩似狂·····	五七
神虛譫語·····	五八
奪氣不語·····	五九

老少異治

六〇

妄投破氣藥論

六〇

妄投補劑論

六二

妄投寒涼藥論

六四

大便

六七

小便

七〇

前後虛實

七一

脈厥

七三

脈不應證

七四

體厥

七五

乘除

七七

卷下

雜氣論

一

論氣盛衰	六
論氣所傷不同	八
虺厥	九
呃逆	一一
似表非表似裏非裏	一一
論食	一四
論飲	一五
損復	一六
標本	一八
行邪伏邪之別	一九
應下諸證	二一
應補諸證	二七
論陰症世間罕有	二八
論陽症似陰	三〇