

湖南优良畜禽品种介绍

湖南省社会主义建设展览馆主编

湖南省农业厅畜牧局编写



湖南科学技术出版社

书号：0121

湖南优良畜禽品种介绍

湖南省社会主义建设展览馆主编

湖南省农业厅畜牧局编写

*

湖南科学技术出版社出版（长沙市新村路）

湖南省新华印刷厂印刷 湖南省新华书店发行

开本：787×1092 1/32 • 印张：1 • 插页：6 • 字数：22,000

1960年1月第一版

1960年1月第1次印刷

印数：1—2,000 定价：（6）0.16元

统一书号：16162·33

目 录

猪 (1)

宁乡猪(1) 沙子岭猪(3) 大圍子猪(4)
东安猪(4) 东山猪(5) 龙潭猪(6)
約克夏猪(7) 巴克夏猪(8) 苏联大白猪(9)

牛 (9)

濱湖水牛(9) 湘西黄牛(11) 秦川牛(13)
南阳牛(14) 濱洲牛(北滿牛) (15)
荷兰牛(16) 杂种牛(16)

羊 (17)

新邵山羊(17) 石門山羊(18) 沙倫山羊(19)
寒羊(20) 湖羊(21)

家禽 (21)

桃源鷄(21) 临武鴨(23) 淮鴨(24)
麻鴨(24) 洋鴨(25) 溱浦鵝(26)
武岡鵝(26) 来航鷄(27) 澳洲黑鷄(28)
蘆花鷄(28) 火鷄(29) 北京鴨(29)
獅头鵝(30)

兔 (31)

本地家兔(31) 力克司兔(31) 大耳兔(32)

十年来，在党的正确领导下，我省家畜家禽生产取得了巨大的成就。特别是人民公社化，给发展畜牧生产开辟了广阔的道路。一年来，人民公社在发展畜牧生产上和其它各方面的工作一样，充分显示了它的巨大优越性，潜力无穷。这就完全驳倒了右倾机会主义分子对人民公社发展畜牧生产的攻击和诬蔑。

现在人民公社已经走向完全健康发展的道路，在今后各项生产上，将更加充分发挥和显示其无比巨大的威力。改良家畜品种是加速畜牧生产发展的重要工作之一。我省地方优良品种很多，解放后在党的领导下，有了很大的发展和提高。现分布在我省的主要畜禽品种有数十种之多，并且都在实行杂交改良，不断提高。与此同时，还从外省或外国先后引进了一批畜禽良种。以改良提高我省地方畜禽品种的生产性能。为着帮助大家对我省的畜禽品种有个大致的了解，加快实现家畜家禽良种化，现将我省和引进的几个主要的家畜家禽优良品种介绍于后：

猪

宁乡猪

宁乡猪为全国著名的优良猪种之一，具有早熟、易肥、耐粗食、性情温顺、蓄脂能力强，屠宰率高等优点(图1)。

(一)原产地：宁乡猪原产地为宁乡县流沙河、草冲、苏家亭

等地，分布在我省的安化、新化、漣源、湘乡、双峰、益阳、邵东、桃江等县及省内很多国营农牧场。外省如湖北、广东、广西等也推广很多。

(二)体型外貌：1.毛色：四肢、胸、腹下部、嘴及下颌部为白色、头颈前端、臀部为黑色，群众叫它为“宁乡花猪”。在体躯中部的背腰部及体侧上方有整片的黑斑，称为“乌云盖雪”，或具有两三大黑斑的称为“大黑花”，有一些小块黑点的称为“金钱花”。2.形态特征：颈薄有垂肉，背腰一般平直，腹大下垂，臀部平整，体躯呈砖状，脚形多猴子脚。头型不一，而以狮子头为其代表。头型分福字头、狮子头和鬃鸡头三种：福字头的是额宽嘴短，额有皱折，体格中等大；狮子头的是头大嘴短，额面凹，皱折较深，体格大；鬃鸡头的是头较狭长，有皱纹，体格中等大。

(三)生产性能：一般母猪乳头为12—13个，每胎平均产仔数约为8—9个，育成率为80—90%。生长迅速，初生体重约一市斤半，断奶满双月体重在20市斤以上，个别的可达30市斤，生后10个月体重可达200市斤，如宁乡县农场喂的一年多的育肥猪，体重达500市斤以上。福字头及狮子头猪，都是边长边肥，连皮带肉，属于脂肪型。据25头猪屠宰测验，活重在80—84公斤的猪，屠宰率为67.4—68.7%，膘厚4.03公分，皮厚0.45—0.51公分，板油4.17%，花油4.39%。

(四)优缺点：这种猪的优点是：毛稀皮薄，生长快，臀平，骨骼细致，耐粗饲料，蓄脂力强，肉质细嫩味美。缺点是体型不固定，繁殖力低，多猴子脚，体质较弱。

沙子岭猪

(一)原产地：湘潭沙子岭猪原产于湘潭市郊区长城一带，分布在本省的湘乡、双峰、涟源、邵阳、衡山、湘潭等县。近年来湖北、广东、河南、河北等省也有前来购买种猪的，分布范围日见扩大(图2)。

(二)体型外貌：1.毛色：头部除嘴筒为白色，额间有白斑外，都为黑色，臀端及尾为黑色，其余各部概为白毛，群众称为“点头黑尾”，但也有在背腰部出现一、二块小黑斑的。2.形态特征：一般体型较高大，垂肉不甚发达，背腰、臀部多平直，四肢强健有力，腹部虽大但少有拖地的，毛较粗。本品种有大型中型之分。大型猪额宽、嘴短，皱折较深，多双脊，肚腹稍紧缩，脚粗，颈及躯干呈砖状。中型猪额较窄，有棱形缟纹，颈较长，猪蹄及尾均较细小，肚腹大而现低形。

(三)生产性能：一般母猪乳头在14个以上，平均产仔数为11点28头，育成率90%以上。中型猪的特点为边长边肥、早熟，50斤以前生长较慢，一般生后9个月可达150—160市斤。大型猪可达120—200市斤，每天可长1—1.5市斤，300市斤以后生长又较缓，生长两年可达500市斤左右。属晚熟种。据10头猪测验，屠宰率为67.69%，膘厚3.19公分，皮厚0.45公分，板油3.35%，花油5%。

(四)优缺点：优点是繁殖力强、皮薄，中型早熟，骨骼较粗实，胸宽深，臀平直，利用饲料性能强，蓄脂力也高。缺点是体型未固定。

大圍子猪

(一)原产地：长沙大圍子猪原产于长沙县大坵、桂井等地，分布于湘潭、长沙、株洲、望城、醴陵、浏阳、平江、湘阴、临湘等县市。外省如湖北省的咸宁、蒲圻、汉口和广东省的广州市等地。(图3)

(二)体型外貌：1.毛色：全身为浅黑色，或一至四肢下部为白色，间有腹下部为白色的，饲养条件好，皮肤一般为桃红色。2.形态特征：额中等宽，头较长，嘴筒较小，无垂肉，眼明亮，胸部平整，侧面看后躯优于前躯，呈楔形，前肢开张，肘头向外拐，为其主要特征。

(三)生产性能：母猪乳头为13—15个，平均每窝可产13头。满双月断奶仔猪重达15斤左右，个别达20斤以上。生后8—10个月，活重可达150—180市斤，骨架较大的，这时生长最快。活重164.5市斤的猪，屠宰率有66—77%，板油3.3—6.05%，花油4.5—4.7%。

(四)优缺点：优点：早熟，生长快，利用饲料能力强，体质强健，耐运输，适应环境力强，繁殖力高，毛稀皮薄，蓄脂力也较好，肉质细嫩味美。缺点：体型不固定，生长不一致。

东安猪

(一)原产地：东安猪产于沿湘桂铁路两侧的茶源、荷池、井头圩、大江口、狮子铺、石期市、台凡市等地和分布在本省的零陵、祁阳、岳阳、新宁等县，外省如广西、广东、湖北也有推广(图4)。

(二) 体形外貌：1. 毛色：顔面、耳、臀端、尾为黑色，黑色边缘还有白花，嘴筒額間軀干及四肢为白色。依毛色不同，可分为两头黑(即基本毛色是白的，俗称白猪)大花猪(軀干部散有不定形的大黑块)及小花猪(軀干部散有数目不一的小黑斑)。2. 形态特征：性情較溫馴，体型中等大，头較粗短，額部有Y形皺紋，或棱形皺折，鼻梁平直，耳略小而下垂，頸較粗短，垂肉发达，軀干中等长，多双脊，背腰微凹，腹部膨大，四肢較粗长，一般腹不拖地，前肢較开张，后肢弯度較大，尾中等长。

(三) 生产性能：母猪乳头多为14个，初胎母猪产仔为3—8头，以6—13胎較平稳，一般为8—10头，平均为8.73头，满双月体重一般为15斤，最大达38斤，最小的6—7斤。一般生后一年可达140—180市斤，个别的可长到240市斤左右。据群众反映：活重在70—150市斤阶段增重最快，以后較慢。平均活重66.84公斤的，屠宰率平均为73.16%。

(四) 优缺点：优点：早熟易肥、体质較强健，背腰尚平直，屠宰率高。缺点：耐粗飼能力較差，繁殖力不高。

东山猪

(一) 原产地：东山猪产于綏宁县的东山、朝仪、鵝公岭等地，这些地方相互鼎立，各距20华里，地区偏僻，位于綏宁县的西北角。分布在靖县、通道、会同、城步、武岡、洞口、隆回、洪江等县、市及广西省、貴州省。

(二) 体型外貌：1. 形态特征：东山猪(图5)体型中等大，性情溫馴，体质强健，头較狭长，額部多隆起，有棱形皺紋，鼻梁一般平直，个别上翘，鼻孔欠发达，下唇略短，眼明亮；耳較大，耳

根硬而突起，耳尖下垂，稍遮住两侧視綫；頸較細短，垂肉不发达，与肩結合良好，背腰微凹，腹部較小，不拖地；四肢細长，后軀較发达，大腿处皺折較淺，股間丰满，后肢多臥系散蹄，皮較厚，毛着生較密。2.毛色：毛色不一致，基本毛色，头及前頸部和臀尾系黑色，尾尖白，額部有流星，鼻梁，四肢及腹部白色，分为：(1)大花猪，頸到背腹相連处为白色，腰臀部为黑色。(2)青背梁，頸肩部有白环，背腰为黑色。(3)乱花猪：除基本毛色外，背腰部散有大、小不一的黑斑。

(三)生产性能：母猪乳房欠发达，乳头細长，生得不整齐，一般初胎母猪产仔4—6头，老母猪6—10头，成活率为7头左右。滿双月体重只有12斤至14斤的，最大的才达20斤以上。生后12个月体重达140—160市斤，有的只100斤左右的，若飼养条件好可达300斤。屠宰率高为64—74.3%。公猪体型較小，前軀較发达，四肢細长，系正，腹部紧縮，背腰平直，睪丸較显露。

(四)优缺点：优点：耐粗食，性情溫馴，抵抗力强，腹部不拖地，骨骼細致。缺点：产仔率不高，生长較慢，胸部欠发达。

龙潭猪

(一)原产地：龙潭猪产于溆浦县龙潭，黄茅园、鹤田龙，葛竹坪，大华、溫水、横板桥。主要銷于溆浦、隆回、洞口、新化、怀化、黔阳、辰溪、会同等县和洪江市。

(二)体型外貌：1.形态特征(图6)：一般体型中等大，头中等长，上下唇齐整，眼尚明亮，鼻孔发达，額較广平，皺紋不一致，耳根硬、耳尖薄而下垂，頸中等长，垂肉不发达，背腰稍凹，前胸較开張，后軀不发达，尾較細长，四肢較长，后肢多臥系撒

蹄。依个体大小来分，有“大种猪”与“小种猪”之分，“大种猪”躯干较长，耳稍大，脚及尾根略粗，“小种猪”则相反。皮肤中等厚而较松弛。2.毛色：毛较稀，毛色接近一致，头及前颈部为黑色，嘴筒下端，白颌及鼻梁部有长流星，臀端及尾为黑色，其他部位都为白色。

(三)生产性能：新母猪产仔多为4—7头，3—4胎以后，提高到8—10头，产仔数平均为8.72头。当地群众说：“13奶猪婆、5奶牛婆”为最好。满双月仔猪一般体重20斤左右，最大40斤、最小6—7斤。饲养一年体重达150斤左右，喂一年半可达400斤。一般屠宰率比宁乡、沙子岭猪略低，膘也较薄，皮下脂肪分布不均匀。皮肤中等厚，板油、花油也不多，但大肠和小肠的长度都大于宁乡猪和沙子岭猪。

(四)优缺点：优点：耐粗饲，适应性较强，骨骼细致，仔猪育成率较高，生长较快。缺点：产仔率低。

約克夏猪

約克夏猪(图7)具有生长快，繁殖力强，适应环境的性能大等特点。原产于英国約克县，于抗日战争前就已引进我省饲养繁殖。解放后在党的重视下，农业部门，于1952、1953年先后从广西良丰牧场和浙江农科所引入約克夏公、母猪数十头，从此我省各专、县农牧场和现在的部分公社都用約克夏公猪杂交改良本地猪群，在提高本地猪的生产性能上，起了很大的作用，而且现已普及到全省各地，深受群众欢迎。

(一)体型外貌：約克夏猪分为大、中、小三个类型，分布在我省的大都为大、中型的，头长适中、面微凹、鼻筒向上翘、

耳长适中、耳根硬、耳肉薄而向上豎。一般特征：毛細有光泽，体型很大，頸短背闊，四肢筋肉发达，嘴形同耳的直立形态为辨别本品种的特性。全身被毛为白色，毛細而多。

(二)生产性能：一般仔母猪在生后11个月可配种，一胎生10头以上，有多达15头以上的。滿双月体重一般为20市斤，最大的有达40市斤以上的，大中型約克夏在两年到两年半的时间內，体重可达到650—1000多市斤。幼年猪育肥从出生到7个月能长200市斤以上，所以也称早熟种。屠宰率一般为70%左右。

(三)优点：发育快、体质强健、生长快，耐粗飼，适应性强。

巴克夏猪

巴克夏猪(图8)具有生活力强，行动活潑，体軀各部对称，适宜放牧，屠宰率高等特点，原产于英国巴克县，含有中国猪的血液，于1954年从浙江等地引进我省飼养繁殖，現在多集中在湘潭、衡阳、常德等专区。

(一)体型外貌：巴克夏猪体型中等大，成年体重最高达500市斤。一般特征：嘴筒短微向上翹，面部凹，头的长短适中，两耳分开直立，頸短而厚，体軀广闊，背腰平直，胸部寬广深厚，臀部肌肉发达，四肢强健。体軀呈长方磚形。被毛光泽美观，全身是黑毛，四蹄、額心、尾端为白色，所以有“六白”之称。除此部位外，倘使在其他部位发现有白点，是为缺点，不应留作种用。

(二)生产性能：1.生长快，早熟易肥。2.生产良好的肉和脂肪，而脂肪和肌肉分布均匀，呈现大理石状。3.肌肉多汁可口。4.利用飼料率高适于放牧。5.平均每胎产仔8—10头，也有产12—

14头的，生后10—12个月的猪能长到200—300市斤，屠宰率为80%。

苏联大白猪

苏联大白猪，产于苏联，是英国约克夏猪在苏联的饲养管理和气候条件下驯化而成的，与原约克夏猪有些变异，具有肉用（腌肉用）脂肪用和肉脂兼用性能。从1956年起陆续从东北、新疆引进我省，现分布在湘潭、衡阳、郴县、常德等专区，生长发育很好，深受群众欢迎。

（一）体型外貌：苏联大白猪（图9）的外形特征：个体大，胸部宽广深厚，背腰宽大而平直，大腿发育良好，四肢强健有力，皮肤薄，呈淡粉红色，被有厚密的白颜色，它比约克夏猪头嘴长，脚杆粗，肚腹扁，背部宽。

（二）生产性能：平均每胎产仔猪11—12头，在较好的饲养管理下，优良母猪每胎产仔猪18—20头，育肥时，在生后6个月体重可达180市斤，生后一年半体重可达500市斤，成年的种猪最高体重达900—1000市斤。同时它的体质强健，四肢有力，行动活泼，能自寻饲料，适宜放牧。

牛

滨湖水牛

（一）原产地：滨湖水牛（图10）原产于滨湖12县，其中以澧县永镇河，常德丹洲，岳阳君山等地产的为最著名，分布于湘中、湘东丘陵地带。西北部的桃源、慈利、石门、沅陵等县的水牛也属

濱湖水牛系統。

(二)體形外貌: 1. 形態特征: 額部平整寬大, 面部清瘦, 兩眼圓大, 靈活, 口大而口槽深, 下顎兩枝骨距離大, 鼻鏡寬廣(鼻鏡汗腺發達, 為放散熱氣的主要氣管)鼻孔大而空爽, 有利於呼吸。角粗而深長, 角根部呈三角形, 向後彎曲。角形弧度大小不一, 一般的角呈圓形, 兩尖相對, 很美麗, 群眾稱為“篩盤角”。一般頸子較短, 母牛、閩牛的头頸比較清瘦, 成年公牛的頸脖因受雄性刺激因素的影響, 現得粗大豐滿。水牛頸部沒有垂皮, 头頸角度大, 伸出方向與地面近平行。一般軀干表現粗大, 閩牛的軀干前後粗細一致, 呈現圓桶狀或長方磚狀; 母牛後軀較前軀發達, 略呈楔形。2. 毛色: 毛色分黑、灰、白三種, 以黑色為最多, 白色極少, 群眾稱灰毛為“蘆毛”, 黑毛為“鐵毛”。據測驗證明, 工作能力與毛色無關。

(三)生長發育情況: 1. 初生公牛體重平均在27.5公斤, 8個月時平均體重在201.5公斤, 而成年的公牛, 母牛, 閩牛, 平均體重在495公斤, 538公斤不等。一般8個月的公牛體斜長增至110厘米, 而7歲以上的成年母、公、閩牛體長為148.5厘米, 142.4厘米不等。體高為135厘米。2. 一般胸圍的增長, 也以8個月內為大, 而成年時的胸圍僅較8個月時增加 $\frac{1}{3}$ 。另外抗病力很強, 與黃牛比較, 抗血吸蟲病的能力大, 黃牛血吸蟲病感染率為1.36—48.8%, 水牛為0.25—5.22%。

(四)生產性能: 1. 役用性能: 由於這種水牛具有個體高大、粗壯, 氣官發達, 體質強健等特點, 因而它的役用性能強, 力氣大, 耐持久, 具體表現在如下幾方面: (1)耕地: 濱湖水牛在產區一般平均每頭牛負擔耕地50—70市畝, 最高的如南縣每頭牛負

担90亩以上。一般在3犁6耙,或十犁8耙,深耕7寸的要求下,甲等水牛日可耕板田4.5—5亩,乙等水牛可耕4—5亩,丙等水牛3.5—4亩。(2)車水抗旱:濱湖区地势較低,湖泊池塘水位多低于稻田位置,不能自流灌溉,絕大部分車水工作需要牛担任,一头水牛能抵上5个劳动力車水,一般可灌溉田4—5亩,水深4寸。(3)运输:收获粮食作物以及送公粮,运貨物等等,都可用水牛拉車运输。2.肉用性能:濱湖水牛,軀干呈长方磚形,为役肉兼用体型。澧县屠宰場用一头跛脚水母牛屠宰試驗,肥瘦程度中等,活重826市斤,屠宰率为39.74%。3.繁殖性能:一般公牛3岁,母牛2.5—3岁,开始配种,母牛繁殖最强的年龄为4—12岁,飼养管理和使役好的繁殖可达20岁以上。一般是一年零3个月生小牛一头。

(五)优缺点:优点:体軀高大,胸部寬广深厚,后軀发育良好,四肢骨架粗健,步幅大;体质强健,劳役能持久,抗病力和环境适应能力都强。缺点:公牛多生长发育不良,后肢为外弧运动,部分蹄形不正为親子蹄、剪刀蹄,个别为变形蹄。

湘西黃牛

(一)原产地:湘西黃牛(图11)产于湘西土家族苗族自治州和常德专区的慈利、石門、桃源一带,以慈利、石門、大庸、沅陵、花垣、桑植、永順、龙山等县为主要产区。中心交易集散市場在桃源漆家河,这种牛分布于湘中、湘北的丘陵平地。一般成年公牛体重300—350公斤,母牛体重250—300公斤,閤牛体重400—450公斤。

(二)体型外貌: 1.形态特征:湘西黃牛个体較粗大,头較

短、嘴筒大、額部平整、鼻鏡寬，鼻孔大，眼睛圓大靈活。角形不一，有“八字角”、“扁担角”、“火叉角”、“佛字角”等，以“八字角”較普遍。頸下垂皮发达，胸部寬广深厚，肋骨圓張，肚腹圓大，后軀发育較好，背比腰长，肢长短于胸深，呈現低型。乳房发育較差，乳头中等长，排列尚整齐。四肢較粗长，前肢正直，后肢弯曲，蹄質坚实形成木碗。2.毛色：被毛短密，分黃、黑、灰，灰白等毛色，黃色毛最普遍，灰白牛极少。

另外湘西牛的胸圍指数与秦川牛相似，比湘南牛、山东牛大。成年母牛前后軀高度較为接近，这說明鬐甲不够发达，而背腰較平直。

(三)生产性能：1.繁殖能力：小公牛性成熟約2岁左右就有性欲表現，开始配种。一般仔母牛初产犢的年齡多在3—4岁，这說明到2、3岁时性已成熟。营养情况好的母牛一年生一胎，一般为3年两胎。2.役用能力：黃牛使用年限，一般为17—18年，最差的10年，最好的20多年、好的黃公牛，每头負担耕地面积20—30市亩，每日犁田5—6亩，母牛3亩左右。一般公牛犁田每日2—3市亩，母牛1.5—1.8市亩。另外用作交通運輸，一头一类黃閩公牛，可拉重450—550斤，每天拉12小时，可走45—65里路。据試驗，一头牛长距离拉車能拉重1,310—1,650市斤，在7时50分鐘內行駛68华里。3.屠宰率：据屠宰6头老廢牛，共得淨肉重1210斤，平均每头淨肉在200斤以上，屠宰率为30—50%。

(四)优缺点：优点：适应环境性能强，耐粗飼，体質强健，抗病力强，胸部寬大，管圍大，役用持久力强。缺点：体型不够大，役用性能还差。

秦川牛

秦川牛体肥高大粗壮,挽曳能力很强,肉用价值也较高,是我国优良牛种之一。原产于陕西和陕西平原区,从1953年起引进我省,分散于郴县、桃江、花垣、衡山、东安、安乡等县。家畜改良配种站,饲养繁殖,除了純种繁殖外,主要是用公牛与母牛杂交,改良当地土种黄母牛。

几年来杂交效果很好。后来各专、县也有从产区引进的。公牛平均体重約575公斤,閤牛500公斤,母牛366公斤。

(一)体型外貌:秦川黄牛(图12)大小适中,公牛及閤牛的头較粗魯,眼大面平,鼻鏡頗寬,呈粉紅色。角短細致,多向外下方或向后稍弯。頸厚薄适中,长度与头长相仿佛。公牛頸部隆起,肩峰发达,背腰一般都平直,肋长而开张,腹部大,荐部稍隆起,臀部长短适中。母牛乳房发育較差,前肢相距尚寬,后肢飞节有內靠現象,蹄趾坚硬,成圓形,大部为紫紅色,少数为黑色。

(二)生产性能:1.挽(拉)力:公牛最大挽力360—450公斤,平均为335公斤,母牛为190—355公斤,平均为252公斤。2.載重量:利用鉄輪大車进行測量,閤牛最少載重2110—2673公斤,平均为2,368公斤,母牛最高載重量1,833—1,910公斤,平均为1,871公斤。3.耕作能力:各种牛在一小时内耕作土地面积公牛为9分—1亩,閤牛平均为7分2厘,母牛平均为6分2厘各种牛在耕作时所用的最大挽力,平均为134.6公斤。4.产肉和产乳:秦川牛的屠宰率为37.7—53.65%,平均为41.8%。一昼夜最高产乳可达1.84公斤,平均为0.64公斤,以产乳期180天計算,一年平均約可泌乳115.28公斤,乳脂率平均为5.39%。

南阳牛

南阳牛(图13)原产于河南南阳专区,以拉車为特长,于1956年引进我省,用以杂交改良我省土种黄牛,加大体型,提高役力。目前数量不多,仅分布在郴县、邵阳、常德等专区。一般生长发育較好。成年公牛平均体重約455公斤,母牛体重約360公斤,閤牛約500公斤。

(一)体形外貌:一般特征:公、母牛都是眼大鼻寬,体肥高大身长,胸部深厚广闊,骨骼粗大,全身肌肉丰满,体质强健。毛色有紅黄、谷黄、草白等顏色,以紅黄及白的为多。公牛头大微呈弓形,母牛頸、头清秀活潑,頸略呈水平状,角有黄和黑色二种,形状有圓形、扁形、綫形三种。蹄形圓大,呈木碗状,蜡色的有带条紋的点,黑色的較坚硬能耐潮湿。由于各地选育标准和环境的不同,分有高脚牛、短脚牛和矮脚牛三种。其特征是:高脚牛四肢特长;短脚牛介于高脚牛与矮脚牛的中間类型;矮脚牛个体矮而体軀长。

(二)生产性能:南阳牛性情敏感,体力强健,步速快,以拉車运输为特长,一头牛每日可耕地2—3市亩,大公牛可耕地4—6市亩,全年可負担30—40亩田地。挽車能力,可載重7,000—10,000公斤,日行25—30公里。它的肉用和乳用性能也高,屠宰率为40—43.2%,平均日产乳1—1.6公斤,最高日产乳7.6公斤,含脂率4.5—7.5%。

濱洲牛(北滿牛)

濱洲牛是一个乳、肉兼用品种,产于黑龙江省的安达,齐齐