

护理专业资格考试

通关
宝典

2009年 执业护士资格考试 模拟试卷

崔景晶 于秀荣 武金莲 主编

- 仿真试卷 5 套
- 覆盖历年高频考点

是高复习效率 掌握考试重点



化学工业出版社
生物·医药出版分社

护理专业资格考试

通关
宝典

2009年 执业护士资格考试 模拟试卷

崔景晶 于秀荣 武金莲 主编



化学工业出版社
生物·医药出版分社

· 北京 ·

本书紧扣最新考试大纲,各科目占分比例、题型与真题相同,难度以近3年真题的平均难度为准,高频率出现的考点覆盖率达到75%。本书可帮助考生在较短的时间内,全面掌握重要考点、迅速提高应试能力。本书适合参加执业护士资格考试的考生参考。

图书在版编目(CIP)数据

2009年执业护士资格考试模拟试卷/崔景晶,于秀荣,
武金莲主编. —北京:化学工业出版社,2009.2
(护理专业资格考试通关宝典)
ISBN 978-7-122-04614-7

I. 2… II. ①崔…②于…③武… III. 护士-资格考核-
习题 IV. R192.6-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第000349号

责任编辑:赵兰江 蔡红
责任校对:周梦华

装帧设计:关飞

出版发行:化学工业出版社 生物·医药出版分社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印刷:北京永鑫印刷有限责任公司
装订:三河市万龙印装有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张11¼ 字数323千字 2009年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:26.00元

版权所有 违者必究

编写人员

主 编 崔景晶 于秀荣 武金莲

副主编 陈晓林 王海英 颜琬华 张 丽 韩瑞敏 李 玲

编 者 (按姓氏笔画排序)

于秀荣	王 辉	王艳华	王海英	牛晓桂
邢娜娜	成桂荣	乔昌秀	丛 薇	刘金霞
刘爱云	李 玲	张 丽	张宝俊	张晓丽
张雪雁	陈晓林	武金莲	赵晓敏	郭红丽
韩瑞敏	崔景晶	颜琬华	霍爱霞	

前言

根据《中华人民共和国执业医师法》，卫生部制定并实施了护士资格考试制度，自 1995 年起每年举行一次执业医师考试。国家进行执业医师考试的目的是全面提高护理人员的护理水平，限制不合格护理人员从事护理行业，其最终目标是确保从业护士为病人提供高水平的优质护理服务。

执业医师考试的主要内容为护理基本理论、基本知识、基本技能，涉及到内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、护理学基础 5 门课程。我们组织了各专业富有经验的护理学教师，针对本次考试编写了该书，力求通过模拟训练，使考生体验考试的题型和难度，同时复习、掌握重要的考点。

“紧扣新编大纲、覆盖考点率高、题型难度均衡、注重简洁时效”是本书的特点。本书紧扣 2009 年卫生部护士资格考试委员会和国家医学考试中心修订的考试大纲，根据考试范围准确把握历年考点，高频率出现的考点覆盖率达到 75%，各科目占分比例、题型严格按照真题标准，难度以近 3 年真题的平均难度为准，用最为简洁的语言，尽可能少的篇幅，使考生在尽可能短的时间内，全面掌握重要考点、迅速提高应试能力、轻松应对资格考试。

为了考生应试水平的迅速提高和顺利通过本次考试，我们从各个方面做了不懈地努力，由于时间比较紧，编写内容多，疏漏和不当之处在所难免，还恳请同行专家和广大考生批评指正。

编者

2009 年 1 月

目 录

模拟试卷（一）	1
基础知识	1
相关专业知识	10
专业知识	19
专业实践技能	28
模拟试卷（二）	36
基础知识	36
相关专业知识	45
专业知识	53
专业实践技能	62
模拟试卷（三）	70
基础知识	70
相关专业知识	79
专业知识	87
专业实践技能	96
模拟试卷（四）	104
基础知识	104
相关专业知识	113
专业知识	121
专业实践技能	130
模拟试卷（五）	138
基础知识	138
相关专业知识	147
专业知识	156
专业实践技能	164

模拟试卷（一）

基础知识

一、以下每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 同一时间测脉率少于心率称
 - A. 脉搏短绌
 - B. 奇脉
 - C. 期前收缩
 - D. 交替脉
 - E. 缓冲脉
2. 心源性呼吸困难最严重的是
 - A. 劳力性呼吸困难
 - B. 阵发性夜间呼吸困难
 - C. 端坐呼吸
 - D. 心源性哮喘
 - E. 急性肺水肿
3. 咯血的直接致死原因为
 - A. 肺不张
 - B. 肺部感染
 - C. 窒息
 - D. 情绪紧张
 - E. 左心衰
4. 与支气管哮喘发作有关的免疫球蛋白是
 - A. IgA
 - B. IgG
 - C. IgE
 - D. IgD
 - E. IgM
5. 成人浸润性肺结核的感染途径是
 - A. 组织蔓延
 - B. 接触传染
 - C. 经呼吸道传染
 - D. 遗传
 - E. 食物传染
6. 肺癌发病的重要危险因素是
 - A. 职业性致病因素
 - B. 长期吸烟
 - C. 免疫缺陷
 - D. 慢性肺部疾病
 - E. 遗传因素
7. 引起肺心病的主要原因为
 - A. 胸廓活动功能障碍
 - B. 呼吸中枢功能障碍
 - C. 慢性支气管炎、肺疾病
 - D. 胸腔内肿瘤
 - E. 过敏反应
8. 体力活动轻度受限制，日常活动可以引起呼吸困难为
 - A. 心功能Ⅰ级
 - B. 心功能Ⅱ级
 - C. 心功能Ⅲ级
 - D. 心功能Ⅳ级
 - E. 心功能代偿期
9. 洋地黄药物常见心血管系统毒性反应为各种心律失常，其中最常见的是
 - A. 窦性心动过缓
 - B. 长期房颤患者的心律变规律
 - C. 室性期前收缩
 - D. 房室传导阻滞
 - E. 室上性心动过速伴房室传导阻滞
10. 风湿性心瓣膜病最常受累的是

- A. 主动脉瓣
 - B. 肺动脉瓣
 - C. 主动脉瓣及肺动脉瓣
 - D. 二尖瓣
 - E. 三尖瓣
11. 急性心肌梗死患者止痛治疗, 下列哪种情况不能应用吗啡
- A. 呼吸抑制
 - B. 频发室性期前收缩
 - C. 心力衰竭
 - D. 高龄患者
 - E. 神志欠清
12. 引起心肌炎最常见的病原体是
- A. 柯萨奇病毒 B
 - B. 脊髓灰质炎病毒
 - C. 疱疹病毒
 - D. 埃可病毒
 - E. 流感
13. 以下哪种药物即保护胃黏膜又消灭幽门螺杆菌
- A. 甲硝唑
 - B. 枸橼酸铋钾
 - C. 黄连素
 - D. 替硝唑
 - E. 呋喃唑酮
14. 在我国, 急性胰腺炎最常见的病因是
- A. 大量饮酒
 - B. 手术与创伤
 - C. 暴饮暴食
 - D. 胆石症与胆道疾病
 - E. 胰管阻塞
15. 慢性肾炎的主要病变部位是
- A. 单侧肾脏的肾小球
 - B. 双侧肾脏的肾小球
 - C. 单侧肾脏的肾小球和肾小管
 - D. 双侧肾脏的肾小球和肾小管
 - E. 双侧肾间质
16. 肾衰竭合并感染时应选用的抗生素是
- A. 红霉素
 - B. 链霉素
 - C. 庆大霉素
 - D. 多黏霉素
 - E. 磺胺药
17. 硫酸亚铁用于治疗
- A. 巨幼红细胞性贫血
 - B. 缺铁性贫血
 - C. 肿瘤化疗引起的贫血
 - D. 溶血性贫血
 - E. 再生障碍性贫血
18. 成人失血 500~800ml, 首先考虑输入
- A. 浓缩红细胞
 - B. 血浆
 - C. 白蛋白
 - D. 晶体液
 - E. 全血
19. 甲状腺功能亢进的病因是
- A. 放射线过多
 - B. 对链球菌变态反应
 - C. 自身免疫性
 - D. 直接细菌感染
 - E. 直接病毒感染
20. 一侧肢体深感觉障碍, 而痛觉、温度觉正常, 称为
- A. 末梢性感觉障碍
 - B. 阶段性感觉障碍
 - C. 交叉性感觉障碍
 - D. 分离性感觉障碍
 - E. 完全性感觉障碍
21. 煮沸消毒时为提高沸点可在水中加入
- A. 碳酸氢钠
 - B. 氢氧化钠
 - C. 明矾
 - D. 亚硝酸钠
 - E. 石炭酸
22. 下列哪种情况可导致细胞脱水
- A. 等渗性脱水
 - B. 高渗性脱水
 - C. 低渗性脱水
 - D. 水中毒
 - E. 以上都不对
23. 关于 ARDS 的病理改变, 不正确的是
- A. 肺微血管栓塞
 - B. 肺泡表面透明膜形成
 - C. 间质性肺水肿
 - D. 肺不张并发感染
 - E. 血气胸
24. 围手术期是指
- A. 术前 1 周
 - B. 手术前后 3 天
 - C. 术前 1 周与术后一段时间

- D. 术后1周
E. 住院期间
25. 下列哪项不是外科非特异性感染常见的致病菌
A. 链球菌
B. 大肠杆菌
C. 表皮葡萄球菌
D. 变形杆菌
E. 梭状芽胞杆菌
26. 烧伤面积按“中国新九分法”估算，以下错误的是
A. 头、面、颈各占3%
B. 双上肢占18%
C. 前后躯干、会阴占27%
D. 双臀占5%
E. 双足、双小腿、双大腿共占46%
27. 癌与肉瘤最主要的区别为
A. 转移途径不同
B. 组织来源不同
C. 发生年龄不同
D. 发生部位不同
E. 生长方式不同
28. 休克病人每小时尿量最低达多少时表示组织灌流良好
A. 20ml
B. 30ml
C. 40ml
D. 50ml
E. 60ml
29. 急性乳腺炎的致病菌多为
A. 大肠杆菌
B. 变形杆菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 溶血性链球菌
E. 白色葡萄球菌
30. 腹外疝发病原因中最重要的是
A. 腹壁强度降低
B. 慢性便秘
C. 慢性咳嗽
D. 排尿困难
E. 腹水
31. 胃癌最常发生的转移途径是
A. 直接蔓延
B. 血行转移
C. 腹腔种植性转移
D. 淋巴结转移
E. 以上都不对
32. 肛瘘常见的病因是
A. 直肠脱垂
B. 肛周脓肿
C. 内痔嵌顿
D. 血栓性外痔
E. 炎性内痔
33. 有关胆汁逆流入胰腺管而引起急性胰腺炎的发病机制，错误的是
A. 出口梗阻
B. 有共同通路
C. 胰液外渗入胰腺组织
D. 胰管腺泡受高压而破裂
E. 胰管内压大于胆管内压
34. 脑疝形成的主要机制为
A. 颅内血容量增加
B. 颅内脑脊液增加
C. 颅内占位性病变
D. 颅内压力分布不均
E. 颅腔内容物体积增大
35. 食管癌较多发生在
A. 胸中段食管
B. 胸上段食管
C. 胸下段食管
D. 食管贲门部
E. 颈部食管
36. 创伤性窒息的病变应除外
A. 毛细血管破裂出血
B. 胸膜腔压力骤升
C. 瞬间声门紧闭
D. 上半身静脉血倒流
E. 小支气管和肺泡破裂
37. 老年人排尿困难最常见的原因是
A. 尿道狭窄
B. 良性前列腺增生
C. 排尿无力
D. 膀胱结石
E. 神经源性膀胱
38. 骨关节结核最常见的发生部位是
A. 肌肉最不发达的腕关节
B. 全身滑膜面积最大的膝关节
C. 负重最大的踝关节
D. 脊柱椎体
E. 活动最多的髋关节

39. 下述哪项不属于胎儿附属物
- 胎盘
 - 子宫肌
 - 胎膜
 - 脐带
 - 羊水
40. 分娩过程中的主要产力是
- 腹压
 - 膈肌收缩力
 - 肛提肌收缩力
 - 子宫收缩力
 - 腹肌收缩力
41. 自然流产按照发展的不同阶段分为几种临床类型, 其中不包括
- 习惯性流产
 - 难免流产
 - 完全流产
 - 不全流产
 - 先兆流产
42. 活跃期停滞是指
- 活跃期胎头下降速度每小时小于 1cm
 - 活跃期超过 16 小时
 - 活跃期超过 8 小时
 - 进入活跃期后, 胎头不再下降达 2 小时以上
 - 进入活跃期后, 宫口不再扩张达 2 小时以上
43. 引起输卵管妊娠最常见的原因是
- 输卵管发育不良
 - 内分泌失调
 - 输卵管炎症
 - 输卵管功能异常
 - 输卵管手术史
44. 关于骨盆的说法不恰当的是
- 骨盆前浅后深, 其大小、形态直接影响分娩
 - 骨盆入口平面呈横椭圆形
 - 骨盆出口平面是最狭窄的平面
 - 中骨盆平面呈纵椭圆形
 - 坐骨棘是胎先露下降位置的重要标志点
45. 外阴阴道假丝酵母菌病的诱因不包括
- 妊娠
 - 糖尿病
 - 长期应用雌激素
 - 肥胖
 - 长期哺乳
46. 有关女性生殖系统自然防御功能的说法不正确的是
- 两侧大阴唇自然合拢
 - 碱性黏液栓堵塞宫颈管, 且宫颈内口紧闭
 - 阴道口闭合, 阴道前后壁紧贴
 - 输卵管纤毛向伞端方向摆动和输卵管的蠕动
 - 子宫内膜周期性剥脱
47. 新生儿生理性黄疸的原因应除外
- 红细胞量多, 寿命短
 - 肝脏 Y、Z 蛋白含量少
 - 肝脏葡萄糖醛酸转移酶活性低下
 - 肠道葡萄糖醛酸苷酶活性低
 - 肝细胞排泄胆红素的能力低下
48. 新生儿寒冷损伤综合征病因不包括
- 棕色脂肪少
 - 体表面积相对较大
 - 寒冷损伤
 - 免疫功能低下
 - 皮下脂肪饱和脂肪酸含量较多
49. 引起鹅口疮的病原体为
- 链球菌
 - 金黄色葡萄球菌
 - 白色念珠菌
 - 铜绿假单胞杆菌 (绿脓杆菌)
 - 大肠杆菌
50. 小儿肺炎的病理生理变化最重要的是
- 低氧血症
 - 酸碱代谢失衡
 - 毒血症
 - 脏器功能异常
 - 肺水肿
51. 引起小儿营养不良最常见的病因为
- 饮食因素
 - 急慢性传染病
 - 迁延性腹泻
 - 发热性疾病
 - 免疫缺陷
52. 水痘病毒属于
- 肠道病毒
 - 副黏病毒
 - 疱疹病毒
 - 流感病毒

- E. 以上都不是
53. 2岁以前小儿呼吸运动的主要形式为
- 胸式呼吸
 - 腹式呼吸
 - 胸腹式呼吸
 - 肋间肌呼吸
 - 辅助呼吸肌呼吸
54. 小儿重症肺炎的特点为
- 肺部啰音明显
 - 呼吸道症状重
 - 伴有神经、循环及消化系统和全身中毒症状
 - WBC $>20\times 10^9/L$
 - 病原为金黄色葡萄球菌
55. 患者，男性，66岁。突发头痛、视物模糊、失语，测血压 210/130mmHg。降压药物应首选
- 卡托普利
 - 呋塞米（速尿）
 - 普萘洛尔（心得安）
 - 硝普钠
 - 维拉帕米（异搏定）
56. 患者，男性，45岁。高血压、蛋白尿、水肿多年。1年前曾查血 Cr 220 $\mu\text{mol/L}$ ，B超双肾缩小，近2周恶心、呕吐加重，测血压 190/105mmHg。该病人出现肾功能损害的原因最可能是
- 急性肾炎
 - 慢性肾炎
 - 急进性肾炎
 - 多囊肾
 - 慢性肾间质肾炎
57. 有机磷农药中毒患者，在使用阿托品、解磷定治疗过程中，患者神志转清醒，呼吸困难减轻，肺部湿啰音减少。约半小时左右，患者突然出现意识模糊、躁动、抽搐，体温高达 39.5℃。出现上述症状的原因是
- 解磷定中毒
 - 脑出血
 - 脑水肿
 - 阿托品中毒
 - 阿托品量不足，中毒症状加重
58. 患者，女性，67岁。诊断脑血栓收入院，体检时发现刺激右脑至踝部无疼痛反应，平衡觉及两点辨别觉存在，该病人出现的症状是
- 运动觉障碍
 - 复合感觉障碍
 - 浅感觉障碍
 - 深感觉障碍
 - 定位感觉障碍
59. 某高血压病人，同时患有支气管哮喘，他不能使用以下哪种降压药
- 呋塞米
 - 阿替洛尔
 - 硝苯地平
 - 卡托普利
 - 哌唑嗪
60. 患者，男性，48岁。食管癌术后第6天，出现吻合口瘘，决定进行肠外营养支持。用 10%脂肪乳剂 500ml 由周围静脉输入，输入速度为 4ml/min，当输入约 50ml 时，患者感胸闷、心悸，体温 38.3℃。应首先考虑哪种原因
- 输入速度太快
 - 脂肪乳剂的过敏反应
 - 脂肪乳剂的毒性反应
 - 突发心肌梗死
 - 吻合口继发性出血
61. 患者，女性，25岁。突发性上腹部剧烈疼痛，后出现转移性右下腹痛，诊断为急性阑尾炎。请问腹痛起始于脐周或上腹的机制是
- 阑尾位置不定
 - 胃肠功能紊乱
 - 躯体神经反射
 - 内脏神经反射
 - 阑尾管壁痉挛
62. 胫腓骨中 1/3 骨折患者，复位后用长腿石膏固定，4个月骨折愈合拆除石膏后，发现膝关节功能发生障碍，其原因是
- 肌肉萎缩
 - 关节僵硬
 - 关节强直
 - 骨折复位不理想
 - 骨折畸形愈合
63. 患者，男性，63岁。患有肝硬化3年，近半年来全身乏力、纳差，经常有牙龈、鼻出血及全身皮肤黏膜的出血点。检查脾轻度肿大。分析造成出血倾向的主要原因是
- 营养缺乏
 - 脾功能亢进

- C. 白蛋白合成减少
D. 毛细血管脆性增加
E. 肝脏对激素的灭活作用减弱
64. 某产妇，经阴顺产一女婴，产后第4天，双乳房胀痛，乳汁排流不畅，最常见的原因是
A. 进食少
B. 卧床时间长、活动少
C. 未及早按摩、热敷乳房
D. 未给新生儿早吸吮、多吸吮
E. 乳头凹陷
65. 某孕妇，孕38周，头先露，临产10小时，助产娩出一体重2800g活女婴。15分钟后娩出胎盘，子宫间歇性出血300ml，检查：胎盘胎膜完整，宫体柔软，呈袋状，经按摩宫缩好转，出血量减少，宫颈未见损伤，阴道伤口出血不多。其出血原因最可能是
A. 软产道损伤
B. 子宫收缩乏力
C. 胎盘、胎膜残留
D. 凝血功能障碍
E. 子宫循环血量增多
66. 李某，女，28岁。因“足月妊娠”入院。经测量孕妇坐骨结节间径为8cm，被告知“出口横径狭窄”，病人询问正常出口横径的正常值应为
A. 11cm
B. 10cm
C. 9.5cm
D. 9cm
E. 8.5cm
67. 一新生儿，男，生后1周，胎龄32周。外周血血红蛋白140g/L。其母咨询补充铁剂的时间
A. 立即开始
B. 生后1个月
C. 生后2个月
D. 生后3个月
E. 无需补充
68. 患儿女，4个月，体重6kg。生后不久即出现腹泻，大便每日4~5次，黄色稀糊状，无特殊臭味，食欲好，无呕吐，母乳喂养，未加辅食。腹泻原因最可能为
A. 生理性腹泻
B. 慢性腹泻
C. 迁延性腹泻

- D. 真菌性肠炎
E. 病毒性肠炎

69. 患儿女，1岁。因发热、拒食3天就诊。查体：精神不振，咽部充血，咽腭弓软腭可见疱疹，心肺听诊无异常，诊断：疱疹性咽峡炎。病原体为
A. 呼吸道合胞病毒
B. 腺病毒
C. 流感病毒
D. 柯萨奇病毒
E. 冠状病毒

二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息，在每道题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(70~72题共用病例)

患者，女性，33岁。月经量增多、牙龈出血，伴头晕、心悸1年。双下肢有散在瘀斑，肝脾未触及。实验室检查：RBC $2.13 \times 10^{12}/L$ ，WBC $3.1 \times 10^9/L$ ，BPC $38 \times 10^9/L$ ，Hb 65g/L，网织红细胞0.5%。骨髓有核细胞减少，淋巴细胞占33%，粒系及红系减少，巨核细胞明显减少。骨髓铁染色细胞外铁(+++).

70. 病人最可能的诊断是
A. 急性白血病
B. 原发性血小板减少性紫癜
C. 再生障碍性贫血
D. 缺铁性贫血
E. 巨幼细胞性贫血
71. 首选治疗药物是
A. 糖皮质激素
B. 雄激素
C. 输血
D. 长春新碱
E. 硫酸亚铁

72. 如果疗效欠佳，下列哪种治疗较有前途
A. 环孢素
B. 干扰素
C. 胎肝输注
D. 自体干细胞移植
E. 同胞骨髓移植

(73~74题共用病例)

患者，男性，45岁，原发性甲亢入院治疗。

清晨未起床前测病人脉率 115 次/分, 血压 18.7/12kPa (140/90mmHg), 拟先给予复方碘化钾溶液等进行充分术前准备后, 择期行甲状腺大部切除术。

73. 按简便公式计算, 该病人的基础代谢率 (BMR) 为

- A. 44%
- B. 50%
- C. 54%
- D. 60%
- E. 64%

74. 术前服用碘剂的作用是

- A. 促进甲状腺素合成
- B. 抑制甲状腺素合成
- C. 抑制甲状腺素释放
- D. 减少促甲状腺激素分泌
- E. 对抗甲状腺素作用

(75~76 题共用病例)

患者右侧胸部被匕首刺伤半小时急诊入院, 自诉胸痛, 呼吸急促, 口唇发绀。查体: 脉搏 110 次/分, 血压 9.3/5.3kPa (70/40mmHg)。右侧胸壁有伤口, 呼吸时能听到空气出入伤口的响声, 气管移向健侧。患侧叩诊呈鼓音。

75. 应首先考虑此患者为

- A. 开放性气胸
- B. 闭合性气胸
- C. 张力性气胸
- D. 损伤性血胸
- E. 胸壁软组织刺伤

76. 引起病人休克的主要原因是

- A. 血容量不足
- B. 纵隔摆动、回心血量减少
- C. 伤侧肺完全萎陷
- D. 心脏受压
- E. 健侧肺部分受压

(77~78 题共用病例)

甲亢患者, 突然出现烦躁不安、高热、大汗淋漓、心率加快、血压骤升。

77. 该患者可能发生了

- A. T_3 型甲状腺功能亢进
- B. 甲状腺功能亢进性心脏病
- C. 淡漠型甲状腺功能亢进
- D. 黏液性水肿
- E. 甲状腺危象

78. 该患者正确的治疗原则为

- A. 迅速阻断儿茶酚胺的释放
- B. 迅速增加甲状腺激素的合成和释放
- C. 促使甲状腺球蛋白释出
- D. 纠正肾上腺髓质功能不全
- E. 增加周围组织对甲状腺激素的反应

(79~80 题共用病例)

患儿女, 6 个月, 8 个月早产, 出生体重 2200g, 母乳喂养, 现体重 8kg。家长发现孩子多汗、夜惊。查体: 精神好, 前囟 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$, 平软, 可见枕秃, 心肺听诊无异常。

79. 最可能的诊断为

- A. 先天性甲状腺机能低下
- B. 软骨营养不良
- C. 维生素 A 缺乏
- D. VitD 缺乏性佝偻病
- E. 营养不良

80. 该病最主要的病因为

- A. 日光照射不足
- B. 生长发育迅速
- C. 慢性腹泻
- D. 药物影响
- E. 人工喂养

三、以下提供若干组考题, 每组考题共使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次, 多次或不被选择。

(81~83 题共用备选答案)

- A. 硝普钠
- B. 硝酸甘油
- C. 酚妥拉明
- D. 呋塞米
- E. 肾上腺素

81. 扩张动静脉, 降低前后负荷

82. 扩张动脉, 减轻后负荷

83. 扩张静脉, 减轻前负荷

(84~86 共用备选答案)

- A. 生理盐水
- B. 牛奶
- C. 弱碱性液体
- D. 液体石蜡
- E. 活性炭

84. 误服浓氨水时可用的保护剂是

85. 误服强酸时可使用的中和剂是

86. 误服强酸时可使用的解毒剂是

(87~88 题共用备选答案)

- A. 代谢性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 混合性酸碱平衡紊乱

87. 中度休克患者易出现

88. 溺水窒息患者易出现

(89~90 题共用备选答案)

- A. 孟氏骨折
- B. 盖氏骨折
- C. Colles 骨折
- D. Smith 骨折
- E. Barton 骨折

89. 桡骨下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位称为

90. 伸直型桡骨下端骨折称为

(91~93 题共用备选答案)

- A. 胎产式
- B. 胎先露
- C. 胎方位
- D. 胎姿势
- E. 胎儿

91. 胎儿纵轴与母体纵轴之间的关系

92. 最先进入母体骨盆入口的胎儿部分

93. 胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系

(94 题备选答案)

- A. 先天性铁储存不足
- B. 铁摄入不足
- C. 铁丢失过多
- D. 铁吸收减少
- E. 生长发育快

94. 青春期少女发生缺铁的主要原因是

四、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择备选答案中所有正确答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

95. 控制支气管哮喘发作可根据病情选择应用

- A. 茶碱类药物
- B. β_2 受体激动药
- C. 脱敏治疗
- D. 糖皮质激素
- E. 色甘酸钠

96. “三偏征”是指

- A. 偏瘫
- B. 听力障碍
- C. 偏身感觉障碍
- D. 同向性偏盲
- E. 语言障碍

97. 麻醉前用药的目的在于

- A. 消除病人对手术的恐惧和紧张情绪
- B. 提高病人痛觉阈值，增强止痛效果
- C. 减少呼吸道分泌物，防止误吸
- D. 消除因手术或麻醉引起的不良反射
- E. 预防手术后感染

98. 胆囊结石可引起的病理改变包括

- A. 梗阻胆囊管致急性胆囊炎
- B. 导致慢性胆囊炎
- C. 胆囊积液
- D. Mirizzi 综合征
- E. 致胆囊肠道瘘

99. 下面可以推算孕龄的项目是

- A. 末次月经
- B. 早孕反应的时间
- C. 胎动出现的时间
- D. 手测宫底高度
- E. 羊水振荡试验

100. 学龄前期和学龄期儿童惊厥的常见病因包括

- A. 颅脑外伤
- B. 脑肿瘤
- C. 脑脓肿
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 癫痫

参考答案

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. E | 3. C |
| 4. C | 5. C | 6. B |
| 7. C | 8. B | 9. C |
| 10. D | 11. A | 12. A |
| 13. B | 14. D | 15. B |
| 16. A | 17. B | 18. D |
| 19. C | 20. D | 21. A |
| 22. B | 23. E | 24. C |
| 25. E | 26. E | 27. B |
| 28. B | 29. C | 30. A |
| 31. D | 32. B | 33. E |
| 34. D | 35. A | 36. E |

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|------------|-----------|----------|
| 37. B | 38. D | 39. B | 70. C | 71. B | 72. E |
| 40. D | 41. A | 42. E | 73. C | 74. C | 75. A |
| 43. C | 44. C | 45. E | 76. B | 77. E | 78. A |
| 46. D | 47. D | 48. D | 79. D | 80. A | 81. A |
| 49. C | 50. A | 51. A | 82. C | 83. B | 84. B |
| 52. C | 53. B | 54. C | 85. C | 86. D | 87. A |
| 55. D | 56. B | 57. D | 88. C | 89. A | 90. C |
| 58. C | 59. B | 60. A | 91. A | 92. B | 93. C |
| 61. D | 62. B | 63. B | 94. C | 95. DE | 96. ACD |
| 64. D | 65. B | 66. D | 97. ABCD | 98. ABCDE | 99. ABCD |
| 67. C | 68. A | 69. D | 100. ABCDE | | |

相关专业知识

- 一、以下每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
- 下列哪项可导致红细胞和血红蛋白值下降
 - 频繁腹泻
 - 连续呕吐
 - 大面积烧伤
 - 肺源性心脏病
 - 妊娠后期
 - 成人脉压差大于 40mmHg 可见于
 - 甲状腺功能减退
 - 主动脉瓣关闭不全
 - 心包积液
 - 严重二尖瓣狭窄
 - 主动脉瓣狭窄
 - 痰液恶臭提示有
 - 病毒感染
 - 厌氧菌感染
 - 衣原体感染
 - 支原体感染
 - 结核杆菌感染
 - 病人面颊潮红，兴奋不安，呼吸急促，痛苦呻吟，属于
 - 满月面容
 - 二尖瓣面容
 - 急性病容
 - 甲亢面容
 - 慢性病容
 - 触诊可以补充
 - 嗅诊所不能确定的体征
 - 叩诊所不能确定的体征
 - 听诊所不能确定的体征
 - 视诊所不能确定的体征
 - 问诊所不能确定的体征
 - 下列哪项符合急性菌痢的化验结果
 - 深褐色软便
 - 黏液脓性便，经检查 WBC (++++), RBC (++)，脓细胞 (++)
 - 软便，镜检未见异常
 - 稀便，镜检见脂肪滴
 - 稀糊便，镜检未见异常
 - 下列哪项体征提示伴有严重呼吸困难的重症哮喘病人病情严重
 - 颈静脉怒张
 - 叩诊过清音
 - 发绀
 - 听诊哮鸣音减弱或消失
 - 双肺布满干、湿性啰音
 - 正常人肺部的叩诊音是
 - 清音
 - 实音
 - 鼓音
 - 过清音
 - 浊音
 - 对可疑糖尿病病人最有诊断价值的检查是
 - 空腹血糖
 - 血浆胰岛素
 - 24 小时尿糖定量
 - 口服葡萄糖耐量试验
 - 胰岛素抗体测定
 - 确诊肺结核最特异的方法是
 - X 线检查
 - CT 检查
 - 痰结核菌检查
 - PPD 试验
 - B 超
 - 确诊 COPD 最特异的方法是
 - X 线检查
 - 纤维支气管镜检查
 - 肺功能检查
 - PEF 检查
 - CT 检查
 - 肺炎球菌肺炎在红色肝样变期痰呈
 - 黑色
 - 黄色
 - 粉红色
 - 铁锈色
 - 绿色
 - 细菌性肺炎最常见的病原菌是
 - 葡萄球菌
 - 大肠杆菌
 - 肺炎球菌
 - 铜绿假单胞菌

- E. 沙眼衣原体
14. 水冲脉的特点
- 脉搏不规则的搏动
 - 平静吸气时脉搏显著减弱
 - 脉搏强-弱交替出现
 - 脉搏骤起骤落
 - 以上都不对
15. B超不适用于
- 肝脏检查
 - 胆囊检查
 - 子宫检查
 - 胰腺检查
 - 骨骼检查
16. 心电图图中，P波表示
- 心房除极波
 - 右心房除极波
 - 左心房除极波
 - 心室除极波
 - 心室复极波
17. 最能反映贫血的实验室检查指标是
- 红细胞计数
 - 网织红细胞计数
 - 血红蛋白测定
 - 红细胞沉降率
 - 红细胞比容测定
18. 尿呈烂苹果气味的疾病是
- 膀胱直肠瘘
 - 肝硬化
 - 膀胱炎
 - 糖尿病酮症酸中毒
 - 肝性脑病
19. 粪便隐血实验检查前避免食用大量
- 蛋类
 - 动物肝、血
 - 面食
 - 甜食
 - 水果
20. 护理慢性肾功能衰竭病人，每天最重要的是
- 测血压
 - 记录24小时出入量
 - 测体重
 - 测体温
 - 尿常规检查
21. 用于冲洗外伤伤口，预防厌氧菌感染的外用药物是
- 呋喃西林
 - 生理盐水
 - 新洁尔灭（苯扎氯铵）
 - 过氧化氢
 - 洗必泰（氯己定）
22. 关于低钾血症的治疗，下列哪项错误
- 口服钾盐最为安全
 - 严重缺钾者，以10%氯化钾10ml静脉缓慢推注
 - 补钾前了解肾功能，要求尿量在30ml/小时以上
 - 24小时内补钾量不宜超过6~8克
 - 必要时进行心电监护
23. 测定中心静脉压（CVP）时，测压玻璃上的零点应与
- 平卧位第四肋间与锁骨中线交点在同一平面
 - 平卧位第四肋间与腋前线交点在同一平面
 - 平卧位第四肋间与腋中线交点在同一平面
 - 平卧位第四肋间与腋后线交点在同一平面
 - 以上都不是
24. 诊断食管癌时，下列哪项不是常规检查
- X线钡餐检查
 - 食管拉网细胞学检查
 - 食管镜检查
 - 纵隔镜检查
 - CT
25. 急性梗阻性化脓性胆管炎最关键的治疗措施是
- 及时使用抗生素
 - 应用肾上腺皮质激素
 - 用升压药
 - 紧急胆道减压手术
 - 纠正体液失衡
26. 急性骨髓炎患者，骨膜下穿刺抽出脓液后，最重要的治疗是
- 应用大剂量抗生素
 - 石膏托固定局部
 - 局部钻孔、开窗引流
 - 降温、补液
 - 全身支持疗法
27. 可作为肿瘤定性诊断的检查是