



College Mathematics Guidance Series

大学数学学习辅导丛书

高等学校经济管理学科数学基础

主编 范培华 胡显佑

线性代数中的 典型例题分析与习题

第二版

中国人民大学 卢 刚 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



College Mathematics Guidance Series
大学数学学习辅导丛书

高等学校经济管理学科数学基础

主编 范培华 胡显佑

线性代数中的 典型例题分析与习题

第二版

中国人民大学 卢 刚 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书作为“面向 21 世纪课程教材”——《高等学校经济管理学科数学基础:线性代数(第三版)》的配套辅导书,由主教材作者卢刚(第 1,2,5 章)和胡显佑(第 3,4 章)编写。为帮助读者系统地学习和掌握线性代数的主要内容和基本方法,各章都提纲挈领地列出了基本概念、重要定理和主要结论。作为教材的扩充,本书有针对性地精选了大量的例题和习题,帮助读者更好地理解基本概念,掌握基本的解题方法和解题思路。本书不仅适合于经济管理各学科本科生的学习需要,也是参加成人继续教育、高教自考读者的一本适用的参考书。对于有志考研的读者,本书也不失为一本很有价值的复习用书。

图书在版编目(CIP)数据

线性代数中的典型例题分析与习题/卢刚主编.

—2 版. —北京:高等教育出版社,2009.3

ISBN 978 - 7 - 04 - 026273 - 5

I. 线… II. 卢… III. 线性代数 - 高等学校 -
教学参考资料 IV. O151.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 023420 号

策划编辑 马 丽 责任编辑 张耀明 封面设计 张 楠
版式设计 陆瑞红 责任校对 王 超 责任印制 陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010 - 58581000
经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京市白帆印务有限公司

购书热线 010 - 58581118
免费咨询 800 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787 × 960 1/16
印 张 11.75
字 数 210 000

版 次 2004 年 1 月第 1 版
2009 年 3 月第 2 版
印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷
定 价 14.40 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 26273 - 00

第二版修订说明

作为“面向 21 世纪课程教材”——《高等学校经济管理学科数学基础:线性代数(第三版)》的配套辅导书,与主教材第三版的修订一致,本书也作了相应的修订。这次修订主要体现在以下几个方面:

1. 调整了部分章节的顺序,以方便读者与主教材配合使用。
2. 对典型例题和习题进行了适当的增删和调整,以便更好地适合教学要求和读者学习的需要。
3. 各章习题的配置改为:(A) 计算题与证明题,(B) 单项选择题两部分。
4. 增加或充实了一些习题的提示内容,特别是对于经常使初学者感到困难的证明题,提示中不仅说明了常用的证明思路,还较为详细地写出了基本的证明形式,以帮助读者学习和掌握基本的证明方法。对于单项选择题的解答,在给出正确答案的基础上,为了使读者更好地理解 and 掌握相关的基本概念,解答中不仅详细地说明了正确选项的选择理由,还解释了错误选项的错误所在。

与主教材相同,本书的第 1,2,5 章由原编者卢刚副教授修订,第 3,4 章由胡显佑教授修订。

我们衷心希望修订后的这本书更便于读者阅读和使用,并且期盼它能够给读者以更大的帮助!同时也盼望读者对于书中的错误和问题给以批评指正。

卢刚 胡显佑
2009 年 3 月

第一版前言

作为“面向 21 世纪课程教材”——《高等学校经济管理学科数学基础:线性代数(第二版)》的配套辅导书,本书有以下两个特点:

1. 紧密结合教材的学习。本书每一章均由三部分组成:“内容要点”、“典型例题分析”和“习题”。

在“内容要点”部分,整理出本章的主要概念、重要定理与结论及应掌握的基本计算,以便读者能够提纲挈领地掌握本章的主要脉络,了解本章的基本要求。

在“典型例题分析”部分,一般是在教材已有例题的基础上,进一步扩大了例题的覆盖面,考虑到不同读者的需要,适当增加部分例题的难度。例题一般分类列出,通过解题前的分析,说明常用的解题思路与方法,一些例题还给出了一题多解。在一类例题讨论之后,以小结的形式,说明需要注意的问题。在例题的选择上,本着“强调基本方法,增强分析能力,开阔解题思路,提高综合能力”的原则,使例题在覆盖面、难易搭配、题型构成等方面对教材内容做了大量补充。

在“习题”部分,结合读者对前两部分内容的学习,选配了相应的习题,并注意到基本题与综合题的搭配。其中(A)部分列出的是基本题;(B)部分列出的是综合题和提高题;而作为以理解概念为主的单项选择题,在(C)中列出。各类习题均给出了参考答案或解题提示。

2. 适合多层次读者的需要。本书虽主要是作为经济管理学科本科学生的学习辅导书,实际上也适合参加成人教育、高教自考、学历文凭考试等读者的学习需要。同时考虑到读者中的许多人还有考研的要求,书中的例题和习题有针对性地选择了一些全国研究生统考中的有代表性的试题,因此本书也是考研的一本系统的复习参考书。

希望本书能够对各方面读者的学习有所帮助和启发!也盼望大家能对书中的问题和不足给以批评和指正。

卢刚 胡显佑
2004 年 3 月

目 录

第 1 章 矩阵	1
(一) 内容要点	1
(二) 典型例题分析	6
习题一	34
(A) 计算题与证明题	34
(B) 单项选择题	41
第 2 章 线性方程组	43
(一) 内容要点	43
(二) 典型例题分析	49
习题二	65
(A) 计算题与证明题	65
(B) 单项选择题	69
第 3 章 矩阵的特征值和特征向量	73
(一) 内容要点	73
(二) 典型例题分析	74
习题三	98
(A) 计算题与证明题	98
(B) 单项选择题	101
第 4 章 二次型	103
(一) 内容要点	103
(二) 典型例题分析	105
习题四	127
(A) 计算题与证明题	127
(B) 单项选择题	129
第 5 章 线性空间与线性变换	131
(一) 内容要点	131
(二) 典型例题分析	135
习题五	151
习题参考答案与提示	156
习题一	156
(A) 计算题与证明题	156

(B) 单项选择题	164
习题二	165
(A) 计算题与证明题	165
(B) 单项选择题	169
习题三	171
(A) 计算题与证明题	171
(B) 单项选择题	173
习题四	173
(A) 计算题与证明题	173
(B) 单项选择题	176
习题五	177

第1章 矩 阵

(一) 内 容 要 点

1. 矩阵的概念

(1) 矩阵的定义

由数域 F 中的 $m \times n$ 个数 $a_{ij}, i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$, 排成的一个 m 行 n 列的表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为数域 F 上的一个 $m \times n$ 矩阵, 记作 A 或 $A = (a_{ij})_{m \times n}$. 其中 a_{ij} 称为 A 的第 i 行第 j 列的元, $i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$.

当 $m=n$ 时, 称 A 为一个 n 阶矩阵或 n 阶方阵.

(2) 矩阵相等

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}, B = (b_{ij})_{s \times r}$, 则 $A = B \Leftrightarrow m = s, n = r$, 且 $a_{ij} = b_{ij}, i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$.

(3) 零矩阵

$A = (a_{ij})_{m \times n}$ 为零矩阵 (记作 $A = O$) $\Leftrightarrow a_{ij} = 0, i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$. 因此若 $A \neq O$, 则 A 至少存在一个元 $a_{ij} \neq 0$.

(4) 方阵的行列式

对于 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 记号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为 A 的行列式, 记作 $\det A$, 或 $|A|$, 或 $|a_{ij}|$.

行列式的递推定义:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} (i=1, 2, \dots, n) \text{ 或 } \det A = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij} (j=1, 2, \dots, n),$$

其中 A_{ij} 是元 a_{ij} 的代数余子式, $i, j = 1, 2, \dots, n$.

注 有些教材中给出的是另一种形式的定义, 可称之为“逆序数定义”:

$$\det A = \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n},$$

其中 $j_1 j_2 \dots j_n$ 为任意一个 n 级排列, $\tau(j_1 j_2 \dots j_n)$ 为该排列的逆序数.

需注意的是, 矩阵是一个表, 而行列式是按一定规则确定的一个数 (一些乘积的代数和). 而且只有方阵才能定义行列式. 同时, 矩阵与行列式的符号也不相同.

2. 矩阵的运算

(1) 加法

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$, 则 $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$.

加法满足以下运算法则:

$$A + B = B + A; (A + B) + C = A + (B + C); A + O = A; A + (-A) = O.$$

其中 $-A$ 称为 A 的负矩阵, $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$.

(2) 数乘

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, k 为常数, 则 $kA = (ka_{ij})_{m \times n}$.

数乘满足以下运算法则:

$$k(A + B) = kA + kB; (k + l)A = kA + lA; k(lA) = l(kA) = (kl)A.$$

其中 A, B 为矩阵, k, l 为常数.

(3) 乘法

设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 则 $AB = C = (c_{ij})_{m \times n}$, 其中 $c_{ij} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$,
 $i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$.

乘法满足以下运算法则:

$$(AB)C = A(BC); A(B + C) = AB + AC; (B + C)D = BD + CD;$$

$$k(AB) = (kA)B = A(kB).$$

其中 A, B, C, D 为矩阵, k 为常数.

(4) 转置

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 将 A 的行与列位置互换, 得到的 $n \times m$ 矩阵称为 A 的转置矩阵, 记作 A^T 或 A' , 即

$$A^T = (a_{ji})_{n \times m} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

转置满足以下运算法则:

$$(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}; (\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T; (k\mathbf{A})^T = k\mathbf{A}^T; (\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T.$$

其中 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为矩阵, k 为常数.

3. 行列式的性质

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$.

性质 1 $\det \mathbf{A}^T = \det \mathbf{A}$.

性质 2 交换 $\mathbf{A}$ 的某两行(或某两列)得到矩阵 $\mathbf{B}$, 则 $\det \mathbf{B} = -\det \mathbf{A}$.

推论 若 $\mathbf{A}$ 有两行(或两列)完全相同, 则 $\det \mathbf{A} = 0$.

性质 3 如果用数 k 乘 $\mathbf{A}$ 的某一行(或某一列), 得到矩阵 $\mathbf{B}$, 则 $\det \mathbf{B} = k \det \mathbf{A}$.

性质 3 也可表述为: 行列式某一行(或某一列)的公因子可以提到行列式外.

推论 1 若 $\mathbf{A}$ 有一行(或一列)元全为零, 则 $\det \mathbf{A} = 0$.

推论 2 若 $\mathbf{A}$ 有两行(或两列)元成比例, 则 $\det \mathbf{A} = 0$.

性质 4 若行列式的某一行(或某一列)的每个元均表示为两个数的和, 则该行列式可以表示为两个行列式的和, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

或

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} + c_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} + c_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} + c_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & c_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & c_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

性质 5 将 $\mathbf{A}$ 的某一行(或某一列)的 k 倍加到另一行(或另一列)上, 得到矩阵 $\mathbf{B}$, 则 $\det \mathbf{B} = \det \mathbf{A}$.

由行列式定义和性质可推出:

定理 1.2 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, 则

$$\begin{aligned} (1) \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{jk} &= \begin{cases} \det \mathbf{A}, & \text{若 } i=k, \\ 0, & \text{若 } i \neq k \end{cases} (i, k=1, 2, \cdots, n); \\ (2) \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{il} &= \begin{cases} \det \mathbf{A}, & \text{若 } j=l, \\ 0, & \text{若 } j \neq l \end{cases} (j, l=1, 2, \cdots, n). \end{aligned}$$

由行列式性质和矩阵乘法还可以得到:

对于 n 阶矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \det \mathbf{B}$.

此结果可以推广为有限个 n 阶矩阵乘积的情况.

范德蒙德行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j).$$

当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 两两互不相同, $D_n \neq 0$.

4. 矩阵的分块及分块矩阵的运算

需注意的是:两个分块矩阵 A 与 B 相加时,要求 A 与 B 的分块方式必须完全相同;而两个分块矩阵 A 与 B 作乘法 AB 时,要求 A 的列的分块方式与 B 的行的分块方式相同,并且乘积矩阵的行的分块方式与 A 的相同,列的分块方式与 B 的相同.

5. 可逆矩阵

(1) 可逆矩阵的几个充分必要条件

n 阶矩阵 A 可逆 $\Leftrightarrow$ 存在 n 阶矩阵 B , 使 $AB = BA = E$

$\Leftrightarrow A$ 非奇异(或非退化), 即 $\det A \neq 0$

$\Leftrightarrow A$ 的等价标准形为 E

$\Leftrightarrow A$ 可以表示为有限个 n 阶初等矩阵的乘积

$\Leftrightarrow r(A) = n$.

注 在后面几章中,还会学到一些关于 n 阶矩阵 A 可逆的充分必要条件,现列举如下:

n 阶矩阵 A 可逆 $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解(第2章)

$\Leftrightarrow A$ 的行(列)向量组线性无关(第2章)

$\Leftrightarrow \mathbf{R}^n$ 中任意一个 n 维列(行)向量均可以表示为 A 的列(行)向量组的线性组合,且表示法惟一(第2章)

$\Leftrightarrow A$ 的行(列)向量组为 $\mathbf{R}^n$ 的一组基(第3章)

$\Leftrightarrow A$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的某两组基之间的过渡矩阵(第5章)

$\Leftrightarrow A$ 的特征值均不为零(第3章)

$\Leftrightarrow A^T A$ 为正定矩阵(第4章)

(2) 可逆矩阵的性质

设 A, B 均为 n 阶($n \geq 2$)可逆矩阵, k 为非零常数, 则

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}; (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T; (kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1};$$

$$\det A^{-1} = (\det A)^{-1} = \frac{1}{\det A}; \det A^* = (\det A)^{n-1}; (A^*)^{-1} = \frac{1}{\det A}A.$$

(3) 求逆矩阵的伴随矩阵法

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \mathbf{A}^* = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

(4) 几种特殊的分块矩阵的逆矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 m 阶可逆矩阵, $\mathbf{B}$ 为 n 阶可逆矩阵, $\mathbf{C}$ 为任意 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{D}$ 为任意 $n \times m$ 矩阵, 则

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \end{pmatrix}; & \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \end{pmatrix}; & \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{D} & \mathbf{B} \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{B}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{B}^{-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

6. 矩阵的初等变换与初等矩阵

(1) 初等变换

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, 则

第一种初等变换: 交换 $\mathbf{A}$ 的某两行(或某两列);

第二种初等变换: 用非零常数 k 乘 $\mathbf{A}$ 的某一行(或某一列);

第三种初等变换: 将 $\mathbf{A}$ 某一行(或某一列)的 k 倍加到另一行(或另一列)上.

(2) 初等矩阵

第一种初等矩阵: 交换 $\mathbf{E}$ 的第 i 行(列)与第 j 行(列)得到的矩阵, 记作 $\mathbf{P}(i, j)$;

第二种初等矩阵: 用非零常数 k 乘 $\mathbf{E}$ 的第 i 行(列)得到的矩阵, 记作 $\mathbf{P}(i(k))$;

第三种初等矩阵: 将 $\mathbf{E}$ 的第 i 行(列)的 k 倍加到第 j 行(列)上, 得到的矩阵, 记作 $\mathbf{P}(i(k), j)$.

初等矩阵的性质:

$$\mathbf{P}(i, j)^T = \mathbf{P}(i, j); \mathbf{P}(i(k))^T = \mathbf{P}(i(k)); \mathbf{P}(i(k), j)^T = \mathbf{P}(j(k), i);$$

$$\mathbf{P}(i, j)^{-1} = \mathbf{P}(i, j); \mathbf{P}(i(k))^{-1} = \mathbf{P}\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right); \mathbf{P}(i(k), j)^{-1} = \mathbf{P}(i(-k), j).$$

(3) 对矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ 进行一次初等行变换, 相当于用一个 m 阶初等矩阵左乘 $\mathbf{A}$; 进行一次初等列变换, 相当于用一个 n 阶初等矩阵右乘 $\mathbf{A}$.

(4) 任意 n 阶可逆矩阵 $\mathbf{A}$ 均可以表示为有限个 n 阶初等矩阵的乘积.

(5) 求逆矩阵的初等行(列)变换法:

$$\begin{aligned} (A \mid E) &\xrightarrow{\text{初等行变换}} (E \mid A^{-1}); \\ \begin{pmatrix} A \\ \vdots \\ E \end{pmatrix} &\xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ \vdots \\ A^{-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

7. 矩阵的秩

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$,

(1) $r(A) = k \Leftrightarrow A$ 至少存在一个 k 阶子式不为零, 并且所有的 $k+1$ 阶子式全为零;

(2) $r(A) \leq \min(m, n)$;

(3) $r(A) = k \Leftrightarrow A$ 的等价标准形 $\tilde{A}$ 的分块矩阵一般形式为

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} E_k & O \\ O & O \end{pmatrix};$$

特别地, 当 $r(A) = m < n$ 时, $\tilde{A} = (E_m, O)$;

当 $r(A) = n < m$ 时, $\tilde{A} = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}$;

当 $r(A) = m = n$ 时, $\tilde{A} = E$.

(4) 初等变换不改变矩阵的秩;

(5) 用初等行变换法求矩阵的秩.

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} B \text{ (梯形矩阵)},$$

则

$r(A) = r(B) = B$ 的非零行即“阶梯”个数.

(二) 典型例题分析

1. 有关矩阵的概念与运算

例 1 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若存在矩阵 X , 满足 $AX = XA$, 则称 X 与 A 可交

换. 试求出所有与 A 可交换的矩阵.

分析 由矩阵乘法可知, 与 3 阶矩阵 A 可交换的矩阵必为 3 阶矩阵. 一般采用的计算形式是:

设

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}$$

与 A 可交换, 然后分别计算 AX 与 XA , 再由 $AX = XA$ 推出 X 的元所具有的结构, 但注意到

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

记作 $A = E + B$, 而

$$AX = (E + B)X = EX + BX = X + BX,$$

$$XA = X(E + B) = XE + XB = X + XB.$$

显然

$$AX = XA \Leftrightarrow BX = XB.$$

由于 B 中的零元较 A 更多, 故 BX 与 XB 的计算结果更加简单.

$$\text{解 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E + B.$$

设

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}$$

与 A 可交换, 则 $AX = XA \Leftrightarrow BX = XB$. 其中

$$BX = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$XB = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & x_{11} & x_{12} \\ 0 & x_{21} & x_{22} \\ 0 & x_{31} & x_{32} \end{pmatrix},$$

由 $BX = XB$ 推出 $x_{21} = 0, x_{31} = 0, x_{32} = 0, x_{11} = x_{22} = x_{33}, x_{12} = x_{23}$. 从而所有与 A 可交换的矩阵形如

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ 0 & x_{11} & x_{12} \\ 0 & 0 & x_{11} \end{pmatrix},$$

其中 x_{11}, x_{12}, x_{13} 为任意常数.

评注 本题计算思路的关键是利用单位矩阵在矩阵乘法中的特殊作用, 此外正确地运用矩阵加法与乘法的分配律也是非常重要的. 对于结构特殊的矩阵, 通过分解可以简化矩阵的乘法计算. 在后面有关方阵的方幂和矩阵求逆的计算

中,还会用到这种思路.

例 2 设对角矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}$, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两互不相

同. 证明: 与 A 可交换的矩阵只能是对角矩阵.

解 显然, 与 n 阶对角矩阵 A 可交换的矩阵必为 n 阶矩阵. 设

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

与 A 可交换. 由 $AX = XA$, 有

$$\begin{pmatrix} a_1 x_{11} & a_1 x_{12} & \cdots & a_1 x_{1n} \\ a_2 x_{21} & a_2 x_{22} & \cdots & a_2 x_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n x_{n1} & a_n x_{n2} & \cdots & a_n x_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 x_{11} & a_2 x_{12} & \cdots & a_n x_{1n} \\ a_1 x_{21} & a_2 x_{22} & \cdots & a_n x_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 x_{n1} & a_2 x_{n2} & \cdots & a_n x_{nn} \end{pmatrix},$$

得到

$$a_i x_{ij} = a_j x_{ij}, \text{ 或 } (a_i - a_j) x_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, \dots, n),$$

由于当 $i \neq j$ 时 $a_i \neq a_j$, 从而由上式必可推出 $x_{ij} = 0 (i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n)$, 即 X 的主对角线以外的元全为零. 故

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & & & \\ & x_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_{nn} \end{pmatrix}, \text{ 其中 } x_{ii} \text{ 为任意常数 } (i = 1, 2, \dots, n).$$

说明 由于 $AX = XA \Leftrightarrow AX(i; j) = XA(i; j) (i, j = 1, 2, \dots, n)$. 而由矩阵乘法, $AX(i; j) = a_i x_{ij}$, $XA(i; j) = a_j x_{ij}$, 由此推出 $a_i x_{ij} = a_j x_{ij}$, 即 $(a_i - a_j) x_{ij} = 0$, 再由 $a_i \neq a_j$, 得到 $x_{ij} = 0 (i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n)$. 这样可使证明形式更简洁些.

例 3 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 证明:

(1) 若 A 为对称矩阵, B 为反称矩阵, 则 AB 为反称矩阵的充分必要条件是 A 与 B 可交换;

(2) 若 A, B 满足 $A^2 = E, B^2 = E$, 则 $(AB)^2 = E$ 的充分必要条件是 A 与 B 可交换.

证明 (1) 已知 $A^T = A, B^T = -B$.

必要性(由 $(AB)^T = -AB$, 证明 $AB = BA$):

由于 $(\mathbf{AB})^T = -\mathbf{AB}$, 另一方面

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = -\mathbf{BA},$$

从而得到

$$-\mathbf{AB} = -\mathbf{BA},$$

即 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$;

充分性(由 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 证明 $(\mathbf{AB})^T = -\mathbf{AB}$):

由于 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 故

$$(\mathbf{AB})^T = (\mathbf{BA})^T = \mathbf{A}^T \mathbf{B}^T = \mathbf{A}(-\mathbf{B}) = -\mathbf{AB},$$

即 $\mathbf{AB}$ 为反称矩阵.

(2) 已知 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{E}, \mathbf{B}^2 = \mathbf{E}$.

必要性(由 $(\mathbf{AB})^2 = \mathbf{E}$, 证明 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$):

由于 $(\mathbf{AB})^2 = \mathbf{E}$, 即

$$(\mathbf{AB})^2 = (\mathbf{AB})(\mathbf{AB}) = \mathbf{ABAB} = \mathbf{E},$$

用 $\mathbf{A}$ 左乘, $\mathbf{B}$ 右乘式 $\mathbf{ABAB} = \mathbf{E}$ 两边, 得到

$$\mathbf{A}^2 \mathbf{BAB}^2 = \mathbf{AEB} = \mathbf{AB},$$

即

$$\mathbf{EBAE} = \mathbf{BA} = \mathbf{AB}.$$

充分性(由 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 证明 $(\mathbf{AB})^2 = \mathbf{E}$):

由于 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 故

$$(\mathbf{AB})^2 = (\mathbf{AB})(\mathbf{AB}) = \mathbf{A}(\mathbf{BA})\mathbf{B} = \mathbf{A}(\mathbf{AB})\mathbf{B} = \mathbf{A}^2 \mathbf{B}^2 = \mathbf{EE} = \mathbf{E},$$

即

$$(\mathbf{AB})^2 = \mathbf{E}.$$

例 4 单项选择题

下列结论中, 不正确的是().

(A) 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶矩阵, 则 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{A} + \mathbf{E}) = \mathbf{A}^2 - \mathbf{E}$

(B) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 $n \times 1$ 矩阵, 则 $\mathbf{A}^T \mathbf{B} = \mathbf{B}^T \mathbf{A}$

(C) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 n 阶矩阵, 且满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 则 $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 = \mathbf{A}^2 + \mathbf{B}^2$

(D) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 n 阶矩阵, 且满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 则对任意正整数 k, m , 有 $\mathbf{A}^k \mathbf{B}^m = \mathbf{B}^m \mathbf{A}^k$

分析 (A) 由矩阵加法与乘法的分配律, 有

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{A} + \mathbf{E}) = \mathbf{A}^2 + \mathbf{AE} - \mathbf{EA} - \mathbf{E}^2 = \mathbf{A}^2 + \mathbf{A} - \mathbf{A} - \mathbf{E} = \mathbf{A}^2 - \mathbf{E}.$$

(B) 由于 $\mathbf{A}^T \mathbf{B}$ 与 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}$ 均为 1 阶矩阵, 而 1 阶矩阵的转置仍为其自身, 即 $(\mathbf{A}^T \mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}$, 且 $(\mathbf{A}^T \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T \mathbf{B}$, 从而 $\mathbf{A}^T \mathbf{B} = \mathbf{B}^T \mathbf{A}$.

(C) 由 $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 = (\mathbf{A} + \mathbf{B})(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \mathbf{A}^2 + \mathbf{AB} + \mathbf{BA} + \mathbf{B}^2$, 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 则

不一定有 $BA = O$ (例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 而 $BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$). 因此, $(A+B)^2 = A^2 + B^2$ 不一定成立. 故(C) 不正确.

(D) 当 $AB = BA$ 时, 可利用数学归纳法证明 $A^k B^m = B^m A^k$ (见本章例 7(1)).

解 应选(C).

2. 求方阵的方幂(1)^①

例 5 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 对任意正整数 $n \geq 2$, 求 $A^n - 2A^{n-1}$.

解 $n=2$ 时, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2A$,

由此可推出

$$A^n = A^2 A^{n-2} = (2A) A^{n-2} = 2A^{n-1},$$

从而

$$A^n - 2A^{n-1} = O_{3 \times 3}.$$

注 此题求解中, 得到 $A^2 = 2A$, $A^3 = A^2 A = 2A^2 = 2^2 A$, $\dots$, 可归纳出 $A^n = 2^{n-1} A$, 这也是一种求 A^n 的方法.

例 6 设 $\alpha = (1, 0, -1)^T$, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T$, 对于任意正整数 n , 求 A^n .

分析 由于 $\alpha = (1, 0, -1)^T$, 故 $A = \alpha\alpha^T$ 为 3 阶矩阵, 但 $\alpha^T \alpha$ 为一阶矩阵, 即一个数. 而

$$\begin{aligned} A^n &= (\alpha\alpha^T)(\alpha\alpha^T)\cdots(\alpha\alpha^T) = \alpha(\alpha^T\alpha)(\alpha^T\alpha)\cdots(\alpha^T\alpha)\alpha^T \\ &= \alpha(\alpha^T\alpha)^{n-1}\alpha^T = (\alpha^T\alpha)^{n-1}\alpha\alpha^T = (\alpha^T\alpha)^{n-1}A. \end{aligned}$$

解 由于 $\alpha = (1, 0, -1)^T$, $A = \alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} (1, 0, -1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} A^n &= (\alpha\alpha^T)(\alpha\alpha^T)\cdots(\alpha\alpha^T) = \alpha(\alpha^T\alpha)(\alpha^T\alpha)\cdots(\alpha^T\alpha)\alpha^T \\ &= (\alpha^T\alpha)^{n-1}\alpha\alpha^T = (\alpha^T\alpha)^{n-1}A, \end{aligned}$$

其中 $\alpha^T\alpha = (1, 0, -1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 2$, 从而

^① 在第 3 章还会给出另外的计算方法, 故此处标记(1).