

疾病中草药原色图谱丛书

烧伤烫伤

中草药原色图谱

主 编

黄燮才

广西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

烧伤烫伤中草药原色图谱/黄燮才主编. —南宁:广西科学技术出版社, 2009. 8

(疾病中草药原色图谱丛书)

ISBN 978 - 7 - 80763 - 248 - 1

I. 烧… II. 黄… III. ①烧伤—中药疗法—中草药—图谱②烧伤—验方—汇编 IV. R289. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 124028 号

疾病中草药原色图谱丛书
烧伤烫伤中草药原色图谱
黄燮才 主编

*

广西科学技术出版社出版

(南宁市东葛路 66 号 邮政编码 530022)

广西新华书店发行

广西雅昌彩色印刷有限公司制版

广西民族印刷厂印刷

(南宁市高新三路 1 号 邮政编码 530007)

*

开本 890mm × 1240mm 1/32 印张 3.5 字数 70 000

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000 册

ISBN 978 - 7 - 80763 - 248 - 1/R · 48 定价: 16.50 元

本书如有倒装缺页, 请与承印厂调换

前 言

烧伤烫伤在工农业生产和日常生活中都可能发生，也是战时最常见的损伤之一，所以也是常见疾病。

早在晋代的《肘后备急方》中就有“烫火灼伤用年久石灰敷之，或加油调”。唐代的《千金方》也有“凡火烧损伤慎勿以冷水洗之”和“治火烧闷绝，不认人，以新尿冷饮之及冷水和蜜饮之……”以及“火疮用梔子、黄芩、白薇煎汤以淋疮，会溜去火热毒。”清代的《洞天奥旨》指出“烧烫伤……轻则害在皮肤，重则害在肌肉，尤甚者害在脏腑”，“……故治火烧之症，必须内外同治，则火毒易解也”。以上记载说明古代对烧伤烫伤早已重视，并积累了一些治疗经验，有些仍沿用至今。新中国成立后，我国在使用中草药和运用中西医结合防治烧伤烫伤方面积累了不少宝贵经验，对保障人民群众的健康起了重大作用，也受到国际医药界的广泛推崇。同时，由于中草药具有药物易找、使用简便和花钱少等优点，仍然有许多人应用中草药治疗烧伤烫伤。为了继承和发掘中国医药学遗产，使中草药在治疗烧伤烫伤中更好地为人类健康服务，我们受广西科学技术出版社的委托，本着安全、有效、简便、经济和药物易找的原则，选择了民间常用而且疗效较好的中草药，结合编者的临床经验，并参考有关文献资料，编著成这本《烧伤烫伤中草药原色图谱》。本书收载中草药 50 种，验方 266 条。

本书适合基层医生和中草药爱好者参考使用，也可供从事烧伤烫伤研究以及资源开发者参考。希望本书的出版能在普及中草药科学知识，搞好城乡医疗保健，保障人民健康，开发利用中草药

治疗烧伤烫伤方面提供可靠依据。

当前，保护自然资源，保持生态平衡，就是保护人类自己的观点已成为越来越多的国家和人民的共识。因此，希望在开发利用中草药时注意生态平衡，保护野生资源和物种。对疗效佳、用量大的野生中草药，应逐步引种栽培，建立生产基地，建立资源保护区，有计划轮采，使我国有限的中草药资源能不断延续，为人类造福。

由于编者的水平有限和客观条件的限制，书中难免存在不足之处，欢迎读者提出宝贵意见。

黄燮才

2008年10月

编写说明

1. 品种：本书收载治烧伤烫伤临床常用中草药 50 种。每种按名称（别名）、来源、形态、生境分布、采收加工、性能、用量、禁忌、验方等项编写。全书还收载疗效较好的验方 266 条，分别见于每种中草药验方项内。目录的编排按笔画多少为顺序。

2. 照片：每种中草药均有 1 帧形态逼真的彩色照片图。除了小草本拍摄全株外，木本、藤本和大型草本，只拍摄有代表性的局部，用局部的枝叶、花或果去表现全体，因此在看图时，应对照形态项的描述，通过图文对照，提高识别能力。

3. 名称：中药原则上采用《中华人民共和国药典》、“部颁标准”或省、自治区“地方标准”所用的名称，草药一般采用植物名或多数地区习用名称，以求药名逐步统一。

4. 学名：每种中草药在来源项只选 1 个符合国际命名法规的学名（拉丁学名）。

5. 验方：中西医病名均予采用，所列使用分量可供参考，使用时可根据药物性能和患者体质强弱、病情轻重、年龄大小、发病季节、所处地域等具体情况进行加减，做到辨证论治。凡不明症状和病情严重的，应及时请医生诊治，以免贻误病情。对有毒药物，用量尤须慎重，以免发生不良作用。

水煎服：是指用清水浸过药面约 2 cm 煎药，煎好后滤出药液再加清水过药面复煎，2 次药液混合，为 1 日量，分 2~3 次服；病情紧急的，则 1 次顿服。煎药容器以沙锅为好，忌用铁器。

先煎：矿物类、介壳类(如龟板等)应打碎先煎,煮沸约 10 分钟后,再下其他药同煎。后下：气味芳香的药物(如薄荷、砂仁等)宜

在一般药即将煎好时方下，再煎 4~5 分钟即可。

布包煎：为防止煎药后药液混浊及减少对消化道和咽喉的不良刺激，有些药物(如灶心土、旋覆花等)要用纱布将药包好再放入锅内煎煮，或先煎去渣，然后再放入其余药同煎。

另炖或另煎：某些贵重药(如人参、鹿茸等)，为了尽量保存其有效成分，以免同煎时被其他药吸收，可另炖或另煎。就是将药切成小片，放在加盖盅内，隔水炖 1~2 小时。

另焗：含有挥发油，容易出味，用量又少的药物(如肉桂等)，可用沸开水半杯或用煎好的药液趁热浸泡并加盖。

冲服：散(粉)剂、小丸、自然汁及某些药物(如三七末、麝香、竹沥、姜汁、蜜糖、白糖或红糖即黄糖)等，需要冲服。

烊化(溶化)：胶质、黏性大而且易溶的药物(如阿胶、鹿胶、龟胶、饴糖等)，与其他药同煎，则易粘锅煮焦，或黏附于其他药，影响药物有效成分溶解。用时应在其他药煎好后，放入去渣的药液中微煮或趁热搅拌，使之溶解。

烧存性(煨存性)：是将药物加热至焦化呈黑褐色，中心部分尚存留一点深黄色叫做“存性”，千万不能将药烧成白灰，以致失去药效。

6. 计量：形态项的长度按公制用 m(米)、cm(厘米)和 mm(毫米)。验方中的重量以传统中药计量换成公制，如 1 斤(16 两)=500 g，1 两=30 g，1 钱=3 g。液体按 1 斤=500 ml(毫升)。验方的用量，除儿科疾病外，均按成人量，儿童用时应酌减。儿童用量一般可按 1~2 岁用成人量的 1/5 量；2~3 岁用 1/4 量；4~7 岁用 1/3 量；8~12 岁用 1/2 量。凡药名前冠有“鲜”字的，是指新鲜的药物，其他均为干燥药，如改为鲜药，一般用量可加倍。外用量可根据药物性能和病情等的不同情况灵活决定。

7. 附录：书后附有别名索引和学名索引，以便检索。

烧伤、烫伤简介

烧伤、烫伤民间也叫“烫火伤”“烧烫伤”和“水火烫伤”等。除了火焰、热水、水蒸气外，生石灰、烧碱、硫酸、盐酸等强酸、弱碱也可造成烧伤。凡烧伤、烫伤，皮肤发热辣痛，不久起水疱，甚则脱去外皮，溃烂流水，为热毒所伤症。按皮肤受损伤的深浅，可以把烧伤分为三度。

I度烧伤：只伤到表皮浅层，表面干燥，红肿热痛，不起水疱，除非面积太大，一般不会发生全身反应。通常经2~3天治疗，表皮自行脱落痊愈。

II度烧伤：又分为浅II度和深II度。浅II度：伤到真皮浅层，皮肤起水疱，水疱底部呈均匀红色，潮湿，局部肿胀，水疱周围有水肿，有时真皮脱落，有剧烈疼痛，还有发热、头昏、头痛等现象。如创面无感染，一般经1~2周治疗，创面愈合。深II度：伤到真皮深层，创面有皮肤附件残留，痛觉迟钝，有水疱，水疱基底苍白，间有红色斑点，潮湿，有发热、头昏、头痛等现象。如创面无感染，一般经3~4周治疗，创面愈合。

III度烧伤：伤达皮肤全层，甚至伤及皮下组织、肌肉、骨骼，创面痛觉消失，无弹力，坚硬如皮革样，蜡白，焦黄或炭化，干燥。干后皮下静脉阻塞如树枝状。如创面无感染，一般治疗2~4

周焦痂脱落，形成肉芽创面。

凡烧伤、烫伤无论轻重，急用童尿灌服，或用童尿1茶杯，加入朱砂1.5 g灌服，以免火毒攻心，或用白砂糖30 g调热开水服或用蜂蜜（蜜糖）30 g调热开水灌服。不可用冷水淋伤处，如用冷水淋则热气内逼，轻则烂人筋骨，手足弯缩，缠绵难愈，重则直攻入心难救。可用麻油涂伤处或用麻油加淘米（糯米最好）水各适量，混合均匀，用筷子不断搅拌至可以挑起成丝为度，涂伤处即能止痛。也可用米醋涂洗患处，既不起水疱，又能止痛。或用粗纸数层浸入尿敷患处，可免起水疱。

病情严重的烧伤、烫伤，应送医院作紧急处理，要中西医结合进行抢救治疗，及早防治休克和防治感染（致病菌多是绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌，本书收录的中草药大部分有抑制绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌作用），积极增强机体抵抗力，防治败血症（败血症是造成烧伤死亡的主要原因）。

烧伤、烫伤的预防：①加强劳动保护和防火、灭火设备的配置，经常开展防火宣传教育，注意遵守安全操作规程制度，积极做好烧伤的预防工作。②在家庭或幼儿园，开水、热粥、热汤都要放在小孩（特别是会爬行的小孩）不易摸到的地方，以免烫伤小孩；注意不要让小孩玩火，以免被烧伤。

目 录

烧伤、烫伤简介..... 1	16.石膏..... 26
一 画	17.功劳木..... 28
1.一点红..... 1	18.冬青叶..... 30
三 画	六 画
2.土大黄..... 3	19.刘寄奴..... 31
3.大叶桉叶..... 5	20.光叶蛇葡萄..... 33
4.大花金银花..... 6	21.阴行草..... 35
5.小叶金花草..... 8	七 画
6.小金樱根..... 9	22.芦荟叶..... 36
7.山竹子..... 11	23.两面针根..... 37
8.山银花..... 13	24.芭蕉..... 40
9.千里光..... 14	25.岗梅..... 41
10.女贞皮..... 16	八 画
四 画	26.炉甘石..... 43
11.无刺功劳木..... 18	27.苦参..... 45
12.水银花..... 19	28.刺黄连..... 47
13.毛冬青..... 20	29.岭南山竹子..... 49
14.乌韭..... 22	30.侧柏叶..... 50
五 画	31.金银花..... 52
15.石灰..... 24	32.金樱子根..... 54

九 画		41. 黄芩	70
33. 梔子	56	42. 黄柏	72
34. 南岭功劳木	58	43. 黄葵花	74
35. 南酸枣树皮	59	44. 黄蜀葵花	76
36. 香港功劳木	62	45. 蚯蚓	77
十 画		十二 画	
37. 烧伤藤	63	46. 寒水石	79
38. 海蛇油	65	47. 斑鸠毛	81
39. 姬蕨叶	67	48. 猴耳环叶	82
十一 画		49. 蜂蜜	84
40. 黄连藤	68	50. 翠云草	87

别名索引	89
拉丁学名索引	91

1. 一点红

来源 菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC. 或小一点红 *Emilia prenanthoides* DC. 的全草。

形态 一年生草本。全株有毛。新鲜时折断有乳状汁液。茎圆柱形，有疏柔毛。单叶互生；茎下部生的叶片倒向羽状分裂，长5~10 cm，宽2.5~6.5 cm，顶端裂片大，宽卵状三角形，顶端钝或近圆形，有不规则锯齿，侧生裂片通常1对，长圆形或长圆状披针形，两面均有疏毛，茎上部生的叶片卵状披针形，较小，边缘有锯齿或全缘，下面有时紫红色。花紫红色；头状花序排成伞房状，生于枝顶；总苞圆柱状；总苞片1层；全为管状花，花冠约与总苞等长，5裂；雄蕊5枚，花药连合。瘦果圆柱形，有毛，顶端



有白色冠毛。花果期7~10月。

小一点红：一年生草本。新鲜时折断有乳状汁液。茎直立或斜升，无毛或有短柔毛。单叶互生；茎下部生的叶片不分裂，倒卵形或倒卵状长圆形，顶端钝，基部渐狭成长柄，边缘全缘或有疏齿，茎中部生的叶片长圆形或线状长圆形，长5~9 cm，宽1~3 cm，无柄，抱茎，边缘有波状齿，两面均无毛或近无毛，茎上部生的叶片小，线状披针形。花红色或紫红色；头状花序排成伞房状，生于枝顶；总苞圆柱状，长8~12 mm，宽5~10 mm；总苞片1层；全为管状花，花冠管长约10 mm，5裂；雄蕊5枚，花药连合。瘦果圆柱形，无毛，顶端有白色冠毛。花果期5~10月。

生境分布 生于山坡、林边、路边、荒地潮湿处、沟边、田埂上。一点红：分布于浙江、江西、安徽、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、云南、贵州；亚洲热带、亚热带地区及非洲也有。小一点红：分布于浙江、福建、湖南、广东、广西、云南、贵州。

采收加工 夏秋季采，鲜用或晒干。用时洗净，切碎。

性能 微苦，凉。清热解毒，抗菌消炎，凉血消肿。

用量 15~30 g。

验方 1. 烧伤：①一点红、功劳木、元宝草各30 g，苦树叶（苦木科苦树的叶）250 g，金樱子根（或小金樱根）60 g。加水1 000 ml煎至约500 ml，取药液涂患处。同时取一点红、金银花各30 g，水煎当茶饮。②一点红、千里光、杠板归、火炭母、牛甘果树皮（大戟科余甘子的树皮）各250 g。加水2 000 ml，煎至约1 000 ml，用此药液清洗创面和涂敷患处。同时取一点红、毛冬青根或叶（或岗梅根或叶）各30 g，水煎当茶饮。

2. 烧伤、烫伤：一点红、两面针根皮、柠檬桉树二层皮各1份，甘草半份，冰片少许，研细粉，用茶油调涂患处。若创面

有感染，可用黄连、黄柏、黄芩各等量水煎洗创面后再涂药。同时取一点红 30 g，岗梅根（或毛冬青根）、白茅根各 15 g，水煎服，每日 1 剂。

2. 土 大 黄 (红筋大黄)

来源 蓼科植物红丝酸模 *Rumex chalepensis* Mill. 的根。

形态 多年生直立草本，高约 1 m。茎带紫色，圆柱状，有多数纵沟。根肥大，肉质，黄色。单叶，基生叶丛生状，有长柄，叶片卵状长椭圆形，长 20~30 cm，叶脉红色，边缘全缘，两面均无毛，下面有小瘤状突起，基部心形；茎生叶互生，有短柄，卵状披针形，叶脉红色，茎上部叶渐小，几乎无柄；托叶膜质。花淡绿色；圆锥花序生于枝顶，花枝由叶丛间抽出；花被 6 片；雄蕊 6 枚。果实卵形，有三棱，成熟时紫褐色或茶褐色。花果期夏秋季。



生境分布 多为栽培或野生于潮湿的山谷、沟边、山脚。分布于河南、山东、江西、浙江、江苏、安徽、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川。

采收加工 秋季采，切片，鲜用或晒干备用。用时洗净，切碎。

性能 辛、苦，凉。清热解毒，凉血，通便，抗菌消炎，消肿。

用量 10~15 g。

验方 1. 烧伤：①土大黄适量。研细粉，麻油或茶油调敷患处。②土大黄、地榆、龙骨、生石膏各 25 g，黄连、黄柏、儿茶各 125 g。研细粉，撒于患处，若创面干燥，可用茶油调药粉涂患处。③土大黄（或大黄）、松香、白矾各等量。将松香融化，加入白矾粉和土大黄（或大黄）粉，用植物油调匀敷患处。用上述①至③方的同时，取金银花、野菊花、毛冬青（或岗梅）各 15 g。水煎，冲白糖适量，冷服。

2. 烧伤、烫伤：①土大黄、地榆各适量，冰片少许。共研细粉，用麻油或茶油调匀涂患处。②土大黄（或大黄）、紫草、当归、甘草各等量。用麻油或茶油浸泡过药面，慢火煎熬约半小时，取药油涂患处。用上述①至②方的同时，取岗梅叶（或毛冬青叶，或冬青叶）、车前草、一点红各 30 g。水煎服。

3. 大面积烧伤、烫伤：土大黄、栀子、苦楝根外层皮、土黄连（北江十大功劳或阔叶十大功劳的根、茎）、毛冬青根（或岗梅根，或冬青树皮）各 60 g，滑石 180 g，薄荷 30 g。共研细粉，用茶油调匀涂患处。同时取黄芩、黄柏各 15 g，栀子 12 g，黄连 10 g，水煎服。

4. 烧伤、烫伤，红肿灼痛起水疱：①土大黄（或大黄）适量，研细粉，调麻油或桐油或鸡蛋清涂患处，也可用米醋调匀涂患处。②土大黄（或大黄）、地榆各等量，研细粉，用花生油或麻油或茶油或桐油调匀敷患处。③土大黄（或大黄）2 份，蜂蜡 1 份，麻油

(或茶油) 4份。将麻油或茶油煮沸, 加入土大黄(或大黄)炸干后取出, 再加入蜂蜡, 搅匀, 待冷, 涂患处。

3. 大叶桉叶 (桉树叶、桉叶)

来源 桃金娘科植物大叶桉 *Eucalyptus robusta* Smith 的叶。

形态 常绿乔木。树皮不脱落, 深褐色, 粗糙, 有扭曲槽纹, 稍松软, 厚约 2 cm。嫩枝无毛, 有棱。单叶互生; 叶片卵状披针形或椭圆状披针形, 长 8~16 cm, 宽 3~7.5 cm, 先端渐尖, 基部两侧不对称, 边缘全缘, 两面均无毛, 对光可见许多油腺点, 揉之有香气, 侧脉多数而明显, 边脉离叶缘约 1 mm; 叶柄无毛。花白色; 直径达 1.8 cm; 伞形花序生于叶腋, 有花 4~8 朵; 总花梗扁平, 长约 2.5 cm; 花梗长不超过 4 mm; 萼管半球形, 无棱; 花



瓣与萼片均4~5片，合生成一帽状体；帽状体约与萼筒等长，花开放时帽状体整个脱落；雄蕊多数，花丝分离。蒴果卵状壶形，长1~1.5 cm，宽约1 cm，上半部略收缩，果瓣3~4片，深藏于萼管内。种子多数。花果期夏秋季。

生境分布 栽培植物，多栽培于平地、山脚、路边、庭园、村边、沟边、河旁或沼泽地。分布于江苏、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、海南、四川、云南、贵州。原产于澳大利亚。

采收加工 全年可采，一般多鲜用。用时洗净，切丝或切碎。

性能 苦、辛，平。清热燥湿，抗菌消炎，收敛，杀虫。

用量 15~30 g（鲜品）。

验方 1. 烧伤：大叶桉叶500 g，加水3 000 ml煎2小时成浓液，涂患处，保持药面湿润。同时取金银花、一点红各30 g。水煎，冷服，每日1剂。

2. 烧伤、烫伤：①大叶桉叶适量，水煎成浓液，涂患处，1日涂数次。同时取毛冬青（或岗梅）根、一点红各30 g。水煎，冷服，当茶饮，每日1剂。②大叶桉叶250 g，加水煎成约500 ml，用消毒纱布浸药液敷患处，经常加药液保持湿润。同时取金银花、积雪草各60 g，水煎当茶频饮，每日1剂。

4. 大花金银花（金银花）

来源 忍冬科植物大花忍冬 *Lonicera macrantha* (D. Don) Spreng. 的花蕾或带初开花和茎（金银花藤）。

形态 多年生半常绿缠绕藤本。茎圆柱形，嫩枝红褐色，密生柔毛和开展的黄褐色长糙毛，毛长约2 mm以上，并散生短腺毛。单叶对生；叶片卵形、卵状长圆形或长圆状披针形，长5~10 cm，