

覽便術技產生

工農

米薏和米苞種

上海農業場
華中農業場
崑山積善場

周潤科著

中華書局印行



為什麼編印工農生產技術便覽？

新時代到了！工農們要領導大家去生產，去勞動！

新時代到了！沒有正當職業的國民，都要去做工，去種田——去勞動！

工農們！假使你們沒有生產的技術和知識，你們怎會有力量去領導大家呢？不過不必灰心，也不用着急，只要好好學習，自然就會學到和得到許多生產技術同知識。現在我們想對你們幫一下忙，就是用我們編印的這一套書，供給你們一些需要的學習資料。

要想改做工，改做農的民衆們！我們知道你們對於做工或種田，都是外行，放心吧！你們只要仔細照了我們這一套書去做，你們會慢慢兒做成功的！

我們知道，工農方面最需要生產技術的指導和生產知識的灌輸。我們這套書，就包括這兩類，所以可說是學習工農最適宜的讀物。

我們又知道工農們讀書不多，不能看太多和太深的文字，所以這套書，特地揀最緊要的說，並且用最淺近的口頭話寫成，或許不用看，聽了別人讀就能懂。

寫這套書的人，可說多數是實際工作的人，所講的話都是他們實地做過的，當然很可靠。

種苞米和薏米

目錄

上 種苞米

一 總說 三十一〇

(一)名稱和來歷 三

(二)形態 四十五

(三)種類 五十八

(四)用途 八十一〇

二 氣候和土質 一〇一一

(一)氣候 一〇一一

(二)土質 一一
三 整地 一二
四 播種 一三

五 施肥 一四一
六 中耕和除草 一六一
七 收穫 一七一
八 病害 一八一
九 蟲害 二二二

下種薏米

一 名稱和來歷 二五十一六

(一)名稱 一五

(二)來歷 一五十一六

二 形態 一六十一七

三 用途和成分 二七十一八

四 氣候和土質 二九

五 種法 二九十一三〇

附表

(一)苞米子粒成分表.....

.....二〇一三一

(二)馬齒種苞米的子粒化學成分表.....三一

(三)中西名詞對照表.....

.....三一一三一

種苞米和薏米

崑山中華農場 技師 周潤科著

上 種苞米

一 總說

(一)名稱和來歷

苞米在植物學上叫做玉蜀黍，俗稱又有玉米、珍珠米、稈頭，苞粟等等名稱。在北方，普通都稱它為苞米，在南方，要算珍珠米這個名稱最普通。

苞米是美洲的原產，在十五世紀時，哥倫布發現美洲後，纔把它的種子帶到西班牙，以後再傳到歐洲各國。我國是在十六世紀的時候，因葡萄牙人的東來，傳入國內，還有人說是在十六世紀時從中亞細亞傳入中國。到底，是怎樣傳入的，還沒有一定的說法。

(二) 形態

苞米雖是長得很高大，可是它的莖和葉，以及根的形態，和稻、麥是差不多的，所以和稻、麥同屬於禾本科，並且它也是一種草本。

苞米的根和稻、麥的根，沒有大相差，都是從莖的下面，發出細而長像纖維或鬚那樣的根，所以這種根，就叫做纖維根或鬚根。苞米的根極長，大約在二或三、四公尺左右。苞米的莖，在接近地面的部分，也生長着根，因為它露出在空氣中，所以就叫做氣根。這種根的用處，可以支持全株，不使它倒伏下去。在地下的鬚根，生長得很細很多，是專供吸收地土中的養料用的，假使泥土鬆而軟，它就更容易發達起來，因此，種苞米對於地土，應該是使它很鬆而軟的。

苞米的莖，普通叫做稈，大約有一至五公尺那樣的高度，所以農家把它栽在園庭裏，苞米的稈，會得高過圍牆。稈上生有許多的節，從節上生出葉來。它的葉，在基部包着稈，形狀和刀的鞘有些相像，所以就叫做葉鞘。葉的片，又長又闊，葉脈是平

行着的。每一株，有八至二十多枚的葉。

苞米的花，有雌雄的分別。雌花在葉和稈的接合部分，普通叫做葉脈，有許多雌花生在一起，聚成一個像穗那樣的東西，將來這個花穗，就會長成一枝穗狀的苞米，這一株苞米就是果實。在果實上面，生着可吃的粒子，有種種的顏色，叫做子粒。苞米的雄花，生在稈的頂上，也是許多的雄花聚在一起，長成像穗那樣的東西。

(三) 種類

苞米的種類很多，現在把重要的記在下面：

1. 本國種 本國的苞米在果實的子粒裏面，含有許多的糊精，所以質地是比較粘一些。子粒的顏色，有黃，有白，還有紫紅色的。果穗大約長六至八寸，每一果穗，有八至十四行的子粒。本國種依據子粒的性質，又分成許多的種類，著名的有：

(1) 遼寧海龍王 (2) 遼寧金黃

(3) 北平攢天黃 (4) 北早晚熟黃

(5) 河北大白

(6) 河北玻璃脆

(7) 上海黃珍珠

(8) 上海紫珍珠

(9) 江蘇南匯白珍珠

(10) 江蘇南匯黃珍珠

(11) 四川老黃

(12) 四川細白

(13) 北平中熟

(14) 保定早熟

2. 美國種 美國是產苞米最著名的國家，苞米的種類，有千餘種之多。現在也把重要的種類，記在下面：

(1) 爆裂種 子粒半透明，質地堅硬，所含的澱粉，都是硬性。子粒有各種的顏色。果穗有二至七寸長。果穗的子粒有八至十六行。本種又有白苞米、珍珠等種。

(2) 馬齒種 子粒堅硬，上面生着凹點。子粒的顏色，有黃色或白色。果穗長六至十二寸。果穗的子粒行數，有八至十二行。本種白色的有瓊生白苞米、自由白苞米、聖却而斯白苞米、銀色白苞米等等種類。子粒黃色的，有黎明、李來愛用種、金黃

種、溫普爾黃苞米、芬克黃苞米等。

(3)硬皮種 子粒的外皮堅硬，澱粉的質地是硬性。子粒黃色或白色。果實穗長六至十四寸。果穗子粒有六至十四行。本種又有紅愛爾蘭種、商福特白苞米、腓力普王、金堆、八條或十二條黃苞米、長苞米、達柯塔白苞米等等種類。

(4)軟質種 子粒軟，澱粉的質地是軟性。子粒有各種的顏色，但是，不大能够見到白色的，普通都是藍色。果穗長六至十寸。果穗上子粒有八至十二行。本種有象牙王、雜種、李亞巴西粉等種類。

(5)甜質種 子粒的外皮很脆，有皺紋，含糖分多，所以味甜。子粒黃色或白色。果穗長四至七寸。果穗上子粒有八至二十四行。本種又有史托威爾長綠種、金彭坦、府城紳士等等。

除了本國種和美國種外，又有下列二種：

1.有稃種 在子粒上有薄膜，所以叫做有稃種，含有硬性的澱粉。子粒有各種的

顏色。果實穗長五至六寸。果穗上的子粒有八至十二行。

2. 甜粉種 子粒含糖質的澱粉很多，所以叫做甜粉種。子粒黃色或白色。果實穗長五至八寸。果穗上的子粒有八至十二行。

(四) 用途

苞米的用途，主要是供給我們吃。吃的時候，可以把它子粒曬乾，研成粉末，這就是苞米粉。可以做成糕餅、窩窩頭，或者把它和入別種的糧食裏面，好比山芋乾、大麥或圓麥軋碎的粉粒、或小麥粉等煮成粥吃。在歐，美各國，往往把苞米粉混入奶粉或其他粉末食品中食用，還有做麵包，餅乾的時候，也把苞米粉加入。此外，把苞米粉炒熟，可以代替咖啡用。在南方，都把苞米整個地煮食，或者蒸食，是隨便吃吃的，即作爲副食品用，這種吃法，當然要揀選含有糖質的種類，所以美國的甜質種或甜粉種，當然是最最合用的了。在上海一帶的地方，最初有歐、美人自己種的甜苞米出賣，後來，在我國人自辦的農場裏面，有種這一類的苞米，銷路還不差。在北

方，以及貧苦的地方，都把苞米做爲主要的食糧，例如，在大連的地方，就是大連大學的師生們也都把苞米做成的窩窩頭，作爲主要的飯食。把苞米的子粒，去餵家畜和家禽，也是極爲相宜的，並且吃了苞米，會長得肥美。講到苞米裏面的養料成份，却很豐富，油質含得更多，所以把它去餵家畜和家禽，可以使得它們長得肥壯。不過，在苞米裏面的維他命不很完全，所以偏食苞米粉，皮膚上會發生一種炎症，叫做玉米黍症。但是混食別種的東西後，就不生這種病了。

苞米的軟桿和軟葉，也可以做飼料，就是帶穗的稈和葉，也是同樣可以用的。

苞米除了做人以及家畜、家禽等的食料外，還有下面所說的幾種用處：

- 1.釀酒用 苞米的子粒，可以發酵，做成酒精。現在我國的酒精廠，也都利用苞米來做酒精，苞米的稈，含有糖分，也可以榨汁做酒。

- 2.製油 苞米的子粒，含油脂很多，所以可把它製油，叫做苞米油。

- 3.製澱粉 苞米的子粒，裏面含有許多的澱粉質，所以從子粒裏面可以提製澱

粉。

4. 其他 茄米的果穗，在取去子粒之後，穗的軸裏面還含有糊精、木糖、醋酸、以及其他種種成分，可以提出去製造消毒藥、溶煤劑、麻醉劑藥、唱片等等。穗軸裏面，含有許多的鉀質，所以可做製鉀的原料。穗軸的質地鬆軟，還可以做軟木塞的代用品。

果穗的外面有皮，叫做苞皮，也有許多的用處：可以做枕、墊子等的填充材料，可以做粗布，可以包裝水果和做紙等。

二 氣候和土質

(一) 氣候

苞米原來是產在溫帶的地方，它喜歡高溫。在北方假使夏季的氣溫很高，也可以去栽種它。苞米非但要高溫，並且還喜歡潮溼，不過，在開花結實的時期中，却不宜

於潮溼，寧可帶乾燥些。

南方溫暖的時期比較長，所以苞米都生長得很高大。在北方，夏季的暖天比較短，所以苞米長得矮小。南方和北方的苞米，雖是因為氣候的不同，生長的情形各別，可是苞米的子粒中的成分，它的含有量，並不受到影響，還是差不多的。

(二) 土質

苞米原來是在隨便什麼的地方，都好去栽種，所以農村裏面，無論在牆邊、屋角或者田園的空餘地方上，都栽着苞米。但是要把苞米種得很好，必須選擇排水良好、富含腐植質的地土去栽種它。根據農業家的研究，知道它最要氮質，所以在泥土中，含有大量的氮質，就能使它生長很好。砂土和粘質土，或者不能留着水分，或者容易積水，都對於苞米的生長，是不相宜的，所以有這種土質的田園，應該先把土質改良，纔能够去種它。

三 整地

種苞米，原來不一定要種在整理得很好的田地上，所以在長着野草，以及有泥塊、石子混在一起的荒地上，也可以去種它。不過，假使要收穫量大，子粒的質地上等，那就非得先把田地整理一番，使它生長得更合宜不可。整地的方法，要先把地土耕鬆，使它的鬚根能十分發展，同時可使在地上的水，不致淤積在土中。耕地的時期，最好在秋天，這樣，可到明年的春天下種。假使在秋天沒有耕地，那末，也要在早春把田地耕好。據農學家的經驗，知道種苞米的田地，耕得愈早，則在將來的收成愈多。在耕地時，必須要耕得深，表土要鋤得細，這都是在整地的時候，要注意的地方。

整地之後，在地土太低或太溼的地方，要做着高畦。在高燥的地方，做平畦，就可以了。不論畦的式樣如何，總是，需要開掘排水的溝渠。

四 播種

苞米要用種子來繁殖，這種子就是在上面所說的子粒，要在隔年採收好的種子。假使是供食用，要用條播或點播的方法；若是把它做飼料用，可以用條播或撒佈法。播種的時期，要依了它的種類和地方來決定的。我國普通從二月至六月，都可以播種。在二月播種的，叫做春播，在六月播種的，叫做夏播。在我國的北方，春播的時期，是在四月上旬，夏播的時期，在六月上旬。

播種的每行距離，就是行距，普通大約五至八公寸。每株的距離，就是株距，大約五至七公寸。播種的深度，普通大約七公分，不過土質粘重的地方，祇要到三—五公分。砂質土，却要加深至一·四公寸。每畝所需要的種子分量，大約要二至五公合。

五 施肥

苞米是和稻、麥同屬一科的植物，所需要的養料也差不多，因此苞米的肥料，也和稻、麥相同。苞米長得很高大，它所需要的肥料分量，當然也要多一些。現在把它所需要的肥料種類和所有的分量，記在下面：

1. 基肥 在播種前，要先把肥料下入園地的畦中，這時，所下入的肥料，就是基肥。在北方所用的基肥的種類和分量如下面所記：

(1) 焜肥 就是把畜舍中的草、灰和糞尿等做成的肥料，主要含有氮質。大約要用一千八百斤。

(2) 米糠 這種肥料，是含有磷質的，大約用六十斤。

(3) 草木灰 這是含有鉀質的肥料，大約需用四十斤。

2. 棉肥 這是在生長期內追補下的肥料，所以叫做棉肥。棉肥可以在中耕之後施

用，下補肥的次數，可以看生長的情形來決定。假使土質肥沃，發育旺盛，下了一次的補肥，就可以了。否則要下二次，補肥可以施用乾人糞四十斤。

在南方因為普通在冬天的作物收穫之下，就要種苞米，所以不宜用效力緩慢的廐肥等肥料做基肥。現在再把在南方所適用的基肥和補肥的種類和分量記在下面：

1. 基肥

(1) 草木灰

五十斤

(2) 豆餅

六十斤

(3) 過磷酸石灰

三十斤

2. 補肥

用人糞尿，要澆一、二次。

苞米的施肥，北方和南方固然兩樣，就是同在北方，也要看地土的肥瘦，來決定肥料的種類和分量，不能够十分地來限定。