

古今圖書集成

中華書局影印


第四四七冊

博物彙編

醫部

藝術典

三〇一三三
(卷)



瘧門三

醫部彙考二百九十一

方一

二虎丹 柴胡去半夏加苦蔥湯 清中白木散

湯

香薷飲

正氣散

六丁散

加減調中益氣湯

柴葛

二陳湯

二木柴葛散

桂附

二陳湯

二十味

桂附

</div

三箇

日久虛寒熱不多或無寒但微熱者邪氣已無

只八珍湯加柴胡黃芩黃芪陳皮以滋補氣血

香薷飲

治傷暑發瘧

香薷二錢 厚朴 扁豆炒各一錢

右哎咀水盞半烏梅一箇煎八分臨時入薑汁一匙溫服

沃雪湯

蒼术炒 甘草鹽浸炙各三兩 防風 白芍藥

蒼术炒 甘草鹽浸炙各三兩 防風 白芍藥

青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥

白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏

常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁右哎咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎服
附子炮裂 半夏製 陳皮 白茯苓 肉桂
炙甘草

治久瘧

二十四味斷瘧飲

常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁常山酒炒 草果 檳榔 知母酒炒 陳皮
青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥
白芷 人參 紫蘇 蒼术 白术 半夏
良薑 伏苓 桂心 葛根 甘草 杏仁

升麻以提之久瘧微邪潮熱加四君子湯去祐邪之藥
欲截加常山檳榔青皮貝母各一錢
二木柴葛湯
一名驅邪湯治諸瘧必用之劑
白术 蒼朮 柴胡 葛根 陳皮各七分
甘草五分
若一日一發及午前發者邪在陽分加枯芩茯苓
半夏各一錢熟甚頭痛加川芎軟石膏各一錢口渴加石膏知母麥門冬各一錢
若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川芎當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各一錢酒黃芩紅花各四分提在陽分可截之
若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參黃芪白茯苓各一錢以補氣川芎熟地黃歸芍以補血
若陽瘧多汗用黃芪人參白术以斂之無汗用柴胡蒼朮白术黃芩葛根以發之
若陰瘧多汗用當歸白芍熟地黃芪黃芩以斂之無汗用柴胡蒼朮川芎紅花升麻以發之
胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而食少者加人參酒芍藥大麥芽各一錢
若欲截之加檳榔常山青皮黃芩各一錢烏梅肉各六分
右欲截之加檳榔常山青皮黃芩各一錢烏梅肉
痰甚加生薑半夏南星枳實炒各一錢黃連黃芩
遂柴胡各半兩空心臨臥服
破塊丸
治瘧瘧結成氣塊腹中不能消散
草朮 大黃各一兩俱生用
右爲細末入麝香少許煉蜜丸如梧桐子大每服
三十九空心冷酒下日三服

桂附二陳湯

治寒瘧但寒少熱多定腰足冷

附子炮裂 半夏製 陳皮 白茯苓 肉桂
炙甘草

右哎咀用老酒半盞入瓶中浸藥每晨服一二杯

右欲截之加檳榔常山青皮黃芩各一錢烏梅肉
痰甚加生薑半夏南星枳實炒各一錢黃連黃芩
遂柴胡各半兩空心臨臥服
破塊丸
治瘧瘧結成氣塊腹中不能消散
草朮 大黃各一兩俱生用
右爲細末入麝香少許煉蜜丸如梧桐子大每服
三十九空心冷酒下日三服

忌怒勞冷食

斬鬼丹明

截瘻

人信五錢用明礬五錢蓋罐內火煅微有黑烟出取起放土地上冷定入雄黃二錢明亮者

右共研勻極細五月五日五家棕角爲丸如小豆

大未發前面東涼水下三丸嚼破吞之妙小兒一

丸以吐爲度

祕方鬼哭丹

治諸瘡疾

茱萸一兩 信石明者三錢

右碾極細以蒸餅爲丸如茱萸大每服三丸發日

早五更以新汲水朝東吞下忌濕麪生冷葷腥

茱萸豆法

治久瘡母痞塊者不宜用消痞丸散等破氣并

熱藥只宜用製豆法食盡一升自然消愈

大黑豆二升 常山半斤 血竭五錢另研

枳實四兩

右用水一斗先剉常山枳實煮十餘沸入豆候熟

去二味再入血竭未用文武火熬盡汁取出曬乾

每日食之一二合後可灸章門二穴其痞自消

瘡疾方晉

不論新久男婦皆可服

白术土炒 白茯苓 川芎各六分 白芍酒炒

陳皮去白 當歸 山楂蒸取肉 知母鹽水炒

黃藥鹽水炒各八分 甘草 黃連薑汁炒

青皮各三分 軟柴胡 半夏薑汁煮透曬乾

條芩酒洗各五分 枳殼熟炒二分

薑一片水煎服寒熱退去柴胡加人參三分孕婦不可用枳殼

桂枝羌活湯河間下同

桂枝 羌活 防風 甘草炙各半兩

右爲粗末每服半兩水一盞半煎至一盞迎發而

服之吐者加半夏麴等分

麻黃羌活湯

治瘡病頭痛項強脈浮惡風無汗者

麻黃去節 羌活 防風 甘草炙各半兩

右爲粗末每服半兩水一盞半煎至一盞溫服如

吐者加半夏麴等分

麻黃桂枝湯

治瘡如前病證而夜發者

麻黃一兩去節 甘草炙三錢 黃芩五錢

桃仁三十箇去皮尖 桂枝三錢

右五味同爲細末依前服桃仁味苦甘辛肝者血

之海血聚則肝氣燥經所謂邪氣深遠而入血故夜發

夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

桂枝石膏湯

治瘡病先以大柴胡湯下過外微邪未盡者

白芷一兩 知母一兩 七錢 石膏四兩

右爲粗末同前煎服

桂枝一兩 知母一兩 七錢 石膏四兩

治瘡發寒熱大爭

桂枝三錢 黃芪 知母 石膏 茄藥各半兩

右爲粗末每服五七錢至一兩水煎如前藥服之

桂枝黃芩湯

服桂枝芍藥湯寒熱轉大者以此與服

柴胡一兩二錢 黃芩 人參 甘草各四錢半

半夏四錢 石膏 知母各五錢 桂枝二錢

右爲粗末依前服之

麻黃黃芩湯

麻黃一兩去節 桃仁三十枚去皮 黃芩五錢

甘草炙三錢 桂枝二錢半

右爲細末同前服法桃仁味苦甘辛肝者血之海

血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之

故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃

陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

桂枝石膏湯

桂枝五錢 石膏 知母各一兩半 黃芩一兩

右爲粗末分作三服水一盞同煎服

大柴胡湯

柴胡半斤 黃芩 茄藥各三兩 半夏半升洗

生薑五兩切 枳實四枚炙 大棗十二枚擘

大黃一兩

右七味以水一斗二升煮取六升去渣再煎溫服

一升日三服

柴胡桂薑湯

柴胡半斤 桂枝三兩去粗皮 苦蔴根四兩

乾薑 黃芩 牡蠣殼各一兩 甘草炙一兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

白虎加桂枝湯仲景

右爲粗末每服五七錢至一兩水煎如前藥服之

脈經云朝發暮解暮發朝解

知母六兩 甘草炙一兩 桂去粗皮三兩

石膏一斤 糜米二合

右剉散每五錢水一盞半煎至八分去滓溫服汁

出卽愈

蜀漆散

蜀漆燒去腥 雲母燒三日夜 龍骨等分

右杵爲散未發前以漿水服半錢匕如溫瘡加蜀

漆一錢臨發時服一錢匕

牡蠣湯

牡蠣四兩熬 麻黃 蜀漆各三兩 甘草二兩

以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥

煮取一升溫服一升若吐則勿更服

人參 柴胡 黃芩 甘草 大黃 當歸

右爲粗末每服三錢水一盞三片煎至七分去

芍藥各等分

對金飲子局方下同

治寒熱瘧疾愈後調理脾胃

橘紅炒赤黃色半斤 厚朴薑製 蒸木製

甘草炙各二兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片一枚煎服一

方加草果倍用蒼术名草果平胃散

人參養胃湯

加桂治感寒發瘧

草果 茯苓 人參去蘆各半兩 甘草炙七錢

橘紅七錢半 厚朴去粗皮薑製 蒸木湯洗炒

半夏湯洗各一兩 藿香洗去土五錢

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一枚煎

至七分去滓熱服脈弱無力或寒多者加乾薑附

子如脈洪有力熱多者加黃芩黃連柴胡朴蒼藿

香散也半果茯橘刮痰也人參惟虛人最宜

四獸湯簡易方

治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏製 人參 茯苓 白朮 橘紅 草果

生薑 烏梅 大棗各等分 甘草炙減半

右以鹽少許淹食項濕紙厚裏慢火煨香熟每服

四錢水一椀煎半椀溫服

牽牛一斤淘去浮者焙搗取末四兩 雞心檳榔

橘紅各二兩 青木香 熟附子 厚朴製

人參 官桂 京三稜 羌活 獨活 乾薑炮

甘草炙 川大黃剉焙 川芎 芍藥各半兩

肉豆蔻六箇

右爲末磁器密收臨用秤牽牛末一兩諸藥末共

一兩研和煉蜜丸桐子大每服二十九橘皮煎湯

下以通利爲度

觀音丸

取下暑毒瘴毒

半夏生 烏梅肉 母丁香 巴豆不去油各十枚

右爲末薑麪糊丸麻子大上下以厚紙蓋貼有油

又再易紙每服五丸臨臥冷水下此方舟人於海

角遇白衣授之

清脾飲濟生方

治瘧瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽

乾小便赤澀

青皮 厚朴薑製 白朮 草果 柴胡 茯苓

黃芩 半夏湯洗七次 甘草炙各等分

每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚未發前服

忌生冷油腻

七聚湯

治五臟氣虛陰陽相勝痃癆發作無時或寒多熱

少或單寒者

附子一枚炮裂以鹽水浸再炮如此七次不浸去皮

臍又方以川烏代附子以水調陳壁土爲糊浸炮七

次右分作二服每服水一椀薑七片棗七枚煎七分

臨發日早溫服

驅瘧飲局方

半夏各三兩 柴胡各四兩

桂心 桔梗 厚朴

黃芪 乾薑炮

甘草各二兩

每服四錢水一盞半薑三片棗四枚煎七分不拘

時溫服

柴朴湯

柴胡 獨活 前胡 黃芩 白朮 茯苓 半夏

蒼朮 厚朴 陳皮 藿香各一錢 甘草三分

水二鍾生薑五片煎一鍾發日五更服

食不尅化加神鞠麥芽山楂

加味香薷飲

香薷一錢 厚朴製 扁豆炒 白朮炒 陳皮

白朮茶 白芍藥炒 黃芩各一錢 甘草炙

黃連薑汁炒 猪苓 澤瀉各五分 木瓜七分

右生薑煎服

口渴實者加天花粉 葛根知母虛者加五味子麥

門冬人參

交加雙解飲子

治瘧疾癆瘍氣神效

肉豆蔻 草豆蔻各一枚一枚麪裹煨一枚生用

厚朴一寸一半用薑汁浸炙一半生用 甘草大者

二兩一半炙用一半生用 生薑一塊如棗大一塊

濕紙裹煨一塊生用

每服分一半用水一椀煎至一大盞去滓空心服

雄黃散

右爲細末每服半錢溫水調下以吐爲度

鼈甲煎丸仲景

治瘧母

烏扇燒 黃芩 鼠婦熬 大黃 桂枝 石葦

厚朴 紫葳 阿膠各七錢半 乾薑 人參

瞿麥 桃仁各五錢 赤硝 龜甲炙各三兩

柴胡 蟠蠅散各一兩五錢 蜂窠炙一兩

芍藥 丹皮 廣蟲炒各一兩二錢半 萃蘚炒

半夏各一錢半

右二十三味爲末取煅金下灰一斗清酒一斛五
斗浸灰候酒盡一半著鼈甲於中養令泛爛如膠

漆紋取汁內諸藥煎爲丸如桐子大空心服七九

日三服千金方用鼈甲十二片又有海藻三分大
戟一分廣蟲五分無鼠婦赤硝一味以鼈甲煎和
諸藥爲丸

瘡母丸

青皮 桃仁 紅花 神翹 龜甲酢煮爲君

三稜 蓬術 海粉 香附俱用酢煮 麥芽

右爲末神翹糊爲丸如桐子大每服五十九白
湯下

鼈甲飲子濟生方

治瘧疾久不愈脅下痞滿腹中結塊名曰瘡母

鼈甲酢炙 白朮 黃芪 草果 檳榔 川芎

橘紅 白芍藥 甘草炙 厚朴製各等分

右咬咀四錢水一盞薑七片棗一枚烏梅少許煎

七分溫服無時

消癬丸

治瘧母停水結癖腹脅堅痛

芫花炒辰砂研細等分

右爲細末蜜丸小豆大每服十九濃棗湯下下後
卽服養胃湯

碧霞丹百一方選方

治久瘧不愈

肉桂去粗皮細研按南方丙丁火 青黛別細研按北方壬癸水

硫黃去沙石細研按中央戊己土 白礬別細研按西方庚辛金

巴豆肉去油別研按東方甲乙木

右件等分五月一日修治用紙裹以盤盛依方位

排定忌貓犬婦人見之安頓神前端午日午時用

五家棕尖和藥令勻丸梧子大令患人以綿裹一
丸塞鼻中男左女右於未發前一日安之約度尋
常發過少許方除

芎歸鼈甲飲

治勞瘧表裏俱虛真元未復疾雖暫止少勞復來

川芎 當歸 龜甲酢炙 茯苓 青皮 陳皮

半夏 芎藥

右咬咀各等分每貼二兩用水二鍾生薑五片棗

二枚烏梅一枚煎至一鍾食遠服熱多加柴胡熱

少加草果

四將軍飲

治寒瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此雖

一時至急用之有驗

附子炮去皮一錢 詞子一錢半 陳皮三錢

甘草一錢半

右作一服水二鍾生薑七片棗七枚煎至一鍾不

拘時服

三發後可用因其衰而減之立效

知母鹽水炒五錢 貝母九分 橘紅 山楂肉

枳殼各一錢五分 檳榔八分 柴胡七分

紫蘇一錢 甘草炙三分

用水二鍾煎至一鍾滓亦用水二鍾煎至八分俱

露一宿臨發日天明服頭煎未發前一箇時辰服

二煎

又方

治瘧乃史崇質得之四明胡君屢試屢驗

黃芪蜜炙一錢六分 人參 白朮 白茯苓

砂仁 草果 陳皮去白

五味子各一錢
甘草七分 烏梅三枚去核

水一鍾生薑三片棗一枚煎一鍾溫服

柴胡桂枝湯入門下同

治少陽瘡寒熱乍往乍來

柴胡一錢 桂枝 黃芩 人參 白芍藥

半夏各一錢 甘草五分

右剝一貼入薑三片棗一枚水煎服

柴胡加桂湯

治少陽瘡往來寒熱極驗

柴胡二錢 黃芩 桂枝各一錢 半夏一錢

甘草四分

右剝作一貼入薑三片棗一枚水煎服

麻黃白朮湯直指方下同

治風瘡

麻黃 桂皮 青皮 陳皮 川芎 白芷

半夏 麻黃 檳榔 甘草各七分

細辛 檳榔 紫蘇葉

赤茯苓 白朮 桔梗

治三陰經溫瘡或夜發者

柴胡 生乾地黃各二錢 人參 半夏 黃芩

甘草 川芎 當歸 赤芍藥各一錢

右剝作一貼入薑三片棗一枚水煎服

柴胡知母湯節下同

治熱瘡及瘧瘧

柴胡 知母各一錢半 蒼朮 黃芩 乾葛
陳皮 半夏 川芎各一錢 甘草炙七分

右剝作一貼入薑三片烏梅二枚水煎清晨服午前又一服久瘡加人參當歸

爭功散得效方

治熱瘡多效

知母 貝母 柴胡 常山 桔子 檳榔

地骨皮 甘草各一錢 蟬退二七箇

右剝作一貼入桃柳枝各五寸煎服未效加過路葛藤五寸同煎服

龍虎湯醫門

治熱瘡火盛舌卷脣焦鼻如煙熏六脈洪緊

石膏二錢半 柴胡 黃連各一錢半 黃芩

知母 黃藥各一錢 梔子八分 半夏七分

粳米百粒

右剝作一貼入薑三片棗一枚水煎服

柴胡 陳湯入門

治瘧瘧

柴胡 半夏各一錢 人參 黃芩 陳皮

細辛 檳榔 紫蘇葉

赤茯苓 白朮 桔梗

右剝作一貼入薑三片棗一枚水煎服

冷附湯得效方

瘡疾無過是痰實而脾胃弱停於胃膈所以五更冷服使藥下達壯脾胃去痰實也

大附子一箇炮去皮臍右切片分二貼每一貼入薑十片水煎去滓露一宿

更初冷服

露蓋飲

生薑四兩連皮搗爛止取自然汁

約明日當發隔夜安排將紗片蓋露一宿五更初與童便合飲之或有痰吐出任之卽安

平陳湯入門下同

治食瘡

蒼朮 半夏各二錢 甘草七分 厚朴 陳皮

赤茯苓各一錢一分半

右剝一貼薑三片棗一枚水煎服

常山飲

治勞瘡

常山 知母 草果各一錢半 良薑一錢

烏梅肉 甘草各五分

右剝作一貼入薑五片棗一枚水煎服

五勞丸直指方

右日乾爲末蜜丸梧子大空心溫酒下三四十九

淡豉 乌梅肉各二兩半

六和湯丹

右日乾爲末蜜丸梧子大空心溫酒下三四十九

常山二錢 知母 貝母 人參 草果 白朮

烏梅 檳榔 柴胡各一錢

右剝作一貼入薑三片棗一枚酒水相半同煎露一宿臨發日服之

烏頭七臺湯直指方

治勞瘧及寒瘲

大川烏一箇以鹽水浸炮七次去皮臍右剉分二貼每貼入薑七片棗七枚葱白三莖水煎稍冷先喫乘乃服藥

地龍飲得效

治瘡瘻大熱煩躁

生地龍大者三條研細用薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下熱熾加

龍腦少許

十將軍丸吳丹

治久瘻及瘧母

縮砂 檳榔 常山 草果各二兩 三稜

蓬木 青皮 陳皮 烏梅 半夏各一兩

右先將常山草果酒酢各一椀浸一宿後入八味同浸至晚炭火煮乾爲末酒酢各半打糊和丸梧子大白湯下三四十九日二服服至八兩卽除根

本方常山草果各二兩餘八味各一兩名老瘻丸

治同

一補一發丹入門

治久瘻內傷挾外感間發內治瘻外發汗

赤茯苓一兩 半夏 陳皮 柴胡 黃芩

蒼术 葛根各七錢 常山三錢

右爲末麪糊和丸梧子大白湯下七十九

辰砂得效

治久瘻不損元氣

右研勻稀米糊和丸皂角子大空心以人參湯化

下十九

養胃丹醫

治久瘻二三年不愈者

蒼术 常山酒蒸各二兩 半夏 陳皮去白

厚朴各一兩半 赤茯苓 蕤香 草果各一兩

甘草炙五錢 烏梅肉四十九箇

右爲末薑湯打糊和丸梧子大薑湯下五七十九

老瘻飲入門一名瘻瘻飲治老瘻結成癰癥在腹脅諸藥不愈

紫蘇葉 川芎各四分 蒼术 草果 桔梗

青皮 陳皮 良薑各七分 白芷 赤茯苓

半夏 枳殼 桂心 乾薑 甘草各五分

右剉作一貼入鹽少許水煎空心服

祕方清脾丸漢丹治瘻三日一發或十日一發

白术一兩半 半夏 青皮 黃芩各一兩

人參 檳榔 草果 蓬木 厚朴各五錢

薑黃 甘草各三錢

右爲末飯丸梧子大白湯下六七十九

黃甲丸醫

治瘻母成塊久不愈

硃砂 阿魏 穿山甲酥炙 檳榔各五錢

雄黃 木香各二錢半

右爲末泡黑豆去皮搗成泥和丸梧子大空心湯下五十九

草果平胃散得效

治脾虛作泄不問寒熱先後宜服

蒼术一錢 厚朴 陳皮 青皮 大腹皮 檳榔 草果各一錢 甘草五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚烏梅一枚桃仁七箇水煎露一宿臨發日五更空心服查再煎朝時

截瘻常山飲下同

常山 草果 檳榔 知母 烏梅 穿山甲炮甘草炙各一錢

右剉作一貼酒水相半煎露一宿臨發日早晨服得吐爲順一方加半夏柴胡去穿山甲如吐加厚朴又或加青皮陳皮

截瘻七寶飲

常山 陳皮 青皮 檳榔 草果 厚朴甘草各一錢

右剉作一貼酒水相半入薑五片烏梅一枚同煎露一宿早晨溫服必須吐而愈

截瘻飲子

常山一錢半 檳榔一錢 丁香半錢 烏梅一箇人參 截瘻飲同前

右剉作一貼好酒一盞浸一宿臨發日清晨溫服

人參 截瘻飲同前

虛人截瘻宜用一切瘻竈可截

人參 白术 白茯苓 當歸 青皮 厚朴柴胡 黃芩 知母 常山酒浸 草果仁

籠甲酢炙各八分 桂枝 甘草各三分

右剉作一貼入薑三片棗二枚烏梅一枚桃仁七箇水煎露一宿臨發日五更空心服查再煎朝時

服糖拌烏梅下藥切忌雞魚豆腐麪食熱物

鬼哭丹丹漢

治瘧瘧

常山一斤剉酢浸春五夏三秋七冬十日曬乾

檳榔各四兩

半夏 貝母各二兩

右爲末雞子清和麪入藥末拌勻作九梧子大每

三十九隔夜臨睡冷酒吞下次日早再一服

不二飲普同鑑

一名止瘧散一名知母散治諸瘧疾一劑截住神

常山 知母 貝母各等分

雞心檳榔要一雌一雄若重一錢則餘藥各一錢

已時食乾物若喫水便吐煎時不得令婦人見

右剗作一貼酒一鍾煎至八分不可過熟熟則不

效露一宿臨發日五更面東溫服令服亦可直至

常山 知母 貝母各等分

雞心檳榔要一雌一雄若重一錢則餘藥各一錢

已時食乾物若喫水便吐煎時不得令婦人見

常山四兩酒浸一宿曬乾 蒼朮泔浸曬 檳榔

草果各二兩

右爲末將浸常山餘酒煮糊和九梧子大每服五

十九前一日臨臥時溫酒送下便臥至當發日難

鳴時服七十丸忌生冷熱物一方無蒼朮草果

黃丹 菜豆粉各一分

右爲末於五月午時粽子尖和九梧子大空

泄脾寒瘧疾不愈振寒少熱面青不食或大便溏

紫河車 菽豆各一兩 甘草半兩 破一錢另研

治瘧

寒水石 滑石 石膏 花粉各四兩 甘草一兩

右爲細末每服五錢新水調下

溫脾散

右爲細末後入砒研勻每服半錢新水調下如是隔日發直待臨睡服藥如頻日發只夜深服忌葷酒魚兔等

萬安散濟生方

治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以取效

氣虛胃弱及妊娠不宜服之

蒼朮泔水浸去黑皮剉炒 厚朴薑汁炒 檳榔

陳皮去白 常山酒浸一宿 廿草炙

右六味各一錢半重和勻用水二盞酒一盞煎至

一盞半去滓夜露一宿當發日分作兩服盪溫早

晨進一服俟其發時再進一服忌食熱物片時

紅丸子

專治食瘧

蓬术 京三棱酢煮各二兩 青皮炒香三兩

阿魏一分酢化 胡椒一兩

右爲末別用陳倉米末同阿魏酢煮糊爲丸如梧

桐子大每服五十九加至百丸用薑湯吞下或因

食生果成瘧用麝香湯吞下一方有乾薑礬紅

狐膽丸華惠

治邪瘧發作無時

右爲末別用陳倉米末同阿魏酢煮糊爲丸如梧

桐子大每服五十九加至百丸用薑湯吞下或因

食生果成瘧用麝香湯吞下一方有乾薑礬紅

果附湯濟生方

右爲末於五月午時粽子尖和九梧子大空

泄小便反多

草果仁 附子炮去皮臍

右等分㕮咀每服半兩水二盞生薑七斤棗一枚

煎至七分去滓不拘時候溫服

柴胡 草果 常山 知母 貝母 檳榔

右用酒水同煎露一宿臨發前二時服

截瘧方丹漢

治瘧寒頭痛如破渴飲冰水外多汗出

人參 白朮 黃芪 黃芩 黃連 山梔

川芎 蒼朮 半夏 花粉

右咬咀水二鍾薑三片煎服

又方

治瘧病發渴

生地 麥門冬 天花粉 牛膝 知母 葛根

炒藥 生甘草

右咬咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿半斤 冬瓜葉 官桂 馬鞭草

右焙乾爲末水丸胡椒大每一兩分四服於當發

之前一時服盡一方青蒿一兩冬青葉馬鞭草桂

各二兩未知孰是姑兩存之以俟知者

瘧後服之

白朮 半夏各一兩 黃連 陳皮各半兩

右爲末粥丸梧子大每服六十九薑湯下

草果飲子

草果 川芎 紫蘇葉 白芷 良薑 炙甘草

青皮去白炒 陳皮去白

右等分爲粗末每服三錢水一盞煎至七分去滓

溫服畱查兩服併一服當發日進三服不以時

參蘇飲

橘紅 枳殼 桔梗 甘草炙各半兩 半夏

乾葛 蘇葉 前胡 人參 茶芩各七錢半

右剉每服五錢水盞半生薑七片棗一箇煎微熱

服一方有木香半兩

小柴胡湯

柴胡八兩 黃芩 人參 甘草炙各三兩

半夏半升

右剉每五錢水盞半生薑五片棗一枚煎服不拘

時

小柴胡加桂湯

右服法與本方同

小柴胡湯去人參加桂一兩

桂枝加黃芪知母石膏湯

桂枝湯加黃芪知母石膏各四錢半

右服法與本方同

白芷石膏三物湯

白芷一兩 知母一兩七錢 石膏四兩

右爲粗末每半兩水一盞半煎一盞溫服

趕鬼丹

治一切瘧疾神效

砒一錢 大豆七錢 甘草七寸 雄黃 輕粉

荷葉各半錢

右爲末滴水爲丸如小豆大重午日未出不見雞犬婦人修合每服一丸無根水下平日夜視北斗來日服忌熱物

蒼木湯

治秋深久瘧胃中無物又無癢癖腹高而食少俗

謂瘧氣入腹

蒼木 草烏頭一錢 杏仁三十箇

右爲粗末都作一服水三升煎至一半均作三服

一日服盡迎發而服

尅效餅子下同

治一切瘧疾

定粉 龍腦 麻香各半兩 硫砂一兩一分

荷葉 菜豆粉 炙甘草各五兩 信炙二兩半

右爲細末煉蜜丸每兩作二十九捏作餅金箔二十

十五張爲衣每服一餅以新汲水磨化每日發者

未發前服間日發者不發夜服隔數日發者一日

夜服連日發者凌晨服

十五張爲衣每服一餅以新汲水磨化每日發者

未發前服間日發者不發夜服隔數日發者一日

治久瘧不止

蝙蝠一枚炙 蛇蛻皮一條燒 龍甲一枚酢炙

蜘蛛一枚去足炙 麻香五分

右爲末五月午時研勻入煉蜜和丸麻子大

每溫酒下五丸

瞻仰丸局方

治一切瘧

常山四兩炒存性 草果二兩炒存性

右爲末薄糊丸梧子大每臥時冷酒服五十九五

更再服忌鵝羊熱物

三聖丸

治諸瘧不拘遠近大小

恆山 檳榔各一兩 鮫鯉甲燙焦一兩半

右爲末糯粉糊丸菜豆大黃丹爲衣每服三五十

丸如上法服

定齋草果飲子良方

快脾治瘧

草果 厚朴薑製各二錢 蒼木米泔水浸三錢

半夏 肉陳皮各一錢半 甘草半錢 烏梅一箇

右㕮咀每服半兩水一盞半薑五片棗一枚煎至

七分不拘時服寒多者加乾薑附子熱甚者加柴

胡瘴瘧加檳榔所加者各等分一方加人參一方

熱多者加石膏

虎頭骨丸

治一切瘧疾

虎頭骨酥炙二兩 硫砂細研 牡蠣粉 桂心

川大黃剉炒 知母各一兩 乳香研 甘草炙

烏梅肉炒 附子炮 根殼炒 木香 常山

麝香研各半兩 桃仁三七枚去皮尖雙仁炒

生薑一塊如雞子大半煨半生

右爲末入研藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧

桐子大每服十五丸食前用桃枝湯下

五行神驗丸

治一切瘧疾

鬱花二兩東方桂心一兩方 乾薑一兩西

巴豆一兩北 方 硫黃一兩中 央 腐香少許

右將五般藥於盤內據五方安排定取四月二十八日夜安桌子上於中庭露以香一爐當度心如是露七夜至端午日早修合將巴豆去殼湯煮五十沸搗研餘藥爲散入麝香以薄糊調蕊花末爲丸如櫻桃大合時忌女子等見丸子燒乾於盒內盛發日淨手取以綿裹香火炙令熱男左女右預前帶安耳中便利時除却淨手後再安耳中不得女子搯觸女子患男子與女忌一切葷腥果子一方無麝香

神聖藥師餅

治瘡疾等證

砒 雄黃各一錢半 白芍七錢半 乾膾脂一錢

右各研極細和勻滴水和爲餅子如棋子大每服三餅臨臥細嚼冷水送下忌濕薑葷腥生硬冷物分作三十服虛實大小加減服之

截瘡散

雞骨常山 茯神去皮木 肉桂去粗皮各等分

甘草減半熱多加之

右不犯鐵器爲粗散每服半兩用常酒大半碗浸一宿於當發日早晨空心去查冷服服後不可吃熱湯查再浸或略煎近發時再服一方不用肉桂茯神却用檳榔烏梅要在人增損也凡瘡須是發作三五次後却用截之爲妙

瘡門四

方二湯 麻香丸 知母湯 木香犀角丸 甘草人參飲 蒜丸 朱砂丸 機皮甘草湯

烏梅丸 薑丸 升麻湯 犀角湯

柴胡湯 顏氣湯 枳殼湯 藥餌丸 大補元煎 右歸飲 五福飲 陰煎 加減一陰煎

陰煎 三陰煎 休瘡飲 大和中飲 小營煎 补陰益氣煎 中飲

柴胡飲 一柴胡飲 二柴胡飲 三柴胡飲 四柴胡飲 五柴胡飲 正柴胡飲 柴胡白虎

大溫中飲 蒜陳煎 柴芩煎 柴胡白虎煎 鎮心飲 雪梨茶理陰煎 養中煎

水賦煎 胃開煎 牛膝煎 何人飲 追瘡

單方

醫案

導引

鍼灸

單方

導引

瘡門四

方一
鼈甲丸良同

治肝瘡色蒼蒼然頭掉氣喘久不瘥者或久熱勞

微動如瘡

鼈甲去裙襕酢浸炙 蜀漆葉 烏梅肉炒 常山 知母各一分 甘草炙 苦參 蕤製

石膏各半兩 香豉一合微炒
右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十九未發前米飲下臨發再服

知母湯

治肝瘡上焦壅滯心煩頭疼寒熱不止肌肉消瘦
不下食

知母 地骨皮 升麻各一兩 犀角鑄 人參

龍甲去裙襕酢炙黃 麥門冬去心焙 柴胡

石膏各二兩 生甘草酒拌 虎頭骨酥炙一兩半

右爲粗末搗篩每服四錢水一大盞入香豉五十粒煎至六分去滓不拘時溫服一方無虎頭骨有

赤茯苓一兩

木香犀角丸

治肝瘡

木香 羚羊角鑄 犀角鑄各一兩半 升麻

元參 猪苓 檳榔各二兩半 龜甲酥炙

甘草炙各二兩 故炒五錢

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九用

溫酒或米飲送下日再服體熱即去一方無甘草

檳榔加大黃五兩

右咬咀治心熱爲瘡不止或止後熱不渴乍來乍去令人煩心甚欲飲清水反寒多不甚熱者

甘草一兩 蜀漆三兩 常山 龜甲各四兩

石膏五兩 香豉一合 桔子 烏梅各十三枚

右咬咀以水九升煮取三升分三服

麝香 黃丹炒紫色 砒霜各一分 硫砂一兩
金箔三十片
治心瘡

右細研令勻用粳米飯和丸如梧桐子大男左女
右中指節上用紺絹裹繫一丸發前以冷酢湯下

一丸忌食熱物

硃砂丸

治心瘡

杏仁十枚去皮尖雙仁熟炒微黃 常山一兩
光明砂半兩細研

右爲末研入硃砂令勻煉蜜和丸如梧桐子大未
發前以粥飲下十五丸欲發時再服

橘皮甘草湯

治脾臟不和瀉痢瘡疾腹痛下部無力體重足痿

脚下痛飲食中滿四肢不舉等病陸景淵方會以

治療甚效

橘皮生用 甘草炙 厚朴去皮薑汁製各一兩

羌活 防風 肉豆蔻 白茯苓各二錢五分

川芎半兩 吳茱萸一錢

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分
去滓食前服

人參 飲良同

治脾瘡

人參 甘草炙各三兩 陳橘皮湯浸去白半兩

烏梅三枚去核焙 草豆蔻十枚去皮

右剉爲末每服五錢用濕紙裹煨熟用水一盞生

古今圖書集成

中華書局影印

薑一片棗一枚擘碎煎至一盞未發前溫服

獨蒜丸

能截脾寒

大蒜不以多少

右於五月五日搗爛次入礬紅拌勻爲丸如圓眼

大每服一丸大蒜湯嚼下

良薑丸

醒脾治瘧

良薑二兩

右爲末猪膽汁和丸如梧桐子大紫蘇湯空心下

二十九

人參丸

治肺瘡心寒熱善驚如有所見

人參 鱉甲去裙襠酢炙 常山 甘草炙

桃仁去皮尖雙仁炒研 肉蓴蓉酒浸切焙

升麻各三分 桂心去粗皮五錢 烏梅肉炒

龍齒研各一兩 丹砂研 阿魏研各一分

杏仁去皮尖雙仁炒研半兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸空心用米飲下未發時併二服

杏仁丸

治肺瘡

杏仁四十枚湯泡去皮尖雙仁炒 常山三分

丹砂別研五錢 甘草一分

右爲細末煉蜜和丸如菉豆大每服十五丸未發米飲下日再服之

烏梅丸

治腎瘡令人灑灑然腰脊痛大便難目睭手足寒及諸瘡久不瘥者

烏梅肉炒一兩五錢 常山三分 止一合炒

麝香別研一錢 虎頭骨酥炙 附子炮去皮臍

肉蓴蓉酒浸焙各五錢 桂心 知母焙各一分

桃仁湯浸去皮尖雙仁炒別研一兩

右搗研爲末拌勻煉蜜和丸如梧桐子大每服一十九空腹米飲下未發服一方無知母

蓴蓉丸

治腎瘡

肉蓴蓉酒浸切焙 烏梅肉炒 桂心 甘草炙

升麻各五錢 淡豉炒 桃仁湯浸去皮尖炒研

常山各三分

右搗研爲末和勻煉蜜爲丸如梧桐子大未發日空腹溫酒下二十九米飲亦得至發時更服二十丸

升麻湯

治足少陽瘡身體解你見人心惕惕然熱多汗出

升麻 鱌甲去裙襠酢炙 淡竹葉各一兩

常山一兩五錢 犀角屑 麥門冬去心焙

知母各三兩 甘草炙五錢

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞

升麻湯

治足少陽瘡解你熱多汗出

犀角湯

去滓空心日午溫服

知母 鱌甲酢炙去裙襠各一兩半 石膏研一兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓於未發前溫服

柴胡 常山 知母焙 鱌甲去裙襠酢炙黃

青蒿乾者 甘草炙 枳殼麸炒 官桂各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入柳枝心七枚葱白二寸細切同煎至七分去滓空腹溫服發前再服

順氣湯

右足陽明胃瘡脅脅支滿腹大

厚朴薑汁製 橘紅焙 白朮 半夏製各一兩

乾薑炮 柴胡 甘草炙各五錢

右粗搗篩每服三錢水一盞薑五片薑一枚擘破煎七分去滓不拘時溫服

枳殼湯

治胃瘡心腹脹滿不食

枳殼去瓢殼炒三兩 厚朴去皮薑製 人參

白朮 白茯苓各一兩

右粗搗篩每服四錢水一盞半入生薑一瓣大切煎至一盞去滓溫服

藥餌

治證同前

良薑 吳茱萸 胡椒各一分

右爲細末豬脾一條剉作糲加五味炒之一半滾

藥一半不滾藥並作餌飫有藥者以墨點之遇點者吞下無藥者嚼下一服效

右補元煎

景岳全書下同

治男婦氣血大壞精神失守危劇等證

人參少則用一二錢多則用一二兩熟地少則用

二三錢多則用二三兩山藥炒杜仲各一錢

枸杞當歸各二三錢泄導者去之炙甘草一二錢

山茱萸一錢畏酸否酸者去之

水二鍾煎七分食遠溫服

右歸飲

凡命門之陽衰陰勝者宜此

熟地二三錢或加至一二兩山藥炒枸杞

杜仲薑製各二錢山茱萸肉一錢甘草炙

肉桂各一二錢製附子一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

五福飲

凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最人參隨宜熟地隨宜白术炒一錢五分

當歸二三錢炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

一陰煎

凡瘡疾傷寒屢散之後取汗既多脈虛氣弱而煩渴不止潮熱不退者此亦汗多傷陰水虧而然也

皆宜用此加減主之熟地黃三五錢生地黃白芍藥麥門冬

丹參各一錢牛膝一錢五分甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

加減一陰煎

治證如前而火之甚者宜用此方生地黃芍藥麥門冬各一錢熟地黃二五錢

水二鍾煎七分食遠溫服

右歸飲

水二鍾五分知母地骨皮各一錢水二鍾煎三陰煎

當歸二三錢熟地黃三五錢炙甘草一錢芍藥酒炒棗仁各二錢人參隨宜

水二鍾煎七分食遠溫服

五陰煎

凡真陰虧損脾虛瘧病等證忌用潤滑宜此主之熟地五七錢或一兩山藥炒芍藥炒各二錢

白术炒炙甘草各一二錢扁豆炒二三錢

茯苓一錢五分人參隨宜五味子二十粒

水二鍾加蓮肉去心二十粒煎服

大營煎

治真陰精血虧損等證

當歸二三錢熟地三五七錢枸杞杜仲各一錢炙甘草肉桂去皮各一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

一陰煎

水二鍾煎七分食遠溫服

小營煎

治血少陰虛此性味平和之方也

當歸芍藥炒枸杞各二錢熟地二三錢炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

補陰益氣煎

水二鍾五分知母地骨皮各一錢水二鍾煎三陰煎

休瘡飲

此止瘡最妙之劑也若汗散既多元氣不復或以衰老或以弱質而瘡有不能止者俱宜用此人參白术炒當歸各三四錢炙甘草八分何首烏製五錢

水一鍾煎七分食遠溫服食再煎或用陰陽水各一鍾煎一鍾查亦如之俱露一宿次早溫服一鍾飯後食遠再服一鍾

大和中飲

水一鍾煎七八分食遠溫服

大和中飲

治飲食雷滯積聚等證

陳皮一二錢枳實一錢砂仁五分山楂

麥芽各二錢厚朴澤瀉各一錢五分

水一鍾半加生薑三五片煎服

小和中飲

治瘡病脅膈脹悶

白茯苓陳皮厚朴各一錢五分山楂肉

扁豆炒各二錢甘草五分

水一鍾半加生薑三五片煎服

一柴胡飲

凡感四時不正之氣以致寒熱如瘡等證但外有邪而內兼火者宜此主之

柴胡二三錢芍藥二錢黃芩生地黃

陳皮各一錢五分 甘草八分

水一鍾半煎七八分溫服

一柴胡飲

凡遇四時外感無火者宜此主之

陳皮 厚朴 柴胡各一錢五分 半夏一錢

細辛一二錢 生薑三五片 甘草八分

水一鍾半煎七八分溫服

三柴胡飲

凡人素稟陰分不足或有感冒不得不從解散而

血氣虛弱不能外達者宜此主之

柴胡二三錢 白芍藥一錢五分 炙甘草

陳皮各一錢 當歸一錢泄者以熱代之 生薑三五片

水一鍾半煎七八分溫服

四柴胡飲

凡人元氣不足外感風寒宜此主之

柴胡二三錢 炙甘草一錢 生薑三五片

當歸二三錢泄者少用 人參二三錢或五七錢

水一鍾半煎七八分溫服

五柴胡飲

凡中氣不足而外邪有不散者非此不可

柴胡一二三錢 芍藥炒一錢五分 當歸

白朮各二三錢 熟地三五錢 炙甘草一錢

陳皮酌用或不必用

水一鍾半煎七分食遠熱服

柴胡一二錢 防風 甘草各一錢 芍藥二錢

正柴胡飲

陳皮一錢五分 生薑三五片

水一鍾半煎七八分熱服

麻桂飲

治陰暑瘧疾夏月用之不必厚蓋但取津津微汗

陳皮隨宜用或不用亦可

水一鍾半加生薑五七片或十片煎八分去浮沫

不拘時服

大溫中飲

治一切陽虛寒瘞陰暑之證

當歸泄者以山藥代之 熟地 白土炒各三五錢

甘草炙一錢 人參二三錢甚者一兩或不用

柴胡二三四錢 麻黃 肉桂 乾薑炒各一二錢

或用根生薑三五七片

水一鍾煎七分去浮沫溫服或略蓋取微汗

柴陳煎

治傷風兼寒多痰瘡等證

柴胡二三錢 陳皮一錢半 甘草一錢 半夏

茯苓各二錢 生薑三五片

水一鍾半煎七分食遠溫服

治傷寒表邪未解外內俱熱瘡瘍等證

柴胡 黃芩 桔子 濤瀉 木通各二錢

水一鍾煎八分溫服

柴胡白虎煎

治陽明溫瘡表邪不解等證

柴胡 黃芩 麥門冬各二錢 石膏三錢
細甘草七分

水一鍾半加竹葉二十片煎服

歸柴飲

治營虛不能作汗及真陰不足外感寒邪難解者

當歸一兩泄者以冬木 柴胡五錢 炙甘草八分

水一鍾半煎服或加生薑三五片或加陳皮一錢

或加人參

雪梨漿

解煩熱退陰火此生津止渴之妙劑也

清香甘美大梨削去皮

別用大梔盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少項

水必甘美但頻飲其水勿食其粗退陰火極速也

理陰煎

通治真陰虛弱等證

熟地三五七錢或一二兩 炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢 乾薑炒黃色一二三錢

或加肉桂一二錢

水一鍾煎七八分熱服此方加附子卽名附子理

陰煎再加人參卽名六味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證

養中煎

治瘡病中氣虛寒者

人參一二三錢 山藥炒黃 白茯苓各二錢

扁豆炒二三錢 甘草炙一錢 乾薑炒一二錢

水一鍾煎七分食遠服

溫胃飲

治中寒瘡病

人參一二三錢或一兩 白朮炒一二錢或一兩
扁豆炒一錢 炙甘草 陳皮各一錢或不用

乾薑炒黑一二三錢 當歸一二錢酒澑者勿用

水二鍾煎七分食遠溫服

胃關煎

治脾腎虛寒瘡病

熟地三五錢或一兩 山藥炒 扁豆炒各二錢
吳茱萸製五七分 炙甘草一二錢 焦乾薑

白朮炒各一二三錢

牛膝煎

水二鍾煎七分食遠溫服

牛膝煎

截瘡大效凡邪散已透而血氣微虛宜此主之

牛膝一錢 當歸 陳皮各三錢

右用好酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎至八分溫服

何人飲

凡氣血俱虛久瘡不止宜此截之

何首烏三錢至一兩隨輕重用之 當歸二三錢

人參三五錢或至一兩 陳皮二三錢大虛者不用

煨生薑三片多塞者用三五錢

水二鍾煎八分於發前二三時溫服若善飲者以不

酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎服亦妙再煎不必用酒

追瘡飲

凡血氣未衰屢散之後而瘡有不止者用此截之

何首烏一兩製 當歸 甘草 半夏 青皮

陳皮 柴胡各三錢

右用井水河水各一鍾煎一鍾相亦如之同露一宿次早溫服一鍾食遠再服一鍾

木賊煎

凡瘡疾形實氣強多溫多痰者宜此截之大效

半夏 青皮各五錢 木賊 厚朴各三錢

白朮 蒼朮 檳榔各一錢

酒二鍾煎八分露一宿於未發之先二時溫服

半夏 青皮各五錢 木賊 厚朴各三錢

白朮 蒼朮 檳榔各一錢

酒二鍾煎八分露一宿於未發之先二時溫服

單方

冬霜以雞羽掃之瓶中密封陰處久亦不壞凡寒熱瘡疾取一錢半熱酒服之

下本草邪瘡取燒尸場上土同葱搗作丸塞耳或繫膊上即

止男左女右

斷絕熱瘡五月五日午時取蚯蚓屎以薑和九梧桐子大硃砂爲末每服三丸無根水下忌生冷即止皆

效或加菖蒲末獨頭蒜同九方書裏

寒熱瘡疾體虛汗多者黃丹百草霜等分爲末發日空心米飲下三錢不過二服愈或糊丸或蒜丸皆效

下附后方同

又方黃丹飛炒一兩恆山末三兩蜜丸梧子大每服

五十九溫酒下平旦及未發將發時一服即效

端午日用黃丹炒二兩獨蒜一百箇搗丸梧子大每

服九丸空心長流水面東下一三發後乃用神效亦

又方黃丹炒建茶等分爲末溫酒服二錢三因

治瘡疾普濟方

又方黃丹飛焙糊丸芩子大每棗子一枚去核包

一丸紙裹煨熟食之

溫瘡不止黃丹炒半兩青蒿童尿浸二兩爲末每服二錢寒多酒服熱多茶服

存七

瘡疾寒熱一日一發或二日發或三日一發古城石灰一錢頭垢五靈脂各一錢研末飯丸皂子大每服一丸五更無根水下即止

集元

不二散用砒一錢剉二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙壓去油入茶三兩爲末每服一錢發日早冷茶

下本草度

瘡瘍鬼瘡食瘡蛇含石末一兩信石末一兩研勻入

水火鼎內上以瓈蓋六一泥固濟煅至藥升在瓈刮

下爲末米糕糊丸菉豆大雄黃爲衣每服一丸黑豆研水五更送下

下同

久瘡不止用硫黃硃砂等分爲末每服二錢臘茶清

下發日五更服當日或大作或不作皆其效也寒多倍硫黃多倍砂

又方用硫黃臘茶等分爲末發日早冷水服二錢二

服效寒多倍硫黃多倍茶

溫瘡不止當歸一兩水煎飲日一服

聖濟總

諸瘡寒熱赤脚馬蘭搗汁入水少許發日早服或入少糖亦可

瘡疾寒熱用青蒿一握水一升搗汁服之

附后

又方用端午日米青蒿葉陰乾桂心等分爲末每服一錢先寒用熱酒先熱用冷酒發日五更服之切忌

發物

又方青蒿二兩童子小便浸焙黃

丹半兩爲末每服二錢白湯調下

七存

瘡疾寒熱齊頭蒿根滴金根各一把搗生酒一錢未發則服以查傳寸口男左女右二日便止海上名方

久瘡不瘥者耳子或根莖亦可焙研末酒糊丸梧子大每酒服三十九日二服生者搗汁服亦可集驗

勞瘡積久不止者長牛膝一握生切以水六升煮一升分三服清早一服未發前一服臨發時一服外臺秘要

瘻瘍邪熱多葵子陰乾爲末酒服一錢午日取花接手亦去瘡聖惠

瘡疾寒熱馬鞭草搗汁五合酒一合分二服千金方

繫臂截瘡旱蓮草搗爛男左女右置寸口上以古文錢壓定帛繫住良久起小泡謂之天灸其瘡即止甚

效生
瘡疾不止蒴藋一大握炙令赤色以水濃煎一盞欲

瘡疾寒熱馬鞭草搗汁五合酒一合分二服千金方

繫臂截瘡旱蓮草搗爛男左女右置寸口上以古文錢壓定帛繫住良久起小泡謂之天灸其瘡即止甚

效生
瘡疾寒熱馬鞭草搗汁五合酒一合分二服千金方

繫臂截瘡旱蓮草搗爛男左女右置寸口上以古文錢壓定帛繫住良久起小泡謂之天灸其瘡即止甚

效生
瘡疾寒熱馬鞭草搗汁五合酒一合分二服千金方

繫臂截瘡旱蓮草搗爛男左女右置寸口上以古文錢壓定帛繫住良久起小泡謂之天灸其瘡即止甚

效生
瘡疾寒熱馬鞭草搗汁五合酒一合分二服千金方

繫臂截瘡旱蓮草搗爛男左女右置寸口上以古文錢壓定帛繫住良久起小泡謂之天灸其瘡即止甚

棗去皮一枚搗成丸梧子大清旦先發時各服一丸白湯下

脾寒厥瘡先寒後熱名寒瘡但寒不熱面色黑者名

厥瘡寒多熱少面黃腹痛名脾瘡三者並宜服此不

蛀草烏頭削去皮沸湯泡二七度以盞蓋良久切焙

研稀糊丸梧子大每服三十九薑十片棗三枚葱三

根煎湯清早服以棗壓之如人行十里許再一服絕

勿飲湯便不發也

東坡方

新久瘡用葛葎草一握去兩頭秋冬用乾者恆山

末等分以淡漿水二大盞浸藥星月下露一宿五更

煎一盞分二服當吐痰愈

脾寒瘡石胡荽一把杵汁半椀入酒半椀和服甚

效生
瘡疾不止火麻葉不問茱萸鍋內文武火慢炒香取

起以紙蓋之令出汗盡爲未臨發前用茶或酒下移

病人原睡處其狀如醉醒即愈

前頓服取吐或漫酒飲之

又方用常山一兩秫米一百粒水六升煮三升分三

服先夜未發臨發時服盡

諸瘡久瘡用三姓人家寒食麪各一合五月五日午

時采青蒿搗自然汁和丸菉豆大臨發日早無根水

下一丸一方加炒黃丹少許

生大

甘草三寸生薑一塊以童子小便二升煎一半溫服

瘡疾寒熱煮豉湯飲數升大吐即愈

附方

瘡疾寒熱翻白草根五七箇煎酒服之

熱瘡不止翹搖草杵汁服之

廣利方

斷截瘡紫載一握搗爛於周身摩擦得汗即愈

附方

男女瘡疾馬齒莧搗紮手寸口男左女右

瘡疾寒熱翻白草根五七箇煎酒服之

熱瘡不止翹搖草杵汁服之

廣利方

甘草三寸生薑一塊以童子小便二升煎一半溫服

瘡疾寒熱煮豉湯飲數升大吐即愈

附方

鬼瘡寒熱樹上自乾桃子二七枚爲末滴水丸梧子

大硃砂爲衣每服一丸侵晨面東井華水下良

附方水

五種瘡疾用桃奴十四枚巴豆七粒黑豆一兩研勻

以冷水和勻丸如梧子大硃砂爲衣發日五更念藥

王菩薩七遍井華水下一丸立瘥不過三次妙不可

養生言主論

瘡疾不已桃花爲末酒服方寸匕良

梅師方

瘡瘍積瘡臨發時以酢和附子塗於背上

附方同

溫瘡熱多恆山一錢小麥三錢淡竹葉一錢水煎五

更服甚

藥性論

瘡瘍積瘡臨發時以酢和附子塗於背上

附方同

瘡瘍積瘡巴豆一枚去心皮射罔去皮如巴豆大大

手亦去瘡

聖惠

瘡疾寒熱青皮一兩燒存性研末發前溫酒服一錢臨時再服

聖惠

久瘡用真阿魏好丹砂各一兩研勻米糊和九皂子

大每空心人參湯化服一丸卽愈

千金下附

瘡瘍寒熱阿魏胭脂各一豆大研勻以蒜膏和覆虎

口上男左女右

聖濟總錄

瘡瘍寒熱青皮一兩燒存性研末發前溫酒服一錢臨時再服

聖惠

久瘡用真阿魏好丹砂各一兩研勻米糊和九皂子

大每空心人參湯化服一丸卽愈

千金下附

瘡瘍寒熱阿魏胭脂各一豆大研勻以蒜膏和覆虎

口上男左女右

聖濟總錄