

丁建华 主编



# 人工 流产后的保健 知多少



- ★ 人工流产有哪些禁忌证
- ★ 人工流产术前要注意什么
- ★ 流产后如何用中医调养
- ★ 药物流产应注意什么

专家面对面

健康知识传播新途径



# 人工 流产 后保 健 知 多 少



- 人工流产的利弊
- 人工流产后的保健知识
- 流产后如何避孕
- 流产后的心理调适。

丁建华 主编



# 人工 流产后保健 知多少



## 图书在版编目（CIP）数据

避孕方法知情选择系列/丁建华主编.—北京：中国人口出版社，2009.7

（警营图书角）

ISBN 978-7-5101-0021-5

I. 避… II. 丁… III. 避孕—方法—问答  
IV. R169.41-44

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第109852号

## 避孕方法知情选择系列

丁建华 主编

---

出版发行 中国人口出版社  
印 刷 北京海淀安华印刷厂  
开 本 850×1168 1/32  
印 张 8.5  
字 数 120千字  
版 次 2009年7月第1版  
印 次 2009年7月第1次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5101-0021-5  
定 价 24.00元（全6册）

---

社 长 陶庆军  
网 址 www.rkcbs.net  
电子信箱 rkcbs@126.com  
电 话 (010)83519390  
传 真 (010)83519401  
地 址 北京市宣武区广安门南街80号中加大厦  
邮 编 100054

---

## 编 委 会

主 编：丁建华

本册主编：张 红 温鑫柱

编 委：武进赟 杨 成 陈丽娟 孟凡荣  
杨达仁 丁建宏 何 军



# 目 录

01 流产有哪些分类? .....	1
02 什么是人工流产? .....	1
03 人工流产有没有危险? .....	2
04 人工流产有哪些适应证? .....	2
05 为什么要慎选无痛人工流产手术? .....	3
06 无痛流产和人工流产术后 哪个对身体伤害小? .....	4
07 人工流产术前应注意哪些问题? .....	4
08 人工流产前为何一定要做B超? .....	5
09 人工流产有哪些禁忌证? .....	6
10 哪些情况下不宜 在门诊行人工流产术? .....	6
11 人工流产的最佳时间是什么时候? .....	7
12 无痛人工流产需要做哪些准备? .....	8
13 人工流产术会有哪些并发症? .....	9
14 如何防治人工流产术时的并发症? .....	10
15 人工流产后应注意哪些问题? .....	12
16 人工流产术后在家怎么调养? .....	13
17 人工流产后怎样通过饮食 调养身体? .....	14
18 流产后如何用中医调养? .....	15
19 流产后食疗方法有哪些? .....	16
20 流产后如何进行日常调养? .....	17
21 人工流产后月经不调正常吗? .....	19

武  
汉  
市  
健  
英  
精  
医  
院  
CON  
TE  
NTS  
JINGYING  
TUSHU  
JIAO

武  
警  
武  
警  
CONTENTS  
JINGYING TUSHU JIAO

22 为什么人工流产后会出现月经停止的现象? .....	20
23 流产后如何护理乳房? .....	21
24 流产后需要“坐月子”吗? .....	21
25 人工流产几天后可以洗头发或洗澡吗? .....	22
26 人工流产术后应该怎样避孕? .....	22
27 人工流产术后多久才可以再次怀孕? .....	23
28 人工流产后少量出血,有问题吗? .....	24
29 人工流产后阴道出血多少天算是正常? .....	25
30 阴道炎影响人工流产吗? .....	25
31 早孕人工流产后多久可以同房? .....	25
32 人工流产后1周,怎么测验孕试纸还是弱阳性? .....	26
33 人工流产后第一个月月经怎么算? .....	26
34 人工流产术后出血的原因有哪些? .....	27
35 什么是药物流产? .....	28
36 药物流产有哪些优点与缺点? .....	29
37 药物流产应注意哪些事项? .....	29
38 哪些人可以采用药物流产? .....	30
39 什么情况下不能选择药物流产术? .....	31
40 药物流产怎样避免宫腔感染? .....	32

CONTENTS

禁忌手册

JINGYING TUSHU JIAO

41 药物流产后出血怎么处理? .....	33
42 可以自己做药物流产吗? .....	34
43 为什么第二种药必须到医院吃? .....	35
44 药物流产不全的症状有哪些? .....	36
45 药物流产的成功率是多少? .....	37
46 成功药物流产有哪些特点? .....	37
47 得了宫外孕能不能做药物流产? .....	38
48 药物流产术后应该注意什么? .....	38
49 药物流产后的饮食调养.....	39
50 药物流产后必须复查吗? .....	40



## 01 流产有哪些分类？

自然流产包括：先兆流产、不全流产和完全流产。

人工流产包括：人工流产、药物流产等。

不论是自然流产还是人工流产（人工流产及药物流产），流产后的调养对妇女而言都非常重要。因为流产后，子宫、卵巢等盆腔组织也会经历一个恢复到正常的过程（复旧）。

### 特别提醒

如果调养得宜，则身体状况能恢复得相当不错；如果不注重调养，则健康可能由此走向下坡，严重的甚至会造成不孕，不可不慎！

## 02 什么是人工流产？

人工流产是指怀孕3个月之内“人工”终止妊娠。分为手术流产和药物流产两种方式。手术方式包括负压吸引术和钳刮术。在怀孕12周以前可以行人工流产术。

负压吸引术就是用一根中空的吸管进到宫腔，通过负压将子



宫内的胚胎及蜕膜组织吸出来，适用于怀孕10周以内。

钳刮术适用于胎儿较大时，用卵圆钳将子宫内的胚胎组织钳夹出来。

### 03 人工流产有没有危险？

人工流产术虽然简单快捷，但它毕竟也是一种手术，具有一定的危险性，如可造成出血、感染、子宫穿孔等并发症，所以不能把它当成节制生育的一种常用手段，平时应做好避孕措施。

### 04 人工流产有哪些适应证？

人工流产适用于因母亲原先患有某些严重疾病（如活动性肺结核、严重的心脑血管疾病等），妊娠以后合并其他疾病，或是发现胚胎异常等，不适宜继续怀孕者；以及作为避孕失败的补救措施。

人工流产按怀孕月份大小可分为早期人工流产和中期引产。怀孕12周前做人工流产称为早期人工流产；怀孕12~27周做人工流产称为中期引产。我们这里所谈的内容主要针对早期人工流产。



## 05

## 为什么要慎选无痛人工流产手术？

当前在广告中大肆宣称“三分钟解决问题”、“一觉醒来烦恼全无”的无痛人工流产手术是否真的“无痛”？

无痛不代表无害，建议女性谨慎选择无痛流产手术。

在普通人工流产手术的刮宫过程中，医生会根据接受手术者的疼痛反应来调整技术操作；但在使用麻醉剂之后，接受手术者失去知觉，无法对疼痛作出及时反应，这就加大了手术伤甚至将子宫壁穿穿的可能性。接受手术的女性可能因此失去生育能力，一觉醒来也许面对的是一辈子的“痛”。





## 06 无痛流产和人工流产术后 哪个对身体伤害小？

无痛流产属于人工流产的一种类型。无痛人工流产和人工流产都是人工流产，区别在于前者使用麻醉剂麻醉，在手术过程中不会感到疼痛，其余步骤都是一样的，与术后的恢复关系不大，对身体的伤害是一样的。

## 07 人工流产术前应注意哪些问题？

※ 发现自己怀孕后而又不能或是不想生育时，应尽量争取在停经50天以内做人工流产。因为怀孕月份愈大，手术并发症愈多，对母体身体伤害越大，所以不要等怀孕月份大了再进行流产或引产手术。

※ 做人工流产术前1周内应避免性生活，术前1日要淋浴、更衣，避免着凉和感冒。

※ 手术当天早晨禁食、禁水。

※ 手术时要与医生密切配合，不要过分紧张。




## 08

## 人工流产前为何一定要做B超？

一般来说，在做人工流产前需要做很多术前检查，包括妇科检查、白带常规、B超、HCG尿检、血检、肝功能、心电图，其中，做B超是非常重要也是必不可少的。为何做人工流产前一定要先做B超呢？

正常情况下，根据停经史、尿妊娠试验呈阳性者一般可诊断为怀孕，但必须排除宫外孕（异位妊娠）。只有确诊为宫内孕，才能进行人工流产术，否则会给受术者带来不必要的伤害。而B超是检查确诊宫内孕的可靠手段，因此人工流产术前必须先做B超。

此外，通过B超可以看清孕囊在子宫腔内的位置，这样有助于手术医师顺利进行手术。B超还可以测定孕囊的大小及发育情况，以便在术后测定是否流产完全，以避免不完全流产的情况，而且技术先进的B超可以看到很小的孕囊，这样便于将人工流产手术提前，减轻手术的风险和受术者的痛苦。最后，B超检查可发现子宫有没有畸形，是否双子宫等，以便在术前做出相应的准





备，避免一些不必要的损伤。

由此可见，人工流产手术前做B超是非常重要的。为了手术顺利进行，人工流产手术一定要做好术前工作，并做好B超检查。

## 09

### 人工流产有哪些禁忌证？

※ 各种疾病的急性阶段，如急性阑尾炎、急性泌尿系感染等。

※ 生殖器炎症，如阴道炎、急性或亚急性宫颈炎、盆腔炎等，经抗炎治疗后再手术。

※ 周身情况不良不能胜任手术，经治疗好转后，可考虑住院手术。

※ 术前2次体温在37.5℃以上者暂缓手术。

## 10

### 哪些情况下不宜在门诊行人工流产术？

※ 高血压病人，血压在150/100毫米汞柱以上。

※ 贫血病人，血红蛋白在80克/升及以下。

※ 子宫肌瘤病人，子宫体较大，大于怀孕12周以上子宫者或



合并生殖道畸形患者。

- ※ 怀孕10周以上者。
- ※ 呕吐等早孕反应严重，尿酮体呈阳性者。
- ※ 先天性心脏病、风湿性心脏病者。
- ※ 急性肝炎或浸润型肺结核者。
- ※ 盆腔或脊柱、肢体畸形不能完成手术体位（膀胱截石位）者。
- ※ 以往有子宫穿孔或阴道穹隆、宫颈穹隆部裂伤的历史。
- ※ 一年内3次人工流产，产后半年内怀孕，剖宫产术后一年内怀孕等高危节育手术者。



## 11

## 人工流产的最佳时间是什么时候？

一般来说，早期的人工流产手术常见的有吸宫术（负压吸引术）和钳刮术两种。前者适用于怀孕10周以内，后者适用于怀孕10~14周。

怀孕10周以内时，胎囊比较小，胎儿和胎盘尚未形成，一般



情况下比较容易将胚胎组织吸出，手术中不良反应轻，出血少，手术时间短，术后休息1~2个小时就可以回家，恢复也很快，对身体影响小。

怀孕超过了14周就不能做以上两种人工流产，而需要住院作引产手术，这样更增加了受术者的痛苦和手术的危险性。

## 12

## 无痛人工流产需要做哪些准备？

在做无痛人工流产手术前后，应该注意如下问题：

(1) 无痛人工流产手术前，必须要经过医生检查，以确定是宫内怀孕。

(2) 要做好如下各项检查，如心电图、B型超声波、白带常规以及血常规、凝血等抽学检查。

(3) 手术前4小时，应该绝对禁食、禁水，防止麻醉后引起呕吐反应，呕吐物进入气管而导致窒息。





(4) 手术结束后，在清醒后的半小时至1小时左右，方可进食、进水。

(5) 手术后，多注意营养和休息，尤其是避孕，1个月内禁止同房，以防发生宫腔感染。

(6) 手术后，至少应用3天抗生素预防感染。

## 13

### 人工流产术会有哪些并发症？

#### 手术时候的并发症：

- ※ 子宫出血在200毫升以上；
- ※ 人工流产综合征又称心脑综合征，发生率12%，受术者突然出现心动过缓，心律失常，血压下降，面色苍白，大汗淋漓等一系列症状，严重者甚至发生昏厥和抽搐；
- ※ 子宫穿孔；
- ※ 漏吸，胚胎组织未能吸出，以至妊娠继续发展。

#### 近期并发症：

- ※ 人工流产不全，术后阴道出血长达15天以上；
- ※ 术后2周内由于致病菌的感染而出现子宫内膜炎、附件炎、盆腔炎等；宫腔积血；
- ※ 宫腔粘连，术后闭经或经量显著减少，有时伴周期性下腹疼痛或有子宫增大积血。