

绿色健康忠告
丛书

摆脱难言之隐 的困扰

——性传播疾病的家庭防治与康复



天津科技翻译出版公司

摆脱难言之隐 的困扰

——性传播疾病的家庭防治与康复

纪黎明 / 胡世敏 / 翟玉英 编著

天津科技翻译出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

摆脱难言之隐的困扰：性传播疾病的家庭防治与康复/纪黎明等编著。—天津：天津科技翻译出版公司，2002.1
(绿色健康忠告丛书)

ISBN 7-5433-0410-4

I . 摆… II . 纪… III . ①性病 - 防治 ②性病 - 康复 IV . R759

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 071317 号

出 版：天津科技翻译出版公司

出 版 人：邢淑琴

地 址：天津市南开区白堤路 244 号

邮政编码：300192

电 话：022-87893561

传 真：022-87892476

E - mail：tsttbc@public.tpt.tj.cn

印 刷：廊坊人民印刷厂

发 行：全国新华书店

版本记录：850×1168 32 开本 5 印张 80 千字

2002 年 1 月第 2 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

定价：9.60 元

(如发现印装问题，可与出版社调换)

前 言

性病，是指以性行为为主要传播方式的一组传染病，对人类健康危害极大。近年来，随着对外开放、旅游事业的迅速发展，国内外人员的频繁交往流动，患者人数成倍增长，流行范围日益扩大，并且性病的病种明显增多。面对这一严峻形势，积极防治性病已是当务之急。因此，性病不仅是医学问题，又是严重的社会问题。

本书以浅显的语言，对性病防治的基本知识，向读者作以全面的介绍，其中不乏新观点。祝性病患者尽早痊愈，并自尊自爱，享受健康的生活。

编 者



什么是性病，性病都包括哪些	1
怎样控制性病的发生与流行	2
什么是梅毒	4
梅毒的感染途径是什么	4
梅毒病人的病程是如何分期的	6
一期梅毒——硬下疳的表现如何	8
二期梅毒的表现如何	9

- | | |
|----|-----------|
| 11 | 三期梅毒表现如何 |
| 13 | 什么是潜伏梅毒 |
| 14 | 什么是胎传梅毒 |
| 15 | 什么是早期胎传梅毒 |
| 16 | 什么是晚期胎传梅毒 |
| 17 | 如何诊断梅毒 |
| 18 | 怎样治疗梅毒 |

19	梅毒患者的随访和复治	33
20	如何预防梅毒	34
22	什么是淋病	35
23	淋病是怎样传染的	36
25	男性淋病的临床症状是什么	36
26	什么是急性淋菌性尿道炎	38
28	什么是急性淋菌性后尿道炎	39
30	什么是慢性淋菌性尿道炎	40
30	女性淋病的主要临床症状是什么	42
	淋病的其他表现还有什么	33
	什么是幼女淋菌性外阴阴道炎	34
	什么是新生儿淋菌性结膜炎	35
	淋病有哪些组织病理改变	36
	如何诊断淋病	36
	怎样治疗淋病	38
	怎样治疗淋病，愈后如何	39
	怎样预防和控制淋病的发生与蔓延	40
	什么是软下疳，其传染途径是怎样的	42

软下疳的主要临床表现是什么	43
如何诊断与鉴别诊断软下疳	47
怎样治疗软下疳	50
什么是性病性淋巴肉芽肿	51
性病性淋巴肉芽肿的主要表现是什么	52
如何诊断与鉴别诊断性病性淋巴肉芽肿	54
怎样治疗性病性淋巴肉芽肿	56
什么是腹股沟肉芽肿	57
腹股沟肉芽肿的主要表现是什么	58
60 如何诊断及治疗腹股沟肉芽肿	
62 什么是生殖器疱疹	
63 生殖器疱疹的临床症状是什么	
66 怎样预防和治疗生殖器疱疹	
67 什么是尖锐湿疣	
69 湿疣的临床症状是什么	
69 孕妇尖锐湿疣有何临床表现	
71 孕妇患上尖锐湿疣如何治疗	
72 产妇患尖锐湿疣是否需剖腹产	

73	尖锐湿疣复发怎么办	
76	什么是阴道滴虫病	
77	阴道滴虫病的传染途径是什么	
79	阴道滴虫病的主要表现是什么	
80	怎样治疗和预防阴道滴虫病	
81	什么是生殖器念珠菌病	
82	念珠菌的传染途径是怎样的	
83	念珠菌病的临床症状是什么	
84	怎样治疗和预防念珠菌病	
	什么是非淋菌性尿道炎	85
	什么是沙眼衣原体感染	86
	沙眼的流行病学是什么	88
	非淋菌性尿道炎的症状如何	90
	如何治疗衣原体性尿道炎	93
	人疥虫的形态及传染途径是什么	94
	人疥虫的临床症状是什么	95
	人疥虫如何检查与治疗	95
	如何预防人疥虫	96

阴虱的形态及传染途径是怎样的	97
阴虱的临床症状是什么	98
阴虱如何检验与治疗	98
怎样对阴虱进行预防	99
什么是传染性软疣	100
什么是人巨细胞病毒感染	102
乙型肝炎为何属于性传播疾病	106
成人T细胞白血病为何也属于性传播疾病	108
哪些性传播疾病与癌症有关	109
 112 什么是艾滋病	
113 艾滋病是怎样传染的	
113 艾滋病有哪些临床症状	
115 如何治疗艾滋病	
116 怎样预防HIV病毒	
118 性病的传播危害有多大	
119 注意观察性生活后的反常表现	
120 如何清洗性器官	
121 中医如何治疗阳痿	

- 122 早泄是可以治疗吗
- 123 性病患者的心理状态是怎样的
- 124 性病患者的羞耻感有哪些表现
- 126 性病患者的负罪感有哪些表现
- 127 性病患者的恐惧感有哪些表现
- 128 性病患者的悲观绝望心理有哪些表现
- 129 性病患者的疑病心理有哪些表现
- 130 性病患者的享乐心理有哪些表现
- 131 性病患者的被社会遗弃心理有哪些表现



什么是性病，性病都包括哪些

性病是一组以性行为为主要传播途径的传染病。在世界范围内广泛流行，对人类健康危害极大。解放前性病曾在我国猖獗流行。我国医学界通常只将梅毒、淋病、软下疳及性病性淋巴肉芽肿列入性病的范畴，称为经典的性病。建国后党和政府积极采取各项防治措施，终于在20世纪60年代取得了在全国范围内基本消灭性病的伟大成绩。但是近年来，随着对外的开放、旅游事业的迅速发展，国内外人员的频繁交往活动，国外思想文化的输入，一些不良的思潮、影响随之而来，使得卖淫、嫖娼等丑恶现象重新出现。吸毒、变态性行为等问题也开始滋生。以致性病在我国再次发生、流行，并且增加了新的病种。除经典的性病外，1975年世界卫生组织规定，凡与性行为、性接触密切相关的各种传染病性疾病统称为性传播疾病(STD)。因此

还包括生殖器疱疹、尖锐湿疣、非淋菌性尿道炎、传染性软疣、阴道滴虫病、生殖器念珠菌病、阴虱、艾滋病等20余种疾病。据估计，全世界每年新发生的STD患者在1亿人以上，尤其是艾滋病蔓延更为迅速。因此对于STD的控制势在必行。只要我们认真贯彻“预防为主”的方针，加强精神文明建设，采取综合治理措施，就一定能够最大限度地控制性病的发生与蔓延。



怎样控制性病的发生与流行

性病主要是通过不正当的性关系而传染的。性伴侣愈多，感染性病的可能性也愈大。因此，提倡性道德，自我约束，可以达到个人预防的目的。通过宣传工作，提高人们的认识，提倡洁身自爱，既不做性病的受染者，也不做性病的传染源。对于性乱交、性犯罪、同性恋、卖淫嫖娼等行为进行认真的管理，多方教育。减少性伴侣，注意性伴侣有无



STD，避免某些性交方式。在性交前或性交后不要滥用抗生素，因为没有一种抗生素能预防所有的STD，并且会导致耐药菌株的发生或引起严重的过敏反应。隔膜、杀精剂、隔膜(阴茎套)-杀精剂合





什么是梅毒

梅毒是苍白螺旋体所引起的一种慢性性病，主要是通过性交传染，也可通过胎盘传给下一代而发生胎传梅毒。梅毒的早期主要侵犯皮肤黏膜，晚期可侵犯全身各个器官，以心血管和神经系统受累最为严重。梅毒可多年无症状，称为潜伏梅毒。15世纪中叶梅毒在欧、亚两洲传播，16世纪初传入我国，19世纪广泛在我国流行，20世纪50年代以来在我国基本控制了梅毒。近年来，随着对外开放以及国际旅游事业的迅速发展，梅毒又在我国传播，甚至更为广泛，给人类带来灾难。




梅毒的感染途径是什么

梅毒的主要感染途径是性接触，未经治疗的



病人在感染后的第1~2年内最具有传染性，这些病人的皮肤与黏膜损害表面有大量的梅毒螺旋体，很容易通过性接触者的皮肤与黏膜上的损伤而传播。



服、毛巾、剃刀、餐具及烟嘴等。

● 医务人员及实验室工作人员在接触病人或含有梅毒螺旋体的标本时，因疏忽也可受染。

● 感染后1~2年病人的血液输给其他人时也可发生传染。



梅毒病人的病程是如何分期的

根据传染途径的不同，梅毒可分为后天与先天（胎传）梅毒，根据其有无传染性分为早期梅毒和晚期梅毒。

早期梅毒：病人感染后2年内的梅毒病人称早期梅毒。如果在2年内给以足量的抗梅治疗，可以治愈，如不进行治疗，则患者可由一期梅毒发展为二期梅毒。晚期（三期）梅毒是病人感染2年以后的病人，可发生心血管梅毒（10%）、中枢神经梅毒（10%）、良性梅毒（15%）。

梅毒螺旋体侵入人体后，一方面在皮肤黏膜下

繁殖，另一方面很快沿着淋巴管到达附近的淋巴结，经过2~14周(10~90天)的潜伏期在侵入部位发生炎症反应，称为硬下疳。经数周后即使不治疗，硬下疳也会自然消失。在硬下疳存在的这一段时期，临幊上称为一期梅毒。

硬下疳出现以后，由于梅毒螺旋体通过皮损附近的淋巴结进入血液传播到全身，使人体几乎所有的组织及血管受累，经过6~8周的潜伏期，可出现低热、浅囊淋巴结肿大、皮肤黏膜疹、骨膜炎、虹膜睫状体炎及脑膜炎等症状，这一段时期，临幊上称为二期梅毒。二期梅毒疹内含有很多梅毒螺旋体，因此传染性也最强。二期梅毒的症状可以不经过治疗而自然消失，进入潜伏状态(或隐性梅毒)。

一期、二期梅毒统称为早期梅毒，病期在2年以内。病期在2年以上的临幊上称为三期梅毒，即晚期梅毒。

梅毒的病程经过是指从未經治疗的病人的自然过程。由于治疗以及个人身体的强弱、抵抗力大小的不同，每个病人的病程变化是不同的。