

妇产科中医药临床实验

长治市妇幼保健院 編

山西人民出版社

妇产科中医藥临床实验

长治市妇幼保健院 編

山西人民出版社出版 (太原井州路七号)

山西省书刊出版业营业許可証晋出字第2号

太原印刷厂印刷 山西省新华书店发行

开本: 787×1092 1/32 · 1 印张 · 22,000字

一九五九年二月第 一 版

一九五九年四月太原第一次印刷

印数: 1—11,090册

統一书号: 14088·16

定 价: 一角二分

前 言

我院在长治市委的领导与鼓舞下，对妇产科疾病，凡不需手术者，大量使用中药。几年来，实践证明，祖国医学是丰富多采的。为了更有力地服务于广大群众，特将我院在妇产科临床上常用而有效的中药方剂，本戒滥戒夸，求精求验的精神，整理出来，作为医界中的经验交流资料。但限于负责整理者的文化与业务水平，缺点错误势所难免，希望读者指正。

編者

一九五九年一月

目 錄

- 一 用附子湯等中藥治療流、早產…………… (1)
- 二 使用小半夏加茯苓湯治療妊娠惡阻…………… (5)
- 三 使用縮宮逐瘀湯治療胎盤殘留…………… (6)
- 四 使用大溫經湯治療更年期子宮出血…………… (7)
- 五 用桂枝茯苓丸等中藥治療生殖器慢性炎症…………… (9)
- 六 用當歸生薑羊肉湯等中藥治療婦女癥瘕…………… (13)
- 七 使用益母脂血丹治療月經不調…………… (14)
- 八 使用速效下乳湯治療產後奶少…………… (15)
- 九 使用四妙湯與陽和湯治療乳腺炎…………… (17)
- 十 使用補中益氣湯的臨床實驗…………… (19)
- 十一 使用歸脾湯的臨床實驗…………… (21)
- 十二 使用當歸芍藥散的臨床實驗…………… (22)
- 十三 使用當歸補血湯的臨床實驗…………… (23)
- 十四 用四物湯等中藥治療產後發熱…………… (24)
- 十五 用加味溫胆湯等中藥治療嘔吐腹瀉…………… (26)
- 十六 用黃芪湯治療子宮頸癌…………… (29)
- 十七 使用生化湯的臨床實驗…………… (30)
- 十八 針灸用於婦科小兒科的臨床實驗…………… (30)

一 用附子湯等中藥治療流、早產

1. 附子湯

主治：婦女有流、早產史，妊娠後下腹冷感，觸診下腹冰冷，患者屢孕屢墮，如不治療或治療不得其法，則終身不能大生（某些急慢性傳染病，跌打損傷，子宮內膜炎等引起的流、早產除外）。

藥品：白朮三錢，茯苓三錢，黨參五錢，附子三錢，白芍三錢（以上是原方）。本方若加黃芪、續斷、當歸、炙草，療效更著。

用法：以水五百西西，煎成二百西西，頓服。可估計在流、早產前一兩個月即開始服，每半个月或一個月服一劑，連服三劑，即達到保胎目的。

治驗：（1）王××年二十歲（院號2746），過去曾流產三個月胎兩次。1955年十二月十二日，孕已三月，因下腹微人，來院門診，自訴下腹有冷感，觸診下腹冰冷。即採用本方治療，并囑其每十天來門診一次。前後共服本方四劑，已將墮胎月份渡過，觸診其下腹溫和已如常人。至1956年七月十九日來我院待產，住十余日，安產一男，體重六斤十二兩。

（2）皇甫××年二十四歲（院號429）。以往有兩次早產史。此次妊娠八個月，于1956年一月二十日來門診，主訴肚脹下腹冷感，听診胎心微弱，六脈沉緊，康氏反映為陰性。當即使用本方，連服二劑。產前來我院待產，三月一日分娩一

女，体重五斤十四两。（3）桑××年二十岁（院号877），1954年与1955年各流产六个月胎一次。这次妊娠六个月，下腹冷感，胀闷下坠，康氏反应为阴性，服本方二剂，大生。

共計两年內以本方治疗同样患者三十名，均达到了保胎目的。

查附子一药，各家本草原有妊娠禁忌之說，而且有胎前无热药的警告，又因朱丹溪以黄芩、白朮为安胎圣药，因此后人多不敢輕易一試。但金匱要略載：附子湯治“妇人怀孕六、七月，脉弦发热，胎胀，腹痛恶寒，少腹如扇”症状。所以我們应根据病情使用。因为內經里有“有故无陨”的記載。本方保胎作用在于附子之增强血行，兴奋細胞。又，此药治疗流、早产的原理与苏联产科学主张用透热疗法治疗先兆流、早产的原理暗相吻合，苏联产科学認為子宫血管和全身血流的隔絕是引起流、早产的主因，用药物或理疗使子宫血管血液充盈，孕妇心力增强，便可使子宫收缩减弱，肌肉减少紧张，則神經自能正常（見苏联巴甫洛夫高級神經活动杂志1951年5期尼巴拉也夫）。

陈修园述：“余內子每得胎三月必堕，遵丹溪用药連堕五次。余赴省应试，內子胎适三月，漏血欲堕，先慈延祖伯字延义，以四物湯加鹿角胶、补骨脂、杜仲、川續断各二錢，一服而安，令每旬一次。余归已六閱月矣，閱其方大駭，叹曰：补骨脂本草載其堕胎，又合鹿角胶、杜仲之溫，芎藭之行以助之，竟能如此之效，設余在家，势必力爭，以黄芩、白朮堕之矣。此后凡遇胎漏欲堕之症，不敢专主凉血，而半产应期而堕者，专主火衰論治。扁鵲謂：‘命門为男子藏精女子系胞之所’。胎孕系于命門，命門之火即是元氣，以此养胎故有日长之势，譬如果实生于春而結于夏，若春夏

忽作非时之寒气冷风，則果实亦因之而黄陨矣。惟用大补大温之剂，令子宫常得暖气，則胎自日长而有成。若非慣患半产不必小题大做。”

查开宝本草載有补骨脂堕胎之說，而妇人良方通气散用补骨脂二两炒为末，先嚼核桃肉半个，空心温酒調下二錢，治妊娠腰痛神效。这方，我曾用于临床，效果良好。据文献看，“药惟病当之”一語，确有至理。

2、芎歸膠艾湯

主治：跌扑损伤及持重伤胎，見血腹痛欲堕。并治子宫机能性出血。

藥品：川芎二錢，阿膠四錢（另包），炒艾叶三錢，当归三錢，白芎三錢，生地六錢，炙甘草二錢。

用法：以水五百西西，煎成一百五十西西，去渣，下阿膠化尽，頓服。

治驗：（1）李××年二十七岁（院号239），妊娠三个月，腹痛腰困阴道流少量血，发病一天即来院治疗。診斷为先兆流产。以本方加續断、杜仲，服药一剂血止胎安。（2）赵××年二十一岁（院号2898），妊娠五个月，因騎車時間过长，胎伤見紅，六天来下腹疼痛。听診胎心微弱。以本方加菟絲子、坤草、黃芪，二剂胎安。（3）申××年二十五岁（院号2927），妊娠六个月，下腹疼痛，阴道出血，經检查子宫未开，听診胎心尙有。即服本方一剂血量减少，再剂血止出院。

我院凡遇跌扑持重伤胎，甚至見紅欲堕无习惯性流、早产史者，一律使用本方，在子宫口未开，血流不多，羊膜未

破的情况下，一般疗效很好。本方对子宫功能性出血，經我院試用，疗效也显著。

3、保胎無憂散

主治：胎伤腹痛腰困，甚至見血不止。

藥品：当归二錢，川芎二錢，黑芥穗一錢，炒艾叶一錢，面炒枳壳八分，炙黃芪五錢，菟絲子一錢，川芎活八分，姜川朴一錢，川貝母一錢半，白芍一錢半，炙甘草八分，生姜三片。

用法：以水四百西西，煎成一百五十西西，頓服。

治驗：張××地委家屬，年三十歲，（門診號8002）第一胎大生，第二胎五個月流產，第三胎四個月流產。於1956年七月門診，經檢查為五個月胎，阴道有少量血性分泌物。主訴腰部痠困，因流產，都是先發現腰困。問診下腹無冷感，觸診下腹溫和，非附子湯之的症，即使用本方一劑，七月二十五日復來門診，主訴腰已不困了。後於九月二十日又來門診，妊娠已七個月，因縫紉衣服屈卷過久，胎傷見紅，微有宮縮症狀。聽診有胎音，又服本方一劑，血止胎安。類似者五例，均以本方獲得保胎。

普子明以撐開作用解釋本方，實際方中是一派疏通血脈增進血液循環的藥品。黃芪有充進心臟機能的功用，因而可使血液循環旺盛，凡子宮下垂、脫肛等症，皆用為要藥，故本方加重其用量。

二 使用小半夏加茯苓湯治疗妊娠

恶阻

主治：妊娠呕吐与恶阻。

藥品：半夏四錢，茯苓四錢，生姜五錢。

用法：水煎，冷透零服，随吐随服，約一至三剂可以止吐。

治驗：（1）韓××长洽市干部家屬，年二十岁（院号1342），于1956年一月二十二日入院，主訴近半月来，飲食物下咽即吐。經內診触見子宮增大如鵝卵，約两个半月胎。患者营养欠佳，皮肤干燥，两目微呈凹陷，尿量减少，五六天大便一次，口干舌燥，舌苔白厚，精神疲憊。因脫水体溫上升至 38.7°C ，脉搏数小。当即补給葡盐水一千毫升，随服溴剂止吐，未效。即由我院中西医会诊，中医主張用此方，如法服之，待药服完后，呕吐全止。进以流动食物，精神逐渐好轉。于一月二十五日出院。月余后，我院韓大夫曾遇該患者在街購物，精神很好。（2）牛××平順人，年二十七岁，业农（院号2138），1956年三月二十八日入院。內診为八十天左右妊娠，呕吐二十天，湯水下咽即吐，胃部膨悶，肌肉消瘦，精神疲憊，已二十天不大便，两目凹陷，口干舌燥，語言无力，由其夫代为主訴。当时因脫水体溫上升至 38.6°C 。先补給葡盐水一千毫升，不用西药止吐，給以本方零服，呕吐渐止，食欲大增，共住院三天。（3）张××年二十三岁（院号2208），主訴呕吐半个月。以前曾妊娠三次，每次都因此症入院，用西药治疗均延至月余才愈，这次很耽忧，要求

人工流产，症状略同以上两例。經內診为两个多月妊娠。又以本方服如前法，一剂吐减，二剂痊愈。停药一日，呕吐复发，但較以前略輕，又进一剂吐止。患者怕复发，不敢出院，又住四天，安然无事，以后出院。

我院在二年內治疗同样患者五十余名，均获显著疗效。

按半夏堕胎之說，始于本草別录。雷公药性賦一書，把它編入妊娠禁忌歌內，以致医者看到有半夏堕胎之說，虽妊娠有用半夏的必要，但不敢輕易一試，因之特效药品受到限制，使患者不能很快地摆脱病苦。虽經前輩如陈修园、程鐘齡等引用內經“有故无損”一段加以說明，仍有些同道临症疑惧，畏首畏尾。經我院試用，无一例事故发生。希进一步研究，得到本方药理的正确意义。半夏、生姜为止吐圣药，非单治恶阻而已，凡一切呕吐均可配伍用之。茯苓鎮靜利尿和胃，三药配合，疗效更增。但此方必須煎成后冷透零服，若頓服必致全部吐出，浪費了药。这就不是方无效，而应归咎于服药不得法。

三 使用縮宮逐瘀湯治疗胎盘

殘留

主治：胎盘不下及胎盘殘留。

藥品：当归一两，川芎八錢，生蒲黃三錢，五灵脂三錢，益母膏五西西。

用法：前四味以水三百西西，煎成一百西西，冲益母膏頓服。

治驗：（1）武××年十九岁（院号2808），經閉三个

多月，（1956年五月十八日經閉）于八月二十三日住院。主訴昨天下午飛跑往听報告，今天陰道有少量出血，下腹疼痛。經檢查宮口沒開，決定先服保胎湯。九月一日流出血塊一塊，無不適感，仍然觀察。九月三日繼續出血，宮口仍未開，經最後診斷為滯留流產。遂擬定本方于本日下午九點鐘服下，安睡一夜，次日晨間覺下腹急迫，下午兩點赴廁所，忽覺血流至股，急返回病房，下組織物一塊，流血約八十西西。檢查該組織無胎兒，只是 6×5 cm的一個完整胎盤，以後血量很少，無任何不適感：（2）靳××年二十六歲（院號2766），子宮出血淋漓不斷，下腹痛，病已六天，來院治療。問診閉經四十天，因洗衣服腰痛見血。內診子宮增大，宮口約開半指，診斷為不完全流產。經服本方六個鐘頭後，流出瘀塊很多，以後逐漸減少，腹痛亦止，不數日出院。

孫思邈千金要方載：“治血漏不止，或新傷胎及產後瘀血不消作堅，使胞門不閉，淋漓去血，經逾日月不止，未可以諸斷血湯，宜與牡丹皮散、丸等，待血堅消便停也”。這一理論說明不完全流產不可用止血藥物，宜先逐瘀，可見中藥逐瘀有代替刮宮手術的效能。

四、使用大溫經湯治療更年期子宮

出血

主治：婦女更年期子宮出血及一般婦女月經過期量多腹痛。

藥品：吳茱萸三錢，當歸三錢，川芎三錢，白芍三錢，黨參三錢，阿膠三錢，丹皮三錢，半夏三錢，寸冬三錢，桂

枝三錢，生姜二錢，炙甘草三錢。

以上十二味，以水六百西西，煎成二百西西，分兩回，中隔四小時服。

治驗：（1）沈××年四十三歲（院號7502），1956年三月十五日經閉，至五月十八日月經復來，時有时无，服中西藥打針皆無效，延至八月二十五日出血增多，欲住院治療，又乏經濟，該村村長念其子抗戰多年，音信全無，即將情況申報縣衛生局，蒙批准免費治療。于九月六日住院，觀其顏面蒼黃，主訴全身無力，頭暈，四肢熱感，咽干。呀診心臟有收縮期雜音，舌面光滑無苔，（久病氣血已虧，故舌面無苔）血色素百分之五十。結合內診化驗，診斷為更年期子宮出血。九月八日服本方一劑，血大減，几等于无，連服三劑，血全止。因久病血虛，視物朦朧，繼服人參養營湯數劑，精神好轉出院。

其他如沁源縣縣長白××，于1957年一月突然閉道出血，刮宮服藥治療均無效，經我院檢查：①炎症性出血。②更年期子宮出血。服本方三劑痊愈。

以本方治療更年期子宮出血很多人，均收顯效。

本方載“金匱要略”婦人雜病篇。其原文是：“問曰：婦人年五十所，病下利，數十日不止，暮即發熱，少腹里急，腹滿，手掌煩熱，唇口干燥，何也？師曰：此病屬帶下，何以故？曾經半產瘀血在少腹不去。何以知之？其症唇口干燥故知之，當以溫經湯主之”。

按“五十所”即五十歲左右的意思。“下利”即下血的意思。“帶下”不是下帶，是指婦女裙帶下的生殖器病。

和劑局方以本方治沖任虛損，月候不調，或來多不斷，或過期不來，或崩中去血過多不止，又治曾經損娠，瘀血停

留，少腹急痛，发热下利，手掌烦热，唇干口燥，及治少腹有寒，久不受孕。

陈修园也很重视本方。他说：“金匱溫經湯一方，無論阴阳虛实，閉塞崩漏老少，善用之无不应手取效”。

附录傅青主一段文献：“妇人年五十外，或六、七十岁，忽然行經者，或下紫血块，或如血淋，人或謂老妇行經是还少之象，誰知是血崩之漸乎！夫妇人至七七之外，天癸已竭，又不服济阴养阴之药，如何能經滿行經，亦如少妇？然經不宜行而行者，乃肝不藏脾不統之故也。非精过泄而命門之火，即气郁甚而发龙雷之火，二火交发而血乃奔矣，有似行經而实非行經也。此等之症非大补肝脾之气与血，而血安能驟止，方用安老湯。人參一两，黃芪一两（生用），大熟地一两（九蒸），白朮五錢（土炒），当归五錢（酒洗），山萸五錢（蒸），阿膠一錢（蛤粉炒），芥穗、甘草各一錢，香附五分（酒炒），木耳炭一錢。水煎服。一剂减，二剂尤减，四剂全减，十剂愈。此方补益肝脾之气，气足自能生血而摄血；又妙在大补肾水，水足而肝气自舒，肝舒而脾自得养。肝藏之而脾统之，又安有泄漏哉！又何虑其血崩哉！”

五 用桂枝、茯苓丸等中藥治

疗生殖器慢性炎症

1. 桂枝茯苓丸

主治：子宮內膜炎，子宮實質炎，慢性卵巢及輸卵管

炎，产后胎盘残留，恶露停滞等症。

藥品：桂枝、茯苓、丹皮、桃仁（去皮尖炒）、白芍。各等量。

制法：共为細末，炼蜜为丸，每丸重二錢。

服法：每服一九，一日二回，开水下。

治驗：（1）王××（門診号4849）1956年二月来門診，主訴經閉两个月。查看患者病例得知以前曾患宮頸炎服过本丸药一斤。这次經检查宮頸光滑，諸症完全消失。复用双合診，确診为已有胎两个月。患者很愉快地說：“以前下白带一年，經過吃你院的丸药以后，白带好了”。（2）魏××沁县人，痛經八年，診断为子宮实質炎，宮頸糜烂，服此药二十天，白带减少，月經来潮，再不疼痛。（3）刘××（院号3182）患子宮实質炎，宮頸糜烂，月經过多，經期腹痛。1956年十月服此药一斤，糜烂痊愈。

統計我院全年使用此药达二百余斤，病人多說有效。

查桂枝、茯苓、丹皮、桃仁、白芍五药的合剂浸液，有抑制球菌增殖的作用，业經刘国声諸氏报告。

方輿挽謂：“此药用于产前則催生，在产后則治恶露停滞，心腹疼痛，或发热憎寒者。又，出死胎、下胞衣，对胎前产后諸杂症，功效不可尽述”。

按生殖器慢性炎症实因血液瘀滞而成，若血液充暢，生机勃勃，何至有慢性炎症或糜烂。此方有疏通血脉之功，故能奏效。古人說：“戶枢不蠹，流水不腐”。实有至理。

2、黄白止帶丸

主治：对阴道滴虫有效，尤其对滴虫及其他原因造成的

阴道炎，均有显效。

藥品：川黃連、白头翁，各等量。

制法：共為細末，蜜丸，如枣形，每丸重二錢。藥末蒸過消毒，蜂蜜熬過消毒，盛丸藥的家具亦應消毒，作丸藥時，手要刷洗消毒。

用法：臨用先消毒外阴，以扩阴器扩开阴道，用过錳酸鉀水沖洗阴道，以棉球拭干，再用鑷子挾取坐藥放入阴道深部，隔一日一次。每上藥一次作一个治疗程；一个治疗程終了，应检查滴虫有无存在，大多数上藥七次就找不到滴虫了。但此症隔一段时期往往复发。我們还没有根治办法。我們計劃繼續研究。

查黃連一藥，神農本草經載：治“妇人阴中肿痛”。进一步联系到白头翁可杀阿米巴原虫，想亦能杀滴虫，遂以此二味配为坐藥，对滴虫症有效，对各种阴道炎有特效。

白头翁真者方效。藥房中出售一种白头翁根皮黑色，不知是何草之根（真者根皮色白）。按白头翁山东人呼为老翁花。此藥生于山野，为多年生草本，全株有毛，叶皆基生，有长柄，叶身分三裂，頂裂与側裂片頗远隔，各叶片复各二回分裂。花莖在花期較短，至結实时长可达三十公分，花下的总苞与花有相当距离。花单生于莖頂，大形，有六萼片，暗赤紫色，外面披白毛，瘦果无数，先端有宿存的花柱，外觀如一堆白发。

医学心悟載：“龙胆泻肝湯治肝經濕熱，兩拘腫痛，或小便澀滯，下疳潰爛等症。医宗金鑑載：“妇人子产肿胀，及两拘痛者，謂之疣疾，乃肝心二經火盛，濕熱下流所致，宜服龙胆泻肝湯”。該書又載：“妇人阴疮日蠱，由七情郁火損傷肝脾，氣血凝滯，濕熱下注，久而生虫，虫蝕生疮，

尿水淋瀝，時痛時痒，有若虫行，少腹脹悶，溺赤頻數，食少体倦，內熱晡熱，經候不調，赤白帶下，種種症見，宜分治之。腫痛者用柴胡、梔子、龍胆草。若潰爛出水而痛者，用加味逍遙散。若重墜者，用補中益氣湯”。

石室秘錄——暗治法載有：

產門內之病非痒則痛，吾立一方，俱可兼治，取效神速。

處方：當歸一兩，梔子三錢，白芍五錢，柴胡一錢，茯苓五錢，棟樹根五分，水煎服。此方系平肝去濕之品，無論有火無火有風有濕俱奏其功，有痰加白芥子一錢，有火加黃芩一錢，有寒加肉桂一錢。

產門內生虫，方用雞肝一付，以針刺無數孔，納入產門內，則虫俱入雞肝之內，三付全愈，也不必添入別藥，只要孔刺甚多則虫有入路，三付后，用白芍五錢，當歸五錢，生甘草三錢，炒梔子三錢，陳皮五分，澤瀉三錢，茯苓三錢，白朮五錢，水煎服，四劑不再發。

產門外生疮，久不愈，用黃柏三錢，炒為末，輕粉五分，兒茶三錢，冰片五分，麝香三分，白微三錢（炒），蚯蚓糞三錢（炒），鉛粉（炒）乳香去油三錢，朝腦三錢，各為末，調勻以藥末擦疮口上，二日即全愈。

祖國醫學一致認為此症是“濕熱為患”，或“濕熱生虫”。所說“虫蝕為患”，與現代醫學若合符節。在治療上採用龍胆瀉肝湯清除濕熱實為治本的办法。試觀近今對阴道滴虫一症，一致採用局部治療法，如阿得平液，滴滴涕合劑，蛇床子精油，等藥，用之當時有效，隔一段時間病即復發，考其原因是未從根本上着手。果能清其濕熱，使滴虫不適于生存，再結合局部治療，一定獲得滿意的效果。採用龍胆瀉肝治療阴道滴虫，希望大家試治，以觀療效。

六 用当归生姜羊肉湯等中 药治疗妇女寒疝

1. 当归生姜羊肉湯

主治：妇女下腹攻冲作痛，腰痠腹墜，痛时有块攻起，小者如茶碗口大，大者如普通碗口大，高出腹壁，触診軟而不坚，不痛时則平复如常。此病多发生于产后或月經过后，中医名为寒疝（很似现代所說的腸痙攣）。

藥品：当归一两，生姜五錢，羊肉四两。

用法：以水八百西西，煎成三百西西，頓服。

治驗：趙××年二十五岁，临汾人，产后寒疝，下腹攻冲作痛，其块大如拳。曾住过医院，并經多方医治，皆无效，来本院就診，服本方一剂，其病痊愈，将养半月，恢复了健康。

本方治疗寒疝多例，均收到显著效果。

李彬說：“当归通經活血，生姜溫中散寒，里急者內虛也，用羊肉补之”。

本草衍义載：“张仲景治寒疝用生姜羊肉湯，服之无不效。有一妇人，生产当寒月，寒气入产門，臍腹以下滿胀，手不敢犯，此寒疝也。师将治之以抵当湯，謂有瘀血非其治也，可服仲景羊肉湯，二剂遂愈”。

2. 当归散

主治：与当归生姜羊肉湯主治略同。