

College Mathematics Guidance Series

大学数学学习辅导丛书

高等学校经济管理学科数学基础

主编 范培华 胡显佑

概率论与数理统计 中的典型例题分析与习题

第二版

中国人民大学 龙永红 主编



高等 教育 出 版 社
HIGHER EDUCATION PRESS



College Mathematics Guidance Series
大学数学学习辅导丛书

高等学校经济管理学科数学基础

主编 范培华 胡显佑

概率论与数理统计 中的典型例题分析与习题

第二版

中国人民大学 龙永红 主编



高等 教育 出 版 社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书作为“面向 21 世纪课程教材”——《高等学校经济管理学科数学基础：概率论与数理统计(第三版)》的配套辅导书，由主教材作者编写。各章对教材相应章节的基本概念、结论和公式进行了归纳总结，结合教材内容以及硕士研究生入学考试要求，有针对性地精选大量的例题和习题，并根据知识点和解题方法进行分类讲解，从而帮助读者系统地掌握基本概念、方法和思路，并提高综合分析和解决问题的能力。此外，书中选编了一些涉及经济、金融中的应用方面的例题和习题，也有一些例题和习题是对教材内容的适当延伸。

本书不仅适合于经济管理各学科本科生的学习需要，也是一本适合成人教育考试、高等教育自学考试的参考书。对于有志考研的读者，本书也不失为一本很有价值的复习用书。

图书在版编目(CIP)数据

概率论与数理统计中的典型例题分析与习题 / 龙永红
主编. —2 版. —北京：高等教育出版社，2009. 7

ISBN 978-7-04-027231-4

I. 概… II. 龙… III. ①概率论 - 高等学校 - 教学参考
资料②数理统计 - 高等学校 - 教学参考资料 IV. O21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 086846 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010—58581000
经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京民族印务有限责任公司

开 本 787 × 960 1/16
印 张 17.75
字 数 330 000

购书热线 010—58581118
咨询电话 400—810—0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2004 年 7 月第 1 版
2009 年 7 月第 2 版
印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷
定 价 21.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 27231-00

第二版修订说明

作为“面向 21 世纪课程教材”——《高等学校经济管理学科数学基础：概率论与数理统计（第三版）》的配套辅导书，本书吸收第一版发行以来使用教师的意见，修订工作主要体现在以下几个方面：

1. 本次修订根据教材内容的调整，对相关的内容进行了取舍。
2. 根据使用本书的教师提出的意见，增加了一些应用性的例题和习题。
3. 对原有的分类做了微调，同时增加了一些例题和习题，以便反映同一类型问题的各种变化，让读者更能体会到典型问题和方法的广泛适应性，进一步开拓思路，提高灵活性。

本书虽然是为经济管理学科本科学生学习概率论与数理统计课程的需要编写的，也是一本适合成人教育考试、高等教育自学考试的参考书。但从作者的了解和收到的反馈来看，许多数学专业的学生也在使用本书作为课外复习参考用书，并收到很好的效果。此外，许多考上研究生的学生也将本书推荐为复习用书，事实上从 2004 年本书第一版发行后，2005 年至 2009 年全国研究生入学考试数学试题的题型较以前有较大变化，但基本上在本书中都能找到，表明本书与我国基础课教学内容的改革和要求的变化十分吻合。

本次修订由龙永红负责 1~3 章，刘刚负责 4~7 章。

我们衷心希望修订后的辅导书更便于读者阅读和使用，并且期盼它能够给读者以更大的帮助！同时也盼望读者对于书中的错误和问题给以批评指正。

编 者
2009 年 4 月

第一版前言

本书是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向 21 世纪课程教材《概率论与数理统计(第二版)(龙永红主编)》的配套辅导书。

全书以教材内容为主线,围绕教材中的基本概念、理论和方法,精心组织典型例题与习题。对每一章教材内容,本书编配四部分内容:内容提要、典型例题分析、习题和习题解答。编写时力求突出以下特点:

1. 选题及其内在的逻辑顺序和结构与课程内容和要求有机联系起来,有助于学生对基础知识的巩固、理解和提高;
2. 选题广泛、典型且新颖,使学生能够受到启发并开拓思路;
3. 打破以往教材按填空、选择、求解题型的分类方式,而按知识和解题思路的自然顺序编排,有助于学生把握知识间的联系;
4. 既有对局部概念的深入理解的问题,又有综合运用相关知识的问题。通过点面结合,促使学生打牢基础的同时,加强知识间的联系并提高综合分析和应用的能力;
5. 启发式的解题分析,帮助学生迅速抓住问题的关键和本质,培养灵活性,避免简单的、机械的模仿,真正提高解题能力;
6. 将知识点和解题方法相结合的分类归纳方法,更有助于学生将巩固基础和提高解题能力相结合;
7. 例题和习题相搭配,联系紧密,使学生能够学练结合,巩固提高;
8. 归纳总结了几乎所有的历届考研题型,使学生能够在巩固基础的同时提高应试能力,避免学生考研复习和一些考研辅导书偏离基础的通病;
9. 对教材中部分较难的习题给以详细的解答,解决学生在学习课程时遇到的困难。

本书第 1~3 章由龙永红教授编写,第 4~7 章由刘刚老师编写。欢迎广大师生提出批评和建议。

龙永红
2004 年 4 月 10 日

目 录

第 1 章 随机事件与概率	1
(一) 内容提要	1
(二) 典型例题分析	6
(三) 习题	29
(四) 习题解答	34
第 2 章 随机变量的分布与数字特征	43
(一) 内容提要	43
(二) 典型例题分析	50
(三) 习题	66
(四) 习题解答	71
第 3 章 随机向量	83
(一) 内容提要	83
(二) 典型例题分析	91
(三) 习题	122
(四) 习题解答	128
第 4 章 数理统计的基础知识	151
(一) 内容提要	151
(二) 典型例题分析	154
(三) 习题	165
(四) 习题解答	167
第 5 章 参数估计与假设检验	173
(一) 内容提要	173
(二) 典型例题分析	184
(三) 习题	211
(四) 习题解答	216
第 6 章 方差分析	236
(一) 内容提要	236
(二) 典型例题分析	242
(三) 习题	250
(四) 习题解答	251
第 7 章 回归分析	257
(一) 内容提要	257

(二) 典型例题分析	262
(三) 习题	270
(四) 习题解答	271

第 1 章

随机事件与概率

(一) 内容提要

一、随机事件

1. 随机现象 事先无法准确预知其结果的现象.
2. 随机现象的统计规律性 随机现象在大量重复出现时所表现出来的量的规律性.
3. 随机试验 对随机现象的观察称为随机试验,一般地,要求随机试验满足(i) 相同条件下可重复试验;(ii) 试验的结果是可观察的,所有可能结果是明确的;(iii) 每次试验将要出现的结果是不确定的,事先无法准确预知.
4. 样本点 随机试验的每个可能的结果称为该试验的一个样本点,用 ω 表示.
5. 样本空间 一个随机试验所有样本点构成的集合称为该试验的样本空间,记作 Ω .
6. 随机事件 随机试验中可能发生也可能不发生的事件称为该试验的一个随机事件.简称为事件,记作 A, B, \dots .
7. 必然事件 在试验中一定发生的事件,用 Ω 表示.
8. 不可能事件 在试验中一定不发生的事件,用 \emptyset 表示.
9. 基本事件 由一个样本点,即试验的一个可能结果所构成的事件.
10. 事件的集合表示 随机事件可由满足相应特征的可能结果(即样本点)的集合来描述,因而可用集合来表示事件.一个试验的结果为 ω ,则当 $\omega \in A$ 时,称事件 A 发生.

二、事件的关系与运算

1. 事件的包含 如果事件 A 发生必然导致 B 发生,则称事件 B 包含事件 A ,记作 $A \subset B$.
2. 事件的相等 如果 $A \subset B$ 且 $B \subset A$,则称事件 A 与 B 相等,记作 $A = B$.

3. 事件的并(和) “ A 与 B 中至少有一个事件发生”这一事件称为事件 A 与事件 B 的并(和), 记作 $A \cup B$ 或 $A+B$.

4. 事件的交(积) “ A 与 B 两个事件均发生”这一事件称为事件 A 与事件 B 的交(积), 记作 $A \cap B$ 或 AB .

5. 事件的差 “事件 A 发生而事件 B 不发生”这一事件称为事件 A 与事件 B 的差, 记作 $A-B$.

6. 互不相容事件 若事件 A 与事件 B 不可能同时发生, 即 $AB = \emptyset$, 则称事件 A 与事件 B 互不相容.

7. 对立事件 “事件 A 不发生”这一事件称为 A 的对立事件, 记作 \bar{A} . 事件 A 与事件 B 互为对立事件当且仅当(i) $AB = \emptyset$; (ii) $A+B = \Omega$.

8. 有限或可数个事件的并 “有限个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 中至少有一个发生”这一事件称为 A_1, A_2, \dots, A_n 的并, 记作 $\bigcup_{i=1}^n A_i$; “可数个事件 A_1, A_2, \dots 中至少有一个发生”这一事件称为 A_1, A_2, \dots 的并, 记作 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$.

9. 有限或可数个事件的交 “ A_1, A_2, \dots, A_n 均发生”这一事件称为 A_1, A_2, \dots, A_n 的交, 记作 $\bigcap_{i=1}^n A_i$; “ A_1, A_2, \dots 均发生”这一事件称为 A_1, A_2, \dots 的交, 记作 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$.

10. 完备事件组 有限个或可数个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 如果两两不相容且并为必然事件, 则称 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 为一个完备事件组.

三、事件的关系与运算的性质

1. 基本性质

- (1) $\emptyset \subset A \subset \Omega$;
- (2) $A-B = A\bar{B} = A-AB$;
- (3) $\bar{A} = \Omega - A$;
- (4) $A \cup B = A \cup (B-A) = (A-B) \cup (B-A) \cup (AB)$;
- (5) $\bar{\bar{A}} = A$.

2. 运算律

- (1) 交换律: $A \cup B = B \cup A$; $A \cap B = B \cap A$;
- (2) 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$;

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$
;
- (3) 分配律: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
;

(4) De Morgan 对偶律:

$$\overline{\bigcup_i A_i} = \bigcap_i \bar{A}_i; \quad \overline{\bigcap_i A_i} = \bigcup_i \bar{A}_i.$$

四、随机事件的概率

1. 概率的描述性定义 一个事件发生的可能性大小的度量.
2. 频率 在 n 次试验中, 事件 A 发生的次数为 $r_n(A)$, 称 $f_n(A) = \frac{r_n(A)}{n}$ 为事件 A 在 n 次试验中发生的频率.
3. 概率的频率解释(统计定义) 在 n 次独立重复试验中, 事件 A 发生的频率为 $f_n(A)$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $f_n(A)$ 趋于一个稳定值, 这个稳定值就是事件 A 在每次试验中发生的概率.
4. 概率的公理化定义 设 Ω 是样本空间, 定义在 Ω 的事件域 \mathcal{F} (全体事件构成的集合) 上的实值函数 $P(\cdot)$ 称为 Ω 上的一个概率测度, 如果它满足下列三条公理:

公理 1: $P(\Omega) = 1$;

公理 2: 对任意事件 A , 有 $P(A) \geq 0$;

公理 3: 对任意可数个两两不相容的事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, 有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

5. 概率的性质

(1) $P(\emptyset) = 0$;

(2) $0 \leq P(A) \leq 1$;

(3) A_1, A_2, \dots, A_n 两两不相容, 则 $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$;

(4) $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$;

(5) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;

(6) $P(A-B) = P(A) - P(AB)$;

(7) $A \supset B$, 则 $P(A-B) = P(A) - P(B)$, $P(A) \geq P(B)$;

(8) $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$,

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC).$$

6. 古典概型

(1) 古典概型的假设条件

- (i) 随机试验只有有限个可能结果, 即样本点总数有限, 亦即基本事件总数有限;

(ii) 每一个可能结果出现的可能性相同.

(2) 古典概型的概率计算公式

设 Ω 是一个古典概型样本空间, 则对任意事件 A , 有

$$P(A) = \frac{A \text{ 中的样本点数}}{\Omega \text{ 中的样本点数}} = \frac{\text{使 } A \text{ 发生的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

7. 几何概型

(1) 几何概型的假设条件

(i) 试验的样本空间 Ω 是 \mathbf{R}^n 中的一个区域;

(ii) 点落入 Ω 中任意区域 A 的可能性大小与区域 A 的几何测度成正比, 而与其位置和形状无关.

(2) 几何概型的概率计算公式

对任意事件 $A \subset \Omega$, 有

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)},$$

其中 $\mu(\cdot)$ 是 \mathbf{R}^n 中的几何测度, 当 $n=1, 2, 3$ 时, 分别表示长度, 面积和体积.

对 A 不是 Ω 的子集的情形, 公式变为

$$P(A) = \frac{\mu(A \cap \Omega)}{\mu(\Omega)}.$$

五、条件概率与事件的独立性

1. 条件概率的定义

若 $P(A) > 0$, 称 $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 为事件 A 发生的条件下 B 发生的条件概率.

2. 条件概率的性质

(1) 条件概率满足概率的三条公理:

(i) $P(\Omega | A) = 1$;

(ii) $P(B | A) \geq 0$;

(iii) A_1, A_2, \dots 为一列两两不相容的事件, 则

$$P\left(\bigcup_i A_i | A\right) = \sum_i P(A_i | A).$$

(2) 条件概率满足概率的其他性质

3. 两个事件的相互独立

(1) 定义

若 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称 A 与 B 相互独立.

(2) 等价条件

- (i) 若 $P(A) > 0$, 则 A 与 B 相互独立等价于 $P(B | A) = P(B)$;
(ii) 若 $P(B) > 0$, 则 A 与 B 相互独立等价于 $P(A | B) = P(A)$.

4. 有限个事件的两两独立与相互独立

(1) 两两独立的定义

A_1, A_2, \dots, A_n 为 n 个事件, 若其中任何两个事件均相互独立, 即 $P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j)$, $i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$, 则称 A_1, A_2, \dots, A_n 两两独立.

(2) 相互独立的定义

A_1, A_2, \dots, A_n 为 n 个事件, 若对任意 $2 \leq k \leq n$, 及 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 均有:

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}),$$

则称 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立.

5. 相互独立的性质

(1) 若 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立, 则其中任意 k ($2 \leq k \leq n$) 个事件均相互独立, 特别地 A_1, A_2, \dots, A_n 两两独立.

(2) 若 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立, 则将其中任意一个或多个事件换成相应的对立事件, 新的事件组仍然相互独立.

(3) 若 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n P(\bar{A}_i) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i)).$$

(4) 任意事件与不可能事件相互独立, 也与必然事件相互独立.

(5) 任意两个非零概率事件, 若其不相容, 则一定不独立.

6. 可数个事件的两两独立与相互独立

(1) 两两独立

A_1, A_2, \dots 是可数个事件, 如果其中任意两个事件均相互独立, 则称 A_1, A_2, \dots 两两独立.

(2) 相互独立

如果 A_1, A_2, \dots 中任意有限个事件均相互独立, 则称 A_1, A_2, \dots 相互独立.

六、乘法公式、全概率公式和贝叶斯公式

1. 乘法公式

(1) 两个事件的情形

若 $P(A_1) > 0$, 则 $P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2 | A_1)$;

若 $P(A_2) > 0$, 则 $P(A_1 A_2) = P(A_2)P(A_1 | A_2)$.

(2) n 个事件的情形

若 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}).$$

2. 全概率公式

设 A_1, A_2, \dots, A_n 是一个完备事件组, 且 $P(A_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$ 则对任意事件 B , 有

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B | A_i).$$

3. 贝叶斯公式

设 A_1, A_2, \dots, A_n 是一个完备事件组, 且 $P(A_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则对任意事件 $B, P(B) > 0$, 有

$$P(A_i | B) = \frac{P(BA_i)}{P(B)} = \frac{P(A_i) P(B | A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) P(B | A_j)}, i = 1, 2, \dots, n.$$

七、独立试验概型

1. 独立试验序列: 如果一系列试验, 各次试验的结果之间相互独立, 则称这一系列试验为一个独立试验序列.

2. 伯努利试验: 只有两个可能结果的试验称为伯努利试验.

3. 伯努利试验序列: 独立重复进行的一系列伯努利试验称为伯努利试验序列.

4. 伯努利定理

在一次试验中, 事件 A 发生的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则在 n 次独立重复试验中, “事件 A 恰好发生 k 次”的概率为

$$b(k, n, p) = C_n^k p^k q^{n-k},$$

其中 $q = 1 - p$.

5. 等待概率

在伯努利试验序列中, 设每次试验中事件 A 发生的概率为 p , 则“直到第 k 次试验事件 A 才首次发生”的概率为

$$g(k, p) = q^{k-1} p.$$

(二) 典型例题分析

一、事件的表示及其等价表示

例 1 设 A, B, C 为三个事件, 则“ A, B, C 中至少有一个不发生”这一事件可表示为 () .

(A) $AB + AC + BC$

(B) $A + B + C$

$$(C) AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC \quad (D) \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$

分析 根据事件的并的定义, 凡是出现“至少有一个”, 均可由“并”来表示, 在本题中, 要表示的事件是“至少有一个不发生”, 由于不发生可由对立事件来表示, 于是“ A, B, C 至少有一个不发生”等价于“ $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 中至少有一个发生”, 故答案(D)正确.

答 选择(D).

注 ① 事件的表示往往不是唯一的, 比如本例中, 该事件还可表述为“恰好一个不发生或恰好两个不发生或三个都不发生”, 或者“三个都发生”的对立事件等来得到相应的表示.


② 在学习和复习时不要仅限于事件表示的“简单”, 要多考虑同一事件的不同表示方法, 越复杂的表示可能越有用, 在实际中特别是概率计算中要根据问题的需要选择相应的表示方法.

③ 读者可以对选项(A), (B), (C)分别给出事件的文字描述.

例 2 一个电路如下图所示, A_i 表示“第 i 个开关闭合”, 则“电路 a 至 b 导通”这一事件可表示为().

- (A) $A_1 + A_2 + A_3 + A_4$ (B) $(A_1 + A_2 + A_3)A_4$
 (C) $A_1 + A_2 A_3 + A_4$ (D) $A_1 A_2 A_3 A_4$

分析 首先要理清问题的线索: “电路 a 至 b 导通”等价于“①, ②, ③三个分支至少有一个导通”, 将每一个“分支 i 导通”视为一个事件, 则所求事件归结为三个事件的并, 接下来关键是要表示出“分支 i 导通”这三个事件.“分支①导通”和“分支③导通”分别等价于“第 1 个开关闭合”和“第 4 个开关闭合”即 A_1 和 A_4 , 而“分支②导通”等价于“第 2 个开关与第 3 个开关均闭合”, 即 $A_2 A_3$, 于是答案(C)正确.



答 选择(C).

例 3 设三个元件寿命分别为 T_1, T_2, T_3 , 并联成一个系统, 则只要有一个元件能正常工作, 系统便能正常工作, 事件“系统的寿命超过 t ”可表示为().

- (A) $\{T_1 + T_2 + T_3 > t\}$ (B) $\{T_1 T_2 T_3 > t\}$
 (C) $\{\min\{T_1, T_2, T_3\} > t\}$ (D) $\{\max\{T_1, T_2, T_3\} > t\}$

分析 “系统的寿命超过 t ”等价于“至少有一个元件的寿命超过 t ”, 这又等价于“三个元件中最大的寿命超过 t ”, 即(D)是正确的.

答 选择(D).

注 ① 上述事件亦可表示为 $\{T_1 > t\} \cup \{T_2 > t\} \cup \{T_3 > t\}$.


② 如果系统是串联的, 答案是(C)或表示为 $\{T_1 > t\} \cap \{T_2 > t\} \cap \{T_3 > t\}$.

二、事件的关系与运算

例4 如果 A 与 B 互不相容, 则()。

- (A) $\bar{A} \bar{B} = \emptyset$ (B) $\bar{A} = B$
 (C) $\bar{A} + \bar{B} = \Omega$ (D) $A + B = \Omega$

分析 这里要区分互不相容和对立事件。如图, A 与 B 互不相容, 显然(D), (B) 不成立。而 $\bar{A} \bar{B} = \Omega - (A \cup B)$ 也不为 \emptyset , 故(A) 也不成立, 事实上, 由于 $\bar{A} + \bar{B} = \overline{AB} = \Omega$ 于是选择(C)。



答 选择(C)。

例5 A, B 是两个事件, 则下列关系正确的是()。

- (A) $(A-B) + B = A$ (B) $AB + (A-B) = A$
 (C) $(A+B) - B = A$ (D) $(AB+A) - B = A$

分析 这类问题关键在于正确理解事件运算的定义和性质, 必要时可借助于文氏图来分析。比如选项(A)的左边的运算结果应该等于 $A+B$, 而不是 A ; 而选项(C)左边运算的含义是 A 发生而 B 不发生, 即为 $A-B$, 这两个选项的关键在于要注意求并和差运算的顺序。选项(B)的左边实际上等于 $AB + A\bar{B} = A(B+\bar{B}) = A$, 从而选项(B)是正确的。最后选项(D)左边的括号中运算结果实际上等于 A , 从而左边运算结果为 $A-B$ 。

答 选择(B)。

注 ① 注意集合(事件)运算与代数运算的区别, 不能简单地抵消。

② 注意事件的结合律和交换律只在纯粹的并运算或纯粹的交运算中成立。

三、应用概率性质计算概率

例6 已知 $P(A) = p, P(B) = q, P(A \cup B) = p+q$, 则 $P(\bar{A} \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

分析 首先, 由题设及加法法则知 $P(AB) = 0$, 尽管 AB 一般不一定等于 \emptyset , 但在概率计算时视其为 \emptyset 也不会影响计算结果。在求填空题时, 这是一种好的技巧。接下来不妨设 $AB = \emptyset$, 此时 $B \subset \bar{A}$, 从而 $P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - p$ 。

答 $1-p$ 。

注 也可由概率公式直接计算:

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cup B) &= P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) + P(B) - (P(B) - P(AB)) \\ &= P(\bar{A}) = 1 - p. \end{aligned}$$

例7 已知 $P(B) = 0.4, P(AB) = 0.2, P(A\bar{B}) = 0.6$, 则 $P(\bar{A} \bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

分析 由于 $P(\bar{A} \bar{B}) = 1 - P(A+B)$, 因而需计算 $P(A+B)$ 。又根据加法公式有

$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$, 其中题设中已知 $P(B)$ 和 $P(AB)$, 因而需计算 $P(A)$, 注意到 $P(AB)+P(A\bar{B})=P(A)$. 由此可计算 $P(A+B)$ 从而得 $P(\bar{A}\bar{B})$.

答 0.

四、由概率性质导出的一些结果

例 8 如果 $P(AB)=0$, 则()。

- (A) A 与 B 不相容 (B) \bar{A} 与 \bar{B} 不相容
 (C) $P(A-B)=P(A)$ (D) $P(A-B)=P(A)-P(B)$

分析 首先注意到零概率事件不一定是不可能事件, 因而(A)不成立, 其次注意到即便是 $AB=\emptyset$, $\bar{A}\bar{B}$ 也不一定不相容, 因而(B)也不成立. 事实上, 由 $P(A-B)=P(A)-P(AB)$ 立即得知(C)是正确的, 而(D)不成立.

答 选择(C).

例 9 设 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.7$, 证明 $0.3 \leq P(AB) \leq 0.6$.

分析 证明概率不等式的基本依据是概率的性质, 通常包括: 事件的概率介于 0 和 1 之间; 子事件的概率不大于母事件的概率; 概率的计算公式等.

证明 首先由 $AB \subset A$, 知 $P(AB) \leq P(A)=0.6$. 其次, 由 $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A \cup B)=0.6+0.7-P(A \cup B)$, 又由 $P(A \cup B) \leq 1$ 知 $P(AB) \geq 0.6+0.7-1=0.3$.

例 10 设 $P(A)+P(B)=1$, 则().

- (A) $P(A \cup B)=1$ (B) $P(A \cap B)=0$
 (C) $P(\bar{A} \cap \bar{B})=P(A \cap B)$ (D) $P(\bar{A} \cap \bar{B})=P(A \cup B)$

分析 由加法法则知选项(A)和(B)一般不成立, 事实上取 $A=B$, 且 $P(A)=\frac{1}{2}$, 便否定了(A)和(B)的正确性. 选项(C)和(D)可利用概率性质来分析:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] = P(AB),$$

故知(C)是正确的.

答 选择(C).

五、古典概率的概率计算

1. 袋中取球问题

例 11 一袋中有 $m+n$ 个球, 其中 m 个黑球, n 个白球, 现随机地从袋中取出 k 个球 ($k \leq m+n$), 求其中恰好有 l 个白球 ($l \leq n$) 的概率.

分析 这是古典概型中的一类最基本的问题, 由于许多问题常常归结为此类问题, 所以尽管它简单, 我们还是列出. 这类问题的特点是所考虑的事件中只

涉及球的结构,不涉及取球的顺序,因而计算样本点数(即基本事件数)时,只需考虑组合数.

解 首先,从 $m+n$ 个球中任取 k 个,取法共有 C_{m+n}^k 种,即试验的基本事件数为 C_{m+n}^k ,而这些取法中恰好有 l 个白球的取法共有 $C_n^l C_m^{k-l}$,于是所求事件 A “恰好有 l 个白球”的概率为

$$P(A) = \frac{C_n^l C_m^{k-l}}{C_{m+n}^k}.$$

例 12 一袋中装有 $m+n$ 个球,其中 m 个黑球, n 个白球,现随机地从中每次取出一个球(不放回),求下列事件的概率:

- (1) 第 i 次取到的是白球;
- (2) 第 i 次才取到白球;
- (3) 前 i 次中能取到白球;
- (4) 前 i 次中恰好取到 l 个白球($l \leq i \leq m+n, l \leq n$);
- (5) 到第 i 次为止才取到 l 个白球($l \leq i \leq m+n, l \leq n$);
- (6) 取球直到剩下的球的颜色都相同为止,最后剩下的全是白球.

分析 本题中取球是按顺序取的,所考虑的事件往往也涉及取球的顺序,所以在计算样本点数(即基本事件数)时,要用排列数.

解 (1) $m+n$ 个球按顺序取出共有 $(m+n)!$ 种取法,其中第 i 次取出的是白球的取法按乘法法则共有 $C_n^1(m+n-1)!$ 种取法,于是“第 i 次取到的是白球”这一事件 A_i 的概率为

$$P(A_i) = \frac{C_n^1(m+n-1)!}{(m+n)!} = \frac{n}{m+n}.$$

(2) 同(1),基本事件总数为 $(m+n)!$ 而“第 i 次才取到白球”等价于“前 $i-1$ 次取到的全是黑球,而且第 i 次取到的是白球”,由乘法法则,其取法共有 $C_n^1 P_m^{i-1}(m+n-i)!$. 于是“第 i 次才取到白球”这一事件 B_i 的概率为

$$\begin{aligned} P(B_i) &= \frac{C_n^1 P_m^{i-1}(m+n-i)!}{(m+n)!} \\ &= \frac{n P_m^{i-1}}{P_{m+n}^i}. \end{aligned}$$

(3) 记该事件为 C_i ,先计算其对立事件“前 i 次没有取到白球”的概率,

$$P(\bar{C}_i) = \frac{P_m^i(m+n-i)!}{(m+n)!} = \frac{P_m^i}{P_{m+n}^i} = \frac{C_m^i}{C_{m+n}^i}.$$

于是