

高等农业院校試用教材

农业植物病理学

下 册

北京农业大学 編

植物保护专业用

农业出版社

高等农业院校試用教材

农业植物病理学

下册

北京农业大学編

植物保护專業用

农业出版社



目 录

第三編 蔬菜病害

第一章 十字花科蔬菜病害	8
第一节 白菜猝倒病	8
第二节 白菜霜霉病	13
第三节 白菜软腐病	18
第四节 甘蓝黑茎病(根朽病)	23
第五节 油菜及采种白菜菌核病	26
第六节 油菜、白菜白锈病	29
第七节 十字花科蔬菜的叶斑病	30
第二章 葫芦科蔬菜病害	35
第一节 黄瓜霜霉病	35
第二节 瓜类白粉病	40
第三节 黄瓜花叶病	43
第四节 黄瓜细菌性角斑病	45
第五节 瓜类枯萎病	46
第六节 瓜类炭疽病	48
第七节 瓜类和茄果类苗期病害	50
第三章 茄科蔬菜病害	54
第一节 茄绵疫病	54
第二节 茄褐纹病	56
第三节 番茄脐腐病	58
第四节 番茄的叶斑病类	60
第五节 番茄青枯病	63
第六节 番茄的病毒病害	64
第七节 辣椒的日烧及炭疽病	67
第四章 豆科蔬菜病害	69
第一节 四季豆花叶病	69
第二节 豆类锈病	71
第三节 菜豆火烧病	73
第四节 菜豆炭疽病	74
第五节 菜豆根腐病	75

第六节	豌豆白粉病	77
第七节	豌豆褐斑病	77
第八节	豆类蔬菜的其他病害	78
第五章	其他蔬菜病害	80
第一节	莴苣、洋葱、菠菜霜霉病	80
第二节	芹菜斑枯病	81
第三节	洋葱、大葱紫斑病	82

第四編 果树病害

第一章	仁果类病害	86
第一节	苹果树腐烂病	86
第二节	苹果輪紋病(粗皮病)与苹果干腐病(胴腐病)	90
第三节	苹果褐斑病	92
第四节	苹果灰斑病与圆斑病	94
第五节	苹果与梨的白粉病	96
第六节	苹果锈果病	98
第七节	苹果花叶病	101
第八节	苹果锈病	102
第九节	苹果炭疽病	103
第十节	苹果生理贮藏病害	105
第十一节	梨黑星病	110
第十二节	梨锈病(赤星病)	113
第十三节	洋梨干枯病(黑病)	116
第二章	葡萄病害	121
第一节	葡萄白腐病	121
第二节	葡萄黑痘病	125
第三节	葡萄霜霉病	128
第四节	葡萄房枯病	130
第五节	葡萄黑腐病	131
第六节	葡萄炭疽病	132
第七节	葡萄褐斑病	133
第八节	葡萄蔓枯病	135
第九节	葡萄根部病害	136
第三章	柑桔病害	139
第一节	柑桔溃疡病	139
第二节	柑桔痂瘡病	142
第三节	柑桔黄龙病	144
第四节	柑桔树脂病	147

第五节	柑桔青霉病和綠霉病	148
第六节	柑桔炭疽病	151
第七节	柑桔黑星病和黑斑病	151
第四章	核果病害	155
第一节	桃树腐爛病	155
第二节	桃縮叶病	158
第三节	桃褐腐病	160
第四节	桃瘻痂病	162
第五节	桃細菌性穿孔病	163
第六节	桃心腐病	165
第七节	杏疔病	166
第八节	根癌病	168
第五章	山果病害	170
第一节	柿圓斑病	170
第二节	柿角斑病	171
第三节	棗瘋病	173
第四节	棗銹病	174
第五节	核桃黑腐病	175

第三編 蔬菜病害

蔬菜是人民日常生活的必需品，对人民营养和健康有着密切关系，党和政府十分关怀人民的生活和健康，重视蔬菜生产，在不同时期都及时地提出发展蔬菜生产的各种指示，并采取了各种有效措施，保证城乡人民的需要。

在党的领导下我国蔬菜栽培事业有了飞跃发展，取得了辉煌成就，蔬菜生产面积迅速扩大，产量显著提高，在蔬菜栽培技术方面创造了很多丰富的经验，全国许多城市贯彻执行了争取蔬菜自给的方针，农村人民公社充分利用土地种植蔬菜。总的说来已经逐步达到“四季丰收”。

在保证蔬菜高额丰产中，防治病虫害是极其重要的措施，很多严重的病害例如白菜三大病害及黄瓜霜霉病等，常使蔬菜遭受巨大的损失，党和政府极其重视蔬菜病害的防治工作，1959年京津和山西、河北、山东、河南等十三（省）市曾组织蔬菜病虫害联防，大大加强了病虫害防治，保证了蔬菜丰收。在蔬菜病害的研究上，对主要病害的发生规律及防治措施方面，也做了全面安排，取得了不少成就，如白菜三大病害的研究，已在全国范围内开展大协作，可以预见，这些病害，不难在短期内获得彻底解决。

我国蔬菜种类很多，栽培面积比较大的主要为大白菜，其次为甘蓝。黄瓜及番茄是南北普遍栽培的夏季作物，但在北方早已发展成为温室及阳畦作物，对冬季及早春的蔬菜供应起了一定的作用。辣椒既是蔬菜，有些品种又是佐料。此外萝卜、茄子、南瓜、冬瓜、西葫蘆、菜豆、洋葱、大葱、蒜、韭、芹菜、胡蘿卜、菠菜等等在一定季节，也是大量供应的。

从这里可以看出，我国最主要的蔬菜是属于十字花科、葫蘆科和茄科，其次是豆科、石蒜科及蝶形花科。我国栽菜历史长久，通过劳动人民多年栽培，培育了无数品种，也积累了无数宝贵经验。在病害防治方面也有着丰富的斗争经验，如北方温室中雄黄熏烟防治黄瓜白粉病，轮作防治西瓜枯萎病等，都是其中杰出的例子，由于蔬菜的病害种类很多，这里首先提一提我国当前主要蔬菜的主要病害，明确我们学习及斗争的重点。

大白菜是全国普遍栽培的蔬菜，它的鲜菜供应期间几乎要占半年，白菜上的最主要的病害是软腐病、干枯病和霜霉病，统称为三大病害。此外还有白斑病、炭疽病及菌核病等，在某些地区或一定年份，也很重要。南方沿海地区以及其他地区的根肿病是一个不可忽视的对象。上述的这些病害几乎是十字花科蔬菜共有的，但是发生的程度各有不同。此外甘蓝的根朽病主要为害甘蓝。

黄瓜的病害很多，也代表着甜瓜、冬瓜、瓠子、西葫蘆、南瓜、西瓜等一切葫蘆科作物的病害。黄瓜上的三大病害为霜霉病、白粉病及花叶病。育苗期易于发生苗病如猝倒等。此外

还有角斑病及炭疽病。有些地区有枯萎病。这些病害也因瓜的种和品种的不同而發生的程度不同，例如霜霉、白粉对西瓜來說是不重要的，但炭疽却成为头等重要的病害。相反，白粉病对南瓜非常重要，可是炭疽病几乎不在南瓜上發生。

茄科蔬菜可以番茄和茄子为代表。番茄在大田中易生臘腐病，冷湿地区易生斑枯病及綿疫病，此外病毒病亦很普遍。茄子的重要病害为褐紋及綿疫。辣椒在大田中最易發生日燒、炭疽和花叶病。在溫室里，番茄易發生叶霉及毛氈病，有时亦生灰霉病。在苗床里，茄科蔬菜的幼苗容易發生立枯及猝倒。

在蔬菜多样化以及發展陽畦及冷洞子的情况下，还須注意芹菜的斑枯病，洋葱的霜霉和紫斑病，菠菜的霜霉和病毒，萵苣的霜霉、褐斑和花叶病等等。

在豆科蔬菜中菜豆的火燒、花叶及根腐病常造成損失，而銹病却是豇豆上麻煩的病害。

蔬菜是管理集約的作物，防治病害，更具条件，化学保护的应用也比較有利。但是無論如何，要达到防病增产，还必須貫徹“农业八字宪法”，既达到綜合防病，又达到高額丰产。我国农民丰富的栽培防病經驗，須大大加以总结，这將为蔬菜病害的防治开辟一个新的途径。

第一章 十字花科蔬菜病害

第一节 白菜孤丁病

白菜孤丁病又称作“抽瘋”或“病毒病害”，它是白菜三大病害中發生期最早的一种病害，發生孤丁病的白菜，往往以后發生霜霉病及軟腐病，因此它是白菜生产上的一个主要威胁。




圖 42 白菜孤丁病

症状特点 白菜幼苗期受病后，心叶产生明脉症，并产生淡綠与濃綠相間的斑駁。叶背主脉及側脉上产生褐色坏死点或条斑，以至叶片抽縮而凹凸不平，受病的成株叶片变硬而脆，颜色逐渐变黃，整株迅速皺縮矮化，停止生长，不能正常包心，这些現象便是“抽瘋”或“孤丁”名称的来源，剖視根部則可見切面上变成黃褐色，导管被角栓質堵塞，根变輕变小，植株受病愈早則損失愈重，受病較晚的植株 虽仍能結球，而且外表近乎正常，但剝去外叶后可以看到内部有些叶片上有很多灰色的坏死斑点。

帶病的留种菜次年种植时，严重

的，花梗尚未抽出便死亡。較輕的花梗抽出时弯弯曲曲，高度不及正常的一半。抽出的新叶片一开始就出現明脉，老叶片上也生坏死斑。花梗上發生很多縱橫的裂口，花瓣的色較淺，有时花尚未开放就萎蔫。受粉結莢后，果莢瘦小，曲折，結实不多，子实不饱满，种子發芽率降低，对产量的影响很大。

病原毒的特性、傳播和發病 白菜孤丁病的病原根据裘維蕃等研究是一种病毒，称为芸苔花叶病毒或蕓菁花叶病毒(*Marmor brassicae* H.)。这种病毒不仅可以侵染多种十字花科蔬菜包括甘蓝、萝卜和小油菜等，而且可以侵染茄科的烟草，藜科的菠菜等。本病毒目前已知可由蚜虫及汁液摩擦傳布，傳毒的主要有桃蚜(*Myzus persicae*)、菜蚜(*Brevicornis brassicae*)和萝卜蚜(*Rhopalosiphum pseudobrassicae*)，蚜虫在有病株上吸食后迁飞到健株上有很高的傳毒百分率(70—80%)，即使少量蚜虫亦能引致發病，但蚜虫一次喂毒后經過一二次放飼后，即失去其傳毒能力，因此这种病毒和蚜虫的关系是非持久性的。另一傳毒途径系汁液摩擦傳染，用病株汁液摩擦在健株叶上可以傳染，此种傳染方式在田間虽起一定作用，但远不及蚜虫傳染主要。初步証实，叶蝉、跳岬等昆虫不能傳毒。白菜种子不帶病毒，病株的花粉也不帶病毒。根据研究，白菜孤丁病除这种蕓菁花叶病毒外还有烟草环斑病毒的株系以及其他病毒存在。

这种病毒的致死溫度为55—60°C，稀釋限点为2,000至3,000倍，病毒在植株的压出液中如果保持在22°C左右可以存活24—96小时。病毒在幼苗上的潜育期为9—14天，潜育期的長短視气温和光照而異，一般有25°C左右，光照長时潜育期較短，如果气温低于15°C，则潜育期延長，有时症状甚至隱潛。

病毒越冬的場所主要有二，一为窖内采种用的大白菜、甘蓝等种株，另一为多年生宿根的作物及杂草如菠菜等。春季这些植物發病后，由蚜虫傳布到各种夏季桥梁寄主上去，这些寄主中最主要的是甘蓝、萝卜及小白菜及其他一些十字花科蔬菜，在秋季白菜种植以后，即由蚜虫傳至白菜上。

白菜受病后生理上受到極大的扰乱，北京农大植保系的研究指出，受病后根部形态变小，單位体重減輕，导管堵塞变黃，根的伤流量即吸收能力大大減低，代謝机能有了变化，地上部分的叶片数减少，光合作用面积减少，叶綠素含量降低，合成机能降低，而呼吸作用則在根部及叶部大大加强，这就消耗了大量的养分。这些因素的綜合作用表現出孤丁病的症状及为害，最終引致白菜产量的降低。

孤丁發病的一些条件 病害發生的程度首先和白菜的發育阶段有关，幼苗六叶期前是最易感病的阶段，愈早侵染则發病愈重，子叶期的叶片及幼茎均能受病。而后期受侵则發病輕微，如感病品种膠州白菜，幼苗期受侵，病情指数达83.2，而在結球期受病，病情指数則仅及苗期的一半(42.3)。由此可見防止白菜幼苗期的受侵，是防治上的重要关键。

从气象条件来看，苗期高温干旱利于孤丁病的發生和发展，高温有利于病毒的發展，除气温外，土温也有極大的关系，裘維蕃等研究指出感病品种膠州白菜，在同样受侵的条件下，不同土温下症状表現也有所不同，当土温为15°C时，病情指数为53.1，20°C时为75.0，25°C

时为85.9,30°C时达93.7,由此可见,土温增高,可以誘致症状的加剧。干旱除有利于蚜虫的孳生繁殖外,对于白菜的生長極为不利,可以引致抵抗力的降低,1960年北京农業大学植保系的調查指出,在高温干旱条件下,蹲苗时期的長短引致了發病情况的差異,不蹲苗的病情指数为9.1,正常蹲苗(11天)为10.8,而長蹲苗(20天)的达16.3。說明了土壤水分对發病的影响。干旱年份过長蹲苗不利于根系的發育,也影响了对病害的抵抗力。1952和1958年是二个孤丁病的大流行年,根据北京地区的气象进行分析,8月中下旬的溫度比常年同期高2—4°C,湿度低7%以上,降雨少四分之三,九月以后仍少下雨,以致溫度高2—5°C,湿度低10%以上,这样的气象条件是有利於病害的發展的。

实际調查和农民經驗都指出早播时發病严重,这實質上也是气象条件的关系,对于播种期的分析应結合当时当地的具体情况,这和降雨以及地塊的土壤湿度以及灌溉情况亦有很大关系。总的說來,秋菜播种在北京地区条件下,以立秋(8月8日左右)的前后3—4天为合适,过晚时病害虽輕,但生長不好,降低产量。

蚜虫的活动和发展和秋菜的發病亦有很大关系,从辽宁兴城的記載来看,蚜虫發生的第一个高峯为8月6日,当时田間尚無病株出現,到8月18日發病率突然升到50%,8月24日上升至89%,而到8月30日已經上升到100%,根据其潛育期9—14天来推算,8月18日的病害的大量發生是和8月6日的蚜虫高峰密切联系的。北京农大植保系1960年的試驗中也获得了类似的结果。

在遮蔭的情况下也可以在一定程度下減輕症狀,树蔭,屋角的白菜往往發病較輕,京津郊区及唐山等地区把白菜与玉米进行套作,或与芸豆、黄瓜等作物間作,对減輕病害起了一定作用,这和光照是有关系的即可以縮短光照,减弱光的强度,但是套作不仅是蔭蔽的作用,还有減少蚜虫的保护作用,和改变田間小气候,降溫增湿,不利于蚜虫繁殖,如天津蔬菜研究所等1959年試驗,与玉米間作的白菜比不間作的蚜虫少96.6%,产量增加71%,这种間作方式可以因地制宜地采用。

在以蔬菜為專業的地区,蔬菜栽植制度对控制孤丁的發生也是一个重要的問題,从栽植的前后作物來說,当地春季栽植采种白菜,夏季又栽植甘藍的地,最易引起孤丁病的發生,如春季栽植采种白菜而夏季种其他蔬菜如蒜类、茄子等,發病即較少。隣作的关系也很大,1960年在新疆的一个典型調查中看出,大面积的甘藍与白菜靠在一起种植的,甘藍病情指数为70.7,近甘藍的大白菜發病为64.3較远的为40.7,最远的为27.1而隔离区的指数仅为16—23%。

白菜对孤丁病的抵抗性 白菜品种間抵抗孤丁病的能力有極大的差異,在同样的条件下,最感病的品种如膠州白及徐州菊心白菜病情指数达95以上,而很多抗病的品种如大娃一号、大毛边等發病仅达1.6—10.3,同一品种內个体間發病程度亦不一致。一般說來,青帮白菜要比白帮的抗病,品質較好的白菜品种都較感病。但抗病性强的品种亦有不少具有推广栽培的价值,部分品質較差但抗病性强的品种和感病而园艺性狀好的品种进行杂交后,不仅可以將抗病性傳遞到后代,而且品質大大改善,产量提高,有明显的杂交优势。

除了品种間抗病性有明显差异以外，必需指出品种內植株个体間的差异也是很大的，在同样的品种內进行接种就发现有些植株接种后受害很重，而有一些则虽有症状但受害很轻，由于白菜是个杂交作物这一現象是很自然的，所以在病害流行年份經常进行单株选择这不仅可以选出比較抗病的品种，而且品质不会很大改变。北京农业大学园艺系从大青口选出的单株就比原来的大青口要抗病得多。

白菜品种的抗病性有些是比较稳定的，在不同地区种植时表現比較一致，不易受地区环境的影响，如山东1号，山东2号，公主岭大麻叶和兴城大麻叶等，而不少品种則很易受环境的影响，抗病性动摇和分离，因此具有一定的地区性，例如青麻叶是抗病品种，不同地区发病情况不一，济南病情指数3.0，北京21.1，天津26.6，哈尔滨42.8，新疆安宁渠37.4，当然其他因素也影响其发病严重程度，但有差异是肯定的。因此各地选择抗病品种时，除引种外，应着重在本地种植的品种中进行选育，就地推广。在原有品种中也可以通过株选逐渐提高抵抗性。白菜品种的抗病性本质正在研究，据初步测定，抗病性与植株的多元酚氧化酶的活性有一定关系，抗病性强的，酶的活性高，[此外，細胞原生质的粘滯度和植株的总糖量也有关系，抗病性强的，粘滯度和总糖量都高，但这些仅仅是了解抗病性机制的开始，需要进一步深入研究。

白菜抗孤丁的特性并不是固定不变的，它和环境条件和栽培管理有着密切的联系，凡栽培管理不善，生长不良的白菜抵抗性均减弱，易于发病，而生长良好的白菜則抗病性增强，优良的抗病品种必需与优良的栽培技术相结合，不然将不能显示其抗病性能。例如抗病的大青口品种过早播种，亦能严重感病，灌溉不善时病情亦复严重。过去一般認為白菜已得孤丁病后就没有办法，而农民經驗則認為得病后施用大肥大水可以控制发病減輕損失，根据北京农业大学植保系1960年的研究，在同样的受侵条件下，增加灌水和追肥可以減低病情并大大增加产量，但大肥必需結合大水，才能更显功效，其原因經初步分析是創造了良好的营养条件，促进根系发育良好，增加了根部的吸收能力，因此改善了病株的代謝机能，挽回了损失。由此可見只要为白菜創造良好的生长发育条件，就可以增进其抵抗能力。

防治措施 防治孤丁病应采取改善栽培管理技术和药剂保护(包括治虫)相结合的綜合措施，而其防治关键則着重在苗期及生长前期。

在栽培管理上首先是因地制宜地采用抗病品种减少高度感病品种的种植面积，从已有的品种中选出或从外地引入优质高产的抗病品种，不少地区如济南等市由于采用了抗病品种基本上控制了为害成为防治孤丁病的成功經驗，北京地区1960年是孤丁病中度发病年，全市高额丰产的田块，均系选用了抗病的青帮系統的品种的，华北各地品种可选用天津綠，青麻叶，大汶菜，大青口，搏心青等品种，目前的迫切任务是进一步选育抗病丰产优质的品种。

在栽培上要考虑播种期勿过早，华北北部以立秋前三天和后四天內种植为合适，有条件地区可以采用育苗移栽，种植的地块应尽可能在邻作和前作上与甘蓝等地錯开，以减少毒源，有条件时亦可因地制宜地实行与玉米等高杆作物間作。加强管理，在播种期高温干旱年份特別注意田間灌水，創造良好的生长条件，增强植株的抵抗能力。在苗期增加肥水是減輕

孤丁为害的有效措施，不仅要施足底肥，在出苗后二片真叶时期即可追施提苗肥，大肥大水绝非大水漫灌，而是采用小水多次勤灌，少量多次追肥，使幼苗生育迅速，生长健壮，很快渡过危险期。如果发病早，而天旱，应考虑缩短蹲苗期。

清除毒源和防治蚜虫具有很大意义，除白菜地应尽可能远离夏季桥梁寄主外，消灭水萝卜等杂草对防治孤丁亦很重要。除治幼苗期的蚜虫极为重要，防蚜对防孤丁的作用的好坏，全看防治时间与彻底程度，由于7月下旬和8月上旬是蚜虫活动迁飞盛期，加上大白菜六叶期前受侵发病重，故除蚜应抓紧苗期，方法是在播种前每亩用6%的666粉三斤（每斤兑细土40斤）撒入土中进行土壤消毒，出苗后每隔5—7天打一次0.5%或1%的666粉，最好是用200倍的6%可湿性666粉进行喷射，保证叶片正反面均能打到。用666药剂治虫可以减低病情，取得一定效果，但还不能绝对防病，有条件进行育苗移栽的地方，集中在苗床防蚜比较容易和彻底，苗长到6个真叶后移栽，可以取得较好的效果。

用化学药剂来治疗病毒病这是近年各国均在研究的方法，应用抗菌素和高等植物杀生素是防治孤丁有前途的治疗剂，尚需进一步加以研究。

白菜孤丁病存在問題 病毒的种类及其寄主范围認識还不够彻底，因此影响到毒源及桥梁寄主的清除。

要找出几种比目前已知的控制病毒的药剂更好的更有效的药剂。

要找出对蚜虫有忌避作用的药剂，使蚜虫不能接近白菜。

为长远考虑要选育品质好产量高同时又高度抗孤丁病的白菜品种，除从本地选育外可从外地引种，而杂交则尤为重要。

由于栽培管理对提高寄主抵抗性关系极大，尚需认真学习及总结农民的丰产防病经验。

与孤丁病相类似的病害 与白菜孤丁病害最相类似的病害是油菜花叶病。北方较少冬油菜而在南方油菜区，这是一个非常重要的病害。流行时损失极大。农民把这个病害称作“瘤”“癞”或“菊花瘟”等。但发生和流行的情况是不一样的。

染病后在已长成的叶片上都不表现症状。在新生的叶片上最初只在半边表现明脉症，以后在叶脉附近发生褪绿现象，逐渐扩大成为花叶。以后长出的新叶上花叶逐渐显著，并发生皱缩症。叶面不平、皱褶、僵缩、畸形，而深绿色部分则有凸起现象，整个植株都矮化，叶片聚集，有时像一个花朵，因此称为“菊花瘟”。

病害如在晚秋发生，病株往往在抽苔前死亡。病株的抗寒力较差，易受冻害，以至在春季形成田间的缺株现象。轻病可以抽苔，但花梗缩短扭曲，花蕊叢集。花苔的色泽较暗，花常不能开展而死亡。病苔所结的种苔呈畸形扭曲，子粒小而不实，有时为空苔。后期得病的症状不明显，主要是基叶的叶脉发黄，抽苔结苔正常，但不实率增加。

病毒的毒原与孤丁病毒是一个种，而是不同的株系。除能用病株汁液摩擦传染外，还能由桃蚜、萝卜蚜及棉蚜传播。播种期内蚜虫虫口的多少常与油菜花叶病的发病率成正相关。

在华东区适当迟播避过蚜虫的活动期，可以减轻发病率，例如10月13日播种的发病率62.7%，而10月18日播的即为6.5%。前华东农科所1957—1958年的结果认为9月25日

播的發病率 77.2%，10月9日播的發病率 20.8%，10月16日播的發病率为 8.8%。其他地区也有类似的記載，不过播种期不能迟于10月25日，如再迟，虽然發病率更低，但产量剧減。

油菜以育苗移栽的为多，苗床的位置靠近宅旁菜地的發病重，主要因为十字花科菜地是病毒的主要来源。苗床高溫干燥病多，如果采用溝灌，使苗床經常保持湿润，可以減輕病害。其他影响發病的因素与孤丁病基本上相同。

油菜品种間的抗病力有显著的不同，华东及南方各地普遍栽培的油菜都 属于 *Brassica campestris* 及 *Br. chinensis* 二个种，其中有許多的变种和品系，抗病力都比較低。目前正在大力推广的胜利油菜及早生朝鮮等属于 *Br. napella* 种，这种油菜的生長季节較長，产量也高而且很抗病。不过这种油菜感染花叶病后也能造成一定的损失。感病輕时，叶片上只發生一些坏死斑，以及环点形坏死斑，感病重时，植株也可以枯死。这些品种的抗病力 近年来也有退化的跡象，因此在推广中不能不注意这个問題。

这一个病害的防治基本上和孤丁是一致的，油菜首先是保护苗床不受蚜虫侵染，管理苗床以水肥为主，其次为控制播种期，但不能太迟。即使采用抗病的胜利油菜或早生朝鮮等也要采用这些措施，以保安全。四川經驗用50%牛尿噴射有極好效果。

另外蘿卜花叶病毒病(又称蘿卜孤丁)也是和白菜孤丁一类的病害，侵染規律 基本上和白菜孤丁相同，但由于它發病早，因此防治这一病害，非但有利于蘿卜的生产，同时也可以減少秋白菜的毒源。

蘿卜花叶病的防治要注意播种时土壤中的灭蚜及保护苗期不受蚜虫受侵，一般使用666(参考白菜孤丁)即有良好效果。

第二节 白菜霜霉病

白菜霜霉病常在华北及东北的大白菜上發生，随着年份的不同而有不同程度的损失。

病害發生的季节性 霜霉病在田間是終年不断存在的，一般在春秋两季发生較多，特別是秋季最为严重，在华北地区，2月下旬即出現在甘蓝的苗床上，5月即可出現在大白菜的采种株上。6月中旬至7月下旬又不断發生在小白菜上，8月中旬即可为害大白菜的幼苗，而在9月中下旬起即可严重發生。

在华北地区秋白菜上，霜霉病發生的高峰时期常依当地雨水的延續情况而定，在保定以北地区，一般在9月下旬即可达到高峰，10月上旬以后即下降，但在保定东南地区有时病害的高峰可以延至10月上中旬，10月下旬以后开始停止蔓延。

症状的特点 霜霉病初起时，在白菜的叶面往往沒有明显的症狀，而在叶背則已經出現白色的霉狀物。幼苗期出現这样的症狀而發病条件合宜时，苗叶及子莖变黃而枯死。在成株叶片上出現叶背的白霉后，叶片正面随即出現淡綠色的病斑，以后轉变为黃色以至黃褐色。病斑扩大时常受叶脉的限制而形成多角形或不規則斑，空气潤湿时，病情發展很快，有时白色霜霉可以發生在叶片的正面，以后叶片变黃而干枯。由于这些病狀特点，农民称此病

为“霜叶”“黄叶子”或“枝干”。




圖 43 白菜霜霉病
1.叶片症狀；2.種株症狀；3.病原(孢囊梗、孢子囊及卵孢子)。

在采种大白菜上，症状出现在叶、花梗、花器及种莢上，主要出現白色霉，綠色部变淡，莢部有时呈曲屈狀。花梗上的病斑为黑褐色的長圓条斑。

病原菌的生物学 白菜霜霉病菌(*Peronospora Parasitica* (Pers.) Fr. = *P. brassicae* Gaumann)是藻狀菌，以無隔菌絲蔓延在寄主的細胞間隙，用吸胞伸入寄主細胞收取养分。吸胞初起时是圓形以至梨形的，以后成为圓柱形及棍棒形，常作兩分叉以至三叉狀，孢囊梗(分生孢子梗)直接从菌絲上产生，由气孔中伸出体外，無色，無分隔，作重复的兩分叉狀(約6—8次的重复分叉)，基端的小梗尖銳，每端帶有孢子囊(分生孢子)一个。孢子囊無色、單胞、長圓形以至卵圆形(24—27×25—30微米)，萌發时直接产生一支芽管。

有性世代产生卵孢子，卵孢子埋在受病組織之内，以受病的子莢中特別多，此外莖与花梗的病斑部也能产生卵孢子，但在叶片中亦能产生这种器官，卵孢子球狀，外表光滑或略帶皺紋，黃色以至黃褐色 26—43微米。

卵孢子是一个重要的越冬器官，但也可以在受病种菜中以菌絲体越冬。卵孢子越冬后如何萌發，如何侵入寄主，目前还不明了。在多年生器官中越冬的菌絲到春季条件适宜时首先产生孢子囊。孢子囊萌發时長出芽管从气孔侵入，也可以直接从表皮的細胞間隙侵入体内。孢子囊在侵入前先在芽管的頂端形成一个压力胞，然后由压力胞伸出侵入絲。

孢子囊萌發最适宜的溫度为 8—12°C (或 7—13°C)，产生分生孢子的最适溫度亦为 8—12°C，但侵入絲侵入的溫度在 16°C 左右，較其萌發的最适溫度为高。卵孢子的萌發溫度与分生孢子可能相似。

病菌中有明显的生理分化現象，根据高又曼的研究，*Peronospora parasitica* 可以分为

兩個种：芥菜上的为 *P. parasitica*，而白菜、油菜、甘蓝及萝卜上的为 *P. brassicae*，而 *P. brassicae* 中又可以按其生理分化，分成三个生理小种。我国王銓茂(1944)在西南研究的結果認為 *Peronospora parasitica* 可以分为三个变种：

1. 芥菜屬变种 *Peronospora parasitica* var. *brassicae* (不侵芥菜, 对萝卜侵染极弱)
2. 萝卜屬变种 *Peronospora parasitica* var. *raphani* (不侵芥菜, 对萝卜侵染極强)
3. 芥菜屬变种 *Peronospora parasitica* var. *capsellae* (对芥菜侵染極强)

芥菜霜霉菌变种又可分为六个生理小种如下：

- 第 1 号：不易侵甘蓝，可以侵油青菜 *B. chinensis* 及大芥菜 *B. juncea*
- 第 2 号：同上，但不易侵油青菜 *B. juncea* 而絕對不能侵油菜 *B. napobrassicae*
- 第 3 号：同上，可以侵油菜 *B. napobrassicae* 但極弱。

第 4 号：不易侵甘蓝也不易侵油青菜 *B. chinensis* 但侵染大芥菜 *B. juncea* 的能力強。

第 5 号：同 4 号，但侵染大芥菜 *B. juncea* 的能力弱。

第 6 号：侵染甘蓝的能力極强。

根据这个研究，可以看出芥菜和萝卜上的霜霉菌与甘蓝及白菜上的霜霉病菌是有区别的。就是在甘蓝、白菜、油菜、芥菜等等之間的霜霉病菌也略有区别。但是病菌的生理小种是可以随环境条件及对寄主的适应性而改变的。两种作物長久栽培在一起时，可能引起一个生理小种的适应而改变。

影响發病的一些因素 霜霉病的發生，一般在气温稍低，而又有忽暖忽寒的情况下最易流行。在低温条件下($7-13^{\circ}\text{C}$)不但容易形成孢子囊，而且也有利于孢子囊的萌發，但侵入寄主的最适溫度較高(16°C)，在侵入以后，菌絲的蔓延及吸胞的發育又要求更高的溫度($20-24^{\circ}\text{C}$)因此病斑發展最快的溫度常在 20°C 以上。有人誤認為霜霉病的流行要求高溫，实际上最易流行的气温是平均在 16°C 上下，因为这个溫度既有利于孢子的萌發，也允許侵入后的菌絲發展。不过在更高的气温下，已侵入的病菌在內部發展快，症狀出現明显，特别是在高溫下易于表現黃色枯斑。农民常說：9、10 月中忽冷忽热又下雨就謂“上班”(霜霉)，这是十分确切的觀察。

根据北京农業大学植保系 1960 年在秋白菜上的觀察：虽然在苗期已經看到霜霉病的出現，但大面积發生是从 8 月中下旬开始的，以后發展是愈到后期愈严重，在 9 月上旬至中旬，10 月上旬和 10 月下旬出現三次病情的發展，而这三次流行發展均与前旬的雨量 和降雨次数，特別是雨量有关，即前旬雨量多且大，次旬霜霉病就發展，由八月到十月中旬，旬平均溫度从 23.3°C 逐漸下降到 10°C 这一溫度，加以日夜溫差变化很大有利于霜霉病的发展而 10 月下旬的气温又較历年为高这就延長了感病适溫期，以至 10 月下旬仍在發展。

总的說來，霜霉病的發病条件以白菜蓮座期(9 月上旬)至包心期(10 月上旬)的气象条件的影响为最大。將霜霉病大流行年的 1958 年，中度流行的 1960 年和不流行的 1957 年的資料进行比較，可以看出病害的流行与否与以旬計的平均气温，降雨量，日照，相对湿度，日

夜溫差均有相关。凡大白菜蓮座期至包心中期溫度高，雨多，空氣濕度大，最低平均气温高的，均为霜霉病流行年，反之則不流行，1957年由于9月上旬至10月上旬平均气温低，降雨量少，日照多，所以病情輕微，在此期間，大流行的1958年和中度流行的1960年的平均气温相似均比1957年为高，而1958年的各旬降雨量则大于1957年和1960年，所以1958年發病特重。

少雨久旱的时候有时病害也会發展，这是由于日夜溫差大，夜晚溫度低，結露良好，有利于病菌侵入，白晝气温高又适合菌絲發育，此外久旱高溫白菜生長不良又可能孤丁病重，也是引起霜霉重的誘因。

霜霉病的發生与白菜的播种期也有一定关系，根据华北各地的調查，播种期愈早，发病愈重，如北京农大1960年在北京調查的結果：

播 种 期	發 病 率	病 情 指 数
8月1日	92%	59.0
8月5日	86%	52.0
8月9日	62%	32.6

其他各地历年調查亦均获得类似結果，这个現象是明确的，由于播种期的不同必然影响到白菜的發育阶段，所以必須闡明白菜發育阶段与抗病性的关系。

关于营养影响白菜霜霉病的关系，有些研究認為营养不好、植株生長不良易于引起發病，衰老或叶綠素量減少可以引起發病，并促使孢子囊的發生。

田間觀察凡管理較差植株衰弱的都發病較重，水肥不足間苗定苗过晚，密度大，株行距不适宜而且田間湿度大时均有利于發病，一般說植株生長良好的發病較輕。

田間的情况亦看出感染孤丁病毒的白菜，易于發生霜霉，軟腐亦重，北京农大植保系1960年的調查不同受病程度的孤丁植株获得如下結果（数字均为病情指数）：

孤 丁 病	0	33.3	66.7	100
霜 霉 病	6.6	26.7	73.3	86.7
軟 腐 病	0	6.6	13.3	56.7

由于病毒对白菜引起生理上的变化，这也影响到营养問題。

在品种抗病鑑定工作中也發現，除了少數品种以外，抵抗孤丁病的品种往往同样也抵抗霜霉病，而感病的則霜霉亦重。如：