

發展多種經營叢書

蔬菜丰产经验



四川省农业厅经济作物处编
四川人民出版社

發展多种經營从書

蔬菜丰产經驗

四川省农业厅經濟作物处編

☆

四川人民出版社出版

成都状元街20号

四川省書刊出版業營業許可証出字第一号
四川省新华書店發行 成都印制厂印刷

开本787×1092耗1/32·36頁· $2\frac{1}{4}$ 印張·56,400字

1959年4月第一版 1959年4月第一次印刷

印数: 1—5,000 定价: (5)1角7分

統一書号: T16118·116

前 言

蔬菜，是人們生活中主要的副食品之一。随着社会主义建設的迅速发展，人民生活水平不断地提高，对蔬菜的需要量，也将不断地增长。因此，我們應該生产出数量大，質量好的蔬菜，滿足广大人民生活的需要。同时，發展蔬菜，也是貫徹自給性生产与商品性生产同时并举方針，增加公社的收入的一项重要办法。

在蔬菜生产中，应貫徹就地生产，就地供应，划片包干，保証自給，必要时还能支援外地的方針，同时，还应该做到数量充足，品种多样化，供应方便及时。我省的人民公社，在党的领导下，今后应繼續破除迷信，大胆革新技术，以提高蔬菜的单位面积产量。

我省各地，在1958年创造出了許多蔬菜丰产經驗。現將已收集整理的一部分材料介紹出来，供各地發展蔬菜参考。

四川省农业廳經濟作物處

1959年3月

目 录

蘿卜亩产六万斤的丰产經驗.....	(1)
蘿卜亩产三万斤的經驗.....	(1)
蓮花白亩产五万五千斤的丰产經驗.....	(2)
冬蓮花白亩产三万七千斤的經驗.....	(3)
蓮花白亩产三万斤的經驗.....	(5)
茄子亩产二万四千多斤的經驗.....	(7)
番茄亩产二万九千多斤的經驗.....	(8)
双季番茄生产經驗.....	(9)
莴笋亩产一万五千斤的丰产經驗.....	(11)
冬莴笋丰产經驗.....	(11)
韭黃的栽培經驗.....	(12)
冬芹菜亩产一万九千斤的經驗.....	(14)
早南瓜的栽培經驗.....	(16)
冬豌豆的丰产經驗.....	(16)
秋黃瓜的栽培經驗.....	(17)
秋笋瓜的栽培經驗.....	(19)
大头菜的栽培經驗.....	(20)
茱芋的栽培經驗.....	(21)
过河菜的高产經驗.....	(21)
蔬菜亩产三十万斤的經驗.....	(22)
蔬菜亩产十万斤的經驗.....	(25)
几种蔬菜的高产經驗.....	(29)
蔬菜高产經驗.....	(32)
利用河壩沙土增种蔬菜的經驗.....	(35)

阿壩藏族自治州几种蔬菜高产經驗·····	(38)
几种早熟蔬菜丰产經驗·····	(40)
蔬菜一年二十熟套作栽培經驗·····	(43)
蔬菜一年十五熟套作栽培經驗·····	(49)
冬瓜、苦瓜为主的套作技术·····	(52)
热季菜变冬季菜的經驗·····	(54)
培育“冬瓜王”的經驗·····	(55)
培育草菇的經驗·····	(57)
快速育葱法·····	(61)
温床育苗法·····	(62)
火窑育苗法·····	(64)
蓮花白留种經驗·····	(68)
蓮花白的育苗技术·····	(69)

蘿卜亩产六万斤的丰产經驗

南充市嘉陵人民公社青晨一大队，1958年种植八十五亩青长
大白蘿卜，平均亩产二万二千五百三十斤。其中一亩高产
地，亩产达到六万斤，一般一个重十二至十三斤，大的重十九至二十
斤。现在将该队栽培冬蘿卜获得大面积丰收經驗介紹如下。

一、选育良种：青长大白蘿卜，是南充地方优良品种。它的主要特点是：叶片少，蘿卜头大，抗病力强，不易抽苔空心，品质好，产量高。

二、栽培方法：选择沙质壤土，在二伏末三伏初下种。将土深耕一尺五寸，每亩施垃圾肥二万斤，开厢二尺四宽，打错窝子，窝行距一尺二寸，一亩五千窝。先用脚踩窝，后用猪粪灌，一亩施三十至四十挑。粪收汗后，用草耙子耙一下又踩窝一次，然后播种，用细泥盖。苗出大叶时，匀第一次苗，每窝留两株。破头后，匀第二次苗（匀的苗，可以栽；在1958年缺种时，我们栽了不少，它比直播的还长得大些，只是成熟期要迟些），每窝留一株，匀后施二次追肥，一亩用猪粪三十挑。到霜降时，施第三次追肥，一亩地施猪粪二十挑，然后上厢，立冬至小雪收获。

（尹嘉猷）

蘿卜亩产三万斤的經驗

成都市郊区金牛人民公社“七一”农场，于1958年种植一亩七分地的蘿卜、菠菜，结果蘿卜平均亩产三万斤，菠菜一万斤。他們的栽培經驗是：

一、品种：采用季馬桩蘿卜，长圆筒形，较耐寒，从播种到收获约一百二十天左右，适宜于轻松土壤，可使根部发育良好，

以沙質壤土為最宜。

二、整地和播種：用鋤挖地，整細弄平後，作成包踩行一丈三尺寬的廂口，按行距一尺二寸開溝，條播菠菜。在溝埂上，以株行距一尺二寸挖窩子，窩深一寸，寬四寸，切不可過深，以防影響小苗出土。窩子打好後，先用對滲尿水，漿窩子（尿一千五百斤）。到秋分時，進行點播，每窩下種四、五粒，每畝用種二十兩。

三、田間管理：勻苗：苗子出土後，要及時勻苗和定苗。苗高二寸時，進行第一次勻苗，勻去瘦弱和變種的苗子，每窩留二株健壯苗。苗高四、五寸，進行第二次勻苗，即定苗。

施肥：播種後二十五天左右，結合澆水追施二、八成尿水一次（尿一千斤）。在第一次追肥後，隔十天左右，再追第二次肥（肥料同前）。約隔一月左右，苗高一尺五寸時，施以二、八成尿水，一直到收穫前，澆白水一次。

中耕除草：除草是保證幼苗生長良好的因素之一。因此，蘿卜在勻苗時，進行中耕，除草兩次。

加強防蟲，保證丰收：蘿卜葉片易遭受蚜蟲菜螟危害，如不加強防治，影響產量很大。因此，在幼苗期和直根生長期中的菜螟，用人工捕殺；蚜蟲，用魚藤精藥劑噴射兩次。

蓮花白畝產五萬五千斤的豐產經驗

南充市嘉陵人民公社紅旗大隊，1958年栽種的蓮花白，其中有一畝地的蓮花白，獲得五萬五千斤的高額豐產。現將該隊栽培蓮花白的經驗介紹如下：

一、選育良種：大蜚葉蓮花白，是南充地方品種。它的特点是：晚熟，產量高，包得緊，一般每個可長十斤左右，大的一個可以長到二十斤以上。

二、育苗：在芒种至大暑期間（即6—7月），可以陸續播種。但以頭伏（7月上旬）播的，產量最高，且不易抽苔。

播種前，將苗床地整好，培育成壯苗。其方法是：選土質較好，排水灌水都方便的地方，深挖，曝曬，以人畜糞尿油餅作底肥，后用豌豆水（去粉）發酵半月，混合豬糞，施在苗床上。糞收汗后，即播種。播后，蓋上篩過的堆肥泥，以蓋着種子為度。搭上陰棚，三天后，苗子即出土。在早晚，注意澆水和取蓋陰棚，使幼苗生長健壯。苗高一尺五寸時，進行移植。

三、栽培管理：本田必須在栽前整好，深挖一尺五寸，施底肥五萬斤。將地作成廂廂，廂寬一丈三尺二寸，打錯窩子，株距一尺六寸，每畝栽三千七百五十窩。栽好苗子后，白天用菜葉遮蓋，晚上揭去，直到成活為止。追肥施清豬糞，每畝四十挑，隔一星期施一次，用量同前。到開小盤時，施第三次，每畝施肥四十至五十挑。開大盤時，追施較濃的人畜糞一次，每畝用八十挑。

蓮花白生長過程中，都有專人管理，除及時滿足水、肥外，中耕除草，防治病蟲害等，也作得很及時。到白露后，開始收穫。

冬蓮花白畝產三萬七千斤的經驗

成都市郊區金牛公社“七一”農場

一、品種

選用大五葉蓮白，生長強健，葉色濃綠，葉粉少，葉脈粗，葉片厚，葉球平頭，卷心緊，外葉少，抗病力強，晚熟，大的重二十斤，從移栽到收穫約一百二十天左右。

二、育苗

1. 苗床的整理：選擇排水良好、半陰半陽的肥沃沙質壤土作為苗床。播種前，先施人糞尿五百斤（一分地），干后，用山鋤深

挖一尺，弄細耙平，作成三尺五寸的廂，廂面要平，廂邊略高一寸，廂溝深約四寸。

2. 播種：採用露地育苗播種，小暑後（7月18日），將種子合細泥，播于廂內。每分地撒子三兩，撒後，蓋河沙掩子。然後，用噴壺連續澆水兩次，第一次澆濕，收汗後，再澆一次水。

3. 幼苗管理：幼苗期，應特別注意管理。為了避免大雨和烈日照射，廂面應搭棚。棚架前高一尺，後高一尺五寸，呈傾斜形，上蓋茅扇，長約八尺，寬四尺左右，以便揭蓋。播種後，根據氣候進行澆水。如天氣太大，早晚應連續澆水二、三次，每次澆透，出芽才整齊。二至三天出芽，在有三片真葉時進行勻苗，去瘦弱的苗子，距離八分至一寸。約過二十多天（8月10日），在露地假植一次，株行距四至五寸。

三、定植

先抄地一遍，深挖一尺二寸，耨三遍，把土打碎，使已施的糞與土充分混合均勻，作成包溝一丈寬的廂口。廂要弄細耙平，在白露後，將苗子移栽于作好的廂內。栽前，先打好窩子，深四寸，寬四寸，挖成深底形，畝植一千八百多株，在廂面正中央（農民稱背溝）點一行瀘州蘿卜，計三百九十六窩。栽蓮白前，事先要澆水，才栽苗子，需帶土團。土團的大小，以不傷根為原則，栽時不宜過深，窩要刨平，以免積水。

四、合理施肥

深挖土地時，每畝施底肥地渣三萬斤，油枯四百斤，骨粉一百五十斤，雞糞三百斤，保證蓮白生長良好，主要是根據蓮白不同的發育期，滿足其需肥的要求，施以不同的肥量，而獲得高產。每次施肥和灌溉時間及用量如下：第一次，澆白水，定植以後，9月13日澆一次水。第二次，人尿一千斤，9月21日施渾渾尿水，每瓢澆二窩。第三次，人尿二千斤，9月27日施渾渾尿，每瓢澆一窩。第四次，人尿二千六百斤，10月7日施肥一次，每

二瓢括一窩。第五次，人尿三千二百四十斤，酸硫銨三十三斤，油枯一百零五斤，10月23日施以混合肥料，括于廂面。第六次，人尿六百斤，11月2日施肥一次，括于廂面。第七次，人尿六百斤，12月4日屙水于廂面。

五、中耕除草

蓮白開小盤時，用小鋤松土一次，深二寸，且在地內做到有草即除，且除去腐爛的外葉，保持園地清潔。

六、防止病虫害

為防治虫害，除在幼苗時捕捉滾心蟲三次外，用滴滴涕乳劑噴射蚜蟲、青蟲兩次。

七、產量

計收的蓮花白三萬七千零二十斤，蘿卜一千七百八十二斤。

蓮花白畝產三萬斤的經驗

閬中縣城郊蔬菜社

一、育苗：冬蓮花白，在夏至前後四至五天育苗。育苗，首先應選好苗床地。苗床地先行翻耕，撿盡石頭瓦塊，整細耙平，做成三尺五寸至四尺寬的廂子，廂與廂間留一尺寬的人行道，廂面用板凳微微壓緊，壓後用鋤頭把表土鏟松（一寸左右），用竹扒把大土塊扒開，把廂面弄平，再把種子均勻地撒在廂面上（每分床地撒種八兩，移栽十五畝）。撒後用細土篩蓋，用稻草或麥草夾好的茅扇把床搭倒，做到早搭晚揭，過了三至四天苗子出土，就要把棚子升高，升到離苗子三尺左右為宜。棚升高後，也要做到早蓋晚揭。若是天氣大了，每天早晚還要用噴霧器噴水。苗子出齊七天後，即可用滴滴涕一兩兌水六十至七十斤噴射，以防治土蠶、跳蚤等害虫。苗高二寸時，即開始疏苗移栽。

二、疏苗移栽：首先要做好塘子，塘子里的土要充分弄細，撿淨石头瓦塊，再用篩子篩過，做成四尺寬，中間平展，四周稍高，如象棉花方格育苗的床子那樣。移苗時，先用水把苗床攪飽，然後分批的在苗床上挑選壯苗，選一株拔一株。把拔起的苗子攪在一起，移栽時再用大指拇粗、五寸長的小木棍，把木棍的一端削尖，再在塘子內每隔二寸五分見方處，根據苗子深淺，鑿成一寸左右深的小孔，邊鑿孔邊安苗，邊扶土邊壓緊，邊攪水。移完後，仍要搭好草棚，做到早蓋晚揭和早晚攪水。五六天後，即可把棚子拆去不要。拆棚過後，應馬上採用三、七成的糞水進行提苗，隔四、五天施一次，連續三次，就可定植了。

三、移栽本地：移栽地應選用土質肥沃、向陽的夾沙壤土，經深耕碎土、早炕土、多耕多耙後，每畝施堆肥一萬斤，耙平再用繩子牽行，行距二尺，窩距一尺五寸，打成口大底平深約五寸的窩子，或採用單行栽作，行寬二尺五寸，窩距一尺五寸，栽成錯窩。在移栽的前一天，塘子內要進行澆水把床子攪飽，攪後一對時再用小刀按苗距劃成二尺五寸見方，一寸五分深的墩子，邊划、邊起、邊運、邊往窩子里放，每窩一墩放好後，隨即進行扶土，務必把土墩蓋嚴弄平，弄平後再用手在苗子周圍扒成一個燈盞窩，在窩內攪上二、八成的清糞水。這樣每隔三、四天攪一次，一直攪到苗子成活為止。苗子轉青後，改用四、六成的糞水，每隔十天攪一次，連攪兩次，每畝每次需用兌好的糞水六十至七十挑。當菜苗開始卷心時，每畝用腐熟的油枯餅五十至一百斤，細堆肥二千斤，拌合均勻，撒在窩子里，同時每畝加施人畜糞六十至七十挑，一併施下，施後蓋土。

四、治蟲：苗期用滴滴涕一斤兌水六百斤，防治鑽心蟲和菜青蟲。卷心後，用人工捕捉土蠶，特別在苗床和塘子里，要注意捕捉蚯蚓子等。另外，還要作好中耕除草工作，每隔六、七天，必須鋤地一次，一直鋤到菜葉封行為止。

茄子亩产二万四千多斤的經驗

重庆市南桐矿区万盛人民公社万盛蔬菜区，产品容小組于1958年种植茄子一亩多，平均亩产二万四千七百二十斤。他們的栽培經驗是：

一、土壤情况：为已种过二年菜的沙質壤土，肥沃疏松，排水良好，有水源保証，沒有种过茄科作物。

二、深挖秋細、整平开厢：定植茄苗前，土地深挖达一尺以上，然后秋細整平，开成連沟二尺寬的高埂深沟排水。

三、提早育苗：元月初，就采用火窑子育苗，并培育了壮苗。

四、施足底肥：这是苗壮果重的重要条件。在定植前，每窩施入腐熟的人粪尿窖窩，一亩地共施了一万二千斤。底肥使土壤疏松，有利于苗根生长。定植后，又施足追肥，生长期間追肥四次，施入畜粪二万八千多斤。这样，充分供給了茄子生长發育需要的养料。

五、实行沟灌密植：这样，增加每亩的株数，是提高单位产量的一个关键。过去每亩只栽一千五百窩左右，1958年通过了辯論，破除了茄子不能密植的保守思想后，实行行距二尺，株距8寸的密植，每亩三千五百多窩，并全部实行了沟灌，充分供給了茄子生长所需要的水分。茄子需水多，因而保障了单位产量的提高。

六、防治病虫害：实行专人管理，每七天打藥一次。定植后，用米糠混六六六粉制成毒餌，誘杀土蚕，保証了全苗。在生长期中，曾發生二十八星瓢虫危害，用可湿性六六六藥一斤加水二百斤噴射四次，和噴射一次波尔多液（用硫酸銅一斤，石灰一斤，水一百斤配成）。还做好了深沟排水，基本上防止了病虫害的發生。

七、专人管理：加强了田間管理，中耕除草四次，消灭了杂

草，并随时打去腋芽，减少了养分的消耗。

番茄亩产二万九千多斤的经验

重庆市九龙坡区人和人民公社石堰大队于1958年种植番茄二亩一分，总产六万一千七百四十二斤，平均亩产二万九千四百零一斤，最大的一个重一斤三两，单株产量最多的达到十二、三斤。该队的丰产经验是：

一、深挖土地：种番茄的土地，深挖一尺多，坎得细，使番茄根系得到了充分的生长发育。

二、选好种子：选用本地“六轮番茄”，自己留种。在二极上，选择有轮的、大的、光滑无疤的果实，将种子取出后，用丝毛草或糠壳混合，放在清水里，将种子上的粘液洗净，洗得越干净越好。种子洗好后，放在阴凉地方阴干，用棕包好，勿使受潮。

三、提早播种，火窑育苗：在腊月间，将火窑子打好，施上人畜粪二三百斤。在正月初，用棕把种子包好，放在温水中，泡一天一夜。然后把种子放在晒干压紧的鹅儿肠草堆里（或牛屎里面，其作用是发热）。一天后，将种子取出，撒在窑子上，然后撒一层石骨子，泼上人畜粪一百斤，盖上草帘，烧窑两天两夜后，将草帘取出围在四周，搭起架子，盖上茅扇防寒，白天揭开，晚上盖好。同时，每天用喷雾器喷水，使其慢慢降温，保持土壤湿润。

四、及时假植，培育壮苗：番茄苗在火窑子里，生长到一寸时，以四寸见方距离，假植到窑田（冷床）里。窑田的土要坎细，泼上人畜粪（每亩苗床施底肥一万斤左右）。番茄苗生长到五、六寸时，进行定植。

五、带土定植：番茄定植前，在向阳、排水好、土质较厚、未发生过青枯病的缓斜坡地上，按行距二尺，窝距一尺打窝，将

番茄苗連土一起搬到窩內栽植。这样，保护了番茄幼苗根系的正常生长，根子入土深，增加了吸收养料的能力。移栽后，即行施肥，每窩半瓢，每亩施肥三千斤左右。

六、勤管理：在定植后二十天左右，薅一次，每窩施肥半瓢。再过几天，就进行上厢培土，增加侧根的发生与横向伸展，使发生须根多，增加了吸收土壤中养分的面积，有利于增加产量。上架（插支柱），勤整枝，每株留两根主干（双干整枝），并把它捆好，以后还剪侧枝六、七次，捆四、五次，勿使枝干倒塌。此外，并根据天气干旱情况，做到了经常均匀灌水，充分满足植株生长发育对水分的需要，因而無裂果。

七、防止病虫：派专人管理，随时注意检查，发现虫害后，立即采取措施，消灭病虫害。在发现土蚕危害时，用滴滴涕、六六六和切细的甜菜混合后，放在窩窩里，土蚕食后即死。

双季番茄生产經驗

泸州市藍田人民公社三大队（原国营前进蔬菜农场），1958年試种的双季番茄获得了丰收。

該队試种春季番茄八亩，平均亩产达到七千一百五十八斤。在春番茄获得丰收的基础上，又試种秋季番茄一亩，亩产四千二百二十四斤，春秋两季番茄亩产达一万一千三百八十二斤，打破了番茄万斤大关。

双季番茄的試植成功，在蔬菜生产上有着巨大的意义。延长了番茄的供应季节，在寒冷的秋冬天气，人們同样可以吃到味美可口的鮮番茄，增加了蔬菜品种供应。在全年缺菜的季节里（4—12月），都有番茄供应。

双季番茄栽培情况如下：

一、提早播种季节：提早播种季节，是提早春番茄成熟，保

証秋番茄收获的关键。春番茄在2月10日—15日播种，秋季番茄在6月16日播种。这样，就可以使春番茄在最热天以前收完，而秋番茄又能在低温来临以前收获。

二、种子处理、育苗：播种前，用福尔马林浸种后，再播入苗床，进行育苗。春番茄的播种期间气温低，因此采用温床育苗，苗龄四十七天移栽。而秋番茄的播种期和苗期正值酷热天气，因此采用冷床育苗，在定植前让苗子在冷床中生长，但同样要使它在上半和下午接受充分的日光。苗龄三十七天移栽，先选择生长健壮、节间短的苗子。

三、深耕、密植：深耕一尺二寸至一尺五寸，先深犁一次，后耙平。移植前，再浅犁一次，耙平，打窝，行距二尺二寸，株距一尺二寸，采用双干形整枝。为了使下部空气流动，搭叉字形竹竿，引导主枝向上生长，上部既能接受强烈阳光，下部空气又流通。

四、重施底肥，分期追肥：番茄移栽以前，打好窝子后，每窝施混合肥三至四斤，和土充分混匀。移栽后，刨一次定根水。在生长期中，施三次追肥，成活以后施一次人畜粪，花期追施一次猪粪，果实膨大再施一次猪粪，这样既满足了番茄前期的生长，又满足了它后期果实膨大对于养分的需要，后二次追肥施用猪粪，能供应番茄后期生长所需要的磷钾肥。

五、灌溉：春季番茄栽下以后，遇到了春旱，因此进行人工浇灌，保证水分的供应。秋季番茄栽下以后，又遇着秋旱，也进行了人工浇灌，天干也要保证产量丰收。

六、勤打芽：番茄生长期中，注意勤打腋芽，防止养分的消耗。

七、防治病虫害：从番茄的生长情况看来，春番茄病害较为严重，秋番茄前期病害轻，后期腐烂病较为严重。

蒿笋亩产一万五千斤的丰产經驗

南充市嘉陵人民公社新生大队，1958年种植蒿笋六百二十五亩，平均亩产一万零五十六斤。其中一亩高产地区，亩产达到一万五千斤。现将该队栽培蒿笋的经验介绍如下。

一、选育良种：白甲柳叶蒿笋，是南充地方优良品种，相传百余年，皮白鲜嫩，容易空心。在立春后，采用摘心法，可以延迟到清明收获，是当地蒿笋最好的品种。

二、育苗：将地深耕一尺五寸，底肥施用水粪一次，一亩施四十挑。粪收汗后，又深耕一次。整细耙平，使粪入泥，用木板拍平，撒下种子，盖上细沙泥，以盖着种子为度。然后用湿谷草盖上，出芽就去掉谷草，改用棚盖，棚高二尺。苗子长到两片大叶、两片小叶时，就定植。

三、栽培方法：蒿笋宜轻粘壤土。将地整细耙平，厢开三尺二寸，进行栽植，每厢三行，株距八寸，一亩七千五百株。栽植最好用铁锹，地湿用刀口插开，栽下苗子，按还原就行。如泥土干燥，窝子的泥，用锹插松拍紧才栽。栽时，把须根栽下地二颗米长，不折根，以防止病菌侵入烂根。栽时手不能对按，防止按破茛子，生长不好，只能按根。蒿笋转活后，灌清猪粪一次，施在厢中间，不能施入窝内，防止霜霉病。蒿笋开大盘叶子快接触时，追施二次人畜粪，施法如第一次。如粪施在窝内，就可能引起烂茛。一般注意上述栽培，即可获得良好收获。（尹嘉猷）

冬蒿笋丰产經驗

成都市龙潭公社十一耕作区衡星连，在成都市郊区东北面的丘陵地区，土质是黄色次重粘土，全年平均温度为 17°C 左右，

較壩區干燥冷涼，1958年種植冬蒿笋九分，亩产七千二百六十一斤，比一般产量高一倍以上，大的蒿笋每根重二斤多，一般的重一斤多。他們栽培冬蒿笋的經驗是：

一、品种：選用較耐热、产量高、品質好的二白皮密节巴蒿笋种。

二、育苗：

种子处理：先将种子放在冷水里浸一夜。然后在竹籃內鋪上一些河沙，再鋪上浸过的种子，盖一層河沙和叶片，将竹籃吊于井中。两三天后，芽子出齐了，就播种。

播种：选排水好的土壤，将地整細整平后，潑尿水，晾干后撒一層腐熟的渣肥和草灰，作成四尺五寸至五尺的厢子。二伏后，将粉嘴的种子撒播在上面，跟即撒水，盖上細土。

苗期管理：幼苗期中注意經常捫水，保持土壤湿润。天气大，早晚都捫水一次，并且要搭棚遮盖，以防大雨。

三、定植：在播种后二十七天定植，不能栽得过迟。作定植用的苗子，不宜用手扯，应用撬子撬，避免伤根。先将地深挖一尺，作成平厢，每厢栽六行，行距一尺一寸，株距六寸，栽后捫水。

四、田間管理：苗子栽下后，如天气大，每天要捫水。苗子轉青后，即施清淡尿水（尿一分兌水九分）。以后，每五天捫一次二八成尿水，到开小盘时，捫一次对成尿水，扯桶子（指莖膨大时）的时候需肥最多，用淨尿捫一次（尿水一万斤），以后只需灌水一至二次。

韭黃的栽培經驗

自貢市郊区的农民栽培韭黃已經有三百多年的历史了，由于多年的栽培，不断地改进栽培技术，現已形成一种特殊的栽培技术，生产出来的韭黃質量很高，終年都可供人們生活的需要，为