

中學生自然研究叢書

鳥類圖譜  
下冊

沐紹良編譯

王雲五 周建人 主編

商務印書館發行

# 目 次

## 下 册

白翅黑燕鷗	浮鶩	116	
魚江郎	大鳳頭燕鷗	119	
玄鶯	鷗	120	
海貓	白鷗	123	
斑鷗	海雀	124	
花魁鳥	角鳴	127	
沙雞	野鴿	128	
傳書鳩	鴿	131	
轆轤	金背斑鳩	斑鳩	132
火斑鳩	古銅色翅鴿	135	
達摩鸚哥	佛法僧	136	
赤喉蜂鳥	秦椒嘴	139	
魚狗	白胸魚狗	140	
小雉喀咕	郭公	143	
杜鵑	花喀咕	筒鳥	144
紅翅鳳頭喀咕	鶲鴉	147	

—鳥類圖譜下冊—

戴勝	✓ 蚊母鳥	148
鶲鶲	鵠鶲	151
黃魚鴟	光足鷦鷯	152
虎鷺	倉鴞	155
✓ 雨燕	針尾雨燕 小雨燕	156
棕腹啄木鳥	小花嘴打木 歪脖	159
山啄木鳥	花嘴打木	160
八色鶇	山鶇	163
大鶲	華北沙鶲 濱鶲	164
冰雞兒	大花鶲	167
黃馬蘭花兒	黃顫兒 山鵠鶲	168
馬蘭花兒	黑背鵠鶲	171
相思鳥	畫眉	172
練鶲	灰斑鶲	175
赭練鶲	東方紅胸鶲	176
郊鶲	黃鶲	179
赤腹鶲	穿草雞	180
中國灰叢樹石棲	藍尾巴根子	183
花紅燕兒	紅點頰	184

—鳥類圖譜下冊—

燕 赤腰燕 西伯利亞岩燕	187
鶲鶲 暗黃臉鶲鶲 柳鶲	188
黃尾根柳鶲 黃眉柳鶲 蒼眉鶲	191
剖葦 小剖葦	192
太平鳥 灰鵙	195
✓伯勞 虎鵙 褐色紅尾伯勞	196
東方倒攀山雀 戴菊鳥 河北烏形山雀	199
陽明鳥 黃鳥	200
風鳥 比翼鳥	203
烏鵲 白脖烏	204
山烏 寒鶲	207
鵠 星鳥	208
管蓮子 噪林鳥	211
印度革瑞克 紅肋粉眼 旋木雀	212
梅花雀 文鳥 索娥	215
錫嘴 桑屬	216
花雞 交喙鳥	219
鸞 靠山紅	220
金絲雀 黃雀	223

—鳥類圖譜下冊—

家雀 山麻雀.....	224
鳳頭雀 寒雀.....	227
黃眉 大眉子.....	228
鐵爪子 葦容兒.....	231

1. 白翅黑燕鷗 *Chlidonias leucoptera* Temminck. 英名

White-winged Black Tern. 鷗科

自南歐至東亞，各地均有繁殖，我國南部亦有其踪跡。翼長，嘴長而直，僅前端略向下方。尾呈燕尾狀，腳甚小，半蹠足。頭、頸及上背黑色（冬季白色，僅頭頂及上頸有黑紋）。小覆羽及翼灰白色，翕灰色。第一列撥風羽灰黑色，上尾筒及尾白色，下部及翼裏面黑色（冬季白色）。下尾筒白色。嘴夏季赤色，冬季黑色，腳赤橙色。尾略呈叉狀。幼鳥體色如冬羽，下部有褐色斑，尾灰色。羣棲於海，冬季逐北方種魚羣南下，故恆為漁夫測知魚羣之標的物。食物以小魚、甲殼類、軟體類、蠕蟲類為主。（圖：左，幼鳥；右，雌夏羽。）

2. 浮鷗 *Chlidonias leucopareia swinhoei* Mathews. 英

名 Chinese Whiskered Tern. 鷗科

繁殖於我國南部及斐律賓羣島。頭頂黑色（冬季額白，頭頂及上頸有黑縱線），背面及體下部灰黑色（冬季下部白色），喉灰色，頸白色。尾短，略呈叉狀，嘴血紅色，腳朱色。幼鳥體色如冬羽，惟頭頂及上頸黑褐色，翕及尾有褐色斑紋。（圖：前，夏羽；後，雄幼鳥。）

—鳥類圖譜下冊—



1



2

—鳥類圖譜下冊—



1



2

1. 魚江郎 *Hydroprogne caspia caspia* Pallas. 英名

Caspian Tern. 鷗科

繁殖於歐、亞、美三洲之北部及非洲。我國則黑龍江一帶爲其繁殖區域。體形甚大，頭頂及上頸黑色。（冬季白色，有黑縱斑。）翕灰鼠色，尾較短，略呈叉狀，灰白色。體下部及上尾筒白色。嘴甚粗強，赤色，腳黑色。幼鳥頭頂有黑白縱斑，背面有暗色斑，嘴暗橙黃色，腳黑褐色。繁殖期在北半球之溫帶地方爲4—7月。（圖：左，雄冬羽；右，雄夏羽。）

2. 大鳳頭燕鷗 *Thalasseus bergii cristatus* Stephens.

英名 Eastern Crested Tern. 鷗科

分布於我國東、南海沿岸、斐律賓、蘇門答臘、大洋洲等處。額白，頭頂及上頸黑色，各羽形成羽冠，混生白羽（冬季頭頂大部份白色）背面真珠灰色，尾略淡。頸及體下部白色。嘴黃，基部帶綠色，腳褐黑色。幼鳥額及頭頂白色，有淡褐黑色縱斑。翕有黑色及淡黃色之斑紋。尾暗灰色，羽端白色。（圖爲雄鳥夏羽。）

1. 玄鷺 *Anous stolidus pileatus* Scopoli. 英名

Philippine Noddy. 鷺科

分布於斐律賓、印度洋及大洋洲一帶，我國福建等處亦有其踪跡。頭頂灰鼠色，額近於白色，額前有黑帶。背面暗褐色，第一列撥風羽及尾褐黑色。下部暗褐色，喉灰褐色，嘴黑色，腳褐黑色。尾呈扇形，略分叉。幼鳥體色稍淡，頭頂灰褐色額白色，眉斑甚闊，白色。（圖：前，雌成鳥；後，雄幼鳥。）


2. 鷗 *Larus canus major* Middendorff. 英名 Asiatic

Common Gull. 鷺科

繁殖於西伯利亞東部及堪察加，冬季南下至我國。夏季頭純白（冬季密生暗褐色縱斑），頸、體下部及尾白色。翕淡灰色，外側第一列撥風羽黑色，前端有闊白斑。內側第一列及第二列撥風羽灰色，前端白色。虹彩黃色或乳脂色，眼瞼緣橙黃色，嘴及腳黃綠色。幼鳥頭及頸淡白色，有灰褐色斑紋。翕褐灰色，羽緣淡褐色。體下部淡白色，有褐色斑紋。嘴褐黃色，腳赭褐色。（圖：左，雄夏羽；右，雄幼鳥。）



1



2

—鳥類圖譜下冊—



1



2

1. 海貓（又名黑尾鷗） *Larus crassirostris* Vieillot.

英名 Black-tailed Gull. 鷗科

產於日本等處，冬季在我國南部。夏季頭頸純白（冬季略帶灰褐色）。翕灰褐色，第一及第二列撥風羽灰色，前端白色。其他各羽黑色。尾白，中央尾之亞帶黑色，末端白色。體下部純白。嘴淡黃色，亞帶爲黑輪，前端赤色。腳略帶黃色，虹彩淡黃色。幼鳥背面暗褐色，羽緣淡色。翼及尾褐黑色，顏灰白色。體下部淡褐色。嘴、腳肉色，惟嘴之前端黑色。五月產卵。（圖：左，雄夏羽，右，雌幼鳥。）

2. 白鷗 *Larus hyperboreus* Gunnerus. 英名 Glaucous Gull. 鷗科

產於歐、美北極圈，冬季南下，在亞洲至我國沿海及日本。成鳥之翕爲極淡之淡灰色，撥風羽白色，前端灰色。其他部份純白。嘴黃色，下嘴角有赤斑1個。腳肉色，虹彩淡黃色（以上第四年夏羽及冬羽）。頭及頸白色，頸部略有淡棕色縱斑；又有暗色眼斑1個。體下部白色，惟腹部略帶棕色。第一列撥風羽白色，外瓣略帶棕色。尾白，略有斑紋。（第三年冬羽）幼鳥之翕淡黃褐色，頭灰色，略有淡褐色縱斑。體下部及撥風羽淡棕色，尾有白斑，並有棕灰色線及黃色亞帶。嘴肉色，前端黑褐色，腳淡紅色，虹彩褐色。（圖：左，雌幼鳥；右，雄冬羽。）

1. 斑鷗 *Brachyramphus marmoratus perdix* Pallas.

英名 Partridge Auk. 海雀科

繁殖於堪察加，我國東三省及山東、青島亦有其踪跡。夏季背面褐色，有黃褐色及淡黃色斑紋。腮及上喉白色，略有黑斑。體下部、上胸以下白色，有黑褐色斑紋。冬季背面黑灰色，肩羽之大部份白色，頸有白輪，體下部純白。嘴黑褐色，腳趾淡肉色，蹠膜暗灰色，虹彩暗褐色。（圖：左，雌鳥夏羽；右，雄鳥冬羽。）


2. 海雀 *Synthliboramphus antiquus* Gmelin. 英名  
Ancient Auk. 海雀科

繁殖於阿拉斯加附近、阿留西安、可孟達羣島、堪察加及黑龍江沿岸等處，冬季南下至我國南部沿岸。雌雄同色，夏季頭頂、腮、喉、後頸、及脇黑色，上頸、後頸下部側方及上翕有白色飾羽。背暗灰色，翼及尾黑色。體下部前頸以下純白。冬季喉及前頸純白，頭側有白帶。嘴灰白色，鼻孔嘴峯及上、下嘴基部黑色，跗蹠及趾蒼灰色或淡紅色，蹠膜灰黑色，虹彩暗褐色。（圖：左，雄夏羽；右，雄冬羽。）

—鳥類圖譜下冊—



1



2

—鳥類圖譜下冊—



1



2

1. 花魁鳥 *Lunda cirrhata* Pallas. 英名 Tufted Puffin.

海雀科

繁殖於白令海及阿拉斯加等處，冬季南下。雌雄同色，夏季背面黑色，額、腮之狹線、及自嘴基部至頭側部份均呈白色，眼後方之流蘇狀大飾羽黃色。體下部煙褐色，喉、頸側及頭側褐黑色，下覆兩羽褐灰色。虹彩乳白色，嘴前半部鮭赤色或赤橙色，後半部橄欖黃色，上嘴有半圓凹部4處，嘴上隆起物蘋果綠色。腳鮭赤色，趾爪黑褐色。冬季嘴基一半之角質被覆部橄欖綠色，略帶暗褐色。顏面黑褐色，眼後方有淡色斑1，無流蘇狀黃飾羽。（圖：左，雄冬羽；右，雄夏羽。）

2. 角鷗 *Fratercula corniculata* Naumann. 英名 Horned Puffin. 海雀科

繁殖於堪察加、可孟達、阿留西安羣島及阿拉斯加等處。雌雄同色，夏季頭頂灰褐色，背面黑色，頭側白色，圍眼部後方有細長之灰色線。頸輪黑褐色，下部白色。虹彩蒼灰色，眼瞼緣赤色，眼下部有革質之細長隆起物，上部有針狀柔軟附屬物，均黑褐色。嘴前端 $\frac{1}{3}$ 鮭赤色，中央部分褐色，基部之 $\frac{2}{3}$ 檸檬黃色，口角隆起部橙黃色。腳赤橙色。冬季嘴基部之 $\frac{2}{3}$ 不被角質物，褐色，口角灰白色，前端僅上嘴赤色，下嘴則為褐色。眼瞼褐色，頭側灰褐色。（圖：左，冬羽；右，夏羽。）