

卫生专业技术资格考试专家委员会/策划编写

2009 卫生专业职称考试冲关捷径

人机对话版

消化内科学 全真模拟试卷

紧扣新版考试大纲 权威专家组建题库
内容涵盖全部考点 真实模拟考试环境

2009 卫生专业职称考试冲关捷径

消化内科学全真模拟试卷

XIAOHUA NEIKEXUE QUANZHEN MONI SHIJUAN

总主编 郑长青

主 编 林连捷 林 艳

副主编 金 玉

编著者 (以姓氏汉语拼音为序)

毕国荣	郭生玉	金 玉	廖爱军
林 艳	林连捷	刘宏博	吕 薇
马 健	王慧涵	王小春	王艳军
王艳秋	徐德魁	叶肖琳	张 琳
张晓雪	郑长青	邹德玲	

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

消化内科学全真模拟试卷/林连捷,林 艳主编. —北京:人民军医出版社,2009.1

(卫生专业职称考试冲关捷径)

ISBN 978-7-5091-2474-1

I. 消… II. ①林…②林… III. 消化系统疾病—诊疗—医药卫生人员—资格考核—习题
IV. R57-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 207818 号

策划编辑:郭伟疆 张利峰 文字编辑:王久红 责任审读:黄栩兵

出 版 人:齐学进

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927272

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:潮河印业有限公司 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:13 字数:420 千字

版、印次:2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~2800

定价:49.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

出版说明

为了满足卫生专业技术人员晋升中级资格应试的需要,人民军医出版社连续多年组织具有丰富试题编写经验的各学科专家以全真模拟试卷的形式编写了《卫生专业职称考试冲关捷径》丛书。本丛书的特点是紧密围绕考试大纲,符合指导用书和临床实践需要,目的是使应试者提高业务能力和应试成绩,顺利通过中级职称考试。我们相信,只要应试者认真复习、掌握试卷所涉及的内容,踏踏实实做模拟试卷,就一定能够顺利通过考试。

本丛书依照最新考试大纲,以全真模拟试题形式将考纲中所有知识点与各学科的系统知识结合起来,经过精心编排,模拟真实的考试环境。为考生提供了将考试大纲重点、知识难点、解题要点、正确答案相结合的高效率复习模式。力争通过试题将考点融会贯通,为准备晋升的医师提供复习、应试的捷径。特别提醒:复习和做模拟题时,千万不要把主要精力放在背记试题和答案上。

在编写本模拟试卷的过程中,编者得到了多方的支持与帮助,在此表示诚挚的谢意。由于参与编写的人员较多,编写时间仓促,难免有错误或疏漏之处,殷切希望广大读者批评指正,以便及时纠正和改进。

最后,衷心祝愿大家顺利通过考试!

编 者

2008年10月

目 录

全真模拟试卷一	(1)	基础知识	(99)
基础知识	(1)	相关专业知识	(107)
相关专业知识	(9)	专业知识	(116)
专业知识	(18)	专业实践能力	(125)
专业实践能力	(26)	答案	(131)
答案	(31)	全真模拟试卷五	(133)
全真模拟试卷二	(33)	基础知识	(133)
基础知识	(33)	相关专业知识	(141)
相关专业知识	(41)	专业知识	(151)
专业知识	(50)	专业实践能力	(161)
专业实践能力	(59)	答案	(165)
答案	(65)	全真模拟试卷六	(167)
全真模拟试卷三	(67)	基础知识	(167)
基础知识	(67)	相关专业知识	(175)
相关专业知识	(75)	专业知识	(185)
专业知识	(84)	专业实践能力	(195)
专业实践能力	(93)	答案	(199)
答案	(97)	人机对话网络版试卷及答案	
全真模拟试卷四	(99)		(201)

全真模拟试卷一

基础知识

第一部分 单选题

本部分在答题过程中可以回退(对已作答试题可返回检查或修改答案)。

单选题(每题1个得分点):以下每道试题有5个备选答案,请从中选择1个最佳答案。

1. 下列哪种疾病紫癜的原因为血小板异常
 - A. 过敏性紫癜
 - B. 药物性紫癜
 - C. 机械性紫癜
 - D. 血小板无力症
 - E. 血友病
2. 感染性发热包括下列哪项
 - A. 心肌梗死后低热
 - B. 白血病
 - C. 甲状腺功能亢进
 - D. 流行性出血热
 - E. 感染后低热
3. 慢性咳嗽伴大量脓痰,常见于
 - A. 百日咳
 - B. 胸膜炎
 - C. 肺炎
 - D. 肺脓肿
 - E. 肺结核
4. 明确诊断肺血管栓塞症应首选哪项检查
 - A. 动脉血气分析
 - B. 血浆D-二聚体
 - C. 心电图
 - D. 超声心动图
 - E. 螺旋CT
5. 引起老年人胸痛的常见原因是
 - A. 胸膜炎
 - B. 肺炎
 - C. 心绞痛
 - D. 风湿性心脏病
 - E. 自发性气胸
6. 关于肿瘤扑落音的特点,正确的是
 - A. 音调比开瓣音响
 - B. 在S₂后,较开瓣音出现早
 - C. 不随体位改变而变化
 - D. 听诊部位在心尖部及胸骨左缘第3、4肋间
 - E. 为主动脉瘤常见体征
7. 发绀伴杵状指可见于
 - A. 肺源性心脏病
 - B. 急性左侧心力衰竭
 - C. 胸腔积液
 - D. 气胸
 - E. 休克
8. 下列哪项不引起混合性呼吸困难
 - A. 重症肺结核
 - B. 重症肺炎
 - C. 慢性阻塞性肺气肿
 - D. 弥漫性肺间质疾病
 - E. 大量胸腔积液
9. 正常心尖冲动范围直径为
 - A. 0.5~1.0 cm
 - B. 0.5~1.5 cm
 - C. 1.5~2.0 cm
 - D. 2.0~2.5 cm
 - E. 2.5~3.0 cm
10. 呕吐伴右上腹痛、发热,最可能是
 - A. 肠梗阻
 - B. 急性下壁心肌梗死
 - C. 急性阑尾炎
 - D. 急性胆囊炎
 - E. 急性胃肠炎
11. 下列引起意识障碍的疾病哪项属颅内感染
 - A. 高血压脑病
 - B. 脑栓塞
 - C. 尿毒症
 - D. 脑型疟疾
 - E. 癫痫

12. 黄疸伴右上腹部阵发性绞痛见于哪种疾病
 - A. 肝炎
 - B. 胆道蛔虫
 - C. 胰头癌
 - D. 急性胆管炎
 - E. 肝硬化
13. Duroziez 双重杂音最常见于
 - A. 主动脉瓣狭窄
 - B. 主动脉瓣关闭不全
 - C. 二尖瓣狭窄
 - D. 肺动脉瓣狭窄
 - E. 肺动脉瓣关闭不全
14. 关于血尿错误的是
 - A. 泌尿系统疾病是最常见原因
 - B. 可见于感染性疾病
 - C. 急性阑尾炎可有血尿
 - D. 不见于正常人
 - E. 可为某些药物的副作用
15. 支气管疾病引起咯血不见于
 - A. 支气管内膜结核
 - B. 支气管肺癌
 - C. 支气管哮喘
 - D. 慢性支气管炎
 - E. 支气管结石
16. 正常心尖冲动位置在
 - A. 第4肋间左锁骨中线内 0.5~1cm
 - B. 第5肋间左锁骨中线内 0.5~1cm
 - C. 第5肋间左锁骨中线内 2.0~2.5cm
 - D. 第6肋间左锁骨中线内 0.5~1.0cm
 - E. 第6肋间左锁骨中线内 1~2cm
17. 枪击音的听诊部位常选择在哪些动脉
 - A. 颈动脉
 - B. 锁骨上动脉
 - C. 股动脉
 - D. 桡动脉
 - E. 肱动脉
18. 呕吐伴上腹部节律性、周期性痛可见于
 - A. 慢性胆囊炎
 - B. 消化性溃疡
 - C. 急性胃炎
 - D. 肝硬化
 - E. 胆石症
19. 听诊时区别第一心音与第二心音很重要, 下列哪项支持前者
 - A. 音调较高
 - B. 强度较低
 - C. 历时较短
 - D. 心尖部听诊最清楚
 - E. 心尖冲动后出现
20. 下列哪项可引起中枢性眩晕
 - A. 梅尼埃病
 - B. 听神经瘤
 - C. 迷路炎
 - D. 前庭神经炎
 - E. 晕动病
21. 引起黄疸的疾病中, 下列哪个是先天性溶血性疾病
 - A. 海洋性贫血
 - B. 蚕豆病
 - C. 新生儿溶血
 - D. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
 - E. 自身免疫性溶血性贫血
22. 心包叩击音最常见于
 - A. 二尖瓣关闭不全
 - B. 扩张型心肌病
 - C. 心包积液
 - D. 缩窄性心包炎
 - E. 心力衰竭
23. 慢性腹痛临床应注意以下几点, 除外
 - A. 腹痛的部位
 - B. 腹痛的性质
 - C. 与遗传的关系
 - D. 腹痛与体位的关系
 - E. 伴随症状
24. 癌症转移引起的淋巴结肿大的特点错误的是
 - A. 有压痛
 - B. 质地坚硬
 - C. 表面可光滑
 - D. 与周围组织粘连
 - E. 可单个或多个
25. 下列哪种心脏病常无震颤
 - A. 室间隔缺损
 - B. 主动脉瓣关闭不全
 - C. 肺动脉瓣狭窄
 - D. 主动脉瓣狭窄
 - E. 动脉导管未闭
26. 关于尿频、尿急、尿痛的概念, 下列哪项是错误的
 - A. 尿频指排尿次数明显增加
 - B. 尿频也指尿量明显增加
 - C. 尿急指患者一有尿意即尿急难忍, 常出现尿

失禁

- D. 尿痛指患者排尿时伴有下腹部疼痛
E. 尿频、尿急、尿痛与尿不尽感合称尿路刺激征
27. 下列哪项是引起头痛的全身性疾病
A. 脑出血
B. 脑外伤
C. 结缔组织病
D. 三叉神经痛
E. 偏头痛
28. 关于咯血与呕血的鉴别,下列哪项是错误的
A. 咯血不可能出现黑粪,呕血一定出现黑粪
B. 咯血为鲜红色,呕血多为暗红色
C. 呕血见于消化道疾病
D. 咯血属碱性,呕血属酸性
E. 咯血血中混有痰泡沫,呕血混有食物残渣、胃液
29. 下列哪种疾病可出现周围性发绀
A. 慢性阻塞性肺气肿
B. 肺水肿
C. 大量胸腔积液
D. 右侧心力衰竭
E. Fallot 三联症
30. 出现 Cheyne-Stokes 和 Biots 呼吸最主要的机制为
A. 胸部外伤呼吸受抑制
B. 胸腔积液呼吸受抑制
C. 呼吸中枢兴奋性降低
D. 呼吸肌麻痹
E. 严重神经衰竭
31. 下列哪项可引起神经精神性呼吸困难
A. 糖尿病酮症酸中毒
B. 脑出血
C. 有机磷农药中毒
D. 重症肌无力
E. 重症贫血
32. 心脏叩诊呈普大型,不随体位改变常见于
A. 肺源性心脏病
B. 高血压性心脏病
C. 扩张型心肌病
D. 心包积液
E. 主动脉瓣关闭不全
33. 主动脉瓣关闭不全时可有以下哪项周围血管征
A. 交替脉
B. 水冲脉
C. 重搏脉
D. 无脉
E. 奇脉
34. 呕吐物少但有粪臭者可见于
A. 急性中毒
B. 幽门梗阻
C. 急性肠炎
D. 肝炎
E. 肠梗阻
35. 关于开瓣音的听诊特点,正确的是
A. 音调较低
B. 听诊部位在胸骨左缘第2肋间
C. 响亮、清脆、持续时间长
D. 在第二心音后出现
E. 吸气时增强
36. 下列哪项是引起便血的结肠疾病
A. 肠伤寒
B. 急性出血性坏死性肠炎
C. 空肠憩室炎
D. 阿米巴痢疾
E. 肠套叠
37. 异常支气管肺泡呼吸音见于下列情况,除外
A. 肺结核
B. 支气管肺炎
C. 大叶性肺炎初期
D. 大叶性肺炎实变期
E. 胸腔积液上方肺膨胀不全区
38. 蜘蛛痣常见的部位不包括
A. 面部
B. 颈部
C. 上臂
D. 前胸
E. 腹部
39. 下列属于非感染性发热的是
A. 大叶性肺炎
B. 肺脓肿
C. 扁桃体炎
D. 甲状腺功能亢进症
E. 流行性脑脊髓膜炎
40. 关于心脏听诊,下列叙述哪项正确
A. 第三心音出现在心室快速充盈期末
B. 奔马律出现在收缩期
C. 开瓣音出现在收缩期
D. 心包叩击音出现在收缩期
E. 主动脉喷射音出现在收缩中晚期

41. 下列哪种疾病引起的腹泻属于慢性腹泻
- 急性肠道缺血
 - 败血症
 - 砷中毒
 - 过敏性紫癜
 - 慢性胰腺炎
42. 下列哪种情况可引起全身淋巴结肿大
- 化脓性扁桃体炎
 - 牙龈炎
 - 淋巴结结核
 - 乳腺癌
 - 白血病
43. 尿急最常见于
- 肾结石
 - 急性膀胱炎
 - 前列腺炎
 - 膀胱癌
 - 使用环磷酰胺
44. 关于胆汁淤积性黄疸, 正确的是
- 尿胆原增加, 尿胆红素(-)
 - 尿胆原减少, 尿胆红素(-)
 - 尿胆原减少, 尿胆红素(+)
 - 尿胆原增加, 尿胆红素(+)
 - 粪胆素(+)
45. 引起头痛的颅脑病变是
- 颈椎先天性畸形
 - 神经衰弱
 - 三叉神经痛
 - 中毒
 - 脑肿瘤
46. 患者老年男性, 有长期吸烟史, 出现刺激性咳嗽, 痰中带血, 最可能为
- 支气管扩张
 - 肺结核
 - 肺炎
 - 支气管肺癌
 - 肺水肿
47. 患者男性, 26岁, 发热、咳嗽、胸痛, 查体可闻及胸膜摩擦音, 该摩擦音的特点是
- 吸气初明显
 - 呼气初明显
 - 与心搏一致
 - 仅能在呼气时听到
 - 屏气时不消失
48. 下列哪种疾病或情况可出现潮式呼吸
- 糖尿病酮症酸中毒
 - 青年人熟睡中
 - 神经衰弱
 - 胸膜炎
 - 脑膜炎
49. 二尖瓣狭窄的杂音听诊特点不包括
- 杂音最响部位在心尖区
 - 时期为舒张中晚期
 - 性质为隆隆样
 - 为递增型
 - 不伴震颤
50. 全身水肿伴重度蛋白尿见于
- 肾源性水肿
 - 心源性水肿
 - 丝虫病
 - 药物性水肿
 - 特发性水肿
51. 患者女性, 56岁, 查体见发绀伴杵状指, 该患者的诊断可能是
- 气胸
 - 先天性心脏病
 - 肺炎
 - 休克
 - 胸腔积液
52. 患者女性, 42岁, 腹痛, 寒战、发热, 呕吐, 黄疸, 该患者可能是
- 急性胰腺炎
 - 急性腹膜炎
 - 急性胆囊炎
 - 急性胃炎
 - 急性肾炎
53. 患者男性, 30岁, 1d前出现尿频, 尿急, 该患者首先应考虑
- 肾炎
 - 前列腺炎
 - 膀胱癌
 - 肾结石
 - 急性膀胱炎
54. 患者女性, 26岁, 叩诊心界向左下移位, 心尖区可闻及收缩期柔和、吹风样、时限短、局限的杂音, 该患者的诊断不可能是
- 冠心病
 - 扩张型心肌病
 - 二尖瓣脱垂综合征
 - 贫血性心脏病
 - 高血压心脏病
55. 患者男性, 查体见颈静脉怒张, 其不可能是

- A. 右侧心力衰竭
B. 心包积液
C. 缩窄性心包炎
D. 高血压
E. 上腔静脉阻塞综合征
56. 患者男性,26岁,活动时出现右胸撕裂样痛,呼吸困难,查体右肺呼吸音消失,该患者的诊断是
A. 右气胸
B. 右胸腔积液
C. 右肺炎
D. 肺梗死
E. 胸膜炎
57. 患者女性,32岁,腹胀,查体肠鸣音消失,该患者最可能的诊断是
A. 大量腹水
B. 急性胰腺炎
C. 急性胆囊炎
D. 肠麻痹
E. 机械性肠梗阻
58. 患者女性,25岁,系统性红斑狼疮病史3年,2d前感冒后出现高热、腰痛。查体:贫血貌,巩膜轻度黄染,脾大。该患者黄疸的原因可能是
A. 溶血性黄疸
B. 肝细胞性黄疸
C. 药物性黄疸
D. 胆汁淤积性黄疸
E. 先天性非溶血性黄疸
59. 患者女性,36岁。反复头痛、流脓鼻涕1年余,耳鼻咽喉科诊断为慢性鼻窦炎。该患者头痛的特点是
A. 为全头痛
B. 平卧位可缓解
C. 多在清晨头痛
D. 月经期加重
E. 与情绪紧张有关
60. 患者男性,1d前大量饮酒后出现腹痛,恶心,呕吐,查体:左上腹有横行呈带状压痛及肌紧张,左腰部皮下淤血而发蓝,该患者的诊断是
A. 胰头癌
B. 胆总管结石
C. 急性胆囊炎
D. 急性坏死型胰腺炎
E. 急性胃炎
61. 患者女性,40岁,出现呕吐,眩晕,查体可见眼球震颤,该患者的诊断是
A. 肠梗阻
B. 幽门梗阻
C. 胆囊炎
D. 细菌性食物中毒
E. 迷路炎
62. 患者男性,32岁,突发右胸痛,呼吸困难,查体:语音震颤减弱,气管向左侧移位,叩诊右侧为鼓音,该患者查体还可见
A. 肝浊音界缩小
B. 肝浊音界消失
C. 肝浊音界扩大
D. 肝浊音界上移
E. 肝浊音界下移
63. 患者男性,18岁,近3d咳嗽,干咳无痰,右胸痛,其可能的诊断为
A. 支气管扩张
B. 胸膜炎
C. 肺脓肿
D. 支气管胸膜瘘
E. 慢性支气管炎
64. 患者女性,28岁,哺乳期,畏寒,发热,乳房肿痛,首先考虑
A. 急性乳腺炎
B. 乳腺癌
C. 乳房乳头状瘤
D. 乳腺囊性增生
E. 乳腺纤维瘤
65. 患者女性,出现腹泻,查体可见皮疹,该患者最可能的诊断是
A. 伤寒
B. 菌痢
C. 霍乱
D. 肠结核
E. 食物中毒
66. 患者女性,甲状腺功能亢进症病史7年,心悸,心电图显示房颤心律,该患者心脏听诊可见
A. S₁强弱相等
B. 心律绝对不整
C. 心率少于脉率
D. 可听到心房颤动音
E. 心率一定正常

67. 患者男性,42岁,出现肾绞痛,同时可见血尿,该患者可能是
- 膀胱结石
 - 肾结核
 - 肾肿瘤
 - 肾结石
 - 肾炎
68. 患者女性,42岁,劳力性呼吸困难,查体:两颧绀红色,心尖区触及舒张期震颤,心浊音界为梨形,该患者的诊断是
- 主动脉瓣关闭不全
 - 主动脉瓣狭窄
 - 房间隔缺损
 - 二尖瓣狭窄
 - 二尖瓣关闭不全
69. 患者男性,32岁,查体:肝脏弥漫性肿大,首先考虑
- 脂肪肝
 - 肝硬化
 - 肝癌
 - 肝炎
 - 白血病
70. 患者男性,53岁,心悸,胸闷,查体:心尖区舒张期隆隆样杂音,心电图显示房颤,该患者心脏听诊不可能存在
- S_1 强弱不等
 - 大炮音
 - 心律绝对不整
 - 开瓣音
 - Graham Steel 杂音
71. 患者男性,34岁,进食大量酸菜后出现发绀,吸氧后发绀无缓解。该患者血中的高铁血红蛋白含量至少为
- 10 g/L
 - 20 g/L
 - 30 g/L
 - 40 g/L
 - 50 g/L
72. 患者男性,查体见皮肤多个紫红色片状改变,压之不褪色,直径4mm,应诊断为
- 瘀点
 - 瘀斑
 - 紫癜
 - 血肿
 - 玫瑰疹
73. 患者男性,40岁,多次测量血压为145/90mmHg,考虑患者存在
- 正常血压
 - 临界高血压
 - 1级高血压
 - 2级高血压
 - 单纯收缩期高血压
74. 患者女性,垫枕右侧卧位,左侧肩胛角尖端可叩得一相对浊音区,撤去枕头浊音区消失,此浊音是由于
- 左肺炎
 - 左肺脓肿
 - 脊柱弯曲
 - 空洞型肺结核
 - 肺梗死
75. 患儿5岁,房间隔缺损,心脏听诊胸骨左缘第2和第3肋间闻及收缩期吹风样杂音。该患者尚可闻及的异常心音是
- 第二心音生理性分裂
 - 第二心音通常分裂
 - 第二心音反常分裂
 - 第二心音固定性分裂
 - S_1 强弱不等
76. 患者男性,42岁,消瘦,右上腹痛,查体:肝剑突下4cm,质硬,边缘不整,有结节,可闻及血管杂音,该患者最可能的诊断是
- 肝炎
 - 肝癌
 - 脂肪肝
 - 肝淤血
 - 肝脓肿
77. 患者女性,32岁,因胸痛来诊,诊断为左侧胸膜炎,治疗2d后胸痛消失,出现呼吸困难,原因是
- 胸膜炎症消失
 - 胸腔积液减少
 - 胸腔积液增加
 - 并发肺部其他疾病
 - 并发心脏病
78. 患者男性,26岁,查体见牙关紧闭,面肌抽搐,呈苦笑状,该患者可能是
- 肠伤寒
 - 甲状腺功能亢进
 - 疟疾
 - 破伤风

- E. 脑炎
79. 患者男性,30岁,反复上腹痛2年,近1周出现夜间痛,进食可缓解,1h前突发上腹部持续性剧烈疼痛,迅速转移至全腹,查体:肝浊音界消失,该患者的诊断是
- 胃溃疡穿孔
 - 十二指肠溃疡穿孔
 - 急性胆囊炎
 - 急性阑尾炎
 - 急性胰腺炎
80. 患者男性,30岁,查体脾肋下1.5cm,该患者的诊断应排除
- 急性肝炎
 - 伤寒
 - 淋巴瘤
 - 败血症
 - 急性疟疾

第二部分 共用题干单选题

进入此部分试题后,您不能返回前面部分查看试题或修改答案;本部分在答题过程中不能回退,(对已作答试题不能返回检查或修改答案)。

共用题干单选题(每个提问1个得分点):以下每道试题有2~6个提问,每个提问有5个备选答案,请选择1个最佳答案。

(81—83题共用题干)

患者女性,52岁,二尖瓣关闭不全病史15年,近日出现心悸,胸闷,行PDE检查显示重度二尖瓣反流。

81. 该患者查体不可能出现的体征有
- 抬举样心尖冲动
 - 收缩期震颤
 - S_1 减弱
 - 可闻及收缩期杂音
 - 杂音向颈部传导
82. 该患者心脏杂音的特点是
- 柔和
 - 2/6级以下
 - 舒张期
 - 吹风样
 - 可有Austin Flint杂音
83. 做Valsalva动作时,下列杂音的强度增强
- 二尖瓣狭窄
 - 二尖瓣关闭不全
 - 肥厚型梗阻性心脏病

- 主动脉瓣关闭不全
- 主动脉瓣狭窄

(84—86题共用题干)

患者女性,56岁,糖尿病病史15年,1d前出现昏迷,呼吸困难,尿酮体4+。

84. 该患者呼吸困难属于
- 肺源性
 - 心源性
 - 中毒性
 - 血源性
 - 神经精神性
85. 该患者呼吸困难的特点是
- 深大呼吸
 - 呼吸浅慢
 - 常伴哮鸣音
 - 三凹症阳性
 - 咳粉红色泡沫痰
86. 该患者的呼吸节律最可能是
- 陈施呼吸
 - 毕奥呼吸
 - 库什摩呼吸
 - 抑制性呼吸
 - 叹气样呼吸

(87—89题共用题干)

患者男性,52岁,高血压心脏病病史10年,1d前因上呼吸道感染在门诊静脉滴注抗生素,速度较快,2h前出现呼吸困难。

87. 该患者呼吸困难最可能是由于
- 急性心肌梗死
 - 肺炎
 - 急性左侧心力衰竭
 - 急性心包积液
 - 肺梗死
88. 该患者查体不可能出现的体征是
- 心尖区舒张期奔马律
 - P_2 亢进
 - 双肺湿啰音
 - 颈静脉怒张
 - 双肺哮鸣音
89. 该患者的呼吸困难可用以下方法缓解,除外
- 平卧位
 - 镇静药
 - 利尿

- D. 降压
- E. 使用氨茶碱

(90—92 题共用题干)

患者男性,70岁,慢性萎缩性胃炎病史30年。1个月前开始出现不规则上腹痛,进食差,体重减轻约6kg,今晨突发呕血,量约100ml。

90. 该患者最可能的诊断是
 - A. 急性胃黏膜病变
 - B. 胃癌
 - C. 食管胃底静脉曲张
 - D. 消化性溃疡
 - E. 食管贲门黏膜撕裂
91. 该患者可能出现的体征是
 - A. 肝掌
 - B. 蜘蛛痣
 - C. 腹壁静脉曲张
 - D. 上腹压痛
 - E. 黄疸
92. 对该患者首选的检查是
 - A. 钡剂
 - B. 便常规
 - C. 腹部超声
 - D. 胃镜
 - E. 腹部CT

(93—95 题共用题干)

患者女性,30岁,尿毒症,出现胸痛,心包摩擦音。

93. 心包摩擦音听诊的特点不包括
 - A. 在心前区最响亮
 - B. 坐位前倾更明显
 - C. 吸气末更明显
 - D. 与心搏一致
 - E. 屏气时仍存在
94. 由于未及时治疗,该患者出现大量心包积液,这时可出现的体征
 - A. 心尖冲动增强
 - B. 靴形心
 - C. 开瓣音
 - D. 烧瓶样心
 - E. S_1 亢进
95. 大量心包积液的体征不包括
 - A. 颈静脉怒张

- B. 肝大
- C. 脉压增大
- D. Ewart征
- E. 奇脉

(96—97 题共用题干)

患者男性,28岁,1d前出现发热,恶心呕吐,腹泻7次,伴里急后重。便培养示志贺痢疾杆菌生长。

96. 哪种大便秘性状提示急性细菌性痢疾
 - A. 果酱样便
 - B. 柏油样便
 - C. 水样便
 - D. 黏液脓血便
 - E. 鲜红血便
97. 其腹泻的发生机制是
 - A. 肠黏膜的吸收面积减少或吸收障碍
 - B. 黏膜炎症、溃疡等致血浆、黏液、脓血渗出
 - C. 肠蠕动亢进致肠内食糜停留时间少
 - D. 胃肠黏膜分泌过多的液体
 - E. 肠内容物渗透压增高

(98—100 题共用题干)

患者女性,40岁,先天性主动脉瓣狭窄,PDE示中度狭窄。

98. 该患者有典型的主动脉瓣狭窄三联征,除了呼吸困难,心绞痛,还包括
 - A. 心悸
 - B. 乏力
 - C. 晕厥
 - D. 咳嗽
 - E. 咯血
99. 该患者不可能出现的体征是
 - A. 心尖冲动增强
 - B. 迟脉
 - C. 主动脉瓣区 S_2 增强
 - D. 抬举样心尖冲动
 - E. S_2 逆分裂
100. 该患者杂音的部位及时期为
 - A. 心尖区收缩期杂音
 - B. 心尖区舒张期杂音
 - C. 胸骨右缘第2肋间舒张期杂音
 - D. 胸骨右缘第2肋间收缩期杂音
 - E. 胸骨左缘第3肋间舒张期杂音

相关专业知识

第一部分 单选题

本部分在答题过程中可以回退(对已作答试题可返回检查或修改答案)。

单选题(每题1个得分点):以下每道试题有5个备选答案,请从中选择1个最佳答案。

1. 钩端螺旋体病多流行于
 - A. 夏秋季
 - B. 冬春季
 - C. 冬秋季
 - D. 冬夏季
 - E. 夏季
2. 结核性腹膜炎常见的并发症是
 - A. 肠出血
 - B. 肠穿孔
 - C. 肠梗阻
 - D. 肠瘘
 - E. 腹腔脓肿
3. 胰腺癌治疗首选的方法是
 - A. 手术治疗
 - B. 放疗
 - C. 化疗
 - D. 免疫治疗
 - E. 基因治疗
4. 特发性肺纤维化肺功能的特点是
 - A. 闭合气量减少
 - B. 阻塞性通气功能障碍
 - C. 混合性通气功能障碍
 - D. 限制性通气功能障碍
 - E. 以上都不是
5. 区分垂体为大腺瘤或微腺瘤以下列哪个数值为界
 - A. 10mm
 - B. 10cm
 - C. 9mm
 - D. 5mm
 - E. 5cm
6. 甲亢危象发生的诱因,不包括
 - A. 抗甲状腺药物治疗剂量不足
 - B. 感染
 - C. 术前准备不充分
 - D. 放射性甲状腺炎
 - E. 精神刺激
7. 肝硬化的病人发生皮肤色素沉着的原因
 - A. 雌激素减少
 - B. 雄激素增多
 - C. 继发血管升压素(抗利尿激素)减少
 - D. 继发醛固酮增多
 - E. 肾上腺皮质激素减少
8. 持续性房颤是指房颤持续时间超过
 - A. 48h
 - B. 3d
 - C. 7d
 - D. 14d
 - E. 半年
9. 下列哪项不符合正常骨髓象特征
 - A. 有核细胞增生活跃
 - B. 粒红比值 2~4:1
 - C. 可见少量网状细胞和肥大细胞
 - D. 原始淋巴细胞占 10%
 - E. 原粒细胞<2%,早幼粒细胞<5%
10. 以下哪种情况最具有洋地黄治疗指征
 - A. 缩窄性心包炎伴肝大,腹水
 - B. 甲亢伴心动过速
 - C. 急性风湿热伴心动过速
 - D. 房颤伴心室率快及心力衰竭
 - E. 肺心病伴心力衰竭
11. 血清促胃液素减少常见于下列哪种疾病
 - A. 卓-艾综合征
 - B. 慢性浅表性胃炎
 - C. 胃溃疡
 - D. 慢性萎缩性胃炎
 - E. 十二指肠壶腹溃疡
12. 下列哪种药物能迅速杀灭 A 群结核菌
 - A. 异烟肼
 - B. 乙胺丁醇
 - C. 卡那霉素
 - D. 对氨基水杨酸钠
 - E. 丙硫异烟胺
13. 诊断系统性红斑狼疮(SLE)敏感性高、特异性较低,作为 SLE 筛选试验的抗体是
 - A. ANA
 - B. 抗 dsDNA 抗体

- C. 抗 Sm 抗体
D. 抗 SSA 抗体
E. 抗 U1RNP 抗体
14. 强直性脊柱炎早期的特征性放射学改变是
A. 骶髂关节炎
B. 韧带骨赘
C. 竹节样脊柱
D. 椎体压缩性骨折
E. 外周关节骨性强直
15. 出现乳酸升高的疾病为
A. 重症肌无力
B. 周期性瘫痪
C. 线粒体肌病
D. 周围神经病
E. 多发性肌炎
16. 脑血栓形成患者出现运动性失语是病变损害了
A. 优势半球额中回后部
B. 优势半球中央前回下部
C. 优势半球角回
D. 优势半球额下回后部
E. 额上回后部
17. 胃溃疡的好发部位是
A. 胃窦部大弯侧
B. 胃窦部小弯侧
C. 胃体部大弯侧
D. 胃体部小弯侧
E. 贲门食管联合部
18. 碘解磷定治疗有机磷中毒的机制是
A. 使胆碱酯酶恢复活性,迅速消除或减轻烟碱样症状
B. 解除有机磷中毒的毒蕈碱样症状
C. 与有机磷结合排出体外
D. 使有机磷氧化还原成无毒物质
E. 以上都不是
19. 治疗肾病综合征,最能体现激素治疗有效的指标是
A. 尿量增加
B. 血白蛋白上升
C. 食欲增加
D. 体重下降
E. 尿蛋白减少或消失
20. 关于乙肝病毒相关性肾炎,下列说法不正确的是
A. 应用干扰素抗病毒治疗
B. 首选糖皮质激素联合细胞毒药物治疗
C. 针对蛋白尿,可用 ACEI 治疗
D. 其预后与病理类型相关
E. 病理类型为膜性肾病的病人预后较好
21. 甲型病毒性肝炎病程中传染性最强的是
A. 潜伏期
B. 黄疸前期
C. 黄疸期
D. 恢复期
E. 慢性期
22. 最易发生幽门梗阻的溃疡是
A. 胃窦部溃疡
B. 十二指肠壶腹溃疡
C. 幽门管溃疡
D. 壶腹后溃疡
E. 复合性溃疡
23. 肠结核的好发部位是
A. 回肠
B. 升结肠
C. 回盲部
D. 横结肠
E. 直肠、乙状结肠
24. 下列哪项不是慢性胰腺炎的临床表现
A. 消瘦
B. 脂肪泻
C. Grey-Turner 征
D. 胰腺假性囊肿
E. 黄疸
25. 根据下列哪项检查结果,基本上可排除伤寒的诊断
A. 肥达反应阴性
B. 血培养阴性
C. 嗜酸性粒细胞绝对计数 $>100 \times 10^6/L$
D. 白细胞总数 $>8 \times 10^9/L$
E. 骨髓培养阴性
26. Sheehan 综合征最早出现的症状是
A. 产后无乳或少乳
B. 水肿
C. 畏寒
D. 记忆力减退
E. 毛发脱落
27. 关于甲亢性心脏病,下列不恰当的是
A. 以年龄大者多见
B. 甲状腺摄 ^{131}I 率不能确诊时,需要做 T_3 抑制试验
C. 心律失常多表现为心房纤颤及期前收缩

- D. 甲亢控制后,心脏病可完全治愈
E. 心尖部可闻及舒张期杂音
28. 库欣病最有诊断意义的发现是
A. X线检查蝶鞍增大
B. 大剂量地塞米松抑制试验不能抑制
C. 小剂量地塞米松抑制试验不能抑制
D. 用美替拉酮(甲吡酮)不能增加 ACTH 产生
E. 血皮质醇增高
29. 下列除哪项外都是骨髓稀释的标志
A. 骨髓有核细胞增生低下或极度低下
B. 未见骨髓小粒和脂肪滴
C. 杆状核细胞的比例小于分叶核细胞
D. 镜下见到浆细胞、组织细胞等
E. 涂片中以成熟粒细胞和淋巴细胞为主
30. 你正在为一位在床上被发现意识丧失者进行心肺复苏,按压和通气比率应为多少
A. 30 次胸外按压,2 次通气
B. 5 次胸外按压,1 次通气
C. 15 次胸外按压,2 次通气
D. 15 次胸外按压,5 次通气
E. 5 次胸外按压,2 次通气
31. 心脏压塞时不出现
A. 心音低钝
B. 声音嘶哑
C. 奇脉
D. 肝颈静脉反流征阳性
E. 双肺满布干湿性啰音
32. 关于肺结核处于稳定期的描述下列哪项是不正确的
A. 病变无活动性
B. 空洞关闭
C. 痰菌连续阴性达 3 个月以上
D. 有空洞者痰菌阴性连续 1 年以上
E. 痰菌连续阴性达 6 个月以上
33. 高温或严寒刺激后常可引起中性粒细胞暂时增加,其机制是
A. 神经兴奋
B. 体内白细胞重新分布
C. 骨髓刺激
D. 血管收缩
E. 激素分泌所致
34. 以下哪项不属于自身抗体
A. 类风湿因子
B. C 反应蛋白
C. 抗核抗体
D. 抗中性粒细胞抗体
E. 抗磷脂抗体
35. 以下哪项临床表现在风湿性疾病中不常见
A. 关节肿胀
B. 关节压痛
C. 手掌指关节桡侧偏斜
D. 晨僵
E. 膝关节强直
36. 肺结核并发症中,下列哪项较常见
A. 支气管扩张
B. 脓胸
C. 气胸
D. 肺外播散
E. 肺气肿
37. 关于卡介苗接种,下列哪项描述是不正确的
A. 卡介苗是一种无毒牛型结核菌活菌疫苗
B. 结素试验阳性者需卡介苗接种
C. 卡介苗接种并不能预防感染
D. 卡介苗接种显著降低儿童结核病
E. 新生儿接种卡介苗,其保护力可维持 5~10 年
38. 糖尿病肾病的病理类型中最常见的是
A. 弥漫性肾小球硬化型
B. 结节性肾小球硬化型
C. 渗出型病变
D. 弥漫增殖型
E. 系膜毛细血管型
39. 脑栓塞栓子主要来源于
A. 心脏
B. 肺静脉
C. 下肢静脉
D. 败血症
E. 脂肪
40. 惊厥性全身性癫痫持续状态必须从速控制发作,并保持不再复发的时间至少为
A. 6h
B. 12h
C. 24h
D. 48h
E. 72h
41. 乙型肝炎患者血清中检出抗-HBs 说明
A. 免疫耐受,病情迁延不愈
B. 获得免疫,疾病已经恢复
C. 肝炎病毒在体内复制
D. 病毒变异,仅查出抗-HBs