

武進謝觀編纂

中國醫學大辭典

冊二

商務印書館

七 畫

【串皮漏】潰瘍之久漏膿水不收口者。治詳潰瘍條。

【串珠茶】山茶花之開粉紅色者。功用詳山茶條。

【串疽】此證由積憤鬱火而成。生於背脊之間。初發一處。其後挨次發出二三處。形雖不同。而色仍同。潰後多相串通。初發漫腫無頭。皮色如常。漸腫漸透。紅色多疼。牽引旁處舉痛。初服仙方活命飲。宜解鬱毒。其餘內外治法。俱與癰疽腫瘍潰瘍同。

【串雅】有內外兩編。見弗字條。

【串瘡】鼠癩之別稱。

【串臀痔】痔之串臀而生者。詳痔條。

【伯高】黃帝臣。見〔靈樞壽夭剛柔篇〕。佐帝討論脈經。窮究義理。

【伯勞】林禽類。形體大於雀。頭圓。嘴短而大。上嘴鈎曲。端尖。側緣有齒狀缺刻。尾長。爪強大而銳。羽毛概茶褐色。雄者翼有白點。雌者下腹部有斑紋。體長六七寸。性皆猛。捕食昆蟲小鳥等。好以其物貫於棘枝。

之上。而徐食之。其「毛」及「踏枝」均可療疾。各詳本條。

【伯勞毛】性質平有毒。功

圍治小兒繼病。（取毛

佩之）


【伯勞踏枝】伯勞鳥所踏

之樹枝也。功圍治小兒語遲。（鞭之即速語）羅論伯勞當萬物不能鳴時而獨能鳴之。以此物令小兒速語。蓋以類相求之意。

【伯萍】貫衆之訛。

【仲宦】欠伸之意。即疲勞也。（素問移精變氣論）外無仲宦之形。

【伽楠香】沈香之一種。形體產於熱帶地方。及廣東瓊州諸山。香木性溫。枝幹竅露。為大蟻所穴。蟻食石蜜遺漬其中。歲久漸浸。木受石蜜氣凝結。堅潤而成。迨香成。則木漸壞。其旁草木咸枯。榕樹之至千年者。亦生之。黃熟則櫻透。黃質遽理。遠勝生香。薰灸經旬香



勞 伯

氣不滅。其種類有生結、熟結、蜜結、糖結、油結、氣結、綠結、鐵結、蘭花結、金絲結、虎斑金絲結、鶯歌綠、洋伽、備土伽、備蟲漏、脫落之分（今海南人見有蟻封高二三尺處，謂其下必有異香，挖之可得。）各詳本條。**陞** 辛香無毒。功用下氣、辟惡、通竅、醒神、返魂、駐魄、固脾、保腎、閉精、固氣、卻邪風、縮二便（佩之可以忍溺。為末作膏貼會陰穴，則溺不出。）治風痰閉塞、精鬼盡着。**籬** 此物與沈香同類，而有牡牝陰陽之別。沈香為牝為陰，故味苦厚，性通利，而臭味潛藏，燃之而其氣轉勝，陰體而陽用，善藏精而起亟，此則為牡為陽，故味辛辣，性禁斂，而氣味顯發，能閉二便，陽體而陰用，善衛外而為固，為通竅醒神閉精固氣之品，故返魂丹及房術多用之。尤具以魂駐魄之能，凡氣脫必陷之證，最為有效。以色紅質堅，鋸之細屑成團，香中帶辛辣者良，香氣溫細，甚為益人（其他諸香賦性多屬燥烈，薰燒日久，則能令人髮白血枯。）藏之須以錫匣貯蜜，蘇合鑿竅為隔，則能滋潤，以本香末養之，則香氣不致耗散（以他種香末養之，則不香）

若枯時，用白蓴葉直之，瘞土數月，即復。日中少曝，尤香。舶來者佳。其產於粵中者，與女兒香相似，色淡黃嫩，而無滋膩，質粗鬆，氣味亦薄，久藏不香。入藥功力甚微。又有以雞刺木、雞骨香、速香、雲頭香等種，澤以伽備香之液，屑偽充，不可不辨。

【住火丹】丹毒之起於背上，色黃赤者，宜用壁上土，豬槽下土，白礬末，入生薑汁、生油調塗。參看丹毒條。

【住痛解毒丸】證治準繩方。藥品川芎、荳蔻、朴硝、白芷、石膏、菊花，各一兩，礪砂五兩，沒藥五錢，麝香少許。團法共研細末，米糊為丸，如梧桐子大。用法每服三五丸，溫湯送下。

【佐】方劑中之監制藥。如寒病治以熱藥，而恐熱藥過甚之為害也，則少用寒涼藥以監制之。如桂枝湯中之芍藥是。

【佐金丸】即左金丸。

【佐脾丸】沈氏尊生書方。功用治食積。藥品山查肉、三兩、萊菔子、連翹、陳皮各五錢，赤茯苓、半夏各二錢。團法共研細末，粥飲為丸，如梧桐子大。用法每服三五

十九。熟湯送下。

【何氏濟生方】**疔**用治牙疳。藥品白礪砂五錢。蒲黃青黛黃蘗。人中白（煨）馬屁勃兒茶各一錢。白殭蠶五分。甘草節八分。麝香冰片各少許。用法合研如塵。凡走馬牙疳齒落喉爛臭不可近者。水漱淨。吹數次即愈。

【何世仁】字元長。青浦人。以醫名。尤善望聞之術。所治病應手輒效。負盛名三十餘年。

【何其偉】字書田。青浦人。家世能醫。初爲諸生。專於學。工古今體詩。未嘗爲醫。父卒。念世業不可無繼。稍稍爲之名。大噪。有徐姓者。昏熱發狂。力能踰牆屋。何曰。是邪食交結也。則其人果以酷暑食水澆飯。旋就柳陰下臥也。以大黃枳實下之而愈。金澤鎮某生。逾冠未婚。得狂疾。用牛黃清心加味法。而屬其家人於煮藥時覆女子褰衣於其上。兩劑而愈。門人疑之。何曰。是陰陽易法。吾用之偶驗耳。嘗作醫論詩云。治病與作文。其道本一貫。病者文之題。切脈腠理現。見到無游移。方成貴果斷。某經用某藥。一味不可亂。心靈則

手敏。法熟用益便。隨證有新獲。豈爲證所難。不見古文家。萬篇局萬變。可見其生平所得力矣。著有醫學妙諦若干卷。

【何若愚】元時人。著有流注指微賦一卷。

【何首烏】蔓草類。形態多年生草。有赤白二種。夜則藤交。（有陰陽交合之象）葉爲心臟形。頂尖端銳。秋日有花莖出自葉腋。開多數小白花成穗。根作大塊相連接。與「莖」葉皆可療疾。各詳本條。

【何首烏丸】證治準繩方。功用治肺風鼻赤面赤。藥畧何首烏一兩五錢。防風黑豆（去皮）荆芥地骨皮（洗）各一兩。桑白皮天仙藤苦參赤土各五錢。（一方有萹本一兩）製法研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。用法每服三四十丸。食後茶清送下。傷醫大千方。功用治膿窠瘡。藥品何首烏四兩。荆芥威靈仙防風蔓荊子（炒）車前子（炒）甘草（炙）各二兩。製法研細。水法壘丸。如梧桐子大。用法每服一錢五分。早晚淡酒送下。即祛風丸之第三方。

【何首烏根】性質苦澆微溫無毒。功用補肝腎和氣血。

避風。

【何首烏莖】功用療風瘡癬疥作癢。(煎湯浴)

【何首烏散】●衛生寶鑑方①功用治癩風癩風疥癬

諸皮膚病。藥品何首烏、蔓荊子、石菖蒲、荊芥穗、甘菊

花、枸杞子、苦參(去蘆)、威靈仙各五錢。用法研為細

末。每服三五錢。食後溫酒或茶清蜜湯調下。每日二

次。②功用治脾肺風毒攻腫。延成癬瘡。甚至肩背拘

急。手足痠裂。肌肉頑痺。及紫癩。白癩。頑麻等風。藥品

何首烏、荊芥穗、蔓荊子、威靈仙、甘草(炙)防風、蚬蚶

草各等分。用法搗羅為末。每服一錢。食後溫酒或沸

湯調下。●證治準繩方③功用治癩風癩疾。藥品何

首烏二斤(白米泔浸一七日。夏月逐日換水。用竹

刀刮令碎。九蒸九曬。胡麻子四兩。九蒸九曬。用法

研為細末。每服二錢。食前溫酒或薄荷湯調下。④用

順氣疎風。活血定痛。治打折筋骨。初時便宜服此

藥。藥品何首烏、當歸、赤芍藥、白芷、烏藥、枳殼、防風、甘

草、川芎、陳皮、香附、紫蘇、羌活、獨活、肉桂。用法加薄荷

生地黃。清水煎。入酒和服。疼痛甚者。加乳香沒藥。⑤

瀉精氣。化虛痰。養血。祛風。烏髭髮。悅顏色。治惡瘡。自

汗(為末。津調封臍中)。肝風。心痛。腹中宿疾。冷氣。腸

風。久痢。婦女帶下。產後諸疾。消癰腫。療頭面風瘡。療

癰。五痔。破傷出血。久服長筋骨。益精髓。延年不老。令

人有子。伏磁砂。雜論此物稟春深之氣而生。性升。屬

陽。入肝腎二經。為益血祛風之品。白者入氣分。赤者

入血分。性質中和。補陰不滯不寒。強陽不燥不熱。功

在天。冬諸藥之上。以產於南方如拳大五瓣者良。

生三百年者。大如栲栳。其力尤足。服之可成地仙。製

法。赤白各半。竹刀刮去皮。米泔浸一日。切作薄片。拌

以黑豆。柳飯砂鍋九蒸九曬。用茯苓為使。忌諸血。無

鱗魚。菜菔。葱蒜。鐵器。并忌與附桂等燥藥同用。

【何首烏酒】醫宗金鑑方。功用治大風。藥品何首烏

四兩。當歸身。當歸尾。穿山甲(炙)生地黃。熟地黃。蝦

蟆。各一兩。側柏葉。松鍼。五加皮。川烏(湯泡去皮)草

烏(湯泡去皮)各四錢。製法將藥入夏布袋內。紮口

用黃酒二十斤。同藥袋入罈內。封固。重湯煮三炷香

埋甕七日。用法開罈口。取酒。時飲之。令醺醺然。作汗

【功用治婦人血風。膚癢心煩。及血風遊走不定。藥品何首烏。防風。白蒺藜。枳殼。天麻。蠶僵。胡麻。羌蔚子。蔓

荊子。各等分。用法研爲細末。每服二錢。不拘時。茵陳

煎湯調下。①功用治婦人血風。骨節疼痛。或手足麻

痹。腰膝沉重。藥品何首烏。羌活。去蘆。當歸。炒去

蘆。赤箭。附子。炮去皮臍。桂心。赤芍藥。芍藥。羚羊

角屑。各七錢五分。威靈仙。牛膝。酒浸。各一兩。防風。

去蘆。五錢。用法研爲細末。每服二錢。不拘時。豆淋

酒調下。張氏醫通方。功用治瘡積滯去後。寒熱不

止。至夜尤甚。藥品生何首烏。五錢。碎。青皮。陳皮。甘

草。炙。各一錢。生薑。七片。大棗。三枚。辟。用法清水

煎。露一宿。侵晨熱服。多汗而渴。加知母。烏梅。虛人腹

痛。加人參。厚朴。木香。榮衛返魂湯之別名。一方

無木通。

【何首烏湯】瘍醫大千方。功用治溼熱風毒。遍身膿窠。

黃水淋漓。肌肉破爛。藥品何首烏。防風。金銀花。荊芥。

蒼朮。白蘚皮。甘草。苦參。連翹。木通。用法加燈芯。清水

煎服。或爲細末。水壘丸。每服三錢。淡酒送下。溲泄加

澤瀉。夏熱加梔子。黃芩。癢加白蒺藜。脾胃弱去苦參。加赤茯苓。

【何首烏葉】功用與莖同。

【何首烏蜜】蜂採何首烏之精英所釀成而色赤者。性質功用較尋常蜂蜜爲良。

【何國棟】字桂巖。號蓼齋。清吳人。著述見吳醫彙講。

【何順中】元崑山人。自曾祖子雲以下。世業醫。至順中

益著。居太醫院四十年。王公大人有招延之者。視義

不視物。必專敬乃往。往則疾家有所恃。或以勢位臨

之。弗能致也。

【何號周天散】幼科痘疹金鏡錄方。功用治痘瘡黑陷。

項強。目直視。腹脹。喘急。發搐。藥品蟾蜍。五錢。淨。地

龍。一兩。去土。用法研爲末。量兒大小。煎乳香湯調

下。三四服瘡起乃效。

【何夢瑤】字報之。號西池。清南海人。進士。歷宰義寧陽

湖。岑溪。思恩。遷牧遼陽。其在思恩。癘疫流行。廣施方

藥。飲者輒起。制府下其方於郡邑。存活甚衆。著有醫

編。

【何瑋】字粹夫。號柏齋。明武陟縣人。弘治時進士。翰林院修撰。官至南京右都御史。服膺陸九淵楊簡許衡薛瑄之學。剛直不阿。劉瑾內行敦篤。精岐黃術。卒諡文定。著有醫學管見一卷。

【何澄】宋人。宣和間有一士人抱病纏年。百治不瘥。延澄視之。其妻引入密室告之曰。妾以良人抱病日久。典賣殆盡。無以供醫藥。願以身酬。澄正色曰。娘子何爲出此言。但放心。當爲調治。取效。切毋以此相污。不有人誅。必有鬼神譴責。未幾。士人病愈。何澄一夕夢入神祠。判官語之曰。汝醫藥有功。不於艱急之際。以色欲爲貪。上帝令賜錢五萬貫。官一員。未幾。月東宮疾。國醫不能治。詔召草澤醫。澄應詔。進劑而愈。朝廷賜官賜錢。一如其夢。

【何燿】字仁源。明丹徒人。以醫名。遇人病雖貧且賤者。務盡心診視。不屑屑計財利。何氏自宋防禦使。曰公務者。謝官隱鎮江市藥。其子柱復謝官隱鎮江市藥。水有孫曰淵。字彥澄。詔徵入京師。膺殊眷。燿其六世孫也。紹述家學。著傷寒全生集行世。年將八十。無疾

卒。

【佗】(音必)滿足之意。(靈樞小鍼解篇)言補者。佗然若有得也。

【佗佗】安重貌。(靈樞陰陽二十五人篇)足厥陰佗佗然。

【余士冕】字子敬。元歙縣人。幼白子。得其家學。而造詣尤精。治法奇妙。立起沈疴。著有諸證析疑。子之儻。世其業。

【余幼白】元歙縣人。精岐黃術。著有蒼生司命。子士冕。世其業。

【余紹寧】字義周。明南城人。幼讀書。二十學醫術。遍訪明師。得異授。精通唐宋朱劉各家。及素問鍼經諸書。能預決人生死。往往奇中。其用藥不循舊方。但對證用藥。無不奏效。性慈愛。尤肯賑恤貧民。常製萬病無憂丸。施布。賴全活者甚衆。著醫書二十卷。名元宗司命。

【余霖】字師愚。清常州人。客中州時。父染疫爲羣醫所誤。及奔喪歸。視諸方。皆不外治傷寒之法。思此證必

有以活人者。公之於世。稍釋隱憾。因讀本草言石膏性寒。大胃胃熱。味淡而薄。能表肌熱。體沈而降。能泄實熱。恍然大悟。非此不足以治熱疫。遇有其證。投之無不獲效。歷三十年。活人不少。遂著疫證一得二卷。於乾隆五十九年。自序刊行。

【余懋】字嘯松。清新安人居於嘉興。父恕堂。精醫。懋亦傳其學。著有推拿述略。牛痘要法。方解別錄。萬選良方。

【佛手三七】卽人參三七之產於廣西田州土司境者。儼似佛手。上有指節形。野生者尤良。或謂卽銅皮鐵骨也。詳銅皮鐵骨條。

【佛手山漆】卽佛手三七。

【佛手柑】千頭柏之別名。

【佛手柑】枸櫞之一種。產於閩廣。幹高丈餘。葉橢圓。鋸齒甚細。葉腋有刺。春開白花。五瓣。夏末實熟。皮黃如柚形。長上端分岐十餘。如手指。清香襲人。蜜漬可食。性質功用與枸櫞同。（一說謂此物專破滯氣。非若枸櫞之兼破痰水。）並可製露。

【佛手草】●雜草類。形態生浙江杭縣秦亭山聖帝殿

廚房後石臺基上。狀如百合。功用治諸種惡瘡。（煎湯洗）●射干之別名。

【佛手參】藏三七之別名。

【佛手散】徐文仲方。功用治室女心腹滿痛。經脈不調。婦人胎前產後諸疾。胎動下血。橫生倒產。子死腹中。產後崩中。血暈。金瘡。亡血昏冒。藥品川芎二兩。當歸（去蘆酒拌）三兩。用法研爲末。每服二錢。清水一杯。黃酒二分。煎至七分。溫服。口噤灌之。或炒研爲末。紅酒調下。①未產前宜先安排此藥。產後速服。藉滌惡露。三日內每日二服。三日外一服。②臨月服之。則縮胎易生。有胎服之。卽動。但不可經火炒爲效。③虛煩不得眠。加人參。竹葉同煎。④血風上喘。下腫。空腹痛。艾葉煎湯調下。⑤水停心下。加茯苓。生薑。⑥虛損腹痛。少氣。頭眩。自汗。加羊肉一兩。生薑十片。⑦腹中刺痛。或發寒熱。並加白芍藥。⑧漏血腹痛。加芍藥。官桂。⑨白帶加芍藥。乾薑。米飲調下。⑩崩中漏下。失血不止。加香附（炒）每一兩入甘草一錢。沸湯煎服。⑪臟

毒每服一錢五分。加塊花（炒研爲末）五分。清水一杯。煎至六分。不拘時服。三日取下血塊。卽愈。吐血亦效。⑤胎氣不安。及產後諸疾。酒煎服。⑥胎傷下血腹痛。加阿膠。艾葉。川續斷。白朮。杜仲。條芩。⑦子死腹中。或胎動。酒水煎服卽安。⑧橫生倒產及死胎。每服四錢。加黑馬料豆一合。炒焦。乘熱淬入水中。加童便一半。煎藥服。少頃再服一劑。神效。⑨難產加百草霜。白芷。各等分。童便好醋。各一盞。沸湯浸服。甚者再服。⑩產後眩暈。加芍藥。⑪產後頭痛及吐血。加荆芥。食後空腹水煎服。或荆芥煎湯調下。日二次。⑫產後口乾煩渴。加烏梅。麥門冬。⑬產後瘀血上沖。入肺而嗽。加桃仁。紅花。杏仁。川貝母。延胡索。⑭產後腹痛不可忍。加官桂。（酒并童便浸）⑮產後惡血注心。迷悶喘急。腹痛。加黑豆一合。生薑自然汁。五勺。煎服。羅讞當歸。川芎。爲血分主藥。性溫而味甘辛。以溫能和血。甘能補血。辛能散血也。必以當歸君。川芎。或一倍或再倍者。蓋以川芎辛竄。捷於升散。過則傷氣。不可單服。久服。然施之於氣鬱血凝。則無不奏效。故用以佐當歸。

而收血病之功。使瘀去新生。血各有所歸也。血既有所歸。則血安其部。而諸血病愈矣。至妊娠胎動胎傷下血。非血壅胎傷。卽血亂妄下。服此以探之。血亂胎未動者。血順則痛止。血壅胎未損者。血行痛止。則胎因之而安也。已動已損者。血得順行。則胎亦因之而順下也。橫生倒生。因用力太早。或誤服催生之藥。致氣逆血亂。亦用此以調之。產後崩中。金瘡亡血昏冒。亦用此以補之。子死腹中。腹痛欲死。亦用此以逐之。以上諸病。皆血病而氣不虛者也。若夫氣虛難產。產後血脫。唇面黃白。少氣煩亂。動則昏冒。若誤與此。反致立敗。則必倍加人參。速固無形之氣。以救有形之血也。至於交骨難開。加龜版梳髮。下輸陰道。寒加薑桂。熱加黃耆。汗加桂枝。痞加荊穗。則以意消息。加減可也。方名不稱歸芎。而曰佛手者。謂其治胎前產後諸疾。如佛手之神妙也。

【佛手蕉】芭蕉之常年開花。實小味甜者。功用與尋常芭蕉同。

【佛手露】性質香淡無毒。功用悅脾。舒肝。寬胸。解鬱。疎

氣開胃。進食。治氣膈。煩熱。骨蒸。羅論此物爲消痞之要藥。亦平肝之良品。

【佛甲草】石草類。形鱗。多年附石生草。可植於瓦牆假山上。莖高四五寸而脆。葉尖長而小。柔澤如馬齒莧。

夏開黃花。經霜則枯。性

質甘寒無毒。功用治湯

火灼傷。又有一種鐵

指甲。常生於牆腳石隙

間。或沿松樹而生。葉似

指甲。煨末可擦牙疼。入皮硝同搗。可罨諸癰毒。火丹

頭面腫脹。未知與此草是否一物。

【佛耳草】金錢草之別名。鼠麴草之別名。

【佛見笑】十姊妹之別名。

【佛前供花】佛前供養之花也。功用治臙瘡。爛腿。均

用香油浸貼。羅論此物以多年陳舊者良。

【佛指甲】佛甲草與鐵指甲之別名。

【佛指香櫞】佛手柑之別名。

【佛家丹】丹毒之起於耳上者。宜用乳香。善火草。瓦雷



佛甲草

內土。各少許。油調敷。參看丹毒條。

【佛座鬚】蓮鬚之別名。

【佛桑】扶桑之別種。開花丹色。中心層出如樓。較他花多一層花瓣者。性質功用與扶桑同。

【佛退】蠶蛻之別名。

【佛袈裟】胞衣之別名。

【佛頂珠痘】痘之天庭間稀少。而形色潤美者。爲最吉之痘。

【佛頂疽】此證因臟腑不調。熱毒上壅所致。生於頭頂顛門之前。屬督脈經上星穴。色紫堅硬腫痛。脈洪大而數者爲實。脈微細而數者爲虛。潰爛黑陷。六脈散大神昏譫語。二便閉結者爲逆。若腳根穿過腦者不治。治法與百會疽同。參看百會疽及癰疽條。按小兒積壅暑熱。頭上生癰。紅腫如桃李。膿血相雜。往往類此。不可誤作佛頂疽治。

【佛掌】雜草類。形似櫻桃。根可療疾。詳本條。

【佛掌根】功用治疔瘡。同生薑蜜研汁服。外以天茄葉貼之。

【佛頭青】扁青之一種。功用與扁青同。

【佛頭疽】即佛頂疽。

【作名】自以為名醫也。〔素問徵四失論〕妄言作名為

粗所窮。

【作強之官】強於作用之機能也。〔素問靈蘭秘典論〕

腎者作強之官。伎巧出焉。

【兌】銳同尖也。〔難經十五難〕上下兌。

【兌金丸】功用治小兒五疳。藥品大黃（錦紋者）膽星。

（陳久者）胡黃連。川連。白牽牛。黑牽牛。石膏（煨）雄

黃。滑石（飛）製法共研細末。水泛丸。如蘿蔔子大。五

色為衣。用法每歲一丸。按歲加增。熟湯送下。病愈即

止。不可多服。忌食魚腥油膩生冷麪豆等物。

【兌疽】此證由憂思氣滯風火結成。生於手腕裏面橫

紋前稍動脈之間。兌骨裏側。屬肺經太淵穴。堅硬漫

腫。疼痛徹骨。手膊不能轉動。此動脈處乃肺經門戶。

若發此疽。或潰深大洩肺氣。最為險候。內外治法。俱

與癰疽腫瘍潰瘍同。

【兌草】雜草類。形似冬日附木而生。葉黃有毛。性質酸

平無毒。功用益氣。輕身延年。

【兌骨穴】〔難經六十六難〕少陰之原。出於兌骨。按此

穴為手少陰經之源。在掌後兌骨之端。陷者中心臟

病治之。用長鍼口中溫煖。刺入三分。留三呼。進一分。

留一呼。徐徐出鍼。以手捫其穴。可復蘇也。

【兌端穴】屬督脈經。在脣上端。主癩疾。吐沫。小便黃。消

渴。衄血。脣吻強。齒齲痛。鼻塞。痰涎。口噤。鼓頷。銅人鍼

二分。灸三壯。炷大如麥。

【治葛】鈎吻之別名。

【冷】體內有寒也。為審病八要之一。如外感之寒。則以

辛熱辛溫散之。內虛之寒。則以甘溫益之。辛熱辛溫

佐之。

【冷水金丹】瘍醫大全方。功用治傷寒發汗。痰痞老痰。

翻胃噎食。療腫毒惡瘡。藥品海浮石。飛羅麪。各三兩。

乳香（去油）沒藥（去油）牛蒡子各一兩。冰片麝香

各一錢。製法用蟾酥三錢七分五釐。酒浸化為丸。如

綠豆大。辰砂（飛過）五錢。為衣。用法輕者每服一丸。

重者三丸。牙痛只用一丸。均冷水送下。忌食雞魚小

米一日戒煩惱勞心之事。

【冷石】即滑石。

【冷汗】所出之汗寒冷如水也。宜各隨證施治。詳汗條。

【冷呃】此證因啓口時。陽氣適當上升。而爲寒氣所襲。

致陽不得越而發呃。宜令其追思往事。思則脾火氣

乘。胃氣和而呃自止。參看呃逆條。

【冷疔】此證由寒溼凝結而成。生於足跟。形如棗栗。紫

白起泡。疼痛徹骨。漸生黑氣。腐爛孔深。時流血水。氣

穢不斂。宜用神燈照法照之。鐵粉散敷之。兼服補劑。

如不愈。用白油膏卽效。初起時用鴿糞煎湯。置盆內。

上用篾籃罩之。四周以舊衣圍住。僅留少許透氣。置

足於上熏之。冷則再易。至不痛爲度。上覆消疔膏。參

看疔瘡條。

【冷泄】卽寒泄。素問至真要大論。冷泄腹脹。

【冷流注】流注之附骨而生。致骨寒而痛。筋縮不能伸

屈者。若誤用刀鍼。則流出瘀黑血。或如屋漏汁。宜用

回陽玉龍膏。稍緩再加生薑肉桂白芷草烏等分熱

酒調敷。並加石菖蒲少許。參看流注條。

【冷風】此證由腎脾俱虛。風溼之邪侵入肢節。盈溢肌

肉。初起麻木不仁。或時冷痛。或肢節酸疼。遇冬則伏

牀不起。宜奇效丹。正陽丹。還真丹。乳香搜風丸之屬。

若不急治。久則氣血不行。發泡穿爛而死。

【冷香飲子】張氏醫通方。所用治中暑夾陰。腹痛瀉利。

藥品生附子。草果。橘紅。甘草（炙）各一錢。生薑五片。

用法清水煎。冷服。

【冷哮】遇冷而哮不止者。治法如下。①宜溫肺湯。補中

益氣湯加茱萸。鍾乳丸。冷哮丸。紫金丸之屬。並以三

建膏護肺。愈穴最妙。②三伏中用白芥子（淨末）一

兩。延胡索一兩。甘遂。細辛各五錢。共爲細末。入麝香。

五分。杵勻。薑汁調塗肺俞膏肓等穴。塗後麻瞀疼痛。

切勿便去。約三炷香時再去。十日後復塗一次。三次

卽愈。此較灸肺俞膏肓天突等穴尤妙。③冷哮痰喘。

用胡椒四十九粒。入活蝦蟆腹中。鹽泥煨存性。臥時

分三次醇酒服。羸者諒分五七服。參看喘條。

【冷哮丸】①全生集方。功用治痰飲經寒卽發。哮喘氣

急。不能平臥。藥品江西白豆豉一兩。白礞一錢。製法

研爲末。飯三錢。研爛。入末爲丸。如萊菔子大。用法每服三四丸。或二三丸。冷茶送下。童子服可除根。張氏醫通方。功用治背受寒氣。卽發喘嗽頑痰結聚。胸膈痞滿。倚息不得臥。藥品麻黃（泡）生川烏。細辛。蜀椒。生白礬。牙皂（去皮弦子。酥炙）半夏。麴。陳膽星。杏仁（去雙仁者。連皮尖用）生甘草。各一兩。紫菀。茸。款冬花。各二兩。製法研爲細末。薑汁調神麴末打糊爲丸。如梧桐子大。用法每遇發時。臨臥時生薑湯服二錢。羸者一錢。更以三建膏貼肺俞穴中。服後時吐頑痰。胸膈自寬。服此數日後。以補脾肺藥調之。俟復發再服。雜論此少變麻黃附子細辛湯之法。而合稀涎散以涌泄其痰。爲開發肺氣之剛劑。但氣虛少食。及痰中見血。營氣受傷者忌之。以其專司疎泄。而無溫養之功也。觀用法之瀉補互施。使得擒縱緩急之妙。

【冷延泛】治詳痰積嘔吐條。

【冷疰】十疰之一。傳尸勞之屬也。

【冷疰】疰之日久不愈者。多見目腫腹脹。便利不止。瀉糞肥膩。或似油珠。煩渴黃瘦。病多在內。宜木香丸參

看疰條。

【冷疽】筋疽之流膿不止者。

【冷淋】此證由於下虛寒襲。氣化不行。致尿水充積膀胱。不能排泄。先發寒慄。而後淋瀝溺數。尿色清白。溺竅腫痛。宜金匱腎氣丸加鹿茸。沈香。餘如肉蓯蓉丸。澤瀉散之屬。均可酌用。或用牛膝五錢煎湯。加麝香少許。下附子八味丸。若因煩渴飲水過多。水積胞中不行。致小便閉澀。竅中苦痛。憎寒凜凜者。宜生附子散。不應。用栝樓瞿麥湯。參看淋條。

【冷淚】眼中無故流淚也。宜用夏枯草。香附子。各等分。研爲細末。麥門冬湯調下。或用胞棗一枚（去核）以花椒二十粒。入內。用溼紙裹煨熟。細嚼。白湯送下。

【冷勞】婦人虛勞之屬於冷者。此證因氣血不足。臟腑虛寒。以致臍下冷痛。手足時寒。經水失常。飲食不化。時或嘔吐。惡寒發熱。骨節痠痛。肌膚羸瘦等證。宜用附子理中湯以回陽。八味地黃丸以壯火。餘如大聖散。渾身碎痛飲十全大補湯。當歸木香湯。熟乾地黃丸。木香丸。煮肝散。硃砂煎丸。肘後癩肝散之屬。均可

酌用。參看婦人虛勞條。

【冷痛】九種心痛之一。

【冷痢】即寒痢。

【冷痰】即寒痰。

【冷痺】即寒痺。

【冷飲】思飲冷物也。〔素問逆調論〕陽盛則外熱。陰虛則內熱。內外皆熱。則喘而渴。故欲冷飲也。

【冷飲傷】詳傷冷飲條。

【冷飯團】土茯苓之別名。

【冷嗽】詳形寒飲冷嗽條。

【冷熱疖】疖之冷熱交互者。宜如聖九。參看疖條。

【冷熱嗽】此證因增減衣裳。寒熱俱感。致乍寒乍熱。亦嗽。飲熱飲冷亦嗽。治法如下。●宜金沸草散。消風散。

各一帖。和煎。或應夢人參散。款冬花散。去麻黃。加薄荷。或二母散。另用辰砂化痰丸。八風丹。含化。●脈浮

風重者。用金沸草散。●脈數或瀉由熱重者。宜萎蕤湯去川芎。加香豉。三錢。參看欬嗽條。

【冷瘡】此證由觸受風寒冷氣。以致血澀不行。生瘡頑

滯。不知痛癢。經久不愈。宜用花椒。附子。雄黃。枯礬之屬。研細。油調敷。

【冷瘡】丹毒之白色者。初起白斑。無熱無痛。遊走不定。是由火毒內蘊未發。而肌膚復受寒鬱所致。宜內服烏藥順氣散。外以生薑擦之。參看丹毒條。

【冷痢】痰積嘔吐之別稱。

【冷廬醫話】五卷。清陸以湑撰。凡醫學之派別。醫書之善否。醫家病家所當知之事。以及病證藥性診察治療保攝之方。隨意論列。語多精審。

【冷癰】癰瘍之屬於寒者。青硬無頭。宜用生鐵鏞。二錢。

白松香。一兩五錢。研細末。入銚內。加麻油。一兩。慢火煎數沸。離火。待熱稍退。入輕粉。二錢。麝香末。少許。攪

勻成膏。量瘡大小攤貼之。甚妙。

【初】病之初期也。得邪方新。感邪方淺。宜以疾利之藥急驅之。則邪去速而正不傷。故初治之法宜猛峻。

【初中】〔中與終通〕每步之氣。以前半為初。後半為終。前半主地氣升。後半主天氣降。〔素問六微旨大論〕

何謂初中。初者。地氣也。中者。天氣也。初凡三十度而

有奇。中氣同法。

【初之氣】一年中第一次之主氣。於時為大寒至驚蟄末六十日八十七刻半。在六氣之中屬風。見〔素問六微旨大論〕及〔六元正紀大論〕

【初六】猶言第一歲之六氣。〔素問六微旨大論〕所謂初六。天之數也。

【初步骨】左右二塊。在起仆骨下。有勢無髓有液。女子無此骨。

【初勞】即第一代傳尸勞。詳第一代傳尸勞條。

【初虞世】〔老學菴筆記〕初虞世。字和甫。以醫名天下。元符中皇子鄧王生。月餘得痢疾。危甚。羣醫束手。虞世獨以為必無可慮。不三日王薨。信乎醫之難也。按虞世為宋朝醫。有超見。論源皆深究素難之理。著有養生必用。

【初筮】竹筍之別名。

【刪注脈訣規正】清沈鏡撰。就高陽生脈訣刪削訂正。其難明處則加以注釋。又將李瀕湖脈學及奇經八脈摘鈔附入。

脈摘鈔附入。

【刪補名醫方論】醫宗金鑑之一。

【刪補頤生微論】四卷。明李中梓撰。初稿定於萬歷戊午。已刊版行世。崇禎壬午。又因舊本自訂之。故稱刪補。凡二十四篇。曰三奇。曰醫宗。曰先天。曰後天。曰辨妄。曰審象。曰宣藥。曰運氣。曰臟腑。曰別證。曰四要。曰化源。曰知機。曰明治。曰風土。曰虛勞。曰邪祟。曰傷寒。曰廣嗣。曰婦科。曰藥性。曰醫方。曰醫藥。曰感應。門類頗為冗雜。三奇論中兼及道書修煉。如去三尸行呵吸等法。皆非醫家本術也。

【刪繁本草】五卷。唐楊損之撰。書中刪去本草之不急者。及有名未用之品。於精義無所發明。

【判】半也。〔靈樞陰陽二十五人篇〕判角之人。

【判角】得五音之角。而居少數者。〔靈樞五音五味篇〕判角與少角。調右足少陽下。〔又〕判角與太角。同左右少陽下。

【判角之人】〔靈樞陰陽二十五人篇〕判角之人。比於左足少陽。少陽之下。枯栝然。

【判商】金之半也。商音。屬金。〔素問五常政大論〕少角

左足少陽。少陽之下。枯栝然。

【判商】金之半也。商音。屬金。〔素問五常政大論〕少角

左足少陽。少陽之下。枯栝然。

與判商同。

【別】●經脈外之別絡。詳〔靈樞經脈篇〕●經脈外之別經。〔靈樞經別篇〕與別俱行。

【別仙蹤】徐長卿之別名。

【別枝】卽別竊。

【別直參】高麗參之堅實力壯者。

【別氣】心腎之氣。不走於目而別出者。〔靈樞邪氣藏府病形篇〕其別氣走於耳而爲聽。

【別絡】〔難經二十三難〕別絡十五。皆因其原。如環無端。轉相灌溉。朝於寸口。人迎。以處百病而決死生也。

【別陽穴】〔靈樞衛氣篇〕手陽明之本。在肘骨中。上至別陽。按此穴卽陽池穴。

【別經】謂與經脈相別也。〔素問氣穴論〕孫絡之脈別經者。其血盛而當寫者。亦三百六十五脈。並注於絡。

【別鄉】猶言別部。〔靈樞五色篇〕色者青黑赤白黃。皆端滿。有別鄉。如小腸之色應於面王。面王者。心之別鄉也。膽之色應於肝左。膽部者。肝之別鄉也。

【別離】●血氣之流動不循常軌也。〔靈樞邪客篇〕余

願盡聞少岐別離之處。離而入陰。別而入陽。願聞其方。●不能一致聯絡舉動也。〔素問陰陽類論〕四支別離。

【別離散】婦人大全良方。功用治婦人風虛與鬼交。悲

喜不常。心神不定。藥品楊柳樹上寄生。白朮各一兩。

桂心。茵芋。天雄。炮去皮臍。薊根。菖蒲。〔九節者〕細

辛。附子。炮去皮臍。乾薑。炮。各五錢。用法。研爲細

末。每服一錢。食前溫酒調下。

【別竊】雜草類。生於川谷。性質苦微溫無毒。功用治風

寒溼痹。身重。四肢酸疼。歷節痛。

【刳貝】吉貝之譌。

【刳刺】刺法之一。一刺卽去。有如刳奪。不用迎隨出入

之法也。〔靈樞經筋篇〕治在燔鍼。刳刺。〔素問調經

論〕燔鍼。刳刺。其下。及與急者。

【利】古書於泄瀉滯下等證。通稱爲利。後人則習用痢

字。證治詳痢條。

【利火湯】傳青主女科方。功用治黑帶下。藥品黃連。梔

子。炒。劉寄奴。大黃。王不留行。茯苓。車前子。酒炒。