

中国科学院中国孢子植物志编辑委员会 编辑

中国苔藓志

第十卷

叶苔目(裂叶苔科—新绒苔科)

高 谦 吴玉环 主编

科学出版社

内 容 简 介

《中国苔藓志》第十卷包括中国产苔纲植物的裂叶苔科、全萼苔科、合叶苔科、地萼苔科、羽苔科、阿氏苔科、顶苞苔科、歧舌苔科、小袋苔科、紫叶苔科、扁萼苔科、毛叶苔科、新绒苔科共 13 科，43 属，299 种(不包括种下分类单位)。科、属、种均有形态结构特征描述，属、种均有中、英文检索表，种有中名、拉丁名、主要文献、生境、产地和地理分布，多数种有附图；黑白线条图 186 幅，书末附有中名、拉丁名索引。

本书可供从事植物资源、生物多样性研究、环境保护与林业和大专院校师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国苔藓志. 第 10 卷, 叶苔目(裂叶苔科—新绒苔科)/高谦, 吴玉环主编.
—北京：科学出版社，2008

ISBN 978-7-03-017420-8

I. 中… II. ①高…②吴… III. ①真菌志—中国 ②叶苔目—真菌志—中国
IV. ①Q949.32②Q949.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 061737 号

责任编辑：张会格 韩学哲 王剑虹/责任校对：宋玲玲

责任印制：钱玉芬/封面设计：槐寿明

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社编务公司排版制作

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 9 月第一 版 开本：787×1092 1/16

2008 年 9 月第一次印刷 印张：30 1/2

印数：1~800 字数：688 000

定价：120.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换(双青))

中国孢子植物志第五届编委名单

(2007年5月)

主 编 魏江春

副 主 编 夏邦美 胡征宇 庄文颖 吴鹏程

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁兰平 王全喜 王幼芳 田金秀

吕国忠 刘杏忠 刘国祥 庄剑云

李增智 李仁辉 杨祝良 陈健斌

张天宇 郑儒永 胡鸿钧 施之新

姚一建 贾 渝 郭 林 高亚辉

谢树莲 戴玉成 魏印心

序

中国孢子植物志是非维管束孢子植物志，分《中国海藻志》、《中国淡水藻志》、《中国真菌志》、《中国地衣志》及《中国苔藓志》五部分。中国孢子植物志是在系统生物学原理与方法的指导下对中国孢子植物进行考察、收集和分类的研究成果；是生物物种多样性研究的主要内容；是物种保护的重要依据，对人类活动与环境甚至全球变化都有不可分割的联系。

中国孢子植物志是我国孢子植物物种数量、形态特征、生理生化性状、地理分布及其与人类关系等方面的综合信息库；是我国生物资源开发利用、科学研究与教学的重要参考文献。

我国气候条件复杂，山河纵横，湖泊星布，海域辽阔，陆生和水生孢子植物资源极其丰富。中国孢子植物分类工作的发展和中国孢子植物志的陆续出版，必将为我国开发利用孢子植物资源和促进学科发展发挥积极作用。

随着科学技术的进步，我国孢子植物分类工作在广度和深度方面将有更大的发展，对于这部著作也将不断补充、修订和提高。

中国科学院中国孢子植物志编辑委员会

1984年10月 北京

中国孢子植物志总序

中国孢子植物志是由《中国海藻志》、《中国淡水藻志》、《中国真菌志》、《中国地衣志》及《中国苔藓志》所组成。至于维管束孢子植物蕨类未被包括在中国孢子植物志之内，是因为它早先已被纳入《中国植物志》计划之内。为了将上述未被纳入《中国植物志》计划之内的藻类、真菌、地衣及苔藓植物纳入中国生物志计划之内，出席1972年中国科学院计划工作会议的孢子植物学工作者提出筹建“中国孢子植物志编辑委员会”的倡议。该倡议经中国科学院领导批准后，“中国孢子植物志编辑委员会”的筹建工作随之启动，并于1973年在广州召开的《中国植物志》、《中国动物志》和中国孢子植物志工作会议上正式成立。自那时起，中国孢子植物志一直在“中国孢子植物志编辑委员会”统一主持下编辑出版。

孢子植物在系统演化上虽然并非单一的自然类群，但是，这并不妨碍在全国统一组织和协调下进行孢子植物志的编写和出版。

随着科学技术的飞速发展，人们关于真菌的知识日益深入的今天，黏菌与卵菌已被从真菌界中分出，分别归隶于原生动物界和管毛生物界。但是，长期以来，由于它们一直被当作真菌由国内外真菌学家进行研究；而且，在“中国孢子植物志编辑委员会”成立时已将黏菌与卵菌纳入中国孢子植物志之一的《中国真菌志》计划之内并陆续出版，因此，沿用包括黏菌与卵菌在内的《中国真菌志》广义名称是必要的。

自“中国孢子植物志编辑委员会”于1973年成立以后，作为“三志”的组成部分，中国孢子植物志的编研工作由中国科学院资助；自1982年起，国家自然科学基金委员会参与部分资助；自1993年以来，作为国家自然科学基金委员会重大项目，在国家基金委资助下，中国科学院及科技部参与部分资助，中国孢子植物志的编辑出版工作不断取得重要进展。

中国孢子植物志是记述我国孢子植物物种的形态、解剖、生态、地理分布及其与人类关系等方面大型系列著作，是我国孢子植物物种多样性的重要研究成果，是我国孢子植物资源的综合信息库，是我国生物资源开发利用、科学研究与教学的重要参考文献。

我国气候条件复杂，山河纵横，湖泊星布，海域辽阔，陆生与水生孢子植物物种多样性极其丰富。中国孢子植物志的陆续出版，必将为我国孢子植物资源的开发利用，为我国孢子植物科学的发展发挥积极作用。

中国科学院中国孢子植物志编辑委员会

主编 曾呈奎

2000年3月 北京

Foreword of the Cryptogamic Flora of China

Cryptogamic Flora of China is composed of *Flora Algarum Marinarum Sinicarum*, *Flora Algarum Sinicarum Aquae Dulcis*, *Flora Fungorum Sinicorum*, *Flora Lichenum Sinicorum*, and *Flora Bryophytorum Sinicorum*, edited and published under the direction of the Editorial Committee of the Cryptogamic Flora of China, Chinese Academy of Sciences(CAS). It also serves as a comprehensive information bank of Chinese cryptogamic resources.

Cryptogams are not a single natural group from a phylogenetic point of view which, however, does not present an obstacle to the editing and publication of the Cryptogamic Flora of China by a coordinated, nationwide organization. The Cryptogamic Flora of China is restricted to non-vascular cryptogams including the bryophytes, algae, fungi, and lichens. The ferns, a group of vascular cryptogams, were earlier included in the plan of *Flora of China*, and are not taken into consideration here. In order to bring the above groups into the plan of Fauna and Flora of China, some leading scientists on cryptogams, who were attending a working meeting of CAS in Beijing in July 1972, proposed to establish the Editorial Committee of the Cryptogamic Flora of China. The proposal was approved later by the CAS. The committee was formally established in the working conference of Fauna and Flora of China, including cryptogams, held by CAS in Guangzhou in March 1973.

Although myxomycetes and oomycetes do not belong to the Kingdom of Fungi in modern treatments, they have long been studied by mycologists. *Flora Fungorum Sinicorum* volumes including myxomycetes and oomycetes have been published, retaining for *Flora Fungorum Sinicorum* the traditional meaning of the term fungi.

Since the establishment of the editorial committee in 1973, compilation of Cryptogamic Flora of China and related studies have been supported financially by the CAS. The National Natural Science Foundation of China has taken an important part of the financial support since 1982. Under the direction of the committee, progress has been made in compilation and study of Cryptogamic Flora of China by organizing and coordinating the main research institutions and universities all over the country. Since 1993, study and compilation of the Chinese fauna, flora, and cryptogamic flora have become one of the key state projects of the National Natural Science Foundation with the combined support of the CAS and the National Science and Technology Ministry.

Cryptogamic Flora of China derives its results from the investigations, collections, and classification of Chinese cryptogams by using theories and methods of systematic and evolutionary biology as its guide. It is the summary of study on species diversity of cryptogams and provides important data for species protection. It is closely connected with human activities, environmental changes and even global changes. Cryptogamic Flora of China is a comprehensive information bank concerning morphology, anatomy, physiology, biochemistry, ecology, and phytogeographical distribution. It includes a series of special

monographs for using the biological resources in China, for scientific research, and for teaching.

China has complicated weather conditions, with a crisscross network of mountains and rivers, lakes of all sizes, and an extensive sea area. China is rich in terrestrial and aquatic cryptogamic resources. The development of taxonomic studies of cryptogams and the publication of *Cryptogamic Flora of China* in concert will play an active role in exploration and utilization of the cryptogamic resources of China and in promoting the development of cryptogamic studies in China.

C. K. Tseng

Editor-in-Chief

The Editorial Committee of the Cryptogamic Flora of China

Chinese Academy of Sciences

March, 2000 in Beijing

《中国苔藓志》序

苔藓植物为孢子植物中组织构造复杂性仅次于蕨类的一大类群。它与孢子植物其他大类的共同特点系通常以孢子来繁衍后代。

由于苔藓植物习生于水湿条件较丰富的生境，在历史上曾与孢子植物其他大类中生态习性近似的种类归为同一类群。在 1801 年和 1844~1847 年，藓类和苔类分别作为植物界的组成部分被确立。20 世纪 70 年代，角苔类被从苔类中分出，因此，苔藓植物门 (Division Bryophyta) 现包含苔纲 (Hepaticae)、角苔纲 (Anthocerotae) 和藓纲 (Musci) 三大类。在系统上，它们被置于蕨类植物和藻类植物之间，而认为系植物界大系统“树”发育上的一个侧枝，或因苔藓植物无演化成其他植物的渊源关系，也有称苔藓植物是植物界的“盲枝”。

苔藓植物在世界各地从热带雨林至寒温带荒漠包括南极洲在内均有分布。一般认为全世界约有 23 000 种苔藓植物，其中包括 8000 种苔类、100 种角苔类和 15 000 种藓类。中国地域辽阔，涉及热带山地雨林、常绿阔叶林、针叶林、草原和干旱荒漠以及形式多样的小生境。中国又具有世界独特的青藏高原和横断山区，现知中国苔藓植物的种类约为全世界的十分之一，并富有特有类型和东亚特有类型。

《中国苔藓志》是 1973 年广州召开的“三志”工作会议上确立，作为中国孢子植物志所包含的藻类(又分海藻和淡水藻)、菌类、地衣和苔藓等五志的一个组成部分。在中国孢子植物志编委会领导和中国科学院给予经费大力支持下，长达十多年酝酿，野外补点和全国有关科研机构及大学间协调，确定了编研分工和编研计划。

自 1993 年中国孢子植物志与《中国植物志》和《中国动物志》作为重大项目列入国家自然科学基金委员会“八五”计划，在国家自然科学基金委员会、中国科学院和国家科学技术部联合资助下，《中国苔藓志》正陆续开始出版，预期在“九五”期间将完成藓类 8 卷的编研任务，“十五”结束全部《中国苔藓志》12 卷的任务。

苔藓植物内在的系统多以苔类植物组织构造较简单，并对环境的适应性弱，而一般认为苔类植物较原始，其次为角苔类，然后是藓类。在苔类和藓类各自的小系统中，又均以植物体直立，孢蒴顶生于茎者为原始，而植物体匍匐的类型及孢蒴非着生茎顶者为进化。《中国苔藓志》的系统因考虑我国对藓类的研究力量较强，其出版顺序以藓类先于苔类，对卷的编号也以藓类在前，苔类在后，前者自 1~8 卷，而后者为 9~12 卷。就具体系统而言，《中国苔藓志》中的藓类部分系按陈邦杰在 1963 年修正的 Brotherus 系统，而苔类部分采用 Schuster(1966~1992) 及 Grolle(1983) 融合的系统。

《中国苔藓志》的研究历史可回溯至 20 世纪 30 年代末。当时以《中国植物志要》 (*Symbolae Sinicae*) 为名，由奥地利人 Handel-Mazzetti 在中国西南地区采集的数以千计的苔藓标本，分别按藓类和苔类由 Brotherus 及 Nicholson、Herzog 和 Verdoorn 鉴定和撰写。在该“志要”中所包含的种类分别为中国藓类种数的 1/3 和苔类的 1/6。

1963 年及 1978 年出版由陈邦杰主编的《中国藓类植物属志》上、下册系《中国苔

藓志》的雏形，虽然该套书不包括种的文献和描述，但已列入中国迄今所知约 95% 的藓类植物。《中国高等植物图鉴》第一卷中的苔藓植物门及后来一系列的地区苔藓志：《东北藓类植物志》、《东北苔类植物志》、《秦岭植物志·苔藓植物门》、《西藏苔藓植物志》和《内蒙古苔藓植物志》及《横断山区苔藓志》等的出版，均为《中国苔藓志》的编研奠定了坚实的基础。

在我国已签署“国际生物多样性公约”，并重视加强对濒危和珍稀物种保护的前景下，《中国苔藓志》成果的陆续问世，无疑可为环境保护、植物资源的更为合理的利用，以及为地球上生物间的相互关系研究做出积极的贡献。

中国科学院中国孢子植物志编辑委员会

副主编 吴鹏程

2000 年 3 月 北京

Foreword of *Flora Bryophytorum Sinicorum*

Bryophytes, as the second largest group in the cryptogams, have less complex construction than Pteridophytes. The common characteristic of the bryophytes with the other taxa in cryptogams is that they usually use their spores for propagation.

Historically, the Bryophytes were classified as members of the cryptogams, in which the majority of members are hygrophilous in habit. In 1801 and from 1844 to 1847, the Musci and the Hepaticae were established separately in the plant kingdom. In 1970s', the hornworts were isolated from the Hepaticae. Thus for the division of Bryophyta consists of Hepaticae, Anthocerotae, and Musci. In the system, the Bryophyta are arranged between the Pteridophyta and the Algae. They are recognized as a lateral branch of the phylogenetic tree in the evolutionary process of the plant kingdom, and seen as a blinding branch, and more so, this branch does not have confirmed connection with any other plant groups.

The bryophytes are distributed worldwide from the tropical rain forest to the cold harsh desert, including Antarctic. Generally, about 23,000 species of bryophytes exist in the world, among them 8,000 species of liverworts, about 100 species of hornworts, and 15,000 species of mosses. China contains not only various microhabitats, but encompasses a wide area, including tropical rain mountain forests, evergreen broad-leaf forests, coniferous forests, meadows, and dry harsh deserts. The Qinghai-Xizang(Tibet) Plateau and the Hengduan Mountains of China are some the most unique regions in the world. There are about 10 percent of the bryophyte species distributed in China, including also members of the endemic taxa and the Eastern Asian elements.

The project “*Flora Bryophytorum Sinicorum*”, established at the “Fauna, Flora and Cryptogamic Flora of China Workshop” in Guangzhou in 1973, is a part of the major project that includes the flora of fresh and marine algae, fungi, lichens, and bryophytes. Academically directed by the Editorial Committee of the Cryptogamic Flora of China, the *Flora Bryophytorum Sinicorum* was financially supported by the Chinese Academy of Sciences and was prepared over a period of ten years. Additionally, through a series of field works, along the close cooperation between the institutions and universities, the editorial plan and schedule were designed.

Since 1993, the Cryptogamic Flora of China, *Flora Reipublicae Popularis Sinicae* and *Fauna Sinica*, as one of the major projects has been enlisted in the “Eighth Five-Year Plan” of the National Natural Science Foundation of China. Under the cooperative financial support of the National Natural Science Foundation of China, the Chinese Academy of Sciences, and the National Science and Technology Department, the total 12 volumes of the *Flora Bryophytorum Sinicorum* will be published in succession. Among which, eight volumes are expected to appear during the “Ninth Five-Year Plan” and the others will be completed in the

“Tenth Five-Year Plan”.

In the infra-system of Bryophytes, generally, the Hepaticae are more ancestral in their characters, followed by the more isolated Anthocerotae, and the more advanced Musci. In both systems of liverworts and mosses, the group with erect stems and acrocarpous capsules is evolutionally primitive, while the group with creeping stems and pleurocarpous capsules is advanced. In consideration of the present study on Chinese mosses, the published order of the *Flora Bryophytorum Sinicorum* is the mosses first, followed by liverworts. Volume 1~8 are for mosses and 9~12 are liverworts. The taxonomic system of the *Flora Bryophytorum Sinicorum* is adapted from one of Brotherus' works and modified by Pan-Chien Chen for mosses in 1963. The liverwort one combines both Schuster's(1966~1992) and Grolle's(1983) systems.

The research history of Chinese bryophytes can be dated back to the late 1930s'. At that time, the *Symbolae Sinicae*, written by Brotherus for mosses, and Nicholson, Herzog and Verdoorn for liverworts, was a preliminary monograph of the bryoflora of China, based on the thousand bryophyte specimens collected by the Austrian Handel-Mazzetti from Southwest China, with some one-third of Chinese mosses and one-sixth of Chinese liverworts included in that monograph.

The *Genera Muscorum Sinicorum*(Volume I and II), edited by Pan-Chien Chen in 1963 and 1978, are the embryonic form of the *Flora Bryophytorum Sinicorum*. About 95% of the species of mosses of China up to that time were listed, although the literature citation and description of each species were not included. The three volumes of the *Flora Bryophytorum Sinicorum* and following local bryofloras including *Iconographia Cormophytorum Sinicorum*, *Flora Muscorum Chiae Boreali-Orientalis*, *Flora Hepaticarum Chiae Boreali-Orientalis*, *Flora Tsinglingensis Tom. III: Bryophyta*, *Bryoflora of Xizang*, *Bryoflora of Hengduan Mts*, *SW China*, *Flora Bryophytarum Intramongolicarum*, and *Flora Bryophytorum Shandongicum* established a steady foundation for the compilation of the *Flora Bryophytorum Sinicorum*.

Under the provision of the “Convention on Biological Diversity” signed by the Chinese government, the studies on the rare and endemic species of biology have been strengthening in China. The publications of the *Flora Bryophytorum Sinicorum* will stimulate environmental protection, promote better usage of plant resources, and allow for great contributions to be made to the studies on the correlation between the biological groups of the world.

Wu Pan-Cheng

Deputy Editor-in-Chief

The Editorial Committee of the Cryptogamic Flora of China

Chinese Academy of Sciences

March, 2000 in Beijing

前　　言

《中国苔藓志》第十卷是继中国苔类植物志中首先出版的《中国苔藓志》第九卷后的一卷，是在中国几代苔藓植物学家共同采集调查、积累资料的基础上，经过著者们多年的艰苦努力、系统研究完成的重要成果。它是中国苔藓植物系统分类研究的总结，是中国苔藓志的一个组成部分。本卷包括叶苔目(*Jungermanniales*)的裂叶苔科(*Lophoziaceae*)、全萼苔科(*Gymnomitriaceae*)、合叶苔科(*Scapaniaceae*)、地萼苔科(*Geocalycaceae*)、紫叶苔科(*Pleuroziaceae*)、扁萼苔科(*Radulaceae*)、毛叶苔科(*Ptilidiaceae*)、新绒苔科(*Neotrichocoleaceae*)等13科，43属，299种。本卷的排列系统主要是参考Schuster(1966)和Grolle(1983)修订的苔类系统编排的，以科、属、种等级为单位，在少数情况下采用了相应等级下的分类单位。拉丁名按现行国际植物命名法规(《密苏里法规》)使用，中名主要参考已出版著作，考虑中名的优先权原则，新记录采用新拟名称使用。卷内各属、种除必须引证原始文献外，重要的异名及其文献和中国及其相邻近地区的文献均予收录。每个种均有详细的形态结构特征描述及生境、产地和分布等详细记载，部分种类还有分类特征讨论，多数种均有特征附图。凡在我国分布较广的种，择其有代表性的地区记录，对模式标本和重要的凭证标本尽可能借阅，但未能检视的重要标本仍加以收录而注明其出处，以便于今后有机会时作补充检视。

涉及本卷相关科、属的标本主要存放在中国科学院沈阳应用生态研究所生物标本馆，并对国内各单位所收藏的标本作了借阅，其中主要的引证标本保存于中国科学院昆明植物研究所、中国科学院华南植物研究所、陕西科学院西安植物园、中山大学、上海自然博物馆、华东师范大学、中国科学院植物研究所、东北林业大学、台湾大学、东海大学等单位，以及国外芬兰赫尔辛基大学、德国Friedrich Schiller大学、日本服部植物研究所、新加坡国立大学、美国纽约植物园、密苏里植物园等单位的植物标本馆，作者们谨对上述各单位的标本馆(室)提供借阅标本的方便致以深深的感谢。

本书研编过程中，得到了赫尔辛基大学的T. Koponen、P. Isoviiita和S. Piippo、纽约植物园的W.R. Buck、密苏里植物园的M.R. Crosby和S. He、日本服部植物研究所的Z. Iwatsuki和新加坡国立大学的B.C. Tan、德国Friedrich Schiller大学的R. Grolle等同行在借阅标本和资料方面的帮助，特致深切的感谢。本书的编研和出版获中国科学院、国家科学技术部和国家自然科学基金会的长期支持、指导和帮助，特此一并致谢。同时感谢中国科学院孢子植物志编辑委员会的指导和帮助。最后还要说明的，在本书研编过程中，由于标本、资料所限，深感其中内容不全，谬误之处难免，望广大同仁和读者补充纠正。

高　谦 吴玉环

中国科学院沈阳应用生态研究所

2003年11月于沈阳

Preface

This volume, the second volume of Chinese Hepaticae after volume 9, is finished after more than ten years of endeavor by researchers based on many specimens collected by several generations of Chinese bryologists. The work started with collecting and studying of specimens, and finished with further identifying, describing, and illustrating work in the help of many references. This volume comprises 13 families, 43 genera, and 299 species and taxa under species of Jungermanniales, including Lophoziaceae, Gymnomitriaceae, Scapaniaceae, Geocalycaceae, Pleuroziaceae, Radulaceae, Ptilidiaceae, and Neotrichocoleaceae et al. The systematical arrangements in this volume mainly follow Schuster (1966) and Grolle (1983), with the rank including family, genus, and species, with taxa under species if necessary. All the scientific names of each taxon were written according to the International Code of Botanical Nomenclature (*St. Louis Code*) and all the Chinese names were treated following the priority. All the original literatures of genera and species including the important synonyms related to China and the neighbor countries with type locations are cited. Each species had its detailed morphologic characteristics descriptions, habitats, localities, and worldwide distribution, as well as the discussion of the brief diagnostic characteristics and taxonomic problems. The illustration of main recognizable characteristic features was attached to each species. If the species is widely distributed in China, only the representatives of its cited specimens must be listed. The type and important voucher specimens must be checked as possible as we can. If it was impossible, we still cited their collectors and numbers, for the purpose of further studies later.

We express our deep gratitude to our colleagues in herbaria of Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, South China Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Xi'an Botanical Garden, Shaanxi Academy of Sciences, Zhongshan University, Shanghai Museum of Natural History, East China Normal University, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Tunghai University, and Taiwan University, as well as the foreign bryologists, Drs. T. Koponen, P. Isoviita, and S. Piippo of Helsinki University, Dr. W.R. Buck of New York Botanical Garden, Drs. M.R. Crosby and S. He of Missouri Botanical Garden, Dr. Z. Iwatsuki of Hattori Botanical Laboratory, Dr. B.C. Tan of Singapore National University, and Dr. R. Grolle of Friedrich Schiller University, Germany for providing specimens and literatures in our studies. We thanks Chinese Academy of Sciences, Ministry of Science and Technology of China, and the National Natural Science Foundation of China for financial support of present research and publication. Thanks are also due to the Editorial Committee of the Cryptogamic Flora of China for their help in our editing work of this volume.

Gao Chien, Wu Yu-Huan
Institute of Applied Ecology,
Chinese Academy of Sciences
Nov., 2003 in Shenyang

目 录

序

中国孢子植物志总序

《中国苔藓志》序

前言

| | |
|---|-----|
| 科 15 裂叶苔科 <i>Lophoziaceae</i> | 1 |
| 属 1 卷叶苔属 <i>Anastrepta</i> (Lindb.) Schiffn. | 3 |
| 属 2 细裂瓣苔属 <i>Barbilophozia</i> Loesk. | 4 |
| 属 3 三瓣苔属 <i>Tritomaria</i> Schiffn. ex Loesk. | 12 |
| 属 4 裂叶苔属 <i>Lophozia</i> (Dumort.) Dumort. | 19 |
| 属 5 小广萼苔属 <i>Tetralophozia</i> (R.M. Schust.) Schljakov..... | 41 |
| 属 6 挺叶苔属 <i>Anastrophyllum</i> (Spruce) Steph. | 42 |
| 属 7 广萼苔属 <i>Chandonanthus</i> Mitt. in J.D. Hook. | 54 |
| 属 8 兜叶苔属(新拟) <i>Denotarisia</i> Grolle..... | 59 |
| 属 9 对耳苔属 <i>Syzygiella</i> Spruce | 59 |
| 属 10 戈氏苔属(新拟) <i>Gottschelia</i> Grolle | 61 |
| 属 11 拟折瓣苔属(新拟) <i>Sphenolobopsis</i> R.M. Schust. et N. Kitag. | 62 |
| 科 16 全萼苔科 <i>Gymnomitriaceae</i> | 63 |
| 属 1 全萼苔属 <i>Gymnomitrium</i> Corda in Opiz..... | 64 |
| 属 2 钱袋苔属 <i>Marsupella</i> Dumort. | 67 |
| 属 3 类钱袋苔属(新拟) <i>Apomarsupella</i> R.M. Schust. | 76 |
| 属 4 湿生苔属 <i>Eremonotus</i> Lindb. et Kaal. ex Pears. | 80 |
| 科 17 合叶苔科 <i>Scapaniaceae</i> | 82 |
| 属 1 褶叶苔属 <i>Diplophyllum</i> (Dumort.) Dumort. | 83 |
| 属 2 大褶叶苔属 <i>Macrodiplophyllum</i> (Buch) Perss. | 88 |
| 属 3 合叶苔属 <i>Scapania</i> (Dumort.) Dumort. | 90 |
| 属 4 侧囊苔属 <i>Delavayella</i> Steph. | 140 |
| 科 18 地萼苔科 <i>Geocalycaceae</i> | 141 |
| 属 1 拟蒴囊苔属 <i>Saccogynidium</i> Grolle | 143 |
| 属 2 蓼囊苔属 <i>Saccogyna</i> Dumort. | 147 |
| 属 3 薄萼苔属 <i>Leptoscyphus</i> Mitt. | 147 |
| 属 4 镰萼苔属 <i>Harpanthus</i> Nees | 150 |
| 属 5 地萼苔属 <i>Geocalyx</i> Nees | 151 |
| 属 6 异萼苔属 <i>Heteroscyphus</i> Schiffn. | 153 |
| 属 7 裂萼苔属 <i>Chiloscyphus</i> Cord. emend. J.J. Engel et R.M. Schust. | 172 |

| | |
|---|-----|
| 科 19 羽苔科 Plagiochilaceae | 194 |
| 属 1 平叶苔属 <i>Pedinophyllum</i> (Lindb.) Lindb. | 195 |
| 属 2 羽苔属 <i>Plagiochila</i> (Dumort.) Dumort. | 197 |
| 属 3 对羽苔属 <i>Plagiochilion</i> S. Hatt. | 338 |
| 属 4 黄羽苔属 <i>Xenochila</i> R.M. Schust. | 343 |
| 科 20 阿氏苔科 Arnelliaceae | 345 |
| 属 1 横叶苔属 <i>Southbya</i> Spruce | 345 |
| 属 2 假萼苔属 <i>Gongylanthus</i> Nees | 347 |
| 科 21 顶苞苔科 Acrobolbaceae | 348 |
| 属 1 顶苞苔属 <i>Acrobolbus</i> Nees | 349 |
| 属 2 囊蒴苔属 <i>Marsupidium</i> Mitt. in J.D. Hook. | 350 |
| 科 22 歧舌苔科 Schistochilaceae | 352 |
| 属 1 狹瓣苔属 <i>Gottschea</i> Nees ex Mont. | 352 |
| 属 2 歧舌苔属 <i>Schistochila</i> Dumort. | 359 |
| 科 23 小袋苔科 Balantiopsidaceae | 363 |
| 属 1 直蒴苔属 <i>Isotachis</i> Mitt. in J.D. Hook. | 364 |
| 科 24 紫叶苔科 Pleuroziaceae | 369 |
| 属 1 紫叶苔属 <i>Pleurozia</i> Dumort. | 369 |
| 属 2 拟紫叶苔属 <i>Eopleurozia</i> R.M. Schust. | 373 |
| 科 25 扁萼苔科 Radulaceae | 373 |
| 属 1 扁萼苔属 <i>Radula</i> Dumort. | 374 |
| 科 26 毛叶苔科 Ptilidiaceae | 430 |
| 属 1 毛叶苔属 <i>Ptilidium</i> Nees | 430 |
| 科 27 新绒苔科 Neotrichocoleaceae | 433 |
| 属 1 囊绒苔属 <i>Trichocoleopsis</i> Okam. | 433 |
| 属 2 新绒苔属 <i>Neotrichocolea</i> S. Hatt. | 436 |
| 参考文献 | 437 |
| 中名索引 | 444 |
| 拉丁名索引 | 448 |

科 15 裂叶苔科 Lophoziaceae*

植物体小到中等大小，稀大形，变异较大，长 1~8 (10) cm，带叶宽 0.5~4 mm，绿色、黄绿色或棕色，质地柔软或挺硬，干湿变化明显。茎匍匐，倾立，稀直立，横切面有分化，皮部细胞较小，中部细胞较大，有时呈背腹面分化，稀不分化；分枝侧生，稀从腹面伸出，有些种具鞭状枝；假根散生，密集或稀疏，生于茎腹面。叶互生，斜生、近横生或横生，叶面常内凹，先端 2~4 裂，少数种类具不规则裂瓣，裂瓣边缘常具齿突或纤毛，稀全缘。叶细胞形态变化较大，从等轴型到长轴型，细胞壁薄或不规则加厚，三角体明显或无；细胞内油体数目变化较大，从几个到几十个，直径 3~10 μm ，均匀或具明显折光点。腹叶明显或仅存于雌苞腹面，或完全缺失，2 裂或披针形，基部边缘常具齿突或纤毛。多数种类具芽胞。雌雄异株，稀雌雄同株。雄苞叶密集呈穗状，生于侧枝的顶端或雌苞的下方，表面常具疣突；精子器柄由单列或双列细胞组成。蒴萼长椭圆形，表面具纵褶，口部常收缩；雌苞叶与茎叶相似，分离或相互连合。孢蒴卵球形，蒴壁 2~5 层细胞，内层细胞壁半环形带状加厚，外层细胞壁节状加厚。孢蒴成熟时瓣裂。孢子小，表面具细密疣，弹丝 2 条螺纹加厚，孢子与弹丝的数目比例约为 2 : 1。

Piippo (1990, 1992) 记录中国裂叶苔科植物共有 12 属、49 种、1 亚种、1 变种。本志记录裂叶苔科植物共 11 属、46 种、2 变种、1 变型。

由于不同的学者对圆叶苔属 *Jamesoniella* 和湿生苔属 *Eremonotus* 在苔类中的系统位置存有争议，作者根据 Grolle (1983) 和 Piippo (1990) 的观点将其分别置于叶苔科和全萼苔科之下。

分属检索表

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. 植物体叶片多数全缘 | 2 |
| 1. 植物体叶片先端多少呈裂瓣状 | 4 |
| 2. 叶腹面基部相连，不相互重叠 | 9. 对耳苔属 <i>Syzygiella</i> |
| 2. 叶腹面基部相互重叠 | 3 |
| 3. 叶细胞三角体明显，呈星状放射结构 | 8. 兜叶苔属 <i>Denotarisia</i> |
| 3. 叶细胞三角体无星状放射结构 | 10. 戈氏苔属 <i>Gottschelia</i> |
| 4. 植物体叶片先端多 2 裂 | 5 |
| 4. 植物体叶片先端多 3~4 裂 | 11 |
| 5. 叶片边缘强烈外卷，腹侧边特别明显 | 1. 卷叶苔属 <i>Anastreptia</i> |
| 5. 叶片边缘不强烈外卷，多少有些内凹 | 6 |
| 6. 裂口达叶长的 2/3~3/4 | 7 |
| 6. 裂口小于或等于叶长的 1/2 | 8 |
| 7. 叶细胞三角体明显；茎具由茎腹面中央伸出的分枝 | 6. 挺叶苔属 <i>Anastrophyllum</i> |
| 7. 叶细胞无三角体；茎具二叉状分枝 | 11. 拟折瓣苔属 <i>Sphenolobopsis</i> |
| 8. 植物体无腹叶 | 9 |

*作者(Auctores): 孙军 (Sun Jun)、曹同 (Cao Tong)

| | |
|---|-------------------------------|
| 8. 植物体具腹叶 | 10 |
| 9. 植物体挺硬，叶片明显内凹或呈纵向对折状 | 6. 挺叶苔属 <i>Anastrophyllo</i> |
| 9. 植物体较柔软，叶片不强烈内凹 | 4. 裂叶苔属 <i>Lophozia</i> |
| 10. 叶片近横生，叶缘腹面基部常有纤毛状附属物 | 2. 细裂瓣苔属 <i>Barbilophozia</i> |
| 10. 叶片斜生，叶缘无纤毛状附属物 | 4. 裂叶苔属 <i>Lophozia</i> |
| 11. 叶片多3裂 | 12 |
| 11. 叶片多4裂 | 14 |
| 12. 植物体具腹叶 | 13 |
| 12. 植物体无腹叶 | 3. 三瓣苔属 <i>Tritomaria</i> |
| 13. 裂口达叶长的4/5；叶裂瓣两侧明显不对称，背瓣远大于腹瓣 | 7. 广萼苔属 <i>Chandonanthus</i> |
| 13. 裂口较浅，不到叶长的1/2；叶裂瓣两侧近于对称，裂瓣近同形 | 2. 细裂瓣苔属 <i>Barbilophozia</i> |
| 14. 植物体细小 | 5. 小广萼苔属 <i>Tetralophozia</i> |
| 14. 植物体粗大 | 2. 细裂瓣苔属 <i>Barbilophozia</i> |

Key to the genera of Lophoziaceae

| | |
|---|---------------------------|
| 1. Leaf apex mostly unlobed | 2 |
| 1. Leaf apex lobed | 4 |
| 2. Ventral leaf base conjoint, not overlapped | 9. <i>Syzygiella</i> |
| 2. Ventral leaf base overlapped | 3 |
| 3. Trigones with obvious tri-astral figure | 8. <i>Denotarisia</i> |
| 3. Trigones without tri-astral figure | 10. <i>Gottschelia</i> |
| 4. Leaf apex mostly bilobed | 5 |
| 4. Leaf apex mostly trilobed or quadrilobed | 11 |
| 5. Leaf margin reflexed, especially at ventral part | 1. <i>Anastrepta</i> |
| 5. Leaf margin somewhat concave | 6 |
| 6. Sinus descending to 2/3~3/4 of leaf length | 7 |
| 6. Sinus descending to 1/2 or less than 1/2 of leaf length | 8 |
| 7. Trigones obvious; shoot sticking out from ventral part of stem | 6. <i>Anastrophyllo</i> |
| 7. Trigones absent; shoot dichotomy | 11. <i>Sphenolobopsis</i> |
| 8. Underleaves absent | 9 |
| 8. Underleaves present | 10 |
| 9. Plants rigid, leaves obviously concave or longitudinally bi-folded | 6. <i>Anastrophyllo</i> |
| 9. Plants delicate, leaves not concave | 4. <i>Lophozia</i> |
| 10. Leaves subtransversely inserted, cilia attachments usually present at ventral part of leaf margin | 2. <i>Barbilophozia</i> |
| 10. Leaves obliquely inserted, cilia attachments absent | 4. <i>Lophozia</i> |
| 11. Leaves mostly trilobed | 12 |
| 11. Leaves mostly quadrilobed | 14 |
| 12. Underleaves present | 13 |
| 12. Underleaves absent | 3. <i>Tritomaria</i> |
| 13. Sinus deep, descending to 4/5 of leaf length; lobes asymmetrical, dorsal lobe bigger than the ventral one | 7. <i>Chandonanthus</i> |
| 13. Sinus shallow, descending less than 1/2 of leaf length; lobes symmetrical | 2. <i>Barbilophozia</i> |