

王邈達著

漢方簡義

鴻臚署



王邈達著

漢方簡義

謁遠署



內容提要

此書以簡單之辭。簡要之旨。釋明張仲景一百十三方之精意。故名漢方簡義。內容分析藥物作用。如何而合成方劑。如何而合於病證。且一藥之加減。與用藥份量之輕重。俱有一定之規範。書中闡明一方可治數病。數病同用一方之理。以便後學見方即可識病。見病即可處方。

茲因再版。根據白雲門本。爲通行本所遺佚者。尙有湯方三急與解釋。附刊於卷末。是則傷寒不止一百十三方。實有一百十六方云。

漢方簡義

書號：0427 開本：787×1092 / 25 印張：5.28 字數：78千字

王 遷 達 著

新醫書局出版

(浙江省書刊出版業營業許可證出字第002號)

· 杭州馬市街書園弄四號 ·

總經售：上海圖書發行公司

· 上海山東中路一二八號 ·

新醫印刷廠印刷

1955年11月第一版 1956年3月第二次印

印數：4,001—6,000 定價：六角七分

漢方簡義序

予讀素問。謂古之治病者。唯移精變氣可祝而已。此猶佛氏之觀想持咒。無假於藥石。今所謂精神治療者也。又覽異法方宜論。謂東方之民治宜砭石。西方之民治宜毒藥。北方之民治宜灸焫。南方之民治宜九鍼。中央之民治宜導引按蹠。是五方之民俗異。其受病亦異。治之亦各有宜。乃近於今之所謂地方病者。大抵陵澤水土風氣既殊。人之居處飲食嗜欲亦別。故疢疾所生。既有方域時代之不同。而湯液醪醴之法。古今之變。亦多而難究。以時人之言概之。則祝由專爲精神作用。導引按蹠屬於生理作用。鍼砭灸焫屬於物理作用。而湯液醪醴。則爲化學作用。凡其術足以愈病者。皆可任之。不必獨重經方也。漢志經方十一家書。皆亡佚。隋志始錄張仲景方十五卷。張仲景療婦人方二卷。初無傷寒金匱之目。世傳王叔和孫思邈王嘉林億之所校錄。慮皆後人綴輯而成。然中土良工。必以仲景爲不祧之祖。則以古法存焉耳。自千金外臺出。病益繁。方益雜。爾後南宋局方。及金元四家以降。人自爲說。其流益紛。學者莫知所擇。故醫家之好古者。必原素問。宗仲景。以其精約。爲不可勝用也。吾友王君邈。達精於醫。標仲景爲漢學。退孫思邈爲唐學。六十以後。本其治病經驗之所得。取仲景方。各爲疏釋。命曰漢方簡義。以示予曰。子其爲我序之。予雖好方伎。而實未暇博涉。平日於柯韻伯尤在涇鄒潤安之書。皆未能究心。老而忘事。所收醫書。亦經亂亡失。王君書。留置几案間。經月而未能畢讀。然信王君之篤嗜仲景。其言必不苟且。不爲枝蔓之辭。題曰簡義。其不違精約之旨。可知也。王君更能揭槧漢方。發揮古義。此其志尤足多者。予謂世

漢方簡義馬序

間病苦之本。不在形體。乃在五志六情。是非湯液醪醴之所能療。非返之恬淡。不能禦賊邪。方且就王君進而求之。無方之書。然應病與藥。十全爲上。不可失一。微王君。固不足以與此。醫本仁術。非仁人不能任。王君拯人疾苦。夙具深心。其爲術。將有大於此者。然則此書。特其嚆矢焉耳。丙戌十一月馬溫翁。

漢方簡義自序

漢方者。漢醫聖張仲景先師所立之方也。方以漢稱。所以別中外分時代也。簡義者。以簡單之辭。簡要之旨。釋明醫聖立方之精意。故名漢方簡義。嗟乎。儒家僅知孔聖而不識孔子之修己教人。醫家僅知醫聖而不明仲景之立方活人。良可慨矣。去夏著仰觀俯察與地理辨正揭隱成得仲弟曉籟自香島來書。以余研究醫方已五十餘年。不可無著述以啟後學。此所以有漢方簡義之作也。書成即以釋此書之命名。與著此書之起意。以爲序。公元一千九百四十二年壬午春王邈達序於時中精舍。

漢方簡義凡例

漢方簡義凡例

一、是書既名漢方簡義。故先列方而後序病。至說義理處。則先釋病而後釋方者。本仲聖因病立方之旨。以杜後世議方不議病之流弊。

一、是書之釋病。本高漢峙先生所著之傷寒尙論辨似以爲言。故立方之先後。亦依尙論篇爲次序。間有先後未妥者。僅於該條下辨明之。

一、是書之釋方。本鄒潤菴先生所著之本經疏證。以立說。故於一百十三方。所用藥品之性味。及主治大略。先立一表。以便與本經相印證。

一、是書耑取高鄒二先賢之言。以釋病釋方者。因自來註解傷寒論。與本草經者。不下數百家。惟二先賢之言。最爲詳晰純正。非有所阿好也。幸勿以鮮見寡聞。與剽竊陳言。見哂。

一、是書更附各方症治於後者。以明一方可治數病。與數病同用一方。均有不易之理。在以便後學。見方即可識病。見病即可處方之微意。勿以繁複視之。

傷寒論一百十三方所用藥品性味及主治大略表

以各方先
後爲次序

桂枝	性溫。味辛。無毒。主通陽而疏衛。
芍藥	性平。微寒。味苦酸。有小毒。主破陰而和營。
甘草	性平。味甘。無毒。主寒熱邪氣。解百藥毒。
薑	性微溫。味辛。無毒。主頭痛鼻塞。欬逆上氣。止嘔吐。能解表。
大棗	性平。味甘。無毒。主安中養脾。補中益氣。和百藥。
豬苓	性平。味甘苦。無毒。主解毒利水。卻濕化濕氣。爲生氣。
澤瀉	性寒。味甘鹹。無毒。主風寒濕溼。消水。養五臟。益氣力。
茯苓	性平。味甘。無毒。主胸腹逆氣。利小便。止消渴。
桂	性溫。味辛。無毒。主養精神。和顏色。爲諸藥先驅。通使。今稱肉桂。
白朮	性溫。味苦甘。無毒。主風寒濕。除熱。消食化痰。
附子	性溫。大熱。味辛甘。有大毒。主治風寒欬逆。破癥堅積。聚溫中。
人參	性微寒。微溫。味甘。無毒。主補五臟。安精神。定魂魄。除邪氣。
乾薑	性溫。大熱。味辛。無毒。主欬逆上氣。溫中。止血。腸澼下痢。能守中。

葛根	性平。味甘。無毒。主消渴大熱。開腠理。生根汁。大寒。療壯熱。
芩朴	性平味苦。無毒。主諸熱。黃疸。腸澼。瘻皮。熱。小腹絞痛。
黃連	性寒。味苦。無毒。主熱氣目痛。腸澼。調胃厚腸。婦人陰腫痛。
厚朴	性溫。味苦。大溫。無毒。主風寒頭痛。寒熱。消痰下氣。止嘔。止痢。
杏仁	性溫。味苦。甘。有毒。主欬逆上氣。喉痙。頭痛。解肌。
桃仁	性平。味苦。甘。無毒。主瘀血。欬逆上氣。消癰瘕。通月水。止痛。
大黃	性寒。味苦。大寒。無毒。主下瘀血。破癰瘕。積聚。調中化食。
芒硝	性大寒。味辛苦。無毒。主五臟積聚。破留血。通經脈。利二便。
水蛭	性平。微寒。味苦。鹹。有毒。主逐瘀血。破血癰。積聚。利水道。
蟲蠶	性微寒。味苦。有毒。主逐瘀血。破積聚。堅痞。利血脈。九竅。
芫花	性溫。味辛。苦。有小毒。主欬逆上氣。咽腫。消胸中痰水。
甘遂	性寒。味苦。甘。大寒。有毒。主大腹癥瘕。留飲宿食。利水道。
大戟	性寒。味苦。甘。大寒。有毒。主十二水。腹滿急痛。皮膚腫痛。
葶苈	性寒。味辛苦。大寒。無毒。主癥瘕。積聚。結氣。通水道。
麻黃	性溫。味苦。無毒。主中風傷寒。發表去熱。出汗止欬逆上氣。

膠 馄 性微溫。味甘。無毒。主補虛乏。止欬。去血如蜜而稀者。名馄。

乾者、名鶴。白而堅、名糖。抽

禹餘糧 性寒。味甘。無毒。主欬逆。寒熱煩滿。血閉癥瘕。小腹痛。

五味子 性溫。味酸。無毒。主養氣。欬逆上氣。強陰。益男子精。

石 膏 性微寒。味辛。大寒。無毒。主中風寒熱。口乾舌焦。腹痛。

半 夏 性平。味辛。有毒。主寒熱下氣。咽喉痛。欬逆。消痰。生熱、微寒。

赤石脂 性大溫。味甘。酸無毒。主養心氣。療腹痛。澁下痢。赤白。小便利。

柴 胡 性平。微寒。味苦。無毒。主心腹去腸胃結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。

枳 實 性寒。味苦。酸無毒。主大風在皮膚。苦痒。除寒熱。結止痢。

旋覆花 性溫。味鹹。甘有小毒。主結氣。脅下滿。驚悸。除水去五臟間寒熱。

代赭石 性寒。味苦。甘無毒。主賊風。腹痛。邪氣。除五臟血脉中熱。止赤沃。

括囊實 性寒。味苦。無毒。主胸渾。悅澤人面。除結痛。渾阻。逆搶。

龍 骨 性平。微寒。味甘。無毒。主欬逆。泄利。膿血。養精神。定魂魄。安五臟。

牡 蠟 性平。微寒。味鹹。無毒。主傷寒。熱營衛虛。止汗。止渴。固帶。

鉛 丹 性微寒。味辛。有毒。主吐逆反胃。驚癇癲疾。除熱。下氣。止小便利。

生 地 性寒。味甘。苦。無毒。主傷中。逐血。除寒熱。積聚。補內傷。不足。

阿膠	性平。微溫。味甘。無毒。主心腹內崩、腰腹痛。女子下血。安胎。
麥冬	性平。微寒。味甘。無毒。主心腹結氣。傷中。傷飽。胃絡血。絕定肺氣。
麻子仁	性平。味甘。無毒。主補中益氣。中風汗出。利小便。復血脈。
酒梔子	性大熱。味苦。甘。辛。有毒。主行藥勢。殺百邪惡毒氣。
香豉	性寒。味苦。大寒。無毒。主五內邪氣。胃中熱氣。心胸大小腸大熱。
赤小豆	性寒。味苦。無毒。主傷寒頭痛。寒熱。煩躁。渴。喘吸。
連翹根	性平。味甘酸。無毒。主下水腫。止洩痢。利小便。下腹脹滿。
連翹葉	性平。味苦。無毒。主寒熱。鼠瘻。癰。癧。腫。惡瘡。結熱。即連翹
梓白皮	性寒。味苦。無毒。主熱去三蟲。
茵陳蒿	性平。微寒。味苦。無毒。主風濕寒熱邪氣。熱結黃疸。
柏皮	性燥。氣寒。味苦。無毒。主五臟腸胃中結熱。黃疸。腸痔。止洩。
蜀漆	性平。微溫。味苦。無毒。主瘧。及欬逆。寒熱。腹中癥瘕痞結。
細辛	性溫。味辛。無毒。主欬逆。頭痛。風濕。渾。痛。能提出依附津液之風寒。
蕘花	性寒。味苦。有毒。主傷寒溫瘧。去十二水。療痰飲欬嗽。
知母	性寒。味苦。無毒。主消渴。熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。

類米	性平味甘苦無毒主益氣止煩止洩。
吳茱萸	性溫味辛大熱有小毒主溫中下氣止痛去痰冷逆氣。
滑石	性寒味甘大寒無毒主身熱澀澀利小便瀉腸胃中積聚乳難。
蜜	性平味甘無毒主心腹邪氣止痛解毒養脾除煩和百藥。
豬胆汁	性寒味苦無毒主傷寒熱渴解斑貓羌青毒潤大腸。
括蔞根	性寒味苦無毒主消渴身熱補中安虛絕續傷。
瓜蒂	性寒味苦有毒主大水欬逆上氣及食諸果皆吐下之。
葱白	性寒味辛無毒主傷寒寒熱能出汗。
人尿	性寒味鹹療寒熱頭痛溫氣童男者尤良能通水道止吐血。
桔梗	性微溫味辛苦有小毒主胸脅痛如刀刺腹滿腸鳴療咽喉痛。
鷄子黃	性微溫氣厚味鹹有涵淹孕育及安定神魂之功。
豬膚	性寒滋潤能治上焦虛浮之火且有滋腎清胃之功即豬肉之皮外垢及內脂去
白粉	性微寒味甘微苦無毒主益津除腸胃中痼熱即括蔞根磨粉一名瑞雪。
苦酒	性溫味酸無毒主癰腫散水氣殺邪毒能軟堅即米醋。
鷄子白	性微寒有解散浮陽之效。

薤白	性溫而滑。味辛苦無毒。主開胸痞。洩痢下重。
烏梅	性平味酸無毒。主下氣除熱滿。安心止肢體痛。偏枯不仁死肌。
蜀椒	性溫味辛大熱。有毒。主邪氣欬逆。溫中能降胃升脾。
當歸	性溫味甘辛大溫無毒。主欬逆上氣。溫中止痛。止客血肉塞。
黃蘖	性寒味苦無毒。主五臟腸胃中結熱。黃疸。腸痔。止洩利。
通草	性平味辛甘無毒。主去惡蟲。除脾胃寒熱。通利九竅。
升麻	性平味甘苦微寒無毒。主解百毒。中惡腹痛。頭痛寒熱。風腫。
葳蕤	性平味甘無毒。主中風暴熱。跌筋結肉。諸不足。即女萎。
天冬	性平味苦甘大寒無毒。主諸暴風。強骨髓。
白頭翁	性溫味苦無毒。主溫瘧。狂易。寒熱癥瘕。積聚逐血。止痛。
秦皮	性微寒味苦無毒。主風寒濕痺。除熱。男子少精。婦人帶下。
商陸	性平味辛酸有毒。主水脹。疝瘕。療腸中邪氣。
海藻	性寒味苦鹹無毒。主癰瘤。氣破散結。氣下十二水腫。
竹葉	性平味苦大寒無毒。主欬逆上氣。除煩熱。風瘻。喉痺。嘔吐。
燒視	主陽陰易病。女病易男。用女子視。男病易女。卽須男子視也。

上列藥物共八十有八品。爲傷寒論一百十三方中所應用者也。因醫者欲明處方之理。法須先明藥物之性味及主治。然後對於各藥之所以配合成方。與處方之所以能治各病者。始得一一相融合而無錯誤。故先立此表冠於一百十三方之首。以便閱者之稽核云。

著者識

漢方簡義目錄

馬序自序凡例

藥品性味及主治大略表

一一七

- 太陽上篇共十六方 桂枝湯 五苓散 真武湯 桂枝加附子湯 桂枝加桂湯更加桂方 桂枝入參湯
葛根黃芩黃連湯 桂枝去芍藥湯 桂枝去芍藥加附子湯 桂枝加厚朴杏仁湯 桃仁承氣湯
抵當湯 調胃承氣湯 十棗湯 大陷胸湯 大陷胸丸
- 太陽中篇共三十七方 麻黃湯 小建中湯 茯苓甘草湯 禹餘糧丸 芍藥甘草附子湯 新加湯 麻黃
杏仁甘草石膏湯 桂枝甘草湯 茯苓桂枝甘草大棗湯 厚朴生薑甘草半夏人參湯 生薑瀉心湯
甘草瀉心湯 大黃黃連瀉心湯 附子瀉心湯 半夏瀉心湯 赤石脂禹餘糧湯 大柴胡湯 旋覆
代赭湯 小陷胸湯 柴胡桂枝湯 柴胡加龍骨牡蠣湯 灸甘草湯 四逆湯 梔子厚朴湯
乾薑湯 梔子豉湯 梔子甘草豉湯 梔子生薑豉湯 乾薑附子湯 茯苓桂枝白朮甘草湯 抵當
丸 桂枝附子湯 桂枝附子湯去桂枝加白朮湯 甘草附子湯 麻黃連翹赤小草湯 苦陳蒿湯
梔子柏皮湯
- 太陽下篇共十五方 大青龍湯 真武湯 桂麻各半湯 桂枝一越婢一湯 桂枝二麻黃一湯 桂枝湯
去桂加梔芩白朮湯 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯 桂枝甘草龍骨牡蠣湯 甘草乾薑湯
芍藥甘草湯 梔芩四逆湯 黃連湯 小青龍湯 白虎加人參湯 白虎湯
- 一一八一四九 一一六三

漢方載義 目錄

二

陽明上篇共四方

小承氣湯 調胃承氣湯 吳茱萸湯

豬苓湯

六四一六八

陽明中篇共四方

蜜煎導方 豬胆導方 大承氣湯

麻仁丸

六九一七二

陽明下篇無正方

少陽全篇共八方 小柴胡湯 柴胡桂枝乾薑湯 桂枝加葛根湯

葛根湯 葛根加半夏湯

黃芩湯

七二一七四

黃芩加半夏生薑湯 瓜蒂散

葛根湯

葛根加半夏湯 黃芩湯

七二一八一

太陰全篇共二方 桂枝芍藥湯 桂枝加大黃湯

八一—一八三

少陰前篇共六方灸穴考三 麻黃附子細辛湯 附子湯 麻黃附子甘草湯

吳茱萸湯

白通湯 白通加

豬胆汁湯 通脈四逆湯

八四一九一

少陰後篇共八方 黃連阿膠湯 桃花湯 豬膚湯 甘草湯 桔梗湯 半夏散及湯

苦酒湯

四逆散

九二—一九七

厥陰全篇共六方 烏梅圓 當歸四逆湯 當歸四逆加吳茱萸生薑湯 麻黃升麻湯

乾薑黃連黃芩人

九八—一〇三

傷寒過經不解共四方三方釋已上見 柴胡加芒硝湯

一〇四—一〇五

差後勞復陰陽易病共六方 枳實梔子豉湯 牡蠣澤瀉散 理中圓

竹葉石膏湯 燒視散

一〇六—一〇

漢方用藥分量舉一以例其餘

一一一

漢方補遺共三方

一〇六—一〇

漢方用藥分量舉一以例其餘

一一一

漢方簡義

古列王邈達著

傷寒論太陽上篇 共十六方

桂枝湯

桂枝三兩

芍藥三兩

甘草一兩

生薑三兩切

大棗十二枚劈

右五味。㕮咀水七升。微火煮取三升去渣。適寒溫服一升。服已須臾。啜熱粥一升。餘以助藥力。溫覆令一時。許遍身熱。微如有汗者佳。不可令如水流滴。病必不除。若一服汗出病差。停後服不必盡劑。若不汗。仍服依前法。又不汗。後服小促役其間。半日許令三服盡。若重者。一晝一夜服。周時觀之。服一劑盡。病症猶在者。更作服。乃服至二三劑。禁生冷黏滑肉麵。五辛酒酪臭惡等物。

此湯爲太陽中風。陽浮陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。嗵嗵惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者之主方。太陽經名。爲手足六經之一。主人身之營衛。營者。有經營於內衛者。有護衛於外之義。卽氣血之精粹而爲作用者也。其隧道從目內眞。精明穴上頭。歷項後由夾脊而行足外廉之後側。故病則見頭痛。項強。脊緊。腰痠。而腿痠其轄。周身之表。故外皮發寒熱。因內連肌內。且易動陽明之壯熱也。其署爲胸次。故表邪上入。則