




黃陂縣麥地壩的萝卜

任伯黃編著

湖北人民出版社

黃陂縣麥地壩的萝卜

任伯黃編著

湖北人民出版社

1956年·武漢

黃陂縣麥地塢的萝卜

任伯黃編著

*

湖北人民出版社出版（武漢解放大道332號）

武漢市書刊出版業營業許可證新出字第1號

新華書店武漢發行所發行

武漢市國營湖北印刷廠印刷

*

787×1092 $\frac{1}{32}$ 開· $\frac{25}{8}$ 印張·7,000字

1956年12月第1版

1956年12月第1次印刷

印數：1—1,000

統一書號：T16105·28

定 價：（5）0.06元

目 錄

麥地壟的蘿卜·····	1
是“衣飯碗”，不准外傳·····	3
打开窗子說亮話·····	4
一 选种·····	5
二 整田和施底肥 ·····	6
三 播种·····	8
四 田間培育和管理 ·····	9
五 防治病虫害 ·····	12
六 收穫和儲藏 ·····	15
大家來学好經驗·····	16

蘿卜是一種很好的副食品，也可以當做水果的代食品。常聽到老人說：“蘿卜進了城，藥鋪要關門；蘿卜上了街，醫生無買賣”。這是因為，蘿卜能夠“寬腸順氣”，能夠幫助消化，能促進人體的“新陳代謝”。因此，多吃蘿卜，就能增進人體的健康。

這裡介紹一種特別好吃的蘿卜，以及它的耕作技術和栽種方法。

麥地壩的蘿卜

這種蘿卜產於黃陂縣木蘭山西邊的黃潭鄉麥地壩。

只要是黃陂人，都會知道麥地壩的蘿卜的名聲。

它的個子不很大，一般有七、八兩一個，

大的也有一斤多重。它和別的蘿卜不同的特点是：皮薄肉嫩水份多，而且具有香甜脆口的優良品質。不論是生吃熟食，或者是泡成鹽蘿卜，都很美味。

它的產量，在山地來說，是非常可觀的。一般畝產量有6 000斤（淨蘿卜，菜在外。下同），好的能達到8 000—12 000斤。像麥地壩新華農業生產合作社的生產委員楊先國，每年都要種兩畝田的蘿卜，每年僅賣蘿卜的錢就有400元（畝產8 000斤，每斤價2分半），比他所有的5畝5分田的水稻產值227.5元（畝產稻谷900斤，每斤價5分）还要多出172.5元。賣蘿卜的收入，成為他改善生活的主要來源。1954年青黃不接的時候，農民楊先禮的生活非常艱難，可是他在1953年蘿卜收穫的季節里，晒了一滿睡櫃的蘿卜干，使他勝利地渡過了春荒。因此，麥地壩的蘿卜，就成為麥地壩人的主要作物了。

是“衣飯碗”，不准外傳

可惜这样好吃的蘿卜，收入又这样大的庄稼，只能出產在麥地壩和它附近的几个小壩子里。虽說附近一帶的農民都以非常羨慕的心情，想求得这一套种蘿卜的經驗，却总像神話一样地被蒙蔽着。

兩百年來，为什么麥地壩的農民所种的蘿卜总是“高人一等”呢？这是有來由的。在旧社会里，个体農民在經營自己的或是地主的小塊土地上，生活是沒有保障的。一旦劳动人民創造出一种独特的、好的生產經驗之后，就会增加了一道保衛自己生活的“屏障”。如果把這個經驗傳开了，在旧社会里，就又会失掉了这个“屏障”。正如这个鄉的党支部書記黃富洲同志在从前所說的：“我們从前是憑智慧活下來了。地主能够買去我們的田，就不能買走我們的智慧。”可想而知，为了生存，这个歷代祖傳的、又經過逐代生產实践考驗过的种蘿卜的經驗，就成

为麥地壩的劳动人民的“衣飯碗”。这怎么能够傳給別人呢?!像楊先國在过去也常这样說:“这个經驗不能告訴別人。人家都种,就不值錢了。”就这样,麥地壩的農民把这个經驗一代一代地傳了五代,渡过了一代比一代更艰苦的生活难关。

說到这里,还有一个笑話:現在的中共羅漢寺區區委書記杜善良同志是那里的人,他在1951年由土地改革工作隊轉为脫產干部以后,在人家的詢問下,把这个种蘿卜的經驗只是簡單地、还留下一手地傳到了木蘭山的东边,还被壩里的人叫着罵了一頓。

打开窗子說亮話


合作化以后,人們的思想开朗了。在这个时候,作者訪問了这个鄉的党支部書記黃富洲同志和几个有經驗的農民。他們毫不保留地、把麥地壩人种蘿卜的經驗整套地介紹出來。在介紹中,他們还說:“自解放以后,就應該把这个

經驗傳開。可惜我們受到黨的教育太少，思想總跟不上時代。現在保守思想再也站不住腳了。”

說起來，這個經驗並不是那樣神秘。只要把麥地壩人種蘿卜的先進經驗介紹出來，弄清了蘿卜栽種的栽培技術，就可以擴大栽培了。

一 選 種

麥地壩的農民喜歡用又白又光的“泥棗”（是插臘的用品，上端稍小，下端稍大）型的蘿卜做種（看第一圖）。蘿卜經過移栽成熟脫粒晒干



第一圖

以后，就用隔篩進行粒选。在篩时，篩去細粒和雜粒，选出粒大而均匀的萝卜种子做种。这样的种子所生的幼苗，就特別齐壯。

二 整田和施底肥

割了头季谷以后，选择朝陽的“油沙土”或“白扇土”的畝田進行起坂。这种田的土質輕松，排水好，加上有充足的陽光，就能够長出好的萝卜。起坂时要搶住“火色”：犁湿了，爱長草、爱結田；犁干了，田土不容易耙細，苗就生長不齐。犁了以后要晒三、四天，然后一次耙細。如果不是一次耙細的田，到以后再耙时，就失掉了“火色”，不容易再耙細了。

田土被耙細以后，就用稻草把干牛屎或糠头、爛草包成大水桶一样的茅包，每畝田需要这样的茅包20个，把它均匀地放在田里，用田里的細土把茅包埋起来，堆成土墩子。墩子堆成以后，就把茅包燒着，進行熏土（看第二圖）。熏土的好处，是能够把土熏松，能够殺虫，并且能供应適當的肥料。点火3天以后，就把每个墩子在原地扒开，在每个墩子上潑一桶腐熟了的大糞和兩担漚好了的牛欄糞（看第三圖），和



第二圖

土一起拌勻散開，再犁一道耙一道。田土經過第二次耙細以後，每畝田再下100斤碾細了的豆餅或麻餅，下的餅要撒均勻。下餅后再犁一道耙一道。



第三圖

經過三犁三耙和施足底肥以後，就起溝開廂。廂子要窄，以便散苗、除草、除蟲和澆水；溝要深，以便排水或引水灌溉。起溝開廂以後，就用鄉耙把每塊廂子鄉成略帶“龜背”形，以便洩水。

三 播 種

在黃陂北部，播種季節有個歌訣：“處暑蕎麥白露菜”。到白露時就要開始播種，這是掌握物候期的經驗，每畝田需用1斤4兩蘿卜子。播種時，種子要隨田里的細土拌勻，按照1寸一行進行條播（看第四圖）。條播的好處，是便于散



第四圖

苗、定苗和除草、除虫、澆水、施追肥。

四 田間培育和管理

蘿卜生長到4匹叶的時候，就要按照6寸远一株的株距一次留下整齐肥壯的苗（看第五圖）。一定要一次散成功、一次定好苗。



第五圖


这个操作方法和一般農民有所不同。一般農民栽種蘿卜，在散苗時怕虫害缺苗，喜歡留密，一次又一次地散苗；等苗長到四、五寸時才定苗。这个作法是不好的。因為，多次間苗雖然可以預防虫害，但是，這是一種消極的辦法；雖然能夠吃上幾次鮮嫩可口的蘿卜菜，可惜田里的肥料就被多餘的苗消耗掉，影響到蘿卜的生長。

定苗以后就开始薅草。因为幼苗的根不稳，只能浅浅地薅松一層表土。薅后晒一天，就点一道腐熟的清水糞催苗生長。以后不管落了雨或者天旱潤了水，凡是田里的土湿了一次以后，不管有草無草，就要中耕一次松一次土。

这个作法也是一般農民不習慣的。一般農民只是見草就薅，沒有草就不薅；懶一点的就是有草也不肯动手。这是不好的。我們應該把“秧薅三道出好谷，棉薅七道白如銀”的道理搬到栽种蘿卜上來。只有这样，長的蘿卜才能“皮薄肉嫩水份多，香甜脆口滿人意”。

如果碰到天旱，必須注意随时潤苗，讓苗不渴水。潤苗有兩種方法：一是挑水潤苗；一是放水或車水灌滿溝，然后用瓢在溝內舀水潤苗（看第六圖）。潤苗时，瓢要拿低些，力气要用勻，讓水潑出去像雨点一样，免得潑伤幼苗。潤水的時間應該在早晚進行，中午天气热，潤水后会使苗發病。潤苗时絕不能采取放水或車水淹苗的办法。

这也是和一般農民在耕作上所不同的地方。一般農民只圖簡單，都習慣淹苗。不懂得苗被淹一次，就等于受一次漬，使田土变成結板，




第六圖

对蘿卜根系的生長是不利的，常常会使蘿卜長不大、毛糙，或是長得奇形怪狀，影响蘿卜的品質。

蘿卜叶長到4寸深时，再追施一道腐熟的清水糞，催蘿卜生長。最好是点小糞，收效更大。在長蘿卜后，就不要再施追肥，以免蘿卜發生黑色斑点和變質。等蘿卜長到湯圓大时，就要深耨和培土，不要使蘿卜露在外面（看第七圖）。

这个作法也和一般農民不同。一般農民不習慣深耨培土，讓蘿卜自流生長。深耨培土有这样的两个好处：一來使蘿卜能够全身埋在松肥的土内吸收养分，便于蘿卜迅速成長；同时可



第七圖

以使蘿卜沒有青頭，不辣口、不泡頭。

五 防治病虫害

虫害是蘿卜的敌人，尤其是天旱或在“秋老虎”时期，更容易發生虫害。一般危害蘿卜的害虫有4种：

1. 綿心虫：有的叫菜螟，又叫旋心虫。多半在蘿卜幼苗期間發生，天旱时更容易蔓延。这种虫首先在菜心內吐上絲，使菜叶綿攏，然后在絲下偷吃菜心。对这种害虫要及早防治，如果等到它藏到絲下以后再治，就不容易用藥來消滅了。到这个时候，就只能用手來捉殺。用手捉，不光是效率低，效果也差多了。

2. 猿叶虫：它的幼虫和成虫都危害蘿卜的生長。嚴重時能够把叶子吃光，咬破蘿卜皮，使蘿卜變得又辣又苦，甚至造成減產和不收。

3. 蚜虫：有的叫蚰子，有的又叫天影子。發虫時只見叶子上一片黑點子，用手一捏，就有褐色水漿。如果叶子上有了這種虫，就應該打藥把虫殺死，免得傳染。

4. 青虫：有的叫菜白蝶，也是危害蘿卜的一種害虫。

過去，麥地壩的農民對這些虫害的發生，是沒有很多辦法的。他們一方面辛辛苦苦地進行手工捕捉；一方面口口聲聲地怨天尤人。現在就不同了。對這四種害虫，都有了科學的防治方法。

防治的農藥分粉劑和水劑兩種：

如果用粉劑，就用3%的滴滴涕粉或6%的六六六粉進行直接噴洒。用砒酸鉛或者用砒酸鈣進行噴洒時，每斤藥要加3斤熟石灰粉，拌勻以後再使用。以上4種農藥的用量都一樣，每畝田用2斤就行了。噴洒時，可用噴霧器或裝在稀布袋里，趁早晚有露水時噴洒在叶子上。

如果用水劑，就要用50%的可濕性滴滴涕