

53

87

(存)

農業知識手冊



黑龍江人民出版社印編

編者的話

我省經過平分土地之後，在中國共產黨和人民政府領導之下，經過近三年的大生產，對「生產發家，勤勞致富」有了正確認識，全省人民的生產情緒均十分高漲，打的糧食也較前增多，生產小組也有了一定的基礎。這是我們今後進一步開展生產運動的好條件。但是地力和舊的生產技術水平和耕作方法是有限制的，若生產技術水平與耕作方法總停留在現在的階段上，要想更多的打糧食是不可能的，我們編印的農業生產知識手冊，就正是爲了提高技術與耕作方法而編寫的，就是爲了將生產小組與人民群衆的生產熱情與技術結合起來，達到增加生產、多打糧食，使農民群衆生活過得更富裕；另外也爲了幫助農村工作同缺解決缺乏領導農業生產知識，特別是農業科學知識的缺陷，以便更好的領導人民的生產。

我們相信在農民群衆中是有很多好的經驗，存在的這些經驗，都需要加以提倡、推廣，本書所介紹的方法，大家可參考研究，務使能適合本地情況，達到增加生產、增加財富之目的，也希望各地農村工作者同志，能注意在宣傳新的經驗中，多用具體事例，教育群衆，採取重點示範，逐步推廣的辦法，以克服一部份群衆中的守舊思想。

本書的材料是在東北農業、農業生產、農業叢書等刊物上蒐集的，內容共分爲肥料、選種、防除病蟲害、耕作方法、消除牲畜病、植樹六部份，取材都是着重現在實用方面的，特別是爲了適應我省情況，特請省農業廳寫了適合我省的耕作方法與優良品種部份。這裏一併向執筆參加寫的同志致謝。

使用新式農具是提高農業生產的重要問題，手頭尚缺乏成熟經驗的材料，這是本書最大的缺點，只有留待第二冊時補正了。

目錄

一、積糞

要攢的是那些糞？

上追肥……

(一)

二、選種與浸種

田間選種……

(一一)

怎樣浸種……

(一二)

洋麻種子怎樣留法

(一三)

亞蔬的收獲與留種

(一四)

優良品種介紹

(一五)

三、消滅病蟲害

要想多打糧，就得拔烏米

(二八)

防除病蟲害……

(二九)

烟末肥皂水治蜜蠻

(三〇)

四、改進耕作方法

秋翻地的好處……

(三一)

苞米雜交多打糧

(三九)

抗旱經驗介紹

(四〇)

冬麥

(四一)

春麥秋播

(四三)

五、愛護牲畜、家禽

怎樣治牲口的結症和鼓脹症癩病

(四五)

牲口的孤眼和傷水

(四七)

豫防牲口傳染病

(四七)

怎樣清除馬癩

(四八)

豬的旋毛蟲和囊蟲

(五三)

牲口在夏季容易得的幾樣病

(五五)

喂小鵝和防鵝瘟

(五七)

六、植樹

關於植樹

(五八)

簡易植樹法

(六〇)

裁種耕地防風林

(六一)

一、積糞

要攢的是那些糞？

積肥料是莊稼人經常的工作，能積肥的東西可多啦，碎草朽木，塵土爛泥，骨頭和牲口切下來的蹄子等，都是肥料，只要你常注意，常收拾，保險能積很多的肥。莊戶人最好的積肥辦法，是從副業生產中來積，在冬天沒有莊稼活幹，做點副業生產，一面能賺錢，一面還積肥。譬如做豆腐賣，豆腐能賺錢，豆腐漿能漚糞，豆腐渣能餚豬，餚豬又能攢糞，一舉數得，是莊戶人頂好的買賣。又如開粉坊，一座粉磨要不住下的推，賺的粉渣能供給兩三個牲口當料用，還能餚五六個大豬，淨用粉漿漚土糞，一冬天也能漚二十多大車，牲口欄裏和豬圈裏攢的糞還在外。其餘若開糖坊、打豆油花生油等事情，都是積肥的好買賣。我再把我們要積的肥，簡略的介紹幾項，以供大家參考。

第一廐肥：就是牲口欄的糞，是牲口糞和雜草、敗葉、乾土等的混合物。這種肥料，含有適當的氮、磷、鉀三種養分，不論用在什麼土壤和農作物裏，無不相宜；效力比較慢些，但是能持久，最好是做底糞用，在種地以前，撒在地面上，越均勻越好，然後再把地耕起來，使混入土中，不要叫它暴露出來。廐糞有下邊幾種：

- 1、牛羊糞性冷勁頭大，是慢勁的，種穀子、麥、蔬菜等當底糞合適，可不要往背陰的地裏施。
- 2、驃馬驥糞性熱、勁頭比較快，不論什麼地性，什麼莊稼都能施用，也是當底糞合適。
- 3、豬圈糞性冷勁頭慢，種菸別上豬圈糞，種別的莊稼都可使它當底糞。

應注意的事件：『養牲口不墊欄，等於閒着玩』，這就是說：牲口欄和豬圈裏，或是常拴牲口的地
方，都須要常墊乾土，乾土能把牲口和豬的糞或尿裏的種種養分吸收進去，不使流失。所以墊牲口欄或
墊猪圈的土，越乾越細越好，因為那樣吸收力才能大。

牲口欄裏，出欄墊土，或墊碎草，要每天一次，這樣能多攢糞，牲口也清潔衛生。但每天出的糞，
須搓碎和土摻合在一塊，抬到一定的地方漚着，等漚好了才能使用。最好抬到豬圈裏漚，和猪糞一摻合
，漚好了勁頭更大，沒有猪可弄到糞汪裏漚。

猪圈要每天撒一次乾土，每次不要多撒，因為少撒勤撒，糞才漚得均勻。圈滿了即可向外出，出的
糞當時用不着，還要培起來漚，這樣才能漚的更均勻，不的話還會有生糞。

花生殼壓碎合上土，弄到猪圈裏漚着，在熱天裏被猪踩上十幾天就能漚好。這種肥料種麥和栽地瓜
用，比上棉籽餅還好。

羊欄也要常墊當出，出的糞也要漚着。羊糞頂壯，羊睡覺趴的地方也更壯，地裏要經過羊睡過一次
覺，就跟上上一次土糞。但因為羊糞勁頭大，光上羊糞的地怕旱天，最好和旁的糞摻在一塊上。

雞鴨糞也是最好的肥料，施在瓜地裏，菸地裏，都很合適，黃瓜南瓜也都很喜歡它。但必須漚好晒
乾後，搓碎了再用，要是整施上或鮮施上，不但不壯，還會招蠅蛆。

第二、大糞：就是人的大便，不漚不壯，漚不好還會生虫子咬壞莊稼，（因為沒漚好的大糞，會發
生溫熱，在春秋時天還不暖。害虫都喜歡溫暖地方，所以容易招虫子；上大糞蓋不嚴，蒼蠅產了卵還會
招蛆。）要能漚好了上地，差不多能頂豆餅用。漚大糞的辦法：天天把茅房裏的大糞，撒上一層乾土，
摻合好了出來，培在背陰的地方，外面用濕泥泥好，叫它發熱。漚好的大糞是暗綠色，或是黑褐色，

在熱天八、九天就能漚好，在冷天裏得二十多天才能使用。要放在向陽通風地方，它裏邊含的氮素很容易發揮飛散，就減少了肥料作用、所以放在蔽陰的地方好。

在科學上說，天糞是一種完全肥料，裏面含着氮、磷、鉀三種養分，尤其是氮素更多。上菜類的植物頂有效，對生根、長莖、結果實也有一定的效能。無論上什麼莊稼，用作鋪糞、苗糞、撒糞都行。但新鮮的大糞，是不能上莊稼的，因為它是酸性，對莊稼有害，漚好了的大糞，經過腐爛和發酵，變成城性才好用。

大糞的勁頭多是長葉子（因為含氮素多），所以種菜上大糞合適，種棉花和瓜要少上大糞；因為棉花上多了大糞容易長瘋杈，瓜上多了大糞，葉子長的稠密了，不透風，不透日光，就會不愛結瓜，種菸上大糞也不好，因為大糞裏含着食鹽，長出菸葉子氣味太辣，不愛燃燒，菸灰也是黑的，菸葉烤出來也不好看。

大糞除了和土拌成乾糞使用外，漚好了的淨大糞，兌上水攪好，稀上莊稼效力更快；但在施用前，要加水到稀薄的程度，使莊稼容易吸收，過薄過厚都不合適。使稀大糞上莊稼，注意不要一次施上，宜分幾次施用，如果一次上的多了，土壤不能全部吸收，反會浪費了肥料。因為效力越快的糞，越需要多次施用，特別是上沙土地，更得這樣辦，不的話，糞的養分不及吸收，就會有被雨冲去的可能，一切糞都是如此，不光大糞是這樣。

第三、攢尿：尿也是很好的肥料，三斤漚好的尿，能趕上一斤大糞，十三斤尿能趕上一斤豆餅，生尿不能澆莊稼，也是得漚好了才能頂事。漚尿要注意幾件事：

1、漚尿要使上點豆餅才能漚的快，一百斤尿約使上二三兩豆餅就行。因為施上豆餅。能使尿中

一部份養分細菌發展的快，即是使尿腐爛的快，細菌少了腐爛的不快。

2、在熱天裏漚尿，過兩三天就能漚好，冷天得用五六天的工夫，並須把漚尿的傢什用草圍好，千萬別叫它上了凍。

3、漚尿不要加水，洗臉的肥皂水也不要倒進去，因為肥皂水能妨礙尿的發酵，並能減少肥料的成份，上地勁頭會少。

4、漚尿不要放在有太陽的地方漚，因為太陽晒了，會減少尿的肥料成分。

5、漚好了尿澆地時，可對上兩倍到三倍的水，最好是現澆現對。

人造尿也能頂人尿用，製造人造尿的方法：修一個好尿池子，梆和底都要使石灰泥好（洋灰更好），不叫它向下滲漏尿倒上三挑子水，加上一挑子人尿當引子，再加上一斤豇豆麵子（有說加豇豆麵不如加豆麵的）天天便棍子攪兩三次，在冬天裏六、七天就能發酵發臭，要在夏天裏，兩三天就能發酵，用它澆莊稼，勁頭也不小。又法：用大缸一個，倒上半缸水，對上半缸尿，再加上一斤缸豆麵，等到發酵後，每天可挑出來一挑澆地，當時就對上一挑子水，這樣可以繼續不斷的漚着使用。

沒有傢什積尿，在避道的地方堆上一堆土，將尿澆在土堆上；或是挖一個坑，時常把碎草、落葉、乾土等往裏邊放，家裏的人都向裏邊小便積攢多了，弄出來堆成堆，發酵後上地，能頂糞用。要知道一個人每天撒的尿比拉的屎多的多，許多地方不知道利用尿，把尿隨便澆掉，真是可惜。

尿的成份，除去百分之九十多水以外，其餘都是主要養分，氮佔百分之四、三，磷佔百分之〇、四，鉀佔百分之一、四，對莊稼的生根、長苗，結果實都有很大的幫助。同時因尿裏所含的養分，都是能容易溶解的，莊稼很容易吸收，所以效力又大又快。漚好了的尿澆麥子，勁頭最大，澆旁的莊稼也行。

花生頂喜澆尿，尿澆的蘿蔔，葉子幾天就能發黑，還不招蟲子。有人說：澆尿會鹹，後經農場試驗，證明並不鹹地，尿澆在地土起的一層白色東西，和鹹地裏起的東西不一樣，對於莊稼沒有什麼害處。

第四、漚青草糞，青草糞也叫綠肥，好處很多，能保住地裏的溫度，使它變化的小，還能保全地裏的水分，使地乾的慢，能減少黏土地的黏性，增加沙土地的黏性，使地鬆軟，好耕好種，也都是它的好處。還能減少病蟲害，種麥子上綠肥頂好，茲將漚的辦法及應注意事情，介紹如下：

1、在糞汪裏漚：糞汪裏不斷水，天天把牲口吃剩的青草和割來要漚的草，先晒一下，晒的大半乾後，用鋤頭碎，就弄到汪裏漚着，和旁的糞一塊漚也行。青草晒了以後漚，爛的快，漚的也均勻。但雨大的時候，汪裏的水不要留過多。

2、在地頭上漚：在地頭上挖一個坑，把要漚的青草鋪上一層，就蓋上一層土，這樣一層一層的填滿了坑，最上一層使泥地上，過半月多翻弄一次，翻過即在泥好，等到四十多天就能漚好。但用的時候，要盡力搗碎。最好是下雨時漚，坑裏須要弄上些水。

3、在地裏漚：鋤不好的地，長了很多青草，割完了地裏的莊稼，當時就把地耕起來，青草全部翻到土下，腐爛成糞，能跟上上一次鋪糞。但有害蟲的楂子，這樣耕不相宜。

4、近山的地方：多割些芫花條、山荊子、山槐子、五加皮、貓兒眼、桺柳、烏頭……等，或多採些白蘡蘋和核桃葉漚綠肥，也能除害蟲，也能壯地，一舉兩得。

5、有種子的青草不能漚，因為種子不容易腐爛，上到地裏會多出青草。

6、要漚的青草如果老了，漚時可摻些人尿，這樣草種籽容易爛掉。

7、用晒乾的青草墊欄，牲口能少生病，出欄時，青草和牲口糞一塊出，一塊漚也行。夏天裏雨水

多，乾泥土難得，最好用乾青草墊欄。

8、在糞汪裏漚綠肥，汪滿了就可以出來再漚，不用等着漚好，因為出來堆成堆，住個十天八天的搗一次，還是一樣能漚好，這樣繼續不斷的漚，不就誤工夫，能多漚。

綠肥除上邊說的好處以外，還有許多好處，我再稍舉幾條如下：

1、綠肥上各種莊稼各種地都行，上碱地不能犯碱，勁頭還要大。

2、綠肥勁頭能持久，還能淹地抗旱。

3、綠肥能放出有機酸，使土壤裏不能溶結的養份，變成容易溶解，成為有用的材料。

4、能緩和酸性的土質。

5、漚豆科一類的綠肥，能够積聚氮素。因為豆科植物的根瘤菌，能將空氣中和土中的氮素吸收同化，變成有機物去供養植物。

第五、攢乾灰：咱們做飯燒的草木灰，是一種含碱性的肥料，遇着潮濕，效用就要損失，要把它和屎尿一塊攢糞，起了化學作用，其中有所含的氮素，容易揮散。不但草木灰裏邊的肥料成份有損失，連屎尿中的肥料成份也損失不少。在同樣的氣候裏，加灰的屎尿比不加灰的，要損失肥料成份兩倍還多，天氣越熱損失的越厲害，在夏天裏至少要損失肥料成份在百分之三十以上。所以攢草木灰最好是乾藏起來，千萬不要和屎尿攢在一起。在空閒的地方，砌上一個灰樓子，頂上苫好，不過叫它漏了雨，樓子的上半截旁邊，留一個小口，好往裏倒灰，底下留個小洞，好往外掏灰，不用灰時，就把洞口堵上，這樣就糟蹋不了肥料了。

草木灰是莊稼的主要鉀素肥料，也富於鈣質磷質，土豆科植物和根莖類或菸草等，效力很大。各種

草木灰，以幼小植物的枝葉的灰、鮮葉子的灰、或堅硬木料的灰比較好，火力太強的灰帶灰白色，力量小，帶暗灰色的力量大。灰裏邊含的鉀素很容易溶解在水內，所以最好乾攢，倒在圈裏或糞溝裏是不相宜的。

草木灰的勁頭，是往植物桿上和枝上吸收的，能增加植物的纖維質，促成莊稼早熟與豆餅等油性肥料混合施用，能幫助分解油性，使肥料發酵快，還能幫助多長澱粉，種麥、榛子、地瓜等。施用它合宣。還有治蜜虫子的效用。種棉花時，棉花種上搓草木灰有效，拌在肥田粉裏上追肥也很好。

第六、骨肥：是重要的燃素肥料，內中含燃素百分之二十四到百分之二十五。雀鳥骨頭最好，獸骨次之，水田、澆地、膠泥地、碱地等均可施用。上在棉、麥、稻、榛子、穀子，高粱、地瓜、花生、蔬菜等地裏都行。性慢，效力持久，作基肥比較好，還可和圈糞混合上，須要早動手施用，晚了就會不及時。骨肥製造法很多，茲介紹幾項如下：

1、燒骨灰：挖一個圓坑，坑底下鋪上木柴，點着火，上邊一層一層的架上骨頭，架滿了圓坑爲止，頂上用碎草蓋好，再使濕泥上，要泥的厚些，上邊留上三個氣眼，不要太大，太大了會透火，也不要過小，過小了會閉火。火一燒，上邊泥的泥就成了硬蓋，等到氣眼裏冒的煙變成青色，趕緊把氣眼閉上，用悶火燒成骨炭。過半天的時間，把骨炭弄出來碾碎，就成了頂好的肥料。

2、燒骨炭的簡單法，薰糞的時候，把底下放上雜草和木柴，再放上骨頭，上面再蓋上雜草和木柴，然後埋好封嚴，用火點着（點火的辦法參看薰糞條），過兩天去看，上邊被燒塌陷了窟窿，把上邊的土壤進去，再把地裏土邊罷一罷，這樣燒上幾天，添上幾次土，火滅了把土刨開，骨頭燒成灰白色，土也薰成黑的了，都成了好糞。須要注意：燒骨炭不要燒的太厲害了，燒的骨炭變成白色，那就是燒過了

火，燒過了火的骨炭不壯。

3、缸漚法：把骨頭放在鍋裏用火煮，燒開了鍋後，還得再煮三兩分鐘，撈出晒乾，砸成碎塊，放在一個大缸裏，每五十斤碎骨加上一百斤水，十五斤生石灰，五十斤草木灰，攪拌均勻後，把缸封好，經過七、八天打開缸看看，拿出一塊碎骨頭，用手一捻就成了細粉，那就是漚好了。全部取出，用碾壓碎，同時加上些牲口糞。這五十斤就可上一畝地。

4、坑漚法，在地上一個刨深坑，坑底先鋪上一層草木灰，然後把骨頭排上一層，上面再放一層石灰，再加上一層草木灰，一層骨頭，一層石灰，這樣一層一層的放好，最上一層，放一層石灰，再墊上一層爛樹葉，然後放上水，用土封好，三、四個月後即可漚好，壓細便能上地。

5、油骨粉：五十斤骨頭加十斤石灰和十斤木灰，擋在鍋一塊煮，把油煮乾淨，撈出來晒乾砸碎，就能上地。上麥子頂好。

6、粗骨粉：就是把骨頭晒乾直接打碎施用。這種骨粉上地見效慢，矮菓木樹比較合適。但是十斤粗骨粉加上五斤草木灰，拌均勻後施用，見效比較快，勁頭也比較大。

7、膠骨粉，把鮮骨頭放在鍋裏煮，把油煮出來，再放到石灰水裏泡五、六天，撈出晒乾打碎，就成了肥料。上地效力比較快，勁頭也比較大。

第七、薰糞法：薰的糞比一般攢的土糞勁頭大，因為經過火燒煙薰後，土裏含的肥料成份如磷、鉀、鈣、硫等，都變成能溶化於水植物容易吸收的養分了，而所燒的草木灰或牛屎灰養分也跑不了，一部份薰入土中，一部份仍留在灰裏，這樣灰肥和土肥摻在一起，所以勁頭格外大。

薰法：把牛屎晒乾，堆成一個小堆，外面圍上晒乾帶草的土片，點着火後，外面再圍一層乾牛屎，

使煙不能全部冒出來，這樣那些帶草的土片，便慢慢燒成熟土了。一挑子乾牛屎能燒成三、四車子熟土，用這些熟土上地，長莊稼很好，能跟上一般糞的效力，沒有乾牛屎燒，使碎草燒也行。

又法：把帶草的土片晒乾或大半乾，使長草的一面向裏，有土的一面向外，這樣一塊一塊的壘起來，壘成一個圓圓形的小土屋。小屋的中間，堆上一個土柱子頂到屋頂，使小土屋容易封頂；屋裏面的牆壁和土柱子上，都留着許多凹洞或空洞，好讓煙火能把所有的土塊薰遍。土屋兩旁靠近地面的地方，各留一個小口，準備點火用，屋頂上留一個煙窗，屋裏邊圍着土柱子放上許多乾牛屎或碎草，但不要壓實，使它容易着火，外面除煙窗以外，全部堵上不十分乾的土，不叫煙向外冒。然後從點火的地方點着火，等到火燒的正旺時，火口和煙窗都用土堵上，但不要封死，叫它稍能流通空氣，讓火慢慢的把土燒熟，使烟灰都集結在土塊上面和洞孔縫隙裏，過兩三天冷透後，便成了很好的肥料。這樣每一百斤牛屎，能薰四千多斤糞。

又法：挖一個薰糞的坑，坑的側面留下三個灶門，坑裏放上碎草或牛屎，垛成堆，壓實它，上面用土壅的厚厚的，然後再從灶門點上（火）叫它溫烟，烟把土薰黑了，年前冬末薰上，到來年種地刨開，連土帶灰掺在一起，就是好的肥料。

薰肥有許多好處，略舉幾項如下：

- 1、在地裏薰肥，薰好了就堆在地裏，種地時刨開就用，不用再往地裏治糞，能省許多工夫，特別是遠地更感覺方便。
- 2、地邊上長的那些雜草，都是藏害蟲的好地方，咱們利用這些雜草薰糞，又能消滅害蟲，一舉兩得。

。

3、薰的糞上地能藥蟲子，因為薰灰中含一種毒素，是亞硫化合物，被熟土吸收了去，有殺蟲效力。

4、薰糞的這種活，半勞動力都能幹，可發動婦女、兒童、老頭去薰。
 5、薰糞上潮濕地最好，能把死黏土變鬆散，背陽的地方變暖，還能吸收空氣裏的濕氣去分解土裏邊的養分，使莊稼容易吸收。

『燒土』也是薰肥的一種，平常在坡裏掃的或鋤的碎草土，每天鍋底下弄上一些，到第二天掏灰時，也把土掏出來，乾灰另外攢着，把土弄到糞堆上當糞。這樣一天燒兩次飯，就能把土燒好了。但須注意：燒土發了黑就行，如果燒的發了紅，那就是燒過了火，不但沒有養分，土質發硬，還不肯長莊稼。

第八、堆肥：是利用廢物堆積起來，漚爛後變成的肥料，比一般肥料都壯，在單純施用土糞的莊稼，沒有施用堆肥的莊稼長的旺。並能增加熟土的深度，好耕好鋤，還能使不溶解的養分變的容易分解，家裏沒有牲口及豬的戶最好利用這個方法攢糞。堆肥的製法很容易，時常把糞尿，樹葉、碎草，塵土等雜物，堆積起來，使它腐爛成糞，這種肥料含有機物頂多，叫做『完全肥料』。

製堆肥的方法，先挖一個窖子，一般的深五尺，長六尺，寬四尺就行，窖子大小，還要看堆肥多少來定好，但太小了不易發熱。地窖挖好後，先在下邊鋪上一層草木灰，再鋪上一層漚好了的牲口糞（這樣可以發熱快些），然後把製堆肥的材料鋪上，鋪到一尺深時，用腳略加踏一下，再灑上污水或人尿，使它濕透。這樣逐漸上堆，逐漸澆水浸透，等窖子堆滿後，上面蓋了三、四寸厚的土，土外再鋪上一層亂草，這一窖子便算製成了。接着可以製第二窖，第三窖……，熱天兩個多月即可漚好，冷天便需要時間更長一些，最好是在漚的期間翻動一次，再壓緊蓋好，不要增加新材料，這樣能漚的均勻，效力也

一定大。

切下的驥、馬、驢等的蹄子，和牛羊等砸下來的角，浸好切碎，漚爛後上地，也是頂好的肥料，都可當堆肥的材料，不過這些東西腐爛比較慢，需要多漚些日子才能用。它的效力很大，並能持久。製好堆肥，如暫時不用，可堆在窖子旁邊，用泥泥上，以免風吹日晒雨淋，消耗了肥料的成分。空出窖子來，可以接着再製。夏天漚上，秋裏種麥施用，秋末漚上，來年種春田施用正合適。

第九、漚土肥：（1）鹽水漚土：在家院的牆根或屋角間，堆上一堆土，將平常家裏用的洗菜水，刷鍋水，洗衣水等，都潑在土堆上，過些日子土發了臭變了色，就抬到糞堆上，這樣一冬能攢一二十車子糞。（2）尿水漚土，上面已經說過，最好土堆不要弄大，可隨着尿的增加，逐漸增加乾土，總以不叫尿水流失爲限。用尿漚的土，上苞米或高粱糧，都很合宜。

不但漚的土和薰的燒的土壯，鍋框土、屋土，河淤土，以及道路上和集場上的塵土，也都是肥料。像炕洞土，鍋框土、屋土等，可直接推到地裏去當糞用就行，道路上和集場上的塵土，塵土弄到糞汪裏一漚，能比一般的土糞還要壯。

上追肥

1、追肥方法：追肥的時期，按各種莊稼也各有不同，普通莊稼爲苞米，高粱，大多數在剗蹠二遍時；如爲速效肥料硫安和腐熟的人糞尿等，可在三遍時行之。剗完後就在作物的根旁（不可離根過遠）用鋤頭角挖一個小坑把糞撒裏去，然後再用犁培土。水田用硫安最好，將池水放淺，撒在壟眼附近，兩三天後再充分灌水，如用豆餅，在插秧前翻入土中就行。

2、追肥注意：（1）人糞尿與硫安，不可和小灰（草木灰）、炕洞土混用，以防養分消失，但相隔五、六天再用也無妨。（2）使用人糞尿和油粕類肥料，要澈底的培上土，不可露出來，以免大量分散流失肥料和招蟲子。（3）硫安不要撒在莊稼葉子上。（4）人糞尿和硫安不可施用於地瓜、土豆子、甜菜等作物，因這些作物不需要其中的養分。

二、選種與浸種

田間選種

一種莊稼在一塊地裏，往往的會混雜好幾樣品種，長的高矮不等，成熟的也早晚不齊，有的還招了病蟲害。要想減少病蟲害，保證莊稼長的好，就應在莊稼成熟的時候，實行田間選種。田間選種時，不在過稀、過密、地邊、道邊、糞堆的地方選，就算長的好，因為是畸形發展，當種子也不甚好。有病蟲害和歪倒的，發芽較晚和弱的更不要選。選的時候，要注意莊稼的顏色，葉子形狀，熟的早晚等一致的標準。茲將各樣莊稼選種的辦法，分別的說一說：

（1）選苞米種；穗子細而高的不好，要上部細下部粗的，不要長旁枝的，葉面要寬的，棒子個要大的，要長在中間的（因靠頂的發育不好）如果一棵長兩個棒子，要選下一個，因為下一個截取養分多，一般的都比較發育好。苞米的粒行，要直立、規矩，粒子要緊密肥大而皮薄，棒子的個，要上下粗細，均勻和飄細的。要顏色一致，沒蟲沒病的。要在地當中選，因地邊上的會和別地裏的苞米串花，種的時

候，要用中間的粒子，因為兩頭的發育不好，出芽會不整齊。

(2) 選高糧：選高粱的標準：稈梢高矮適中，不易倒，堅實而水分多的，抗旱性大。穗和節都與原品種長像一樣，成熟早的。(3) 穗形長大如圓錐形，穗上小枝多；全穗突出葉稍以外的。(4) 穗子重量大，無黑穗病，形狀薄滿，容易脫粒的。(5) 脫粒時上半截種子與下半截種子分別保存，早種用上半截，晚種用下半截。(6) 葉子和稻子發紅的及出差的都不要。選出來，把穗擋下，晒乾，掛在通風的地方收藏着，不致受了潮濕，等到種地時再打下種籽來，預備下種。

(3) 選穀子：第一要選熟的早，熟的整齊，稻子強硬，沒有倒的。第二穗頭粗，分量重，碼子密，粒子緊，顏色新鮮的。第三沒有受過病蟲害的。第四每棵最少能分四、五個稻子，每個稻子長的穗都能上成的。第五和原品種長像一樣的。第六要選穗子毛長不怕風磨的。第七要注意不在出槍桿過多的地方選。第八選種時要選葉子微帶綠色，穗子看着發灰黃，用手一摸，覺着發「紫」的，那樣的是好穗子。第九來年種莊稼，穀穗兩頭的粒子不要，光留中間的種籽。

(4) 選豆種：(1) 枝多角多，稈棵直立不易倒的，枝和枝之間節不長的。(2) 豆粒大、成熟早、顏色鮮明、皮色發亮的。(3) 豆莢成熟的很整齊，沒炸裂的毛病。(4) 招了鑽莢蟲，或受了鬼絲經過的，都不要。(5) 選出種粒來，晒乾後打下粒子，裝在缸裏，放在涼些的地方，不要叫它走了油。

(5) 選麥子：(1) 在割麥前幾天，選早熟的麥穗，但不要死麥穗，也不要早熟了而掉粒子的麥穗。(2) 要選麥穗大，麥粒飽滿，並麥粒排列整齊的。(3) 要選不倒棵的麥穗，因稻子粗能抗風。(4) 糜底、窪地、地頭上，麥穗長的好也不選，因為是積水養多的原故，今年長的好，明年種上不一定