

太乙仙制本草藥性大全

三

新刻太乙仙製本草藥性大全卷之三

本草精義

木部



其心半卷
多脂者單
名桂按桂
林桂嶺因

桂為名令之所生不離此郡從嶺以南

際海畫看桂樹惟柳象州最多味既辛

烈皮又厚堅十人所採厚者必嫩薄者

必老以老薄者為一色以厚嫩者為一

色嫩既辛香薰又筒卷者必味淡自然

板薄板薄者必味桂以心大者名焉

藥性炮製

木部

桂君牙辛甘氣大熱浮也陽中之陽也有小毒

百藥無所畏終草木毒入少助心經

主治簡桂筒桂相同卷精神和顏色耐老牡桂

板桂一類堅骨節通血脈墮胎四者性並辛

溫難作風寒正是柳桂桂枝味淡能治上焦

頭目蕪橫行手臂調榮血和肌表止煩出汗

疎和散風經云氣薄則發泄是也肉桂木桂

性熱溫下焦寒冷併秋冬發泄黃豚利

性熱溫下焦寒冷併秋冬發泄黃豚利

筒者即菌桂也以嫩而易殺稔皮宜
 冬至同餌忌生葱收必陰乾用旋阻片
 餘剩須密紙重裹犯風免辛氣泄陽種
 類多般地產各外箇桂正則無骨形類
 竹生交趾桂林軒桂屬廣薄皮產南海
 山谷官桂品極高而堪充進貢却出觀
 實不佳皮極厚而肉理麗虛乃發從領
 箇桂因皮嫩如筒卷束枝桂謂皮老若
 板坦平柳桂係至軟枝稍肉桂指至厚
 脂肉桂枝梗小條非身幹麗厚之處
 杜心近木黃肉但去外甲錯麗皮品分
 既明欺罔難入又各主治亦詳知氣
 之薄者桂枝也氣之厚者肉桂也氣薄
 則發泄桂枝上行而發表氣厚則發熱
 肉桂下行而補腎興天地親上親下之

水道溫筋燠臟破血通紅經三氣厚則發熱
 是也桂心美之之義性畏守治多在中官桂
 貴之之辭味甚辛治易解表如此之異蓋緣
 本乎天者親上本乎地者親下理之自然性
 分所不可移也然柳桂桂枝入足太陽之腑
 桂心紫桂入心在手少陰之經本經註云桂
 有小毒亦從類化與黃芩黃連為伍小毒何
 施明為前附子為使全得熱性與人參麥門
 冬甘草同用能調中益氣實衛護榮與柴胡
 紫石英乾地黃同用却主吐衄血止豆砂
 乾漆穿山甲水蛭虻虫如此有再可同用
 則小毒化為大毒矣春夏禁服冬宜煎
 補註 治陰受病熱厥內熱方用酒調一升
 蜀椒一升乾薑一斗桂一斗加吟咀著

桂 牡



谷即廣

州今俗用牡桂狀似桂而扁廣殊薄皮
色黃脂肉甚少如木蘭味亦類桂不
知當是別樹爲復猶是桂生有老宿者
固經云葉狹長於菌桂但言侵木桂一
種郭璞云南人呼桂厚皮者爲木桂桂
樹葉似枇杷而白華而不著子叢生巖
窟枝葉冬夏常青間無雜木蘗恭以謂
牡桂即木桂二月八月採皮日乾用之

清酒七綿絮一斤細門布四丈入酒中置
馬矢壘中善日午勿使泄氣五夜出而
綿絮暴著復漬之以盡其汁再漬必盡其
乃出布綿絮之并用滓與絮布為中其布
長六七尺為六七中即用生布多中以為
寒所刺之處今熱入至凍復多中以為
熨之三十綿絮而止汗出至凍復多中以為
論而止起布內無見風每刺必發如此病已
矣○治覺筋急亦以白酒和桂奎之造并漿
法夏月飲之解煩渴益氣消痰桂奎一兩白
蜜一升以水二升先煎取一斗未冷入新釐
酒中後下二物撓二三百轉令勻先以油單
一重覆上加紙七重以電封之五日去紙一
重七日開之藥成氣香味美格節絕高○失
音佳未著舌下漸煎汁○小兒脾中遺尿不
自養桂末雄雞肝作芋分搗丸如小豆大每
服溫水下○心腹俱脹痛短氣欲絕或已絕
桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓類
服無挂用乾薑亦得治中風四肢逆冷吐清
水宛轉啼呼者取二兩咬咀以水三升煮取
二升去滓適寒溫服○反腰有血痛挂節
三升許以苦酒和塗痛上乾復塗○卒吐血
并骨方寸書後含二丁許腹亦瘀下血大
神驗○產後腹中腹痛末生溫酒服寸日
三服○蜀椒閉口者有毒謂食之便氣欲絕
或下白沫身軀冷者急煎桂服之多飲冷

菌 桂



一名同

桂一名

肉桂生

交趾桂

林山谷

嚴華問無骨正圓如竹唐註云菌者竹
名古方用筒桂者是故云三重者良其
筒桂亦有二三重卷者葉似柿葉中三
道交肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是
菌然大枝皮不能重卷味極淡薄不入
藥用今賓州所出者相類壯桂葉狹於
菌桂而長數倍其嫩枝皮半卷多紫與
今宜州韶州者相類彼土人謂其皮為
木蘭皮肉為桂心此又有黃紫兩色益
可驗也桂葉如栢葉而澤黑皮黃心赤

水一二升勿食飲吐

太乙曰

凡使勿薄者要紫色厚者去上麁皮取

五兩取有味厚處生用如未用即用重密熟

緝并紙裹勿令犯風其州上只有桂草元無

桂心用桂草葉用陽木皮遂

或桂心凡使即單搗用之

桂君即木桂味辛氣溫無毒

主治治上氣咳逆結氣喉痺吐吸心痛脇風脇

痛溫經通脉止煩出汗利關節中益氣此

桂味厚於氣久服通神輕身不老經云治奔

遯氣能通血脉

補註治大人小兒喫雞果子多腹脹氣急方

取肉桂碾末飯丸如葶下大小兒熟水

丸未啞再服

菌桂使即筒桂味辛氣溫無毒此正圓如筒

故名筒桂

(桂 柳)



一名桂
枝又謂
之官桂
然本經

今欽州所出者葉密而細亦恐是其類
但不作柏葉形為疑耳皮厚者名木桂
則枚付是也蘇恭以牡桂與單名桂為
一物亦未可據其木俱高三四丈多生
深山蠻洞中人家園圃亦有種者移植
于嶺北則氣味殊少辛辣固不堪入藥
也三月四月生花全類茱萸九月結實
今人多以裝綴花果作筵且其葉其香
可用作飲香尤佳二月八月採皮九月
採花並陰乾不可近火中品又有天竺
桂云生西胡國功用似桂不過烈今亦

主治 主百病養精神和顏色為諸藥先聘通便
久服輕身不老面生光華媚下品如童子
補註 抱朴子云桂可以合藥和而服之
七年能步行水上長生下印他子服
桂二十年足下毛生日行五百里力容千斤
列仙傳云沅縣好生桂飲水謂藥世見之
又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服
之韓終采藥詩云閩河之桂
實大如栗得而食之後天而老
柳桂 使即桂枝味辛氣溫無毒治之云氣味俱
輕故能上行發散於表內寒則肉桂補陽則
柳桂桂辛熱散經寒引導陽氣若正氣虛者
以辛潤之散寒邪治奔豚
主治 仲景云湯液用桂枝發表用肉桂補腎其
氣之清濁上下一定之理也此藥可以久服
能護榮氣能實胃氣則在足太陽膀胱經也

只言桂仲景文言桂枝者枝條也非身

餘也取其輕薄而能發散一種柳桂乃

桂之嫩小枝條也又宜入治上焦藥用

也蓋亦取其枝上皮其木身麓厚外亦

不日用箇經云葉似柿葉而尖狹光淨

花白莖黃四月開花五月結實樹皮青

黃淡薄若若筒亦名箇桂厚硬味薄者

名桂枝又云不入藥三七月採皮曝乾

桂心



一名紫

桂乃諸

桂之心

不若一

字桂也

出歌州桂州交州者甚良箇經云葉狹

張子箇桂之二倍其嫩枝半捲多葉肉

或問湯液發汗用桂枝補腎用肉桂小柴胡

止云加桂何也答曰肉桂大辛春夏禁用其

治表寒當看時令故只云加桂而已秋冬治

下部腹痛非桂不能止也專治奔豚氣痛

桂心君味苦辛性溫無毒桂心入手少陰心經

主治殺草木毒專治九種心痛殺三蟲破血通

經及胎衣不下除咳逆治氣喘止腹氣冷

痛下痢鼻中息肉軟脚痺不仁

補註治風頭痛天陰雨風先發者用一兩為

心痛妨悶用一分為末以酒一大盞煎半盞

去滓熱服效○寒疝心氣痛為散熱酒下

用二兩劈去皮搗羅為散熱酒下○不飲食

產後惡血衝心痛氣悶欲飲酒下○中風面目

引偏痺牙車急舌不轉以酒煮取汁故

卒中心痛用八分以水四升煮取一升分二

手皺起筋理虛軟謂之桂枝又名肉桂
削去上皮名曰桂心藥中以此為善其
厚皮者名曰木桂二月八月採皮曝乾
去皮留心用按諸桂所治不同无非各
因其材而致用也然本經謂桂止煩出
汗仲景治傷寒乃云无汗不得服桂枝
又云汗過多者桂枝甘草湯是又用其
閉汗何特反其經義耶抑一藥而二用
耶噫此正所謂殊途而合轍也蓋桂善
通血脉本經言桂止煩出汗者非桂能
開腠理而發出汗也以之調其榮血則
衛氣自和邪无容地遂自汗出而解矣
仲景言汗多用桂枝者亦非桂枝能閉
腠理而止汗也以之調和榮衛則邪
從汗出邪去而汗自止矣昧者不識出

服○治唾血搗作末以水小方寸寸○卒外
腎偏腫取炙炙令熱熨之曰可○五度治
小兒胎毒用一乃去其籠皮近以
風失音用一乃去其籠皮近以
刀時展首為末分三服每用一
至一盞服之差大妙○按三田之藥所出各
異為治亦稍別世俗所用者
薄者為桂枝宜入治頭目發熱風寒外景
表者為桂枝宜入治頭目發熱風寒外景
病自汗以桂枝溫榮衛而發其邪去則表
密而汗自止正辛甘發散之義後人用桂止
汗失經旨矣身熱者為桂枝宜入治臟
補腎氣及下焦寒者為桂枝宜入治
除制去雜厚用近裏者為桂枝心又入嫩小枝
條為柳桂味淡尤宜入治
焦及橫行手臂桂也
祝實臣味苦酸鹹氣寒無毒景天為之使
主治主五內和熱去五痔腫疼七月七日取槐
置高如巢二口以上煎稠硬圓止涎唾補
如鼠屎大納穀道內三易之乃愈止涎唾補
絕傷涼大腸消乳痕除男子陰瘡溫瘰不敗
欵女人產戶痛瘰難當仍理人瘡且墮胎孕

汗止汗之意凡病傷寒便用桂枝湯幸
遇太陽傷風自汗者固獲奇効儻係太
陽傷寒无汗者而亦用之為害豈淺上
乎猶有謂仲景之治表虛而一槩用飲
蘆汗者此又失大經之旨矣

〔實槐〕



一名槐
實生河
南平澤
今處上
有之其

木有極高大者謹按爾雅槐有數種葉
大而黑者名懷槐昼合夜開者名守宮
葉細而青綠者但謂之槐其功用不
同別四月五月開花六月七月結實
實七月採嫩實搗取汁作煎十月採

酒吞七粒催產尤良專理女小兒痲急痛久
服明目補腦黑髮延年

○補註古方明目黑髮用槐子于牛膽中清酒
白髮變黑百日食後吞一槐子十日身輕三十日

月上巳日採子服之去百病長生通神或大
熱心悶以子燒末酒服方寸效治妊婦

難產令易方以水吞槐子七日即出槐
房莢收煎代茶去頭老莢陳導風熱亦

太乙曰凡採得後去單了并五子者破用為牛
三子者凡使用銅

乳浸一宿
蒸過用

槐白皮味苦煮酒治中風皮膚不仁服効煎湯

洗五痔產門痒痛尤奇消食品中重却壯熱

驚癇理一切惡爛諸瘡疥癬重瘡

肉生肌

○補註治癰腫瘡用白皮醋浸半日洗之及諸
惡瘡治內癰用白皮搗丸綿裹內下

老實入藥今醫家用槐者最多春採嫩枝煨為黑灰以搽齒去虫燒青枝取瀝以塗癰取花之陳久者從末飲服以治下血折取嫩旁角作湯以當茗主頭風明目補腦煨白皮汁以治口齒及下水吞黑子以變白髮木上耳取末服方寸亦治大便秘血及五痔脫肛等皆常用有殊效者葛洪著仙鵲明目使髮不落方十月已日取槐子去皮內新甕中封口三七日初服一枚再二枚至十日十枚還復一丸始大良劉禹錫傳信方著硤州王及即中槐湯灸痔法以槐枝濃煎湯先洗痔便以炙炙其上上壯以知為度及早充西川安撫使判官乘驛入駱谷及宿有痔疾因此大作其狀如

○補註治鼻氣管寒以水五升煮槐葉取三升風明目方嫩葉一斤煮如造炙法取葉碾作末如芥法煎呷之療陰瘡及濕痒用槐樹此面塗葉不見日處一大握水二升煮取一升洗之三五遍令傷暖若沙遠恐傷風即以米粉粉之即效○主和氣產難絕傷風初嗽葉亦可食又主聽聾牙齦諸風癢槐根味苦氣寒作神燭可燒乃主喉痺寒熱洗瘡住痒煨揩齒殺虫春採以炆存性為末

胡瓜貫於腸頭執如瘡灰火云 僊

主郵吏云此病其曾患來須臾即差及命所使作槐湯洗熱瓜上令用艾炙至三五壯忽覺一道氣入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳

按衍義云槐突止言突今當分為二突本出夾中若搗夾條者當言夾也夾中子大如豆堅而紫色者突今下條不析出夾與夾中子蓋其用各別皆味導風熱又云槐花今染家亦用收時折其未開花煮一沸出之谷中有所澄下稠黃滓滲漉為餅紫色更鮮明治腸風熱瀉血甚佳不可過劑日

揩齒去虫

○補註 療胎赤眼取槐枝如馬鞭大長二尺作子一人以其木研之至微止令附以塗向

眼上便以艾炙之七壯治九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩頭水三大升煎取一升頓服治崩中或赤白不問年月遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸効

槐花味苦平無毒炒黃赤涼大腸去熱眼赤心

痛理腸風瀉血及皮膚風

白痢去胃腸孕痛殺腹臟蛔蛇

○補註 治上血痢能前芥穗等分為末酒調下以多少碗作夫細研

食前溫酒服二錢錢

槐膠主諸風化涎筋脉拘攣

作湯散九煎服治口眼喎斜

破傷風雜諸藥亦可水煮作湯治風痺肢難

實栢



生太山山谷今處有之而乾州首獨

佳三月開花九月結實候成熟時收採

蒸膜乾春罏取熟仁子用屋邊者為宜

塚上者切忌霜後採實去殼取仁先以

醇酒浸曝乾次取黃精汁和煮執筋連

撓盡汗絕休研細成霜入劑方効畏羊

菊麴麵諸石羊蹄根菊花神麴白麵一

切石使牡蛎麻子桂皮謹按陶隱居說

栢忌取塚墓上者今云出乾州者最佳

則乾州栢葉茂大者皆是乾陵所出他

處皆無大者但取其州上所守之太氣

舉動散風毒身如虫行噤口急風殊功破腦

傷風立効

槐蘭即槐栢上木耳又名槐蘭子栢所生堅

如桑耳者良用作細末酒服之如八陰中瘡

痛治痔瘻穀道血流

補註藥蟲心痛取槐栢上木耳燒灰末如

寸許出藥腸疴方槐栢上耳若不止飲水一升

樹東枝令孕婦手把即易產藤樹中不止不

問年月遠近方以槐耳燒灰為末以酒服効

栢實君味甘辛氣平無毒牡蠣及桂為之使

主治聰耳目却風寒濕痺吸口歷節止腰疼益

氣血去恍惚虛損欬汗治腎冷腰冷併膀胱

冷膿宿水潤腎燥肺燥及面顏燥澁不光興

陽道殺百和止驚悸安五臟風眩痛亦可

味豐美可也乾陵之栢異於他栢其味未有無文理者而其大多為芝蔴靈氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者可直萬錢閩陝人家多以為貴宜其子實最佳也又以其枝節燒油膏傳惡瘡久不差有蟲者牛馬畜產有瘡疥名為重病以傳之三五次無不愈也

側栢葉



密州出者尤佳雖與栢相類而其葉

皆側向而生功効殊別收採無時張仲景方療吐血不止者栢葉湯主之清栢葉一把乾薑一片阿膠一挺炙三味以

煎調久服不飢不老增壽輕少

補註

小兒腹驚驚風腹痛不乳食大便青白者老人虛必栢子仁末溫水調下二錢○松蘿研落白蠟丸栢子大以少黃丹湯服二十或食前

天久陰即於鐵中密水用瓶器盛栢子仁若火緩緩煮成煎為度每煎三兩栢子仁用酒乾為度

側栢葉 君味苦澁氣寒又曰微溫無毒漬用嫩葉良翠歸者收採務向月令建方春採東夏採南秋採

此總得節候生氣 治即止吐衄崩痢重生髮髮為煨澁仙丹係補陰要藥若合黃連煎服小兒重痢真疼久服輕身益氣耐冷止飢與酒相宜止尿

葉良翠歸者收採務向月令建方春採東夏採南秋採

水二升煮二升去滓白絞馬通汁一升

相和合煎取一升綿漚一服盡之山東

醫工亦多用側栢經云性寒止痛其方

採藥入日中濕搗令極爛如泥冷水調

作膏以治大人及小兒被湯火燒熱傳

於傷處用帛子繫定三兩日瘡當斂仍

滅癰又取葉焙乾為末與川黃連二味

同煎為汁服之以療男子婦人小兒大

腹下黑血茶脚色或膿血如靛色所謂

蟲刺者治之有殊方又能殺五臟蟲道

家多作栢葉湯常蓋人古栢葉尤奇今

益州諸葛孔明廟中有大栢木相傳是

蜀世所植故人多採收以作藥其味甚

香於常栢也

孫真人枕中記採栢法以三月四

血又治冷風歷節疼痛

○補註治大風疾眉髮脫落用葉小蒸九曝搗

夜一服熱水下五九或十九生治晏

不計時以類滿少氣胸中疼痛生治晏

痢疾服之治鼠疫種核痛才生治晏

腫上熱鹽着腫上發令熱氣下即消生治晏

方○藥酒用葉多生治晏

太乙日其有子生治晏

無子葉上有微赤毛若生治晏

一斤先陳去兩畔并心枝子用生治晏

了焙乾又浸又焙生治晏

如修事一斤用黃精自然汁十二兩

栢白皮無毒燒灰敷火灼爛生治晏

餽釀酒主歷節風痺療疥生治晏

○補註治中熱油及火燒瘡以栢白皮猪脂煎

月採新生松葉可長二十四寸

取陰乾細搗為末其柄葉取深出巖谷

中採當年新生可長二三寸者陰乾細

搗為末用白蜜丸如小豆大常以月一

十五日口未出時燒香東向手持藥八

十一丸以酒下服一年延十年命服二

年延二十年命欲得長肌肉加大麻戶

勝欲心多壯健者加茯苓人參以藥除

百病益元氣添五臟六腑清明耳目強

壯不衰老延年益壽神驗用七月七日

露水九之更佳服時乃呪曰神仙直藥

脉合自然服藥入腹天地同年呪訖服

藥斷食雜肉五辛最切忌慎之

物裏脚然後以栢樹木細刺

抱朴子云漢成帝時獵者於

無衣服身皆生黑毛跳坑起

其所在合圖取得乃是一歸

秦之宮人開東賊至秦王出

無所食泊欲餓死有一老

突初時苦渴後稍便哭遂不

不熱此女是秦人至成時

松脂便味苦其氣溫無毒六

者佳黃白色者良黑色者不

主治瘰癧疽惡瘡頭瘍治日

風安五臟除伏熱胃脘解消

神延年耐老熬膏貼瘡毒長

殺蟲父服益氣

補註治切瘦煉成松脂末

以炒粉粉食之治齊齋

十一月便乾頭者三兩度

二鼻科斷離者二百目差

斷離者二百目差斷盡父

房室瘰癧

瘰癧

瘰癧

A stylized black and white illustration of a pine tree branch. The branch is thick and gnarled, with several clusters of needles at the tips. A small, cloud-like shape is visible near the base of the branch. The style is reminiscent of traditional East Asian ink wash painting.

一名松香 一名松膏 一名松肪 一名白

節者風百節酸痛不可忍松脂三十斤煉五
十編不膩五十編亦可二編以煉酥三
升溫和松脂三升執攪令極稠以空腹以酒
服方寸寸日三數食麴粥為佳
雜物果子一百日差○松節五十斤節風四
肢疼痛如解落松脂二十斤二三十兩三
日服一合日五六服冷手心○松脂三兩煉
也一內相和熟搗可丸通退以薄綿裹內
耳孔中塞之日一度易○療刺人肉疼痛百
聖不差方松脂流出如細孔頭香者傳瘡上
以綿裹三五日當有根出不痛不痒不瘡有
落○集驗療蠶蠶咬松脂乾如雄雞乳內
須更蠶蠶歸松脂出松脂乾如雄雞乳內
虎尊即綿煉松脂法十斤松脂五爰以水煮
過令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四
兩茯苓末淘眼水下一刀圭即終年不食而
復延齡身
輕清矣

臧少旌添脂流芳出新登

水沉釜底者勿用候凝結每炒如前過

畢三迴色白如玉研和群藥加白茯苓

栢子仁其菊花共刺亦可車服為丸酒

吞

○按抱朴子云趙瞿病癩歷年醫不差

家乃膏糧棄送於山穴中瞿自愁不幸

悲嘆涕泣經月有仙人經穴見之哀之

是問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞

命於是仙人取靈藥賜之教其服百

餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人再過視

之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此

是松脂彼處極多汝可求服之長服身

轉輕力百倍登危涉險終日不閉年百

歲齒不墮髮不白夜卧常見有光大如

服之則仙傳云陸陸好食松子能飛行走

及馬以松子遺堯堯不能服松子有蒲松也

松黃即松花主治雖輕身益氣能發上焦山人及

時拂取作湯點之甚佳花底收曬乾研末

羅細雞清雞彈九成豆粒暑痢止澁如神

○補註衍義曰松黃一如蒲但其味差淡上產

昏悶不爽於花川芎當歸石膏蒲黃五物等

同為末每服二錢水二合紅花二錢同煎七

分去滓粥後溫溫細呷松子多海藥水今關

右亦有但細小味薄治月本同治虛秘

松根白皮味苦氣溫無毒

主治主辟穀腹內不飢補虛損五勞益氣

松節味苦氣溫無毒

主治燥血中之溫卻脚痺軟弱去風風治

風虛軟痛

○補註脚轉筋疼痛卒急者松節一兩細剉如

米粒乳香一錢右件藥用銀石器內慢