

猪疫验方选

第一集



黔南人民出版社

2858.28

611

6.624
61/2
(3)

猪 疫 驗 方 选

(第 一 集)

黔南自治州畜牧局編

猪 疫 驗 方 选

(第一集)

黔南自治州畜牧局編

*

黔南人民出版社出版

(都匀市文明路2号)

(贵州省书刊出版业营业許可証出字第007号)

貴州人民印刷厂印刷 各地新华书店經售

*

开本: 787×1092 $\frac{1}{16}$ 印張: 1 $\frac{1}{2}$ 字数: 31,300

1961年2月第一版 1961年2月第一次印刷

印数: 0,001—2,500册

統一書号: 16 (黔) 05·0011 (0023)

定 价: (7) 一角八分

前 言

我国中兽医继承了祖国数千年来的医学宝贵遗产，具有丰富的实践经验；许多中兽医工作者掌握有不少费省效宏的验方和秘方。但解放前在封建势力和国民党反动派的统治和歧视下，广大中兽医工作者没有社会地位，许多可贵的实践经验和秘验单方淹没失传了，剩下的部分也一直分散隐藏在个人手里，没有被充分利用起来。

解放后，党对中兽医贯彻了“团结、使用、教育和提高”的方针，广大中兽医工作者在党的领导和关怀下，发挥了无穷的智慧和力量，献出了许多秘方和验方，对祖国的社会主义建设作出了巨大的贡献。根据不完全的统计，我州八个县（市）的中兽医工作者一千多人，从一九五〇年以来，共治疗了各种病畜一百多万头次，治愈率平均达百分之八十五以上，大大地减少了牲畜的死亡，保证了以猪为首的畜牧事业的大发展，也促进了工农业生产的大发展。

为了进一步挖掘中兽医的潜力，交流工作经验，以推动养猪事业的顺利发展，加速社会主义建设，我们从我州广大中兽医工作者几年来献出的秘验单方中，审查和整理出一百二十多个医治猪的主要疾病的验方，编成“猪疫验方选”第一集，提供畜牧兽医工作者、饲养管理人员作医治猪病的参考。今后还将继续出版续集。

本书有关猪的病名、病状、配方、疗法等，均按照献方者的原意，只在语句上略加修改，但其中也难免有差错之处，敬希读者批评指正。

黔南自治州畜牧局

一九六一年一月

目 录

一、猪的传染病	(1)
猪瘟 (俗称烂肠瘟或猪霍乱)	(1)
猪肺疫 (俗称清水症或锁喉风)	(8)
猪丹毒 (俗称打火印或红斑麻)	(14)
炭疽 (俗称猪飞疔)	(18)
猪急性喘气病	(20)
仔猪白痢	(20)
猪流行性感胃	(22)
猪痘 (痘疮)	(23)
二、猪的内科病	(25)
胃肠卡他 (俗称猪拉稀)	(25)
猪风湿症	(27)
猪热症	(28)
猪子宫脱出	(29)
猪脓肿	(29)
猪湿疹	(30)
猪抽筋病	(30)
猪蛔虫病	(31)
三、附录：各种草药参照使用表	(32)

一、猪的傳染病

猪 瘟 (俗称烂腸瘟或猪霍乱)

b

一，病因：是由一种滤过性病毒引起的，这种病毒常附在污染的飼料和用具上，健猪接触后，由口腔、皮肤、粘膜、呼吸道等处传染。

二，病状：精神不好，飲食大减，爱钻草窝，不愿起立，即或站起，全身发抖。体温升高到摄氏四十度以上，眼发红，有眼屎，大便先干后稀，粪内混有鼻涕状脓液，病重的带血，皮肤出现不均的红色斑点，指压不退色。

三，治疗：

处方1：大蒜一两 見血子一两 螃蟹一个 都云参三錢
皮硝一两 雄黃五錢。

用法：将药研成粉末，用黃鼠狼酒一两兑成糊状灌服。

献方人：三都周泽林

处方2：水黃花(根) 半斤。

用法：熬水內服。

注：上述用量是指大猪。中猪用六两，小猪用四两。

献方人：貴定廖子清

处方3：大蒜五錢 雄黃一錢 栽秧木(过山龙)一两。

用法：先将栽秧木置于鍋中煎煮，滤出药液，再将大蒜去

皮冲烂，雄黄研細成粉，跟葯液混勻灌服。每日服二次，每次大猪五两，小猪三两。

献方人：长順艾国臣

处方4：蘿卜子一两 麦芽五錢 大黃二两。

用法：将蘿卜子置于鍋中煎煮，取其滤液与麦芽和大黃混勻灌服。大猪服一飯碗，小猪服半碗。

献方人：独山卢海洲

处方5：礞蓮二两 薯皮二两 馬蜂头三錢。

用法：将上述三种葯放在鍋內炒焦后研成粉末，兌开水灌服。每日服二次，大猪每次八两，小猪每次四两。

献方人：独山刘凤伯

处方6：苦罈子一两 揚尘一两 老鴉蒜一两 大蒜五錢 雄黃二錢。

用法：将上述各种葯混合，捶成浆糊状，兌溫开水灌服。每日服三次，大猪每次服二至三两，小猪每次服一两。

献方人：罗甸郭紹华

处方7：紅山豆根五錢 青藤香二錢 三不跳一錢 穿心蓮二錢 青藤根三錢 小血藤（又名鋸鋸草）三錢 五倍子一錢。

用法：煎水內服。

献方人：貴定王迎州

处方8：白泥巴（又名觀音粉）一斤 葛根四两 酸木瓜

四两 一片丹一片。

用法：将白泥巴篩过兑水四斤泡葛根、酸木瓜和一片丹，再加水一斤煎煮，取其滤液灌服。猪重五十斤以上的每头每次服三两，猪重二十至五十斤的每头每次服一两五钱，猪重二十斤以下的每头每次服八钱。

献方人：贵定彭荣清

处方9：苦盘莲一两五钱 馬鞭稍四两 路边香二两 仁丹草二两 人骨头五钱。

用法：将药捶融，加水煮沸过滤，再加菜油二两灌服。另外，用野棉花根一两捶融包入猪耳朵内（病轻包一只耳朵，病重包两只耳朵），用麻绳将耳朵捆好。上述药量，大猪全服，中猪减半，小猪服三分之一（小猪不捆耳朵包药），每日服二次。

献方人：贵定罗明坤

处方10：巴蕉水四两 水獭猫骨粉一两 万年水一两。

用法：将万年水用纱布滤过，加入水獭猫骨粉及巴蕉水，调匀煮开即可灌服。

献方人：望谟岑朝甫

处方11：大蒜二两 胡椒一两 野花椒一两 香付子一两 生姜五两 雄黄二两 石菖蒲三两。

用法：将以上各药研为细末，加茶油少许，用温水调成丸子喂之。大猪每次服三至五钱，小猪减半。

献方者：州商业局

处方12：大黃一兩 黃芩一兩 黃柏一兩 枳子一兩 蒼
朮一兩 細辛五兩 牙皂五兩 豬苓一兩。

用法：煎水灌服。

献方者：州商业局

处方13：大黃三兩 蒼朮二兩 辛黃一兩半 明雄二兩
牙皂一兩 枳子二兩 樟腦一兩 甘草一兩半 薄荷三兩 柴
胡二兩 黃芩二兩。

用法：將上藥研成末，加蜜糖少許制成丸子，每粒二兩
重。每日服一次，大豬每次服五粒，中豬每次服四粒，小豬每
次服三粒。

献方者：州商业局

处方14：大蒜三錢 大黃一錢 杏仁二錢 雄黃一錢 元
參一錢 木通一錢半 生甘草五分。

用法：煎成汁后，加燒酒半斤內服。病輕者每日服一次，
病重者每日早晚各服一次。

献方者：州商业局

处方15：砂仁四錢 柴胡四錢 薄荷五錢 元參四錢 知
母四錢 鹽黃白四錢 鹽知母三錢 炙枝子三錢 花粉三錢
陳皮三錢 霜桑葉六錢 葛根五錢 大黃一兩 當歸一兩。

用法：研成細末，用蜜作丸口服。一百斤以上的豬全
服。

献方者：州商业局

处方16：滑石一錢 木通一錢 黃芩一錢 芒硝一錢 車

前子一錢 桔梗一錢 石膏一錢 銀花一錢 蓮壳一錢 甘草一錢。

用法：研為細末，用蜜作丸口服。每日服一次。毛重三十斤左右的猪全量。

献方者：州商业局

处方17：白全古三兩 石芹菜三兩 枝子五兩 大黃四兩 黃柏三兩 魚腥草三兩 黃芩三兩 樟腦一兩。

用法：先將藥煎好，後放樟腦灌服。大猪每日每頭服二次，每次一飯碗，中小猪酌減。

献方者：州商业局

处方18：田基黃五兩 一枝箭二兩 山芙蓉四兩。

用法：將藥研成細末，加鹽二兩，混于飼料內喂之。

献方者：州商业局

处方19：青竹標（蛇名）酒五錢 燒蛇酒五錢 枯骨粉四錢 明雄一錢 大鵝爾腸三錢 燕窩草灰一錢 門冬三錢 甘草四錢 大蒜一錢 生地子三錢 大力子一錢 白蔻四錢。

用法：將上述明雄、大鵝爾腸、門冬、甘草、大蒜、生地子、大力子、白蔻等用水煎後，兌入上述二種藥酒及枯骨粉、燕窩草灰灌服。一日服一次，四次可愈。

献方者：州商业局

处方20：芒硝一錢 硃砂蓮三錢 石菖蒲一錢 苦參三錢。

用法：煎水灌服。

献方者：州商业局

处方21：地黃蓮三錢 大力子根三錢 馬鞭稍三錢 刺梨根三錢 硃砂蓮三錢 竹筍灰三錢 龍胆草三錢 木瓜三錢。

用法：煎水灌服。

獻方者：州商業局

处方22：青竹標（蛇名）油一兩五錢 枯骨粉一錢五分 天花粉五錢 大泡通二兩 馬鞭稍一兩。

用法：煎水灌服。

獻方者：州商業局

处方23：岩馬桑三兩 苦參二兩 門冬一兩五錢 柏香果一兩五錢 黃蓮五錢 馬鞭稍二兩 花粉五錢 栗壳五錢 乳香三錢 沒藥三錢 三步跳三錢 藿香三錢。

用法：以童便作引，煎服。

獻方者：州商業局

处方24：血余（燒過的人髮）一兩 鳳凰窩一兩 偷油婆四個 陳艾一兩 甘草一兩。

用法：煎水內服。

獻方者：州商業局

处方25：牙皂五兩 細辛五兩 川板五兩 雄黃五兩。

用法：將以上各藥研成細粉，裝入瓶內封好。發現豬有瘟症時，將此藥粉少許吹入豬鼻內，使其打噴。經不多時間，再檢查體溫是否退熱，繼續再吹一次，使其恢復正常狀態時為止。

獻方者：州商業局

处方26：水薄荷八两 石芹菜八两 川椒八两 火麻八两
芦根八两 两面针八两。

用法：将上药用水六斤煮成三斤，拌入饲料内喂。每日喂二次。

献方者：州商业局

处方27：黄莲三两 百解三两 土子莧三两 水萝卜三两
天花粉三两。

用法：将药用水三十二两煎成十六两的浓液灌服。每日服二至三次。大猪全服，中猪服三分之二，小猪服三分之一。

献方者：州商业局

处方28：威灵仙六两 千斤力六两 扁叶六两 白花叶六
两 升麻六两 黄花草六两 馬蓮桉六两 荆芥六两 牛舌草
六两 五加皮六两 五爪金龙六两。

用法：将以上各药加清水二十斤煎煮，取其药液拌入饲料内，每日喂二至三次。

献方者：州商业局

处方29：两面针四两 一面针四两 四方艾四两 黄枝子
四两 白花草四两 土黄莲四两 路边菊四两 通天刚四两
鉄凉伞四两 五层皮四两 大茶叶四两 山胡椒四两 金销起
四两 六谷子四两 木贼四两 車前草四两。

用法：加水过药九寸煎煮，如猪食量达到一桶量时，可喂药水五斤。

献方者：州商业局

处方30：黄芩五錢 黃蓮三錢 黃柏五錢 甘草一两。

用法：將藥研成末，兌菜油二兩內服。

獻方人：龔安羅登武

猪 肺 疫（俗称清水症或鎖喉風）

一、病因：是一种巴氏杆菌存在于健猪的呼吸道或消化道內，一旦飼养管理不当，猪身体瘦，抵抗力弱而发病，或因有病猪未及时隔离，由呼吸道及吃了污染本菌的飼料而传染。

二、病状：病后体温上升到摄氏四十度至四十一度，喉咙肿大，口流白泡沫或清水，舌伸于口外。皮肤出現紅块，手触发热，有痛感，咳嗽，病初呼吸快，病重的呼吸困难，不吃东西，腹部发紅紫色，呈現犬坐姿勢。

三、治疗：

处方1：麻玉果（又名三步跳）二錢 老蛇包谷（要炮制）三錢 烏豆一分 山胡豆五兩 生青藤香三兩 盐巴二兩 揚尘一两。

用法：將盐巴、揚尘涂在病猪口內舌根內面的水泡处，用其余各藥研末灌服（烏豆是毒的，要用酒精烧过）。

獻方人：望謨黃道成

处方2：偷油婆三个 地牯牛十至二十个 牛馬蝇五个。

用法：將藥搗烂，用开水灌服。大猪一次量。

獻方人：望謨黃道成

处方3：八爪金龙五錢 地苦胆三錢 独脚蓮三錢 岩馬桑三錢 岩白菜二錢 猪牙皂（烧成灰）一两 麝芋一两。

用法：将上述药打碎，用石磨磨成粉，兑温开水内服。日服三次，大猪每次服二至三两，小猪每次服一两。

献方人：罗甸郭紹华

处方4：蚂蚁三十个左右 蜂子（窝做在晒衣竹杆上的）一个 壁蜂（在墙壁上筑窝居住的）一个。

用法：将药置于乳钵内磨成浆糊状，再用温开水调匀灌服。每日服二次，大猪每次服十两，小猪每次服二两。

献方人：独山刘凤扬

处方5：千脚虫一至二个 糖蛾半个 大血藤五钱 小血藤五钱。

用法：将千脚虫和糖蛾用乳钵研细成浆，把大、小血藤切成一寸长短后捣烂，再用白酒一两，温开水五两调匀灌服。每日服一次，每次大猪服五两，小猪服二两。

献方人：长顺艾国臣

处方6：燕窝泥二两。

用法：用温开水一碗，将此泥调匀后服用。每日服一次，大猪每次服二两，仔猪每次服一两。

献方人：独山卢海洲

处方7：蚂蚁窝（烧成灰）五钱 天炮子三钱 猪牙皂五钱。

用法：把药混合烧成灰。服时将猪嘴打开，用木棒塞进口中，不使其重合紧闭，然后用竹筒把灰装入口中，使人用口吹进去。

献方人：罗甸郭紹华

处方8：用梅針在火上烧过，找好部位，用右手执好油針，以閃电般的速度用力由脖子的肿部一側刺穿过另一側，梅針不拔出，迅速用鸡屎藤（白色的）由梅針的尖端一側穿过另一側，再拔出梅針，充分地让囊包內的黄色液体流出，然后用烏豆漿五錢（刚由磨子里取出的）敷于手术口之处。經過三十分鐘，取石灰五两用清洁的水調成石灰漿，涂在經過手术的囊包上。

献方人：罗甸郭紹华

处方9：四脚蛇一个 糖蛾一个 偷油婆四个。

用法：晒干后混合研成粉，兑开水四两灌服。大猪全量，中猪减半。

献方人：貴定彭荣清

处方10：猪牙皂十六两 十样錯十六两 洗衣汗水四十八两。

用法：将药冲烂，兑洗衣汗水煮好，滤去渣，即可灌服。五十斤以上的猪每次服四两，二十斤以上的每次服三两，二十斤以下的每次服一两五錢。

献方人：貴定彭荣清

处方11：人尿八两 偷油婆五个 盘蓮二两 水黄花二两 石菖蒲四两 刺猪肚子五錢 篋子虫三条 地牯牛十二个 青竹标（泡成酒）一条 金猫狗脊二两 岩棕三分。

用法：将药一起捶烂，加水煮沸滤过后，再加尿和青竹标

酒一起灌服。同时用梅针刺破耳根耳尖和尾根尾尖。

献方人：貴定罗明坤

处方12：格老柴 三两 路边黄 二两 牛舌片 一两半。

用法：兑淘米水内服。每日服二次。

献方人：岑凤云

处方13：南瓜花 竹内蜜蜂。

用法：研末泡酒灌服。大猪服七两，中猪服五两，小猪服二两。

献方人：貴定周胜全

处方14：鸡君皮（母鸡的） 一分 猪蹄壳 二个。

用法：鸡君皮烧干捣成细末，猪蹄壳烧成灰研成末，两者混合均匀，用竹筒吹入猪口内肿处及喉骨处。

献方人：貴定李银先

处方15：狗肉香（又名鱼香菜） 三两 苍朮 三两 麝芋 二两。

用法：将麝芋沾上酒精烧过（不能烧熟），再将其余二种药研末后一起内服。

献方人：望谟黄道成

处方16：猪鼻孔 五分 蛇莲 五分。

用法：兑酒内服。

献方人：望谟黄道成

处方17：鐮口菜一两 小臭叶一两 水馬桑三两 豆半菜
一两 芋子药（又名滾山蛛）二两。

用法：研末兌水适量服。

献方人：望謨黃道成

处方18：青头蛤蟆一个 干螺蛳二个 薺芋花三两 推屎
爬虫一个。

用法：共研成末，兌麻油二两內服。

献方人：瓮安魏德方

处方19：大蒜秆三根 雄黄一錢 猪牙皂四个 陈艾一
两。

用法：混合裹成紙領，用火点燃烘鼻。如清水来得多，再
加盐面和鍋烟子混合，放进猪嘴里。

献方人：瓮安魏德方

处方20：石芹果八两 枝子一两 馬兜苓一两 大黄一两
防风一两 知母一两 天冬一两 黃蓮一两 黃芩一两 黃柏
一两 車前子一两 銀花一两 連翹一两。

用法：将以上藥物先用清水泡三至四小时，然后煮成浓
汁，掺放在食內喂猪。每日喂一至二次，每次大猪喂二百毫
升，中猪喂一百五十毫升，小猪喂一百毫升。

献方者：州商业局

处方21：柑子五两 寄生五两 黄金草二两 枇杷叶五片
鴨脚木一两 大枫叶一两 苦子麻一两 黃沙枫一两 鷓鴣龙
五两 盘蛇蓮五两 甘草一两。