

卷一

# 浙江的好稻種

浙江省人民政府農林廳編  
浙江省科學技術普及協會

浙江人民出版社

53331

849

存

書號：(浙)099

浙江的好稻種

36開 19千字

編寫者：浙江省人民政府農林廳  
浙江省科學技術普及協會

出版者：浙江人民出版社  
杭州武林路萬石里壹號

浙江省書刊出版營業許可證出字第001號

發行者：新華書店浙江分店

印刷者：農民大眾報印刷廠

1—4,000

1954年6月第一版

定價1,200元

1954年6月第一次印圖

目錄

雙季稻早籼：五〇三

大葉改良種 南稻

雙季稻晚籼：大荆白

泥塘京揀 細稈晚青

晚籼九號

早中籼稻：六五〇六

二〇六五

勝利籼

五五七五

鐵管籼

中籼稻：二六七六

金穀黃

矮大種

矮紅稻

豬毛簇

松江老來青

晚粳稻：一〇五〇九

## 雙季稻早籼

### 五〇三

「五〇三」改良種，原產地餘姚縣，是配合雙季稻栽培很好的早稻種。全省大部分雙季稻地區都適宜栽培。鄞縣、鎮海、黃岩、平陽、永嘉等縣種植得比較普遍，一般來說比當地土種每一畝能增產五十斤左右。

這個稻種稈子粗矮，植株高二尺半到三尺，稻頭長六、七寸，每一個稻頭有八十多顆穀粒，穀粒生得緊密、粗大、穀壳薄，顏色金黃而有光澤，發棵不多不少，耐肥不容易倒伏，適宜在肥沃的田裏種植。但是容易落粒，必須及時收穫。為了避免損失，可在八九成黃熟時收割。清明播種，立夏插秧，夏至後抽穗，大暑後二、三天成熟，從插秧到收穫大約要八十五天時間。

### 「五〇三」稻種的優點很多：

一、產量高。一九五三年餘姚縣牟山鄉魏堯坤互助組，有九戶種當地土種「早黃岩」的，每畝平均收四百二十四斤，有六戶種「五〇三」稻種的，每畝平均收到四百六十九斤半，他們組裏宣紀林的豐產田，每畝收到五百四十九斤。溫嶺縣陳君榮農友種了早籼「五〇三」，每畝平均比當地土種「中性白」增產一百

零一斤。

二、稈硬耐肥，不容易倒伏。黃岩縣三甲區徐良保在一九五三年做過試驗，同一塊田裏種的「葉下坑」和「流白」都倒伏了，只有「五〇三」沒有倒伏。

三、穀壳薄，出米多，米質好，價錢高。台州地區羣衆反映：「五〇三」每斗穀可出白米五升三合，煮成飯味道又好，當地土種「餘姚白」每斗穀只能出米五升，煮成飯味道也差；賣價也比土種高，像奉化縣「五〇三」每石穀價要比土種「羅江尖」高二千元。

四、抗病能力比較強。根據在紹興等地了解，種「五〇三」的，得稻熱病、白葉枯病等，都比土種「六十日」「七十日」輕。

此外，鎮海、上虞、紹興等縣農友反映「五〇三」成熟比土種早，不大會影響嵌稻；但台州地區羣衆反映却比土種遲收三、五天，羣衆嫌成熟遲。根據臨海縣農友的試驗：如果酌量提早播種期和插秧期一天到三天，同時提前插嵌稻是以克服這個缺點的。因為「五〇三」穀壳薄，抽穗後容易遭受稻椿象為害，如有發生，就要及早在早晨露水未乾時，用網兜捕殺（開花期不能用此法）。

因為這個稻種的好處多，大家都歡喜種植，台州專區自一九五一年開始在臨海縣大田區重點推廣，到目前除仙居縣外，其他各縣都有栽培。像黃岩縣有許多農友說：「種了『五〇三』，才真開了眼，知道生產不會到頂。」

## 大葉改良種

「大葉改良種」是雙季稻中比較好的一個早稻種，在嵊縣已栽培了很長時間，很受羣衆歡迎。像馬仁鄉一百畝早稻中，就有九十畝以上是這種早稻的。因為這個稻種栽培年代已久，來歷已無從查考，羣衆只知道是改良種，看到它的葉子又闊又長，就叫它「大葉改良種」。也有些農友因為它的稈子粗硬，不容易倒伏，就叫它「健稈稻」。在嵊縣，不論種在陽畈田或山壠田上，生長都很好。上虞、紹興、奉化、臨安、溫嶺、臨海、黃岩、蕭山等地也有種植。目前這個稻種中有粗稈與細稈兩種，比較起來細稈不如粗稈好。

「大葉改良種」植株高約三尺八寸，稻頭長六寸左右，每個稻頭有一百四十到二百二十顆穀粒，穀壳黃色，部分有頂芒，稈尖（穀粒的頂端，稈讀夫）淡黃色，夏至抽穗，大暑後五、六天成熟，從插秧到收穫大約要八十五天時間。

這個稻種的優點是：耐寒、耐肥和耐澇。嵊縣臨城區周文寶種的「廣籼」和周仙達種的「大葉改良種」，同在一個地方，同時被水淹了兩夜，「廣籼」倒伏了，損失很大；「大葉改良種」却沒有受影響。一九五二年嵊縣周家坂村評比良種時，發現有一丘田耕作施肥等方法都相同，「大葉改良種」穗大粒多，每個稻穗有一百多顆穀粒，「散絲白」每穗只有七十六顆穀粒，而且糠殼多，在耐肥、

抵抗自然災害和配合雙季稻種植等方面都不如「大葉改良種」，因此大家一致評選「大葉改良種」為當地優良品種。一九五二年勞動模範俞金根種植的結果，每畝收到五百斤。一九五三年嵊縣勞動模範史千榮種的「大葉改良種」每畝收到五百六十六斤半。

一九五三年這個稻種在紹興縣試種，仍能保持穗大粒多、耐肥不倒等優點，東湖農場大面積種植，每畝產量比「五〇三」還高出八十斤。當地羣衆種植成功的例子也不少，像斗門區金有根每畝收五百二十九斤，比當地土種高出二成到三成。

臨安縣種的「大葉改良種」是橫潭村俞金根在一九五〇年從嵊縣換來的，一九五一年臨安縣農場才開始試種示範，羣衆看了很歡迎，都去換種種植，推廣得很快，到一九五三年，全縣各區已都有人種植了。

這個稻種雖然比較耐肥，但因為植株較高，葉片又長又闊，發棵又多，如果耕作不得法，容易生長過旺，影響晚稻的生長。因此，應看田腳的肥瘦，注意施肥數量不能過多，最好施足基肥，早施和少施追肥，插秧二十五天以後，不再追施氮肥。爭取兩季豐收。如果發現晚稻因受影響而發棵少、葉軋長，可在早稻收割後，把晚稻下垂而生長不好的葉子尖端割掉一寸，再馬上施用速效肥料，促使發棵，在立秋處暑之間，再施用肥效比較長的餅肥，供晚稻抽穗結實。

## 南稻

「南稻」是蕭山縣河上區與諸暨縣城南區、牌頭區（雙季稻地區）、璜山區、陳蔡區（三熟制地區）的一個農家早稻稻種。據河上區樓塔鎮的農友們說：這個品種是八、九年前從廣東引種過來的，當地就叫它「白廣白」；但諸暨縣的農友們又說是從南京引來的，都叫它「南京種」；還有許多農友看到它的莖稈基部有紅色，又叫它「紅蒲頭早稻」或「紅梗早稻」。

這個稻種植株高四尺半左右，穗長粒多，每個稻頭有一百五十到二百顆穀粒，沒有芒，穗形散開，穀半攏粒，穀壳淡黃色，稈尖紫色。清明播種，立夏插秧，夏至做肚孕穗，大暑初成熟，生長期八十五天左右。根據國營湘湖農場大面積栽培的經驗，可作為雙季間作的早稻，因為它成熟早、稈子高，影響嵌稻生長，更適宜做雙季連作的早稻。又因它的生長期短，很適合後熟作物的生長，因此諸暨縣部分地區又作為三熟制的單季早稻。

這個稻種的優點是產量高。像一九五二年蕭山縣樓塔鎮農友樓關林，種了二畝三分雙季稻，早稻就是種的「南稻」，只一季就收到糙穀一千四百二十斤，平均每畝收六百十七斤，比當地一般早稻平均每畝四百五十斤增產三成七。一九五三年溫嶺縣農場的試驗，「南稻」與其他七個早稻品種種在同一塊田裏，同樣耕

作施肥，結果「南稻」產量最高，平均每畝收六百二十一斤，倒伏的程度也最輕。缺點是成熟期比當地農家品種要稍遲幾天。臨海縣農友們的經驗，只要早播種，早插二天到三天，早施肥，是可以提早成熟的。還有一個缺點就是發棵不多。一九五三年國營湘湖農場每叢稻插了三、四根，結果平均每畝收了五百五十斤，農場的工人阮孔宇說：「如果一九五四年每叢稻插到七、八根，產量還能提高。」

## 雙季稻晚種

### 大荆白

「大荆白」是黃岩縣農民評選出來的雙季晚稻良種。在黃岩縣沿海的鹹水土和平原的淡水土種植，都能得到豐產，既適合作雙季稻的嵌稻，又適宜連作。因為這個稻種是先在大荆鄉開始種植的，所以大家就叫它「大荆白」。黃岩縣城關區農友王阿豆選用了這個稻種，幾年來連年獲得豐收，產量都比當地一般稻種高。像一九五二年每畝收到六百五十二斤，比當地土種「岩頭紅」多收一百五十二斤。頭陀區萬全鄉陳日根農友種了「大荆白」，也比當地土種「小稈」每畝增產七十多斤。許多農友都說：種了「大荆白」，每畝多收五十斤是牢靠的。因此，要求換種的農友很多，據三甲鄉四甲村調查，一九五三年只有二十多畝種這個稻種，經過換種後，今年種植這個稻種的大約要擴大到一百多畝，一年之間擴大了五倍。

「大荆白」不但在黃岩縣生長良好，就是在溫嶺、臨海等地，產量也比一般土種高。溫嶺縣試種結果：不但比當地土種產量高，而且在五個試種的品種中，也是「大荆白」的產量最高。

這個稻種植株高約二尺八寸，稈子粗，稻頭有八寸長，每一個稻頭有一百到一百二十顆穀粒，最多的有二百二十顆，穀壳深黃。秋分抽穗，霜降成熟，從插秧到成熟大約需要一百六十天，一般每畝的產量在五百斤左右。

「大荆白」的優點是：耐肥力強。像黃岩縣城關區王阿豆種的一丘「矮仁」稻，比「大荆白」少施八担廐肥，「矮仁」稻倒伏了，而「大荆白」還嫌肥料不足。這種稻抗旱和耐淹的能力也比較強。像一九五三年旱天，當地其他土種都晒得有些枯黃了，「大荆白」的稈葉還很健旺，影響產量不大。另外，還有米質好，燒飯香，抵抗螟蟲、稻苞蟲的力量強等好處。缺點是容易生稻熱病，生長慢，成熟比較遲，應當適當提早種植。稻種中紅米混雜也比較多，必須注意選種。

### 泥塘京揀

「泥塘京揀」稻種，是農友們從「泥塘京」稻種中揀選單穗培育成功的，所以叫做「泥塘京揀」。平陽縣栽培得比較普遍，當地羣衆認為這是雙季稻中一個良好的晚稻種。適宜種植在平原地區土壤肥沃的田裏。

這個稻種植株矮，稈子硬，稻頭不長，一般是五寸半，每一個稻頭有一百多顆穀粒，穀壳黃褐色，無芒，腹白小，肯發棵，米質好，燒飯香。秋分前四天抽穗，立冬前四天成熟，從插秧到收割需要一百五十五天左右，一般每畝產量在五

百斤左右。

因為這個稻種需要肥料比較多，所以一般田腳差或缺肥的農戶都不願意種植。像瑞安縣九里鄉潘時土，有一丘田種了這個稻種，因為田腳差，一連施了四次肥料還不見轉青，所以當羣衆向他換種時，他說：「要種這個稻種，趕快先去積肥料吧。」又像平陽縣金鄉區有一位農友看見這個稻種不錯，瘦瘠的田裏也種上幾畝，結果稻稈矮黃無力，就罵它「黃胖種」。實際上並不是這個稻種壞，而是肥料不足的緣故。像靈溪區對露鄉因為水源充足，下的肥料多，「泥塘京揀」就生長得很好，稻頭沉重，穀粒飽滿。雲岩鄉的張恆文，別人勸他換些種種，他說：「什麼泥塘揀不泥塘揀，我就是不揀，看我豐產不豐產。」去年秋收後，他暗暗地比了比產量，才對人家說：「日後我也要揀了。」

「泥塘京揀」在瑞安縣種植也很好，當地農友們反映這個稻種有以下幾個好處：

一、抗螟蟲能力強。像瑞安縣九里鄉潘寶興一九五三年種了一畝五分「泥塘京揀」，附近的幾丘，種土種的，螟害很嚴重，其中潘寶健的一畝田，只收到七十多斤穀，而潘寶興的田白穗比較少，每畝收到四百斤。又像東山鄉林順和試種的八個品種中，也算「泥塘京揀」枯心苗最少。

二、抽穗快而整齊，成熟一致。九里鄉胡寶善說：「早三天到田裏去看，稻

在做肚，三天後去看看，稻頭已經斬齊了，再過三天去看，只見稻頭都已下垂了。」

三、不容易落粒。九里鄉農友潘時土說：「割稻時，種『荒四百』的田，滿田都有落粒，種『泥塘京揀』的田，就很難找到。」

四、出米多。「泥塘京揀」每百斤穀可碾白米七十四斤，而「荒四百」每百斤只能碾白米六十八斤。

「泥塘京揀」的主要缺點是：穗頭比較小，穀粒不多；因為這個稻種稈矮葉綠，鐵甲蟲特別歡喜吃。因此，在秧田時要用灌水浮撈法或用藥粉（六六六）噴殺。

### 細稈晚青

「細稈晚青」是配合雙季稻種植的一個優良的農家晚稻稻種。有的農友當作單季晚稻來種植，產量也不低。這個稻種在本省鄞縣種植已有四十多年，種植面很普遍。其他像慈谿、餘姚、奉化、鎮海等地也有栽培。據老農民說：「細稈晚青在初引來種植的時候，稻頭短，產量低，但現在稻頭已長起來，越種越好了。」「晚青」目前有粗稈、細稈二種。粗稈的產量低、品質差，栽培面積已逐年減少。像鄞縣少白鄉只有細稈一種了。羣衆所以歡喜種植這個稻種，是因為它的米質非

常好，燒成飯特別香。像甯波有許多米店以前都拿「南鄉細稈米」作為吸引買主的廣告。

「細稈晚青」的植株高三尺八寸到四尺五寸，稻頭長七寸左右，每一個稻頭的穀粒，有一百顆左右，穀形尖長，穀壳褐色，沒有芒，發棵能力強，抽穗不很整齊，成熟也不一致，所以也有人叫它「野稻」。白露後抽穗，立冬前成熟，從插秧到成熟需要一百五十天時間。作單季稻種植，一般每畝可收七百多斤，配合雙季稻種植每畝也可收五百斤左右。

這個稻種稈子細韌，抗風耐勞能力還不差，但比較怕旱，做肚灌漿時更不能缺水，鄞縣農民說：「細稈晚，很怕旱，夏白連秋，顆粒無收。」因此要注意灌溉工作。

紹興縣東湖農場及少數農友在一九五三年種植這個稻種，結果都生長得不錯，像金有根每畝收到五百零三斤，比當地土種增產二成，因此，這個稻種只要進一步加以培育，是有發展前途的。

### 晚稈九號

「晚稈九號」改良稻，是從甯波晚青稻中選育成功的，是一個配合雙季稻栽培很好的晚稻種，也可作單季稻來種植。當作雙季稻栽培時，和早稈「五〇三」、

「天花落」、「餘姚尖」、「矮脚黃」等早稻種配合栽培都很相宜，本省富陽、杭縣、慈谿、鎮海、海甯、奉化、紹興等縣都有栽培。農友們給這個稻種取的名字很多，有的叫「白蒲頭」，有的叫「洋稻」，有的叫「霜稻」或「冷稻頭」，也有的叫「矮黃」或「黃尖」的。

「晚稻九號」的稈子細小，高約三尺半到四尺，稻頭小，穗長約六十多，一個稻頭有八十到一百八十顆穀粒。穀粒上闊下狹，殼色深黃，沒有芒。穀雨前播種，小滿到夏至邊插秧，秋分抽穗齊，霜降前後可以收穫，從插秧到成熟需要一百四十天左右。

這個稻種的優點是：發棵能力、抵抗螟害和耐旱能力都比較強。如果早期遭受災害，還能再發棵或用分秧補種；不會受到很大損失。另外，因為它抽穗整齊，成熟一致，所以收割起來也便當。

富陽縣農友把這個稻種當作單季晚稻來種植，生長也很好，一九五二年太平區農場種植結果，每畝收到六百四十一斤。當地羣衆看了很歡迎，都向農場換種，不多久，就換去稻種六千多斤。一九五三年富陽縣旱情很重，但「晚稻九號」仍舊生長健旺，抽穗成熟整齊，產量高出當地一般稻種。像木橋鄉許晉深種的一畝一分田，收到糙穀五百斤，比其他稻種增產二成以上。城關鎮鮑順田的產量更高，每畝收到六百斤。他說：「沒有『晚稻九號』這個稻種，今年那有這樣好收成？」

成。

「城關鎮生產能手許長生也說：「這是靠得牢、拿得穩的稻種。」」晚籼九號」不很耐肥，不宜種在太肥沃的田裏，施肥時也要注意免得倒伏。因為它發棵多，小株密植時要少插幾根。根據部分地區反映，說這個稻種抽穗、成熟不整齊，紅米多，產量已在逐漸降低，因此，除加強培育外，更要注意選種。

一九五一年，縣農業局對水稻品種考察組：「稻大粒一來一筆直幹」，本省安陽縣「固始寒武門種和它一樣外幹」。縣二年計劃：「稻幹粗葉繁茂，穗長，一次五〇粒以上，穗長中等，六五〇六一，株叢合抱或以上，並有葉鞘呈對稱，莖節短，莖基部膨脹，並有分蘖一百天左右。

黃安市：固始谷頭產種與普通不同，株叢低矮附着地面，一株每叢開兩穗花，穗長三寸，粒長而窄，穗形圓錐形，穗軸平滑無毛，穗軸基部膨脹，並有分蘖一百天左右。

## 六五〇六一

## 早中稻

### 六五〇六

早中稻「六五〇六」是從金華縣農家品種「八十日」裏面選育出來的，除了適合浙東三熟制地區栽培外，在浙西部分的單季早稻地區也有種植。這個稻種幼苗強壯，生長快，株高三尺半到四尺半，葉片比較闊，稻頭長六、七寸，穀壳淡黃，沒有芒。因為各地氣候與習慣不同，播種期也稍有先後。一般在清明前後播種，穀雨到立夏插秧，立秋後三、四天收割，從插秧到成熟約一百天左右。

一九五〇年江山縣推廣早中稻「六五〇六」，很適合當地土性，連年獲得豐收，因此農友們都叫它「解放種」。像上余村江仁傑種植結果，比一九四九年每畝增產一成半，他就高興得唱起快板來說：「解放種」來「解放種」，確實是個好稻種，共產黨來翻了身，多收糧食快選種。

「六五〇六」的優點是產量高，抗病耐澆能力比較強。一九五一年龍游縣上王鄉農友葉益茂，有九分二厘田種土種「千計響」，只收稻穀四百斤，一九五二年改種了「六五〇六」，結合精耕細作，每畝收到八百二十五斤。衢縣雙橋鄉一九五二年有八十多畝田發生了稻熱病，但毛源海種的「六五〇六」，生長却很好。