

(5)

1125

周正銘

XXXXXXXXXXXXXXXXX
X
X 內部參考資料 X
X
XXXXXXXXXXXXXXXXX

全國主要農作物優良品種目錄

農業部種子管理局編印

1957年7月

前 言

近几年来，在我国各地推广的作物优良品种，种类很多，在农业生产上起了不同程度的增产作用。过去从中央至地方对于这些品种资料一般只作了局部、零星的了解，缺乏有计划的全面掌握，因此对于交流品种和發揮品种的潜在力量不免受到一定的限制。为此有必要对现有优良品种作较全面的搜集整理，以供各地在换种、引种以及推广品种工作的参考，并为今后进一步对各个品种进行深入研究打下有利的基础。

我们于今春就着手进行这个工作，首先根据过去各省区报部资料和新近搜集的资料，采用品种卡片的整理方法，分别汇编各省（区）主要作物优良品种目录初稿，然后又经各省区农业领导部门加以补充修正。全部内容包括：水稻、陆稻、深水稻、小麦、大麦、燕麦、高粱、粟、玉米、甘薯、马铃薯、大豆、花生、油菜、芝麻、向日葵、亚麻、棉花等 18 种主要作物计 772 个品种，并按各品种的名称、类型、来源、主要性状、分布地区、推广面积及其增产成效各项分别编列。在品种的编排方面，是按汉语拼音字母顺序排列，以便于查阅。

这本册子所列的品种资料，可能还有不少优良品种没有包括在内，同时因为这个工作是第一次着手，由于人力、时间和资料的限制，不仅内容不够细致全面，而发生错误之处也在所难免，尚有待于今后各地继续搜集这方面的资料予以补充修正，使臻完善。

农业部种子管理局

1957年7月

目 錄

(一) 水 稻	259个	1
1、粳 稻	184个	1
2、粳 稻	75个	30
(二) 陸 稻	13个	45
(三) 深水稻	9个	46
(四) 小 麥	174个	48
1、冬 麥	137个	48
2、春 麥	37个	71
(五) 大 麥	12个	77
(六) 燕 麥	3个	79
(七) 玉 米	70个	80
(八) 高 粱	23个	91
(九) 粟	30个	94
(十) 甘 薯	25个	99
(十一) 馬鈴薯	16个	104
(十二) 大 豆	48个	107
(十三) 油 菜	22个	115
(十四) 花 生	23个	119
(十五) 芝 麻	9个	122
(十六) 向日葵	6个	124
(十七) 亞 麻	8个	125
(十八) 棉 花	22个	126
附錄: 全國各省区主要農作物优良品种索引		131

1、 籼 稻

(一) 水 稻

編号	品 种 名 称	品种类型	品 种 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 区	推廣面積及增產成效
A: 1	矮 脚 番 子	連作晚粳	湖南地方主要品种。	莖細矮、分蘖力强、較耐肥、易受螟害、適于深泥田、垸田、壩田、本田生育期93—95天。	湖南醴陵	一般每畝產量300—400斤，最高600斤。
2	矮 脚 麻	中 粳	湖南地方主要品种。	莖高4尺左右、分蘖力强、穗長粒多、耐肥、不易倒、易落粒、適于較肥沃的田、本田生育期110天。	湖南新寧、城步。	一般每畝產量550—650斤，最高900斤。
3	矮 薏 祗	晚 造	廣東農家优良品种。	秆矮、分蘖力强、抽穗整齐、成熟一致、粒形扁大、米質好、抗風、適宜于垸田栽培。	廣東東江、兴梅一帶种植較普遍、翁源等縣亦有种植。	
4	矮 子 粘	早中粳	廣西容縣農家良种。	株高3尺左右、秆粗硬、耐肥、不易倒伏、叶面寬大、叶色濃綠、抽穗較整齐、成熟一致、分蘖力特强、較耐寒、谷粒飽滿、千粒重約26克、米質中等、全生育期130—140天。	廣西容縣等地。	畝產500—600斤。
B: 5	白 谷 糯 16 号	中熟早粳	原產安徽，1928—1930年由前中山大学農學院稻作試驗場用穗選法育成。	適應性强、耐旱、可作陸稻栽培、產量穩定、对稻熱病和白叶枯病、抵抗較弱、不耐肥、过肥易感染病害、全生育期在兩廣均为115天。	廣東伏山、韶關、惠陽、潯江、谷浦各專区，廣西桂西直屬縣及容縣、百色、宜山等專区。	兩廣1956年推廣面積計达640万畝，廣東陽江縣一區列尾第一農業社1.07畝，畝產达805斤。
6	白 壳 矮	晚 造	原產廣東潮安縣，为潮汕地区晚稻高產品种之一。	莖秆矮壯、穗長大、米質好、抽穗整齐、耐肥、不耐旱、不实粒多、易徒長、適宜于肥沃的粘質土、但較瘦瘠沙質土亦可种植、本田生育期115天。	廣東澄海、潮汕、揭陽、潮陽等縣。	逐步推廣，一般每畝產量700—800斤，最高980斤。

編 號	品 種 名 稱	品種類型	品 種 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 區	推廣面積及增產成效
7	白 麻 粘	粘 稻	湖南地方主要品種。	產量高、質優、不倒伏、分蘗力強、耐肥、丰產潛力大、全生育期158—165天。	陝西關中及陝南地區。	1956年推廣面積達6萬畝，據陝南農場5年試驗，高出一般農家種10—20%。
8	白 米 多 粘	晚 粘		分蘗力較紅米多粘強，只適于秋前栽秧，秋后栽秧難于成熟、適于較肥沃的粘砂質土壤種植、生育期85天。	湖南洞庭湖區及長沙一帶。	一般每畝產量340—450斤，最高600斤。
9	白 米 谷	粘 稻	廣西桂林農家品種。	籽粒粗、穗大、耐肥、不實粒多、生育期126天。	廣西桂林市、臨桂縣等地。	1956年推廣面積約7萬多畝，增產10%。
10	百 天 早	早 粘	貴州農家良種。	分蘗力中等、籽硬、適合種雙季稻地區、常用來作頭季稻、成熟期約100天左右。	貴州册亨、安龍等縣。	
11	白粘（大白谷）	中 粘	貴州省農家良種。	株高大、耐肥、穗長粒多、米質好、出米率高、分蘗力中等、抗病蟲力較差、適宜種植垅田及中上等肥田、中熟或中晚熟、產量高。	貴州全省各縣均有栽培，其中畢節、遵義、銅仁等專區栽培較少。	最高每畝產量有達1,000斤以上。
12	芭 芽 粘	中 粘	湖南地方主要品種。	莖高葉大、分蘗力強、穗長粒密、耐肥不易倒伏、適于坪田、壟田、岸田、本田生育期105—110天。	湖南臨湘。	一般每畝產量500—550斤。
13	半 天 子	雙季早粘	原產台灣，1950—52年經福建省龍岩專區農場試驗結果良好。	根群發達、莖秆粗壯、米質好、穗長、粒密、小穗多、耐旱、抗螟力較強、抗病力較差、對土壤要求不高、但能耐肥、分蘗力較差、生育期135天。	福建龍岩、長汀、永定等縣。	一般每畝產量400—530斤，較當地種增產37%。

編号	品 种 名 称	品种类型	品 种 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 区	推廣面積及增產成效
14	保 太 占	粳 稻	从廣西賓溪縣農家品种中選出來。	秆粗大、耐肥、不耐旱、生育期125天	廣西容縣專区各縣的部分地区。	1956年推廣面積約 5,000 畝，增產 10%。
15	巴 州 谷	粳 稻	四川万縣農家品种。	較耐肥、分蘖力中等、產量穩定、米質中等、適宜于中上肥田种植、全生育期140天。	四川嘉陵江流域一帶。	一般畝產 500—600斤。
16	玻 璃 粘 (宜粘、宜山粘、 皇 后 粘)	早 造	原產廣东南海縣官山鄉，是農家優良品种。	生势壯旺、叶色淡綠、穗大粒細長、腹白小、米質优、適應性强、耐肥、抗倒伏、抗病虫害力强、但生育期較長、在廣东从播种到收穫需130—135天。	廣东伏山專区。	推廣面積由1955年的 300,000畝，擴大到1956年800,000畝。一般畝產 450斤左右。
C: 17	長 粒 粳	中 粳	前江西吉安農藝場从農家种中選育而成。	莖秆粗長、穗長粒稀、谷粒特長(8.5耗)、米質很好、有耐淹特性、但因米細長不適于机碾。	江西除撫州專区外，全省其他各地均有种植。	估計1956年推廣面積为50万畝，一般每畝產量550斤，較普通种增產約10%。
18	茶 粘 1 号	早 中 粳	前湖南農業改進所从衡陽農家品种“茶粘”中選育而成。	莖秆粗壯、穗長粒稀、耐肥、不倒伏、抗涝、抗病力强、較早熟、適于稻豆兩熟、本田生育期湖南90—105天。	湖南湘南一帶及廣东韶关專区。	廣东推廣面積由1955年的550,000畝，擴大到1956年560,000畝，湖南一般每畝產量 500斤。
19	成 都 小 白 条	粳 稻	四川省農家品种。	分蘖中等、適應性强、成熟后穗的分枝易折斷、粒大、易落粒、全生育期140天。	四川成都平原各縣。	畝產高达 700斤以上。
20	城 下 早	双季早粳	江西臨川縣的地方良种。	適應性强、較耐瘠、耐旱、分蘖力强、產量穩定、抗病虫力弱、莖秆細軟、不大耐肥、易倒伏、不耐淹。	江西撫州專区。	

編號	品 种 名 称	品种类型	品 种 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 区	推廣面積及增產成效
21	赤 叶 仔	晚造迟熟	廣東潮陽區農家種，經澄海縣農場選育而成。	極迟熟，粒重、莖秆粗大強硬、耐肥、適應性強、本田生育期130天左右、全生育期160—170天。	廣東澄海縣。	最高每畝產量達1,180斤。
22	川 農 422	中 稻	1938年由前川農所從農家種“瀘縣谷兒”中穗選出來。	分蘗力較強、產量穩定、無芒、壳薄、出米率高、米質優良、着粒密、全生育期130天。	四川成都平原、達縣專區各縣和內江、溫江、綿陽、遂寧、南充、雅安各地。	1956年推廣面積754,197畝，單產300—600斤，高的達700斤以上。
23	川 農 1051	稻 稻	1938年從農家品種“仁壽東油條”中單穗選出。	秆細硬矮小、不易倒伏、分蘗力及耐肥均強、較耐旱、种壳厚、腹白小、品質優、全生育期138天。	四川川西丘陵地區。	目前已停止推廣。
D: 24	大 邦 圩	單 双 季 稻 晚 稻	福建沙縣農家的評選良種。	莖秆粗大、分蘗中等、谷粒有短芒、米質好、抗風力很強、不易倒伏與脫粒、對螟害和稻熱病抵抗力強、很耐肥、適應性強。	福建尤溪、順昌、南平等縣。	1955年種植面積已達6萬畝以上，一般每畝產量500斤，最高達930斤。
25	大 剛 粘	晚 造	原產廣西桂平縣，1940年引入廣東粵北地區種植。	秆硬、抗倒伏、耐肥、抗風力較強、不易落粒、虫害少、米質粗、迟熟、對多种有影響、本田生育期120—130天。	廣東韶關專區各縣。	推廣面積由1955年的162,000畝，擴大到1956年540,000畝。
26	大 荆 白	晚 稻	原產浙江東清縣大荆鄉。	莖秆粗硬，株高3.5尺、穗長6—7寸、着粒緊密、壳黃褐色、分蘗弱、抽穗整齊、耐肥不倒伏、成熟較迟、易落粒、本田生育期間作150—160天，連作100—105天。	浙江溫州專區甌江以北地區。	一般較當地種增產40—50斤，臨海農民反映：“大荆白到那里，增產到那里”。

編号	品 种 名 称	品种类型	品 种 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 区	推廣面積及增產成效
27	大 黃 粘	晚 粘	廣东西江地区農家优良品种。	耐肥不易倒伏、耐旱、耐碱、抗風、不易感染稻熱病、生长期間易受螟害、在廣東本田生育期120天、廣西全生育期約130多天。	廣東高要專区各縣、廣西潯溪、蒼梧、藤縣、桂平、貴縣、容縣各地。	兩廣1956年推廣面積計达 252万畝、在廣西增產 10 %左右。
28	大 叶 粘 (天 生 稻)	中 粘	安徽農家良种。	秆健、穗黃色、短芒成熟早而一致、不易落粒、產量穩定、抗寒抗旱抗澇力差、壳薄、米色白。	安徽沿江地区。	一般每畝產量 450斤左右。
29	澄 秋 5 号	晚 造	廣東揭陽農業試驗站由澄海縣農家种“秋播了”中選育而成、1953年开始推廣。	生長健壯、插后易回青、枝秆強硬、分蘖力中上、出穗整齐、腹白少、粒密、耐肥、不易倒伏、但成熟时有包頸現象、宜栽于深肥田、本田生育期115天。	廣東汕頭專区各縣如揭陽、潮陽、潮安、普寧、汕头、澄海、丰順、饒平、蕉嶺、長寧、梅縣等地。	推廣面積由1955年的130,000畝、擴大到1956年430,000畝。
30	电 杆 紅	中 粘	湖南地方主要品种。	叶鞘、稃尖、柱头紫色、較耐肥、耐旱、易倒伏、適于砂質壤土种植、本田生育期90—95天。	湖南湘潭。	一般每畝產量 450—500斤。
31	頂 头 禾 (齐頂禾、英雄禾)	双季早粘	原產福建福清縣、1953年經上杭張繼特約農戶試种、結果良好。	莖秆粗硬、根群發達、很耐肥、抗旱力强、成熟快而一致、不易感染稻熱病、但分蘖較早、抗虫力較差、易掉粒。	福建福清、上杭等縣。	1956年推廣面積达25,000畝、每畝產量400—500斤。
32	短 廣 花 螺	粘 稻	系由台灣引進內地的品种。	莖秆粗壮、穗長粒多而密、谷粒橙黃小而圓、生育期約125天。	江西中部及东部地区。	
33	多 稻	早 粘	浙江乐清縣農家良种。	耐旱、耐碱、抗虫(稻飛虫)不宜太肥田地种植、米有紅白兩种、品質好。	浙江乐清縣。	

編 號	品 種 名 稱	品種类型	品 種 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 區	推廣面積及增產成效
34	東 莞 白 18 号	粳 稻	前中山大學 農學院稻作試驗 場育成。	耐肥、耐漬、米質中上、全 生育期126天（其中秧齡30天）。	廣西石龍、蒼 梧、平南、容縣、 博白各縣。	1956年推廣面積 2萬畝，增產10%左 右。
E: 35	惡 打 粘	晚 粳		莖秆粗壯分、蘗力中等、抗倒 伏力強、廣西全生育期為130天。	廣東湛江、合 浦專區，廣西博 白、靈山、合浦、 浦北各縣。	廣東1956年推廣 面積達47萬畝，廣西 約1,000多畝，增產 10%左右。
G: 36	剛 稻	粳 稻	江蘇揚中縣 農家良種。	秆高4—5尺、小穗排列密、 無芒、壳淡黃色、稃硬粗、抗倒、 不易落粒、耐肥、耐漬、抗旱力 弱、抗風、抗病力強、米質脹性 較差。	江蘇鎮江專區 和揚中專縣，以及 沿江水源充足的圩 田漚田地區。	1955年揚中縣 六墩鄉一社155畝剛 稻，平均畝產590斤， 其中1.29畝達887.5 斤。
37	焊 農 3425	早 粳	前江西省農 業院从上高縣 農家品種“上高 早”中選出的。	莖秆粗健、劍叶短而寬、抽 穗整齊一致、不倒伏、不易落粒、 出米率高、生育期約110天。	江西全省各 地。	估計1956年推廣 面積為150萬，平均 畝產500斤以上，較 一般增產10—15%。
38	焊 農 5636	早 粳	前南昌農事 試驗場从余干農 家種“興黃早” 單穗選育而成。	莖秆短而細、分蘗力特強、 谷粒細長、米質好、出米率高、 耐肥力較差。	江西全省各 地。	估計1956年推廣 面積為100萬畝，平均 每畝產量500斤左右、 較一般增產10%。
39	高 脚 番 子	連作晚粳	湖南地方主 要品種。	莖秆高、分蘗強、穗長粒密 而大、需肥較少、不易倒伏、米 質好、抗病虫力弱、適于深泥田、 坪田、壩田。	湖南澧陵。	一般每畝產量 400斤。最高500多斤。
40	江 洲 粘	晚造迟熟	原產廣西河 池縣江州。	秆硬、耐肥、不倒伏、米質 中等、但易落粒、易徒長、生育 期長、芒種播種、小雪收穫、系 迟熟種。	廣東合浦專 區。	

編 號	品 種 名 稱	品種类型	品 種 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 區	推廣面積及增產成效
41	解 放 粳	中 粳	湖南常德稻作試驗場育成。	莖秆肥壯、叶寬、劍叶角度小、穗短粒密、抗漬、再生力強、生育期100天左右。	湖南洞庭湖区 慈利。	一般每畝產量 500多斤，最高800多 斤。
42	金 風 雪 5 号	晚造迟熟	前中山大学農學院稻作試驗場育成。	秆粗壯、出穗整齊、分蘗多、耐肥、耐漬、耐碱、耐風力特強、系迟熟种。	廣東珠江三角 洲一帶。	
43	金 山 粘 3 号	晚造中熟	前中山大学農學院稻作試驗場育成。	分蘗力強、秆長、穗長中等、抽穗齊、不耐風、谷粒細長、着粒疏、系中熟种。	廣東伏山、汕 頭專區各縣。	推廣面積由1955 年的 258,000畝，擴 大到 1956年860,000 畝，一般畝產 300多 斤。
44	九 担 倒 (其其种、烏蒂 命、白尾秋等)	双季晚粳	1948年福建連江縣農民陳其其从高脚烏蒂命中選出單株育成。	根系發達、入土很深、莖秆堅硬粗壯、分蘗力較弱、米質白而香、耐肥、耐旱、耐鹽碱、抗風、病虫少、不易倒伏、難脫粒。	福建連江、福 州、閩侯各地。	1956年種植面積 估計約 6,000畝，每 畝產量400—700斤。
45	鷄 爪 粳	中 粳	安徽農家良种。	產量穩定、適應性廣、出米率高、抗旱、不易脫粒、秆硬不倒伏、耐肥力較差、抗漬力差、米質中等。	安徽懷寧、滁 縣等地。	一般每畝產量 400 斤左右。
46	廣 東 麻	中 粳	湖南地方主要品种。	莖粗壯、較耐肥、不易倒、米質不好、不擇土壤。	湖南武岡、邵 陽。	
47	廣 東 早	双季早粳	原產廣東省。	根群發達、分蘗及抗病力均強、耐旱、耐漬、耐鹽、耐碱力中等、不易倒伏、易脫粒。	福建平原、沿 海、山区均宜栽 培。	1956年推廣面積 約達10,000畝，每畝 產量300—400斤，最 高達800斤。

編號	品 种 名 称	品种类型	品 种 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 区	推廣面積及增產成效
48	廣 場 7 号	早 造	華南農業科學研究所育成。	分蘖力中、耐肥力中等、抽穗成熟均整齊、米質中、抗倒伏及抗稻熱病力較廣場13号弱、適于中等深肥田、全生育期115—120天。	廣東海南、中山各縣。	
49	廣 場 13 号	早造早熟	廣東省農業試驗場及華南農業科學研究所1950—1955年育成。	莖秆粗大、生勢很強、耐肥力及抗倒伏性均強、不實粒少、產量穩定、適應性較強、不論沙田、圍田、坑田及坑田等均可獲得丰收、全生育期115—120天、其中本田生育期100天。	廣東粵中專區各縣及湛江、高要區、惠陽各地。	南海縣圍田地區3年來引種結果，每畝產量在600斤以上的不少，較當地土種增產100斤以上。該縣1956年準備擴大種植面積10万多畝。
50	觀 音 占	籼 稻	廣西全縣農家品種。	分蘖多、耐肥、不易倒伏、生育期136天。	廣西桂林專區全縣、興安、及平樂專區各縣。	1956年推廣面積約3萬畝，增產10%。
51	貴 陽 籼	中 籼	由原貴州農業改進所在貴陽郊區農家中選育而成。	株中高、秆較壯、分蘖力較強、而耐肥不易倒伏、穗大較抗旱、成熟後易落粒。	貴州安龍、江口、劍河、羅甸等縣。	
52	過 冬 青	連作晚籼	湖南地方主要品種。	分蘖力強、着粒密、耐寒力強、抗旱力較差、適于粘、沙質壤土。	湖南瀏陽。	
H: 53	哈 哈 種	晚造中熟	原產廣東潮汕平原區。	分蘖快而多、耐肥力中等、易倒伏、不易感染稻熱病、有紋枯病。	廣東潮陽分布很廣、揭陽也有少量種植。	近年在華南農科所大田繁殖結果表現良好，每畝產量達到600多斤。
54	綫 谷	中 籼	湖南地方主要品種。	叶鞘、稃尖、柱頭紫色、抽穗整齊、分蘖力弱、需肥較少、易落粒。	湖南。	

編号	品 种 名 称	品种类型	品 种 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 区	推廣面積及增產成效
55	咸 雪 9 号	晚 造	前中山大学農學院稻作試驗場培育而成。	抗稻苞虫、分蘖弱、米質中等、適應性強、耐冷、抗風、本田生育期 120 天。	廣東梅縣、蕉嶺、興梅等地。	
56	仙 游 本	双季連作晚 粳	原產福建仙游，1952 年福建莆田縣評選為農家良種。	莖秆粗壯、不易倒伏、分蘖力弱、米質好、早熟、耐肥、抗旱力和抗病虫力較強、但因叶色青綠、卷叶虫为害較重。	福建莆田、仙游、福清、閩侯、南平、龍岩、大田等縣。	1956 年推廣面積達 15 萬畝，每畝產量 500—600 斤，最高可達 900 多斤。
57	小 白 粘 (小白谷)	中 早 粳	貴州農家良種。	株較矮小、較耐肥、成熟較早、分蘖力強、適于密植、米質好、能抗旱、籽較軟、易遭病虫害、較易落粒。	貴州畢節、遵義、銅仁等專區較少栽培外，全省其他各縣均有栽培。	推廣面積由 1955 年的 108,805 畝，擴大到 1956 年 149,730 畝。
58	小 稻	早熟粳稻	甘肅銀川的農家良種。	植株較矮、小穗稀疏、粒圓柱形、耐肥力強、生育期短，一般 80—90 天，早播（芒种前）迟播（夏至）均可成熟。	甘肅銀川中部、中寧、永寧、寧湖、吳忠、金積、灵武等縣，以銀川一帶种植較廣。	一般畝產 200 斤左右。
59	小 多 稻	晚 粳	安徽江淮地區農家良種。	粒小、麻壳、白米、全生育期 130 天左右。	安徽主要分布在安慶專區及蚌埠專區南部。	每畝產量 300—450 斤。
60	小 紅 稻	晚 粳	安徽農家良種。	莖秆較細、分蘖力強、無芒、白壳紅米、抗寒力強、產量穩定、生育期短、120 天左右。	安徽主要分布在蕪湖、安慶兩專區。	一般每畝產量 300—400 斤，肥沃土壤可達 500 斤左右。
61	夏 至 白 16 号	早 粳	原產廣州市沙河附近，由前中山大学農學院稻作試驗場選育而成。	耐肥、不易倒伏、耐旱、结实率很高、抗寒力較弱、易感染胡麻叶斑病、全生育期廣東為 108 天、廣西 115 天。	廣東湛江專區，廣西容縣專區各縣和宜山專區大苗山等縣。	兩廣 1956 年推廣面積計達 162 萬畝，其中廣東為 140 萬畝，近年在廣東湛江專區推廣，有些地區比南特 16 号为高，一般每畝產量在 500 斤左右，在廣西增產 10%。

編号	品 种 名 称	品种类型	品 种 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 区	推廣面積及增產成效
62	洗 白 早	早 籼	湖南地方主要品种。	莖粗、穗長、粒密、較耐肥、適于較肥沃的砂質或粘質壤土。	湖南瀏陽、攸縣。	一般每畝產量400—500斤。
63	細 杆 晚 青	晚 籼	1951年为浙江鄞縣的初选种。	適應性强、耐肥、較抗旱、抗病力强、杆細而韌、不倒伏、產量穩定、米質好、但無效分蘗多、在双季連作情況下、本田生育期160天左右。	浙江寧波、鄞縣、嵊縣、余姚、鎮海、奉化、慈溪等縣。	
64	細 粒 谷	中 籼	原產江西湖口，由前江西省農業院从單穗选育而成。	分蘗力强、產量高、米質好、谷粒稍細小、抗旱、生長快、成熟早、易落粒、在江西生育期为130多天。	江西輝北的九江、瑞昌、焊东的玉山、余江、鄧埠以及江苏丹陽、鎮江、揚州、高郵、江浦等地。	江西1956年估計推廣面積为20万亩，一般每畝產量在500斤以上，較当地种增產10%左右。
65	西 南 粘	粘 稻	四川省農家品种。	分蘗力强、耐瘠、適于二山田及瘠田、抽穗成熟均整齐、穗長、着粒較稀、米質好。	四川。	
66	新 西 洋 2 号	晚 造	廣東揭陽縣農場从農家品种中选育出來的。	穗長结实率較多、米質好、抗病力較强、但不耐肥、較易倒伏、本田生育期約110天。	廣東揭陽、惠陽各地。	逐步推廣，增產20%。
67	新 西 洋 14 号	晚 造	廣東揭陽縣農場从農家品种“新西洋”中选育出來。	分蘗强、出穗齐、米質中等、抗病力較强、但成熟度不够一致、不甚耐肥、較易倒伏。	廣東揭陽縣。	逐步在山区及丘陵地区推廣，增產10—20%。
68	黑 督 4 号	粘 稻	前中山大学農學院稻作試驗場育成。	秆矮整齐、穗形中等、着粒密而大、成扁圓形、品質上等早熟、耐肥中等、抽穗齐、不耐浸、不耐寒、全生育期110天。	廣東湛江地区。	每畝產量約500斤。

編 號	品 種 名 稱	品種類型	種 品 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 區	推廣面積及增產成效
69	華 東 399	中 粒	華東農業科學研究所勝利稻×中農4號雜交育成。	穗大稈尖無色、谷壳深黃、耐肥、不倒伏、避螟、不太抗病、白叶枯病重、抽穗整齊、早熟、高產質優、在安徽生育期為119天。	安徽宣城、徽州、蕪湖、安慶部分地區及江蘇各地。	據安慶試驗站試驗結果每畝產量684.8斤，較一般產量為高，在江蘇較勝利稻增產8%左右。
70	黃 禾 子	双季晚粒	从江西焊縣農家種中檢定，經過農場比較試驗選育而成。	莖秆較健、耐肥、分蘖力強、落粒密、無芒、米質白、品質好、出米率高、抗浮腫子能力較強。	江西除九江專區外，全省其他各地均有種植。	估計1956年推廣面積為150萬畝，一般每畝產量300斤，高的可達500斤，較普通種增產15—20%。
71	黃 占 (鷄兒占、青尾占、) 老鼠占、占仔、)	晚 造	廣東農家良種。	分蘖力很強、米質好、抗旱能力很強、但不甚耐肥、本田生育期101天。	廣東茂名、吳川、徐聞、廉江、陽江等縣。	逐步推廣，增產10—20%。 一般每畝產量400斤。
72	華 南 15 号		華南農科所新育成的品種。	米質好、發芽能力很強、耐肥、不易倒伏、自移植到成熟107天。	廣東番禺、南海、高要、陽江等縣試種結果良好。	
73	湖 北 早		湖南地方主要品種。	成熟早、耐肥力弱、易倒伏、不耐漬、旱、抽穗整齊、適宜沙性田、淺泥田、草子田種植。	湖南醴陵。	
74	紅 脚 早	早 粒	湖南醴陵農家品種，1953年引進湖北試種。	莖秆強硬、分蘖強、抽穗整齊、落粒密、稈尖紫色、葉綠帶紅紋、葉鞘紅紫色、成熟早、產量高而穩定、米質好、適應性強、生育期105—110天。	湖南醴陵、瀏陽等地，湖北黃梅、洪湖、孝感、武昌、嘉魚、蒲圻等縣有大面積種植、鄂北容城、隨縣、宜城、南漳等縣已試種成功，正在擴大種植，因其成熟早產量高為擴展双季稻的好早稻品種。	1956年湖北推廣面積達20萬畝，在湖南一般每畝產量400—450斤。

編号	品 种 名 称	品种类型	品 种 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 区	推廣面積及增產成效
75	紅 叶 香 稻	中 粳	安徽全椒縣 農家良种相傳由 江南引進。	莖秆高而細、粒黃色、米很 香、品質好、抗螟力強、早熟丰 產、本田生育期85天左右。	安徽宣城、蕪 湖、貴池、全椒等 縣均有少量种植。	在全椒每畝產量 430—560斤。
76	紅 毛 黃	中 粳	湖南地方主 要品种。	分蘖強、適應性大、耐肥、 米質好、出米率高、適于較肥沃 的坪田、壩田、岸田。	四川。	
77	紅 米 番 子 (紅米多粘)	連作晚粳	湖南地方主 要品种。	莖矮細弱、叶細多毛、谷粒 細長、適應性強、耐漬、易倒、 易落粒、米紫紅色、適于粘砂質 壤土、本田生育期80天。	湖南洞庭湖 區。	一般每畝產量300 —400斤，最高600斤。
78	暹 黑 7 号	早造中熟	前中山大學 農學院稻作試驗 場用暹羅×黑督 雜交育成。	很耐肥、分蘖較多、成熟一 致、粒多而密、抗寒力較弱、易 感染叶稻熱病及白叶枯病、不實 粒多、適宜栽培在深肥田和山区 的丘陵地區。	廣東高要、惠 陽、伏山、湛江各 專區。	1956年推廣面積 為100,000畝，增產 20%。
79	暹 粘 (矮 秆 粘)	晚 造	原產泰國， 引入海南島种植 已有四、五十年 歷史。	分蘖力強、成熟一致、米質好 耐肥、不易倒伏、產量穩定、適 應性廣、5、6月播种、10月收 穫。	廣東海南專區 各縣。	推廣面積由1956 年的171,000畝，擴大 到1956年570,000畝。
80	選 粘	中 粳	湖南地方主 要品种。	莖較高、分蘖中等、劍叶角 大、適應力強、較耐肥、耐漬、 米質好、成熟早、適于較肥沃的 坪田、岸田、壩田、本田生育期 100—105天。	湖南湘東、湘 中、湘南各地。	一般每畝產量 450—550斤，最高 720斤。
81	選 粘 305	早造中熟	前中山大學 農學院稻作試驗 場育成。	為抗垸田及圍田區的早造中 熟良种，但耐肥反抗倒伏性不及 廣場 13 号、產量較白谷糯 16 号 為高。	廣東粵北及粵 中專區各縣。	較白谷糯增產 10%以上。

編 號	品 種 名 稱	品種类型	品 種 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 区	推廣面積及增產成效
82	雪 花 早	双季早籼	江西臨川縣李家渡地方品種。	谷粒寬大飽滿、無芒、壳薄、出米率高、早熟、適應性強、較耐旱、耐瘠、分蘗力強、高產穩定、莖秆細柔易倒伏、不耐浸、易受螟害。	江西臨川等地區。	
83	薄 早	籼 稻	从廣西桂平縣農家品種中評選出來。	秆硬、耐肥、少倒伏、分蘗中等、穗長、適宜于深肥田栽培、生育期約120天。	廣西容縣專區各縣。	1956年推廣面積約6,000畝,增產15—20%。
J: 84	楊 村 1 号	早 籼	1953年廣西賓陽縣蒙村農業社育成。	秆硬、耐肥、抗風、穗長粒密、不易倒伏、分蘗強、產量高、生長抽穗整齊、成熟一致、生育期120天(其中秧齡25天)。	廣西賓陽縣。	1956年推廣面積約4,000—5,000畝,增產10—12%。
85	岩 谷	中 籼	貴州農家良種。	耐肥抗倒伏、着粒密、籽粒飽滿、秆硬耐寒、宜在高山冷水田栽培。	貴州普定、郎岱、松桃、翁安等縣。	
86	莽和堡白皮大稻	籼 稻	甘肅銀川專區的農家良種。	小穗排列較稀、無芒、米質白、粒圓柱狀、產量穩定、播種略迟、仍可正常成熟、生育期110—115天。	甘肅永寧、賀蘭、平羅、銀川、寧朔等地均有種植。	一般產量 350—400斤。
87	洋 溪 稻	籼 稻	河南農家良種。	產量高、分蘗力強、抗虫、品質好、莖秆較低、不耐旱、米色及成熟不一致。	河南信陽專區野。	
88	野 谷 粘	中 籼	由貴州湄潭縣毛垌鄉農民李洪章1933年在高谷子中選單株培育而成。	株矮、莖秆硬抗倒伏、分蘗力強、成熟一致、出米率高、米質較好、不宜在高山冷水田栽培、宜在平坝田及半山的坡田栽培、肥田中易倒伏、且因叶片較弱、易受病虫害。	貴州遵义、婺川、風崗、湄潭等縣分布很廣。	

編號	品 种 名 称	品种类型	品 种 來 源	主 要 性 狀	分 布 地 区	推廣面積及增產成效
89	野 禾	間作晚粳	湖南醴陵縣農家良種。	莖秆硬、着粒密、耐肥、不易倒伏、分蘖力低、易遭螟害、適于山冲田、本田生育期 135天左右。	湖南醴陵等縣。	一般每畝產量 500 斤以上。
90	宜 賓 竹 丫 谷	粳 稻	四川省農家品種。	分蘖力強、秆矮而弱、耐旱、耐瘠、產量穩定、腹白小。	四川川南、宜賓、瀘州、江津、及岷江下游一帶。	一般畝產 500—600斤，高的達800斤。
91	一 股 香	早 粳	湖南地方主要品種。	莖秆矮、適應性較大、耐肥、適于較肥沃的沙質或粘質壤土、本田生育期85—90天。	湖南瀏陽。	一般每畝產量 350—400斤。
92	一 綫 紅	中 粳	1946年—1952年由華東農業科學研究所在南京選育而成。	莖細弱、易倒伏、穗大粒密、無芒、耐旱、耐瘠、產量高、米質中等、在浙江及安徽全生育期為125—130天。	江蘇鎮江、南通、高郵、南京、句容、浙江金華專區、安徽蕪湖、休寧、歙縣亦有少量種植。	一般畝產 500斤左右，江蘇句容縣農場畝產高達 717斤以上，較當地種“黃瓜粳”增產30%。
93	宜 良 亂 腳 龍 (大白谷)	粳 稻	云南農家品種。	株高 4—5 尺、秆粗壯不易倒伏、穗大粒多、每穗約28—27公分、約有145粒、秕率達11%、穀稈多、株形是谷稈開散亂叉、故名亂腳龍、粒形中長、籽粒較重(千粒重26.3克)出米率74%耐肥抗病易脫粒、全生育期 180天、其中秧田期45天。	云南宜良、玉溪、峨山、蒙自、連水、楚雄、巍山等縣。	1956年推廣面積計達27萬畝，每畝產量700—800斤，高的達1,400多斤。
94	一 粒 種 (爆炸粳)	晚 造	廣東農家優良品種。	米質好、耐肥、耐旱、抗風、抗倒伏力強、產量穩定、但抽穗不齊、適應性強、本田生育期約 115—120天。	廣東高要、瀘江、伏山、韶關專區各縣。	推廣面積由1955年的 700,000畝擴大到1956年232萬畝，增產10—20%。