



# 2009国家执业药师资格考试

## 药学综合知识与 技能应试习题集

李 欣 陈永法 ○ 编

中国协和医科大学出版社



2019届医学生执业药师  
药学综合知识与  
技能应试习题集

# 药学综合知识与 技能应试习题集

卷一 药学综合知识与技能应试习题集



国家执业药师资格考试

(2009 版)

药学综合知识与技能  
应试习题集

中国协和医科大学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

药学综合知识与技能应试习题集: 2009 版 / 李歆, 陈永法编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2009. 4

ISBN 978 - 7 - 81136 - 171 - 1

I. 药… II. 李… III. 药物学 - 药剂人员 - 资格考核 - 习题 IV. R9 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 051412 号

国家执业药师资格考试

**药学综合知识与技能应试习题集 (2009 版)**

---

编 者: 李 歆 陈永法

责任编辑: 陈永生 何海青

---

出版发行: 中国协和医科大学出版社  
(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: [www.pumcp.com](http://www.pumcp.com)

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京丽源印刷厂

---

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张: 8

字 数: 160 千字

版 次: 2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000

定 价: 16.00 元

---

ISBN 978 - 7 - 81136 - 171 - 1/R · 171

---

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

## 编者的话

为了适应我国医药事业的发展，促进我国医药产品走向世界，逐步实现药师制度与国际执业药师制度接轨，建立客观公正的评价人才的体系，造就一批既有专业知识，又有法律知识；既有实际能力，又能严格执法的医药生产和经营管理人员，以充分发挥执业药师在确保药品质量，保障人民用药安全和维护人民健康方面的特殊作用，国家每年举行一次全国执业药师资格考试。为了配合这项工作的开展，方便广大考生在较短时间内全面复习考试要求内容，检验自身专业知识水平，自2000年开始，我们邀请了国内有关专业的资深专家，编写了《国家执业药师资格考试应试系列丛书》，并随着大纲的修订进行不断的修改与完善。本套丛书编写的特点是，紧扣《全国执业药师资格考试大纲》，严格按照《大纲》要求的范围与深度，注重试题的严谨与准确，努力体现执业药师应具备的知识水平，因而适合广大应试人员复习与自测。

全国执业药师考试全部采用多选题形式，包括A、B、X三种类型：“A型题（单项选择题）”，每题的备选答案中只有一个最佳答案；“B型题（配伍选择题）”，备选答案在前，试题在后，每组若干题，对应同一组备选答案。每小题只有一个最符合题目要求的答案，每个备选答案可重复选用，也可以不被选用；“X型题（多项选择题）”，每题的备选答案中有2个或2个以上正确答案，少选、多选或错选均不得分。

本套丛书是在各位作者的通力合作及辛勤劳动下完成的，若能对广大考生顺利通过执业药师资格考试有所帮助，我们将感到莫大的欣慰。随着社会的发展与进步，执业药师考试水平也在不断的提高，我们将根据情况，对本书进行不断的修订与完善，为促进我国执业药师综合素质的提高做出积极的贡献。我们真诚欢迎广大读者对我们的工作提出自己的意见和要求。祝阅读书的读者通过努力取得优异成绩，成为合格的执业药师。

2009年6月

## 目 录

第一章 药学服务与咨询 .....	( 1 )
第二章 处方调剂 .....	( 8 )
第三章 常用医学检查及其临床意义 .....	( 21 )
第四章 常见病症的自我药疗 .....	( 32 )
第五章 10 种疾病的药物治疗 .....	( 44 )
第六章 特殊人群的用药指导 .....	( 59 )
第七章 临床常见中毒物质与解救 .....	( 79 )
第八章 治疗药物监测与给药个体化 .....	( 88 )
第九章 药品的临床评价 .....	( 93 )
第十章 药物临床使用的安全性 .....	( 100 )
第十一章 药品的保管 .....	( 108 )
第十二章 药物信息服务 .....	( 113 )
第十三章 医疗器械基本知识 .....	( 119 )

# 第一章 药学服务与咨询

## 【A型题】

1. 关于药学服务的含义，正确的是  
A 于1890年由美国学者 Hepler 和 Strand 倡导  
B 其目标是提高药物治疗的安全性、有效性和经济性，实现改善和提高人类生命质量的理想目标  
C 药学服务就等同于传统的药物治疗  
D 药学服务就是临床药学工作  
E 于1990年由德国学者 Hepler 和 Strand 倡导

2. 下列关于药学服务的基本要素的理解，正确的是  
A 药学服务是以实物形式满足公众的合理用药的需要  
B 药学服务的“服务”就等同于行为上的功能（service）  
C 药学服务仅涉及住院患者和门诊患者  
D 药学服务中的服务包含的是一个群体（药师）对另一个群体（患者）的关怀和责任  
E 药学服务的社会属性仅表现在服务于治疗性用药

3. 药师在与患者沟通时，应采用的语言表达技巧是  
A 多使用服务用语和通俗易懂的语言

- B 尽量使用专业术语  
C 谈话时尽量采用长句子  
D 用“是”、“不是”或简单一句话就可以答复的问题  
E 尽量使用封闭式的提问方式
4. 不属于药师在与患者沟通时应关注的特殊人群的是  
A 婴幼儿  
B 国外来宾  
C 老年人  
D 孕妇  
E 少数民族
5. 药历的内容不包括  
A 用药方案  
B 用药经过  
C 用药指导  
D 药学监护计划  
E 药物效应动力学数据
6. 不属于 TITRS 药历模式的内容的为  
A 主题（title）  
B 诊疗的介绍（introduction）  
C 体检信息（objective）  
D 正文部分（text）  
E 提出建议（recommendation）
7. 关于患者投诉的处理，正确的是  
A 接待患者的地点宜选择在门诊大

- A 厅、医院药房等场所
- B 一般性的投诉，可由当事人接待患者
- C 接待患者投诉时，接待者的举止行为要点第一是尊重、第二是微笑
- D 接待患者时，应该自己先坐下，患者后坐下
- E 如果投诉即时发生，则应争取在现场应对投诉，解决全部问题

8. 下列关于药学服务的具体工作，说法正确的是

- A 现代药学服务要求药学工作从以调剂为主向以临床为主转移，从保证药品供应向药学技术服务转移，因此，处方调剂不再是药师直接面向患者的工作岗位
- B 随着药师工作的转型，调剂工作要由“药学知识技术服务型”向“具体操作经验服务型”转变
- C 治疗药物监测是药师参与临床药物治疗、提供药学服务的重要方式和途径
- D 药物利用研究和评价的目的是普及合理用药的理念和基本知识，提高用药的依从性
- E 药物利用研究和评价的目的包括从医疗方面评价药物的合理性以及从社会、经济等方面评价药物的治疗效果

9. 下列哪一项不属于药学服务的主要实施内容

- A 把医疗、药学、护理有机地结合在一起，让医师、药师、护士齐心协力，共同承担医疗责任
- B 既为患者个人服务，又为整个社会的国民健康教育服务

- C 代替医护人员制定和实施药物治疗方案
- D 指导、帮助患者合理地使用药物
- E 提供药学信息服务，促进医药合作，保证患者用药的安全、有效和经济

10. 关于患者用药咨询的环境，表述正确的是

- A 咨询处应远离门诊药房或药店大堂，处于明显位置
- B 药师咨询的位置应尽量隐蔽，使患者放心、大胆地提出问题
- C 对任何患者都应采取柜台式面对面咨询的方式
- D 咨询台应准备药学、医学的参考资料、书籍以及向患者发放的医药科普宣传资料
- E 任何单位都必须配备装有数据库的计算机和打印机，可当场打印患者所需文件

11. 关于患者用药咨询的方式，表述正确的是

- A 只有医院药师才有义务向购药的患者讲授安全用药的知识
- B 通过网站向大众宣传促进健康的小知识，是被动咨询的一部分
- C 药师日常承接的咨询以主动咨询居多
- D 药师咨询往往采用面对面的方式或借助其他通讯工具
- E 药师在接受咨询时应通过封闭式提问了解更多患者的背景资料

12. 下列关于药师在向患者提供咨询服务时，应需要特别关注的问题的表述，错误的是

- A 向老年人进行解释时语速宜慢，还可以适当多用文字、图片形式以方便他们理解和记忆
- B 对于女性患者，还要注意问询是否已经妊娠或有无准备怀孕的打算、是否正在哺乳
- C 对于一般患者的咨询，应采用带数字的医学专业术语来表示
- D 对第一次用药的患者尽量提供书面材料
- E 对于患者咨询的问题，能够当场给予解答的就当场解答，不能当场答复的，或者不十分清楚的问题，不要冒失地回答

13. 下列哪一项项是药师所有工作中最重要的内容，并且是联系、沟通医、药、患最重要的纽带

- A 参与临床药物治疗
- B 治疗药物监测
- C 处方调剂
- D 药物利用研究和评价
- E 药学信息服务

### 【B型题】

(14~17题共用备选答案)

#### 关于药学服务的效果

- A 提供新药信息，提高新药科研水平
- B 预防药品不良反应的发生率，减少药源性疾病的发生率
- C 帮助患者按时、按量、按疗程使用药物
- D 节约治疗费用，提高治疗效益/费用比值，减少医药资源的浪费
- E 改善病情或症状，如疼痛、发热、哮喘、高血压、高血脂、高血糖等

14. 属于提高药物治疗的安全性的是
15. 属于提高药物治疗的经济性的是

16. 属于提高药物治疗的依从性的是
17. 属于提高药物治疗的有效性的是

(18~21题共用备选答案)

中国药学会医院药学专业委员会结合国外药历模式，发布了国内药历书写原则与格式，具体内容包括

- A 用药记录
- B 用药评价
- C 主诉信息
- D 病历摘要
- E 基本情况

18. 写明用药问题与指导、药学监护计划、药学干预内容、TDM数据、对药物治疗的建设性意见、结果评价的项目称为

19. 写明药品名称、规格、剂量、给药途径、起始时间、停药时间、联合用药、不良反应或药品短缺品种的项目称为

20. 注明患者姓名、性别、年龄、出生年月、职业、体重或体重指数、婚姻状况、病案号或病区病床号等的项目称为

21. 写明既往病史、体格检查、临床诊断、非药物治疗情况、既往用药史、药物过敏史、主要实验室检查数据、出院或转归的项目称为

(22~25题共用备选答案)

#### 关于SOAP药历模式

- A 签字
- B 主诉信息
- C 体检信息
- D 提出治疗方案
- E 评价

22. S是指

23. O是指

24. A是指

25. P是指

## (26~28题共用备选答案)

经过北京市数家医院的调查，在患者用药投诉中

- A 15%
- B 25%
- C 55%
- D 40%
- E 30%

26. 对药师服务态度不满意的占

27. 反映药品数量或质量问题的占

28. 包括不良反应和药品价格在内的其他问题约占

## (29~32题共用备选答案)

关于药师参与药物治疗可提高疗效，典型实践事例

- A 美国
- B 澳大利亚
- C 新西兰
- D 荷兰
- E 中国

29. 在抗凝药物治疗中，药师可根据监测凝血酶原时间，调整患者华法林的剂量，维持长期的抗凝血治疗的国家是

30. 药师对哮喘患者进行长期治疗监护，药师从选药和剂量、用药依从性、药品不良反应、药物相互作用、呼吸峰流量计使用等多方面对患者进行辅导与跟踪的国家的是

31. 药师通过对高危人群如有高血压家族史者以及老年人进行血脂异常和血压异常的筛查与监测，提前进行饮食、运动或药物干预的国家的是

32. 药师在参与临床治疗和抢救时，对数例因吞服大量催眠药中毒致深度昏迷患者，在现场了解病情，查看药品包装，综合分析后明确催眠药的范围，并进行 TDM，结果证实后采用血液净化治疗，使患者转危

## 为安的国家是

(33~34题共用备选答案)关于接待患者投诉的行为要点

- A 举止大方
- B 尊重
- C 热情
- D 微笑
- E 态度温和

33. 第一是

34. 第二是

## (35~37题共用备选答案)

关于心理学家总结的情感表达的公式

- A 50%
- B 43%
- C 7%
- D 55%
- E 38%

35. 动作表情占

36. 语调占

37. 语言占

## (38~41题共用备选答案)

关于药学服务的具体工作，

- A 促进医药合作，保证患者用药安全、有效和经济
- B 及时发现、正确认识不良反应，采取相应的防治措施
- C 用药的合理化
- D 获得最佳的治疗效果、承受最低的治疗风险，与医师共同承担医疗责任
- E 普及合理用药的理念和基本知识，提高用药依从性
- 38. 药师参与健康教育的目的是
- 39. 药物利用研究和评价的目的是
- 40. 通过开展用药咨询、提供药学信

息服务，可以

41. 药品不良反应监测和报告的目的是

(42~45题共用备选答案)

关于医师用药咨询

- A 成为抢救病人毒物中毒解救团队中的一员
- B 使医师了解对新药系统评价的信息内容，为临床合理用药提供依据
- C 保证了治疗药物的安全有效，延长了患者的存活时间
- D 为药物经济学评价提供理论参数，为公正解决医患纠纷提供科学的论证指导
- E 增强公众健康意识，减少影响健康的危险因素

42. 药师向医师提供新药信息的目的是

43. 治疗药物监测的目的是

44. 药师向医师开展药品不良反应信息的咨询服务，有益于

45. 药师积极参与临床用药方案的设计，可以

(46~49题共用备选答案)

关于现代药学的发展

- A 促进合理用药为主
- B 药品工业化生产为中心
- C 药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作
- D 新药研制为中心
- E 患者为中心，强调改善患者生命质量

46. 以药品供应为中心的阶段的特征是

47. 临床药学阶段以

48. 药学服务阶段以

49. Pharmaceutical Care阶段是以

【X型题】

50. 沟通的意义在于

- A 使患者获得有关用药的指导，以利于疾病的治疗
- B 提高用药的有效性、依从性和安全性
- C 可确立药师的价值感，树立药师形象，提高公众对药师的认知度
- D 沟通是了解患者心灵的窗口，药师可以从中获取患者的信息、问题
- E 通过药师科学、专业、严谨、耐心的回答，解决患者在药物治疗过程中的问题

51. 药学服务的主要实施内容包括

- A 把医疗、药学、护理有机地结合在一起，让医师、药师、护士齐心协力，共同承担医疗责任
- B 定期对药物的使用和管理进行科学评估
- C 指导、帮助患者合理地使用药物
- D 药学服务的唯一目的就是为患者个人服务
- E 积极参与疾病的预防、治疗和保健

52. 药学服务的对象中重要人群包括

- A 用药周期长的慢性病患者，或需长期甚至终身用药者
- B 患有多种疾病，病情和用药复杂，需同时合并应用多种药品者
- C 血液透析者、过敏体质者
- D 用药效果理想的患者
- E 老年人、小儿、妊娠及哺乳期妇女

53. 下列属于药学服务的效果的是

- A 改善病情或症状，如疼痛、发热、

- A 哮喘、高血压、高血脂、高血糖等  
 B 减少和降低发病率、复发率、并发症、死亡率  
 C 缩短住院时间，减少急诊次数和住院次数  
 D 节约治疗费用，提高治疗效益/费用比值，减少医药资源的浪费  
 E 帮助提高公众的健康意识，普及康复的方法

54. 根据药物咨询对象的不同，可将药物咨询分为

- A 患者用药咨询  
 B 药师用药咨询  
 C 医师用药咨询  
 D 护士用药咨询  
 E 公众用药咨询

55. 下列哪些属于药师在特殊情况下的提示

- A 患者同时使用 2 种或 2 种以上含同一成份的药品时；或合并用药较多时  
 B 需要进行 TDM 的患者  
 C 患者所用的药品近期发现严重或罕见不良反应  
 D 患者依从性不好时，或患者认为疗效不理想、剂量不足以奏效时  
 E 当一种药品只有一种适应证时

56. 医师用药咨询的内容主要包括

- A 新药信息  
 B 合理用药信息  
 C 治疗药物监测  
 D 药品不良反应  
 E 禁忌证

57. 开展 ADR 的咨询服务，有益于

- A 提高医师合理用药的意识和能力  
 B 防范和规避发生 ADR 的风险  
 C 为上市新药审评和注册提供依据  
 D 为药物经济学评价提供理论参数  
 E 使医师了解对新药系统评价的信息内容

58. 临床使用盐酸多巴胺，不应与呋塞米配伍使用的原因有

- A 盐酸多巴胺是一种酸性物质  
 B 盐酸多巴胺有一个游离的酚羟基、易被氧化成醌类  
 C 呋塞米注射液成酸性  
 D 呋塞米注射液与多巴胺配伍后溶液成酸性  
 E 呋塞米注射液容易使多巴胺氧化而形成黑色聚合物

59. 从我国已经开展药物咨询服务工作的医院发布的统计资料看，一般医院的医师主要咨询

- A 药物的药效学与药动学  
 B 药品的选择  
 C 同一生产厂家生产的不同药品的价效比  
 D 国内外新药动态  
 E 食品中毒鉴别与解救

60. 护理的工作特点决定了护士需要更多地获得有关药物的哪些信息

- A 有关药物的剂量  
 B 有关药物的用法  
 C 注射剂配置溶媒  
 D 输液药物的稳定性  
 E 输液滴注速度

61. 对哪些特殊患者应单设一个比较隐蔽的咨询环境

- A 计划生育患者  
 B 妇产科患者  
 C 泌尿科患者  
 D 呼吸科患者  
 E 性病科患者

62. 需要医师双签字的情形有  
 A 处方中用法用量与说明书不一致时  
 B 非药品说明书中所指示的用法、用量、适应证时  
 C 患者正在使用的药物中有配伍禁忌或配伍不当时  
 D 超越说明书范围的适应证或超过说

- 明书范围的使用剂量  
 E 病情需要，处方中配药剂量超过规定剂量时

### 63. 药品不良反应监测和报告的目的有

- A 普及合理用药的理念和基本知识，提高用药的依从性  
 B 用药的合理化  
 C 及时发现、正确认识不良反应  
 D 采取相应的防治措施，减少药源性疾病的发生  
 E 获得最佳的药物治疗效果

### 参考答案

#### A型题

1. B 2. D 3. A 4. D 5. E 6. C 7. C 8. C 9. C 10. D  
 11. D 12. C 13. C

#### B型题

14. B 15. D 16. C 17. E 18. B 19. A 20. E 21. D 22. B 23. C  
 24. E 25. D 26. C 27. E 28. A 29. A 30. C 31. A 32. E 33. B  
 34. D 35. D 36. E 37. C 38. E 39. C 40. A 41. B 42. B 43. C  
 44. D 45. A 46. C 47. A 48. E 49. E

#### X型题

50. ABCDE 51. ABCE 52. ABCE 53. ABCDE 54. ACDE 55. ABCD  
 56. ABCDE 57. ABCD 58. AE 59. ABDE 60. ABCDE 61. ABCE  
 62. DE 63. CD

## 第二章 处方调剂

### 【A型题】

1. 有关处方的性质，正确叙述不包括  
A. 处方具有权威性、技术和经济性  
B. 处方的技术性表现在医师明确诊断、合理开具处方  
C. 处方的技术性表现在药师准确调配处方、发给患者  
D. 处方的经济性表现在处方是药品消耗的原始依据  
E. 处方的经济性表现在处方是患者用药的真实凭证

2. 处方书写的要求是  
A. 不得超过 5 种药品  
B. 不得超过 3 日用量  
C. 字迹清楚，不得涂改  
D. 医师、药师不得使用药品缩写名称  
E. 每张处方不得限于一名患者用药

3. 下述药物联用对临床药效学有影响的是  
A. 青蒿素联用乙胺嘧啶  
B. 阿托品联用甲氧氯普胺  
C. 丙磺舒联用青霉素  
D. 山楂丸联用胃舒平  
E. 丹参片联用复方氢氧化铝

4. 给药时间适应生物钟规律不正确的是

- A. 餐后服用血脂调节药  
B. 餐前服用氢氧化铝凝胶  
C. 早晚餐中服用熊去氧胆酸  
D. 餐后服用非甾体抗炎药  
E. 清晨服用驱虫药
5. 调配差错出现的原因不包括  
A. 处方辨认不清  
B. 缩写不规范  
C. 选择药品错误  
D. 药物有配伍禁忌  
E. 业务不熟悉
6. 发生药品调配差错的应对原则是  
A. 核对 - 报告 - 调查 - 改进措施  
B. 报告 - 调查 - 核对 - 改进措施  
C. 报告 - 调查 - 改进措施  
D. 报告 - 核对 - 调查 - 改进措施  
E. 调查 - 核对 - 报告 - 改进措施
7. 口服补液盐（氯化钠 3.5g、碳酸氢钠 2.5g 和葡萄糖 20g，加水至 1000ml）用于中度脱水腹泻病人，成人 3400ml。问给予体重 10kg 的患儿口服补液盐多少克，配成多少毫升  
A. 20.8g, 800ml  
B. 22.1g, 850ml  
C. 23.4g, 900ml  
D. 24.7g, 950ml  
E. 26.0g, 1000ml

8. 对处方的理解不正确的是
- 处方是执业医师或执业助理医师为患者诊断开具的用药指令
  - 处方是药学技术人员为患者调剂配发药品的凭据
  - 是处方开具者与处方调配之间的书面依据
  - 是处方调配者与患者之间的书面依据
  - 处方具有法律、技术和经济上的意义

9. 处方的法律意义在于
- 因开具处方造成的医疗差错或事故，医师负有法律责任
  - 因调配处方造成的医疗差错或事故，药师负有法律责任
  - 因开具处方或调配处方所造成的医疗差错或事故，医师和药师分别负有相应的法律责任
  - 医师具有诊断权和开具处方权。但无调配处方权
  - 药师具有审核、调配处方权。但无诊断权和开具处方权

10. 处方的经济性在于
- 处方是药品消耗及收入结账的凭证和原始依据，也是患者治疗用药全过程的真实凭证
  - 最大限度地降低患者保健支出
  - 提高健康水平
  - 在有限的资金下获得最大的保健效益
  - 降低卫生保健支出

11. 关于处方权限的问题，不正确的是

- 开具处方是医师的特权
- 医师必须尊重病人对药物预防、诊断和治疗的知情权
- 患者的病情及用药，必须得到开具处方医生和配方药师的尊重与保密
- 开具处方的医师必须是医学院校毕业，取得任职资格，并在卫生行政部门注册后方具有处方资格
- 医疗机构中有处方资格的医师须经科主任审核，医务部门批准，将本人签字在药剂科留样备查

12. 处方一般不得超过

- 3日用量
- 7日用量
- 5日用量
- 10日用量
- 4日用量

13. 调配处方过程中必须做到“四查十对”，确保调配的处方和发出的药品准确无误，其中“十对”内容不正确的是

- 对科别、患者姓名、性别、年龄；对药品用法、用量
- 对用量与患者年龄是否相符，对是否有配伍禁忌或药物相互作用
- 对处方是否在有效期内
- 对药品名称
- 对药品包剂型、规格

14. 药动学的药物相互作用，在吸收方面，说法不正确的是

- 一些弱酸性药物配伍碱性药物，使胃液的pH值升高，会增加弱酸性药物的吸收
- 一些抗胆碱药（如颠茄浸膏片）可缓胃的排空，有利于配伍药物的吸收

- C 活性炭与药物的吸附作用较强，利用这一吸附作用减少毒性药物，起到中毒解救作用
- D 四环素类药物与钙、镁、铝、铋等无机盐抗酸药合用会生成配位化合物，影响吸收，降低抗菌效果
- E 新霉素口服后，肠道正常菌丛受损，使之可代谢毒性药物的能力下降，增加甲氨蝶呤吸收，造成患者中毒

15. 狹义的药物相互作用是指

- A 体内的配伍变化
- B 体外的配伍变化
- C 体外的相互作用
- D 体内的药理作用
- E 体外的物理化学变化

16. 体内的药物相互作用主要是指

- A 药物的不良反应
- B 药物的药理作用
- C 药物的毒性
- D 药物的物理化学变化
- E 药物的治疗作用

17. 处方调配的五个程序为

- A 收方、调配、划价、核查和发药
- B 收方、划价、核查、调配和发药
- C 收方、核查、划价、调配和发药
- D 收方、划价、调配、核查和发药
- E 收方、调配、核查、划价和发药

18. 处方调配程序中是执业药师主要职责的两项技术要求很高的工作是

- A 核查和发药
- B 收方和划价
- C 收方审核和调配
- D 划价和调配

#### E 调配和发药

19. 同一张处方开写相同成分而商品名不同的二种以上药品，药师审核处方时，不正确的是

- A 药师必须提醒医师
- B 避免发生重复超剂量用量
- C 让医师按实际供应药品的名称修改
- D 药师在调配中做主调换给病人
- E 医师把名称修改后，药师调配

20. 磺胺类药物之间存在交叉过敏反应，不正确的含义是

- A 二种磺胺药不能同时使用
- B 只要对一种磺胺药过敏，不可使用其他结构相似的药物
- C 例如含磺胺成分的复方制剂
- D 例如利尿药和口服磺胺脲类降糖药
- E 对磺胺药过敏者，收方时要询问，做到用药安全

21. 按体表面积计算法，计算小儿用药剂量，公式如下：①小儿用药剂量 = 成人剂量 × 某体重小儿体表面积 / 1.73；②体重 30kg 以下的小儿：小儿体表面积 = 体重 × 0.035 + 0.1。试问某小儿体重 20. Kg，用药剂量约应为成人剂量的

- A 1/5
- B 2/5
- C 1/4
- D 1/2
- E 2/3

22. 60 岁以上的老年人用药剂量，一般给予

- A 成人常用量的 3/4
- B 成人常用量的 1/2
- C 成人常用量的 1/3

D 成人常用量的 2/3

E 成人常用量的 1/3

23. 处方中药品的用法，应注意药品的

A AUC

B 半数致死量 LD<sub>50</sub>

C MIC

D 血浆半衰期 t<sub>1/2</sub>

E 表观面积 Vd

24. 蒸馏水的外文缩写是

A Ag

B Ag. dest

C gtt

D Iv. gtt

E qid

25. 单剂量配方制 (UDDS) 是指

- A 药师把病人所需的药品按一次剂量单独包装
- B 调剂人员把病人的药品，按一次剂量用分包机单独分装
- C 护士把病人的药品，按一次剂量分开包装
- D 药师把病人一次剂量的药品单独包装
- E 调剂人员把病人所需服用的各种药品固体制剂，按一次剂量用分包机单独包装

26. 在处方调配处方审核中，处方前记中书写不完整最常见的项目是

A 姓名

B 性别

C 年龄

D 诊断

E 年月日

27. 当口服或注射给药呈现不规则的药物动力学时，可改用其他哪种剂型

A 散剂

B 栓剂

C 溶液剂

D 气雾剂

E 混悬剂

### 【B型题】

(28~32题共用备选答案)

处方中容易混淆的药品通用名，其中有

A 氟尿嘧啶

B 异丙嗪

C 普鲁卡因

D 阿糖胞苷

E 他巴唑

28. 氟胞嘧啶

29. 氯丙嗪

30. 普鲁卡因胺

31. 阿糖胞苷

32. 地巴唑

(33~36题共用备选答案)

关于处方常见外文的缩写，其中

A Dil

B ED

C DTC

D NS

E UDDS

33. 生理盐水是

34. 非处方药是

35. 每晚是

36. 单剂量配方制是

(37~41题共用备选答案)

关于药物相互作用药动学的影响

A 丙胺太林不宜合用多潘立酮