

25.69  
4495

1958年全国农业展览会吉林省展览资料

# 吉林土制农药

(一)

吉林省农业厅 编



吉林人民出版社

1958年全国农业展览会吉林省展览资料

**吉林土制农药(一) 吉林省农业厅 编**

吉林人民出版社出版 (长春市北京大街) 吉林省书刊出版业营业许可证出字第1号

长春新华印刷厂印刷 吉林省新华书店发行

开本：787×1092 1/16 印张：7/8 字数：10,000 印数：5,000 册

1958年12月第1版 1958年12月第1版第1次印刷

统一书号：16091·69

定价(7)：0.10元

## 前　　言

我省土农药的資源极为丰富，广大农民利用土药也有丰富的經驗。特別是有些野生植物，有显著的防治效果，只要积极挖掘这些資源，就可以解决很多問題。目前不少地区在大力发动与組織群众，积极开展土农药挖掘、試制、推广工作。据不完全統計，从7月初到9月中旬，各地挖掘出来并經過多次試驗效果良好的，已将近60种，还有許多种正在試驗。德惠县利用臭蒲草，創制了5种土药，可以防治蚜虫、粘虫、菜青虫等，且杀虫效果均在90%以上。該县現已制造出18,000余斤土药，消灭高粱蚜虫面积达5,000余公頃。磐石县則制出33种土农药，建起472个药厂。九台县利用40余种野生植物，配制了39种土药，能有效的防治20种农作物病虫害。据实际試驗，其中有10种土药，灭蚜效果在80—90%以上，甚至于有的土药相当于666治蚜的效果。經过各地鑒評認為：土农药不仅是解决当前农药不足的重要途径，而且也是今后开展群众性大規模消灭病虫害运动的方向。因为它有五大好处：花錢少，效果好，資源多，可以就地取材，配制简单，容易自制；有些土药既能治虫，又能肥苗，一举两得。

为了推动这一工作，我們收集了省内各地經驗，并参考过去有关資料加以整理。因为大規模利用土农药还是件新事，还缺乏較成熟的經驗；这里所介紹的防治对象、配制、使用方法等，由于时间短促，还没来得及作進一步的研究和鑒定，所以請大家多提意見。

## 目 次

土制农药五十七种 .....	1
利用野生植物制造农药的基本方法 .....	22

# 土制农药五十七种

## 一 石灰硫黃合剂

(一) 配合量：生石灰1斤，硫黃粉2斤，清水10斤。

(二) 配制法：先用少量清水把生石灰化开，然后加水10斤，攪勻后倒在鍋內，再把硫黃粉用篩子慢慢篩在鍋中，不断的攪拌，并随时加入少量开水，一直用大火熬煮，当水变成赤褐色时，就可停火。放凉后再把药液取出，澄清，去掉沉在底下的渣滓，即成石灰硫黃合剂原液。

(三) 使用法：使用前，用波美比重計量量原液的浓度，按着掺水量对照表稀釋，用噴霧器噴洒。

(四) 防治对象和效果：主治紅蜘蛛、麦类锈病及果树病害，效果可达70—90%。

防治紅蜘蛛、麦蜘蛛一般稀釋到0.2—0.3度；果树生长季节，防治病害和各种介壳虫时，可稀釋到0.2—0.5度。每垧用稀釋的药水1,500—2,000斤。

### (五) 注意事項：

①配制时，必須选择洁白良好的生石灰块，不要用已經受潮粉碎的石灰。

②先用少量水将生石灰化开，并用少量水加入调匀成糊状，然后再倒入大量的水，否则会发生块粒，影响药剂质量。

③熬石灰硫黄合剂时，要用生铁锅，熬煮时要用急火，同时要不断的搅拌。

④本剂是强碱性的药剂，要避免溅到衣服或皮肤上，必须顺风喷洒。用过的喷雾器要洗干净，以免腐蚀。

⑤使用时不要和棉油皂、波尔多液、666、滴滴涕等农药混合使用。贮存原液时，要严密封闭，以免接触空气，使药剂变质失效。

## 二 土制硫酸亚铁

(一) 配合量：硫酸50斤，碎铁60斤，清水300斤。

(二) 配制法：先将水倒入锅里，再把碎铁放入，煮沸2小时，然后再加硫酸，加硫酸时必须注意慢慢倒入，并随倒随搅，直到加完不再加热，让它自行反应。4小时之后，浓度一般在波美134度即可出锅过滤。结晶时间一般约为24小时。

结晶后剩下来的水内含有硫酸，可以回收再用。第二次制造时可用剩下的稀硫酸水再加硫酸30—35斤，兑水200斤和碎铁100斤，按上法处理（必须注意要先放水，再放铁，最后加硫酸液）。

这样制造出来的成品，含铁量为53.95%，含硫酸亚铁为98.69%。

(三) 使用方法与防治对象：

①粉用法：把硫酸亚铁烘干或晒干，碾成粉末，每斤加石灰5斤，在早晨露水未干时撒布，可防治水稻瘟病和果树病害。秧田每亩用量3—4斤，本田每亩用4—5斤。

②液用法：硫酸亚铁1斤，生石灰2斤，水100斤。将水装在两个缸中，先把硫酸亚铁1斤，用少量热水化开，滤去渣滓，倒入50斤水搅匀，另将生石灰2斤，加少量凉水化开，过滤后倒入另外50斤清水中搅匀。然后把两种液体，同时慢慢倒入另一个大缸中，充分搅拌即成。喷洒时间最好选择晴天下午。

用这种方法，可以代替波尔多液，以防治稻瘟、果树病害等，秧田每亩喷洒100斤，本田每亩150—200斤。

③按照上列比例配好的药粉或药水，加0.5%666粉剂1斤，可以兼治水稻负泥虫、蝗虫等。

④浸种：用硫酸亚铁5斤，加水100斤，配成5%的硫酸亚铁溶液，浸种5小时，可以防治麦类黑穗病。

浸种后的药液，可連續使用3—4次。

#### （四）注意事项：

①配制时要先放水，后下铁，最后再加硫酸。

②配制药粉时必須将硫酸亚铁碾细，与消石灰混合均匀，才能发挥药效。

③配制硫酸亚铁溶液时，要用瓦缸或木桶，切勿用金属器皿，以免腐蚀。

④配制的药水要当天使用，不能久放。

⑤使用时要順風喷撒。

### 三 石硫烟草合剂

(一) 配合量：烟草2斤或烟梗稈3斤，生石灰0.8斤，硫黃0.14斤，清水100斤。

(二) 配制法：先把烟草或烟梗稈撕碎或切碎，用20斤水浸泡，然后加入生石灰和硫黃，待将烟液全部浸出后，滤去渣子，再兑水80斤，攪拌均匀即可。

(三) 防治对象和效果：用噴霧器噴洒，可以防治粘虫、玉米螟、蚜虫、蝗虫及果树病害，杀虫效果可达95%以上。

(四) 試驗地点：磐石等地。

### 四 八合灭虫剂

八合灭虫剂是用砒霜、煤油、草烏等八种物質加工制成的药粉，可以防治蚜虫、紅蜘蛛、玉米螟和果树害虫等。

(一) 配制法：用砒霜1.2两，煤油1.2两，硫酸銅5两，草烏2.5两，巴豆3.7两，皂角2.5两，烏賊骨5錢，石灰3斤，混合后碾成細末即成。

(二) 使用法：

(1) 噴霧法：用药粉1斤，溫水5斤，調成糊状，放置20分鐘，再兑水150—200斤，攪拌均匀，用噴霧器噴洒。

(2) 拌种法：播种时，用草木灰和药粉，一起混拌在种子里，可治地下害虫。每垧用药15—20斤。

(三) 杀虫效果，一般达90%以上。

## 五 万能殺虫剂

(一) 配含量：狼毒1斤，走馬芹根3斤，臭蒲草根3斤，大申2斤，烟梗2斤，肥皂0.6斤，生石灰0.86斤，硫黃0.14斤，水250斤。

### (二) 配制法：

①将狼毒、走馬芹根、臭蒲草根、大申切碎，放入鍋內，加水30斤，熬煮两小时，滤去渣子。

②将烟梗和肥皂切碎，加水30斤，煮成紅棕色的液体，过滤后即成烟草肥皂液。

③用10斤水，放入石灰中，制成石灰液，再倒入鍋內，加热熬煮，放入硫黃后，煮成櫻紅色，即成石灰硫黃合剂。

④将三种药液混合在一起，加水180斤，充分攪拌即成。

(三) 防治对象和效果：据磐石县实际試驗，用噴霧器噴洒，可以防治粘虫、大豆蚜虫、玉米螟、鑽心虫、菜青虫、蝗虫和果树害虫，杀虫效果达95%以上。

## 六 五毒合剂

五毒合剂是由狼毒、大芦粒、独角蓮（俗名丁毒豆）、青核桃皮和大活等五种毒性較强的野生植物配制而成。

(一) 配制法：先将五种植物切碎，各取3两，同

时放入鍋內，加水5斤，煮沸1小时，冷却后，即成原液。

(二) 使用方法：使用时，1斤原液兑水10—15斤，加1%的肥皂水，充分攪拌后，就可噴洒。

(三) 防治对象和效果：据九台、磐石县試驗結果，可防治各种咀嚼和吸收型口器害虫，防治高粱蚜虫效果达85%以上。

## 七 四苦合剂

四苦合剂是由苦参（俗名山槐）、黃柏（俗名黃玻璃树皮）、杏树叶、杏仁等四种具有强苦性的植物制成的。配合量是：苦参1斤，黃柏、苦杏叶各半斤，杏仁2两，水6斤，煮沸后再熬半小时，可得原液1斤半。使用时，1斤原液兑水5斤，防治高粱蚜虫效果可达75%以上。

## 八 工农杀虫剂

(一) 配合量：烟草1斤（用烟梗2斤或烟稈4斤代替均可），肥皂4两，6%可湿性666粉3两，水100斤。

(二) 配制法：将烟草或烟梗切碎，用20斤水浸泡一昼夜，或熬煮两小时，制成烟草肥皂液。然后再加入666和水，充分攪拌即成。

(三) 防治对象与效果：据磐石县試驗，用噴撒方法，可防治粘虫、蚜虫、螟虫等，杀虫效果达90%以上。

## 九 刺杀剂

(一) 原料：蛤蠣烟、辣椒、硫黃、透骨草、石灰。

(二) 配制法：蛤蠣烟1斤，辣椒半斤，硫黃3錢，透骨草1两，石灰1斤，兌水10斤，熬煮1小时后，可制成原液6斤。

(三) 使用法：使用时每斤原液加水10—15斤，用噴霧器噴洒。

(四) 防治对象与效果：据磐石县試驗，可防治大豆蚜虫、菜青虫、粘虫等。效果达80—90%。

## 十 二苦合剂

(一) 配合量：苦参1两，杏叶1斤，透骨草1两，水10斤。

(二) 配制法：先将苦参、杏叶切碎，放入鍋內，加水煮2小时，过滤后可得原液6斤。

(三) 防治对象和效果：据九台县試驗，防治菜青虫效果为50—80%。

## 十一 二毒合剂

此剂是由大申、大芦粒两种有毒植物配制而成。其配制方法是：用大申、大芦粒各3斤，洗淨切碎后，放入鍋內，加水30斤，煮1小时，可得原液15斤，噴洒防治菜青虫，24小时后杀虫效果为50—60%。

## 十二 刺毒剂

(一) 配制法：山辣椒4斤，青核桃皮10斤，透骨草1斤，水50斤。将原料切碎，加水煮1点半鐘，过滤后即可使用。

(二) 防治对象和效果：九台县用噴洒方法，防治菜青虫效果为50—80%。

## 十三 狼毒肥皂剂

(一) 配合量：狼毒1斤，肥皂3两，水5斤。

(二) 配制法：先将狼毒根切碎，放在鍋內加水熬煮50分鐘，再把切碎的肥皂放入，过10分鐘就可得出原液1斤。

(三) 使用法和防治对象：使用时，每斤原液兑水10—15斤，用噴洒方法，可防治高粱蚜虫、玉米螟及蔬菜害虫。

(四) 杀虫效能：噴洒药水后，經過10—15分鐘，就可将害虫全部杀死，效能非常显著。

## 十四 狼毒杀虫剂

将狼毒根切碎，放在石窩內搗烂，装在筐或草袋中，放到水田的水口处，經過一个昼夜后，就可杀死水稻地下害虫，如稻搖蚊、泥苞虫等。据敦化、蛟河、辽源等地实际防治結果，杀虫效果可达85%以上。

## 十五 臭蒲草面起子石灰剂

(一) 配合量: 臭蒲根1斤, 石灰及面起子半斤, 水6斤。

(二) 配制法: 将臭蒲根洗净切碎, 放入锅内, 加入石灰、面起子和水, 煮半小时, 成黑褐液即成。

(三) 使用方法和防治对象: 使用时, 兑水5倍, 用喷雾器喷撒, 可防治高粱蚜虫、菜青虫等。

(四) 杀虫效果: 喷洒20分钟以后, 就可杀死全部害虫。

## 十六 老鵝眼石灰剂

(一) 配合量: 老鵝眼果、叶1斤, 生石灰2两, 水3斤。

(二) 配制法: 将老鵝眼洗净切碎, 放入锅内, 加水煮沸后, 把生石灰放入, 再熬煮1个小时, 成杏黄色原液即可。用喷洒方法, 可防治高粱蚜虫。

(三) 杀虫效果: 据九台县防治高粱蚜虫试验, 原液杀虫率达100%, 兑水3倍杀虫率为85%, 兑水5—8倍杀虫率为70%。

## 十七 烟草石灰剂

(一) 配合量: 烟草1斤(或用烟梗2斤代替), 生石灰半斤, 水100斤。

(二) 配制法:

①冷浸法: 将烟草或烟梗切碎, 放入20斤冷水中浸

一昼夜，滤去渣子，即可将石灰水倒入，加足水充分搅拌使用。

②熬煮法：将烟叶或烟梗切碎，与生石灰同时放入锅内，加水20斤，熬煮1个小时，冷却后滤去渣子，兑足水量即成。

(三) 防治对象和效果：采用喷洒方法，可防治大豆蚜虫、蔬菜蚜虫等，杀虫效果达80%。

### 十八 烟油肥皂剂

(一) 配合量：烟油1两，肥皂1两半，清水2.4斤。

(二) 配合法：先将烟油兑水2斤，煮40分钟；再把肥皂切成碎片，用4两水化开，兑在烟油水中，再煮10分钟即成原液。

(三) 使用方法和防治对象：使用时，每斤原液兑水10—15斤，可防治高粱大豆蚜虫、玉米螟、菜青虫、蝗虫和蒼蝇等。

(四) 杀虫效果：喷洒后经10—30分钟，害虫全部杀死。

(五) 来源：九台县在8个烟斗中掘出1两多烟油子。

### 十九 野烟石灰混合剂

此剂是由野烟、石灰和水煮制而成。制时先将半斤整株野烟，用剪刀剪碎，放入锅内，加1两石灰，3斤水，熬煮40分钟滤渣即成。使用时，每斤原液兑水10—15斤，

杀灭蚜虫效果可达85%以上。

## 二十 青核桃皮石灰剂

将1斤青核桃皮，放入石窝内，捣烂如泥，加入半斤生石灰，拌匀后放在1斤的清水中，泡制10小时，滤渣即成原液。使用时，每斤原液兑水5斤，以防治水稻负泥虫、菜青虫等，杀虫效果达80—100%。

## 二十一 青核桃皮杀虫剂

此剂在水田地区均有应用。它可以有效的防治水稻的各种地下害虫，如稻搖蚊、泥苞虫等。其方法是：将青核桃皮放入石窝内，捣成泥状，装入草袋中，放在水口处，或拌在細砂上，撒布田間。

## 二十二 核桃叶水剂

(一) 配制法：核桃叶5斤，石灰2两，水30斤，煮1点半鐘，可得原液15斤。

(二) 防治对象：各种苗期害虫。

(三) 杀虫效果：一般达80%左右。

## 二十三 猫眼花根肥皂剂

将1斤猫眼花根和2两透骨草切碎，放入鍋內，加4斤水，煮沸后再放入1两肥皂，过半点鐘，即可滤出原液。使用时，每斤原液兑水3—5斤，防治高粱蚜虫效果达85%。

## 二十四 馬尿騷大活合剂

用馬尿騷根3两，大活（俗名走馬芹根）2两，水3斤，煮40分鐘，取液1斤。使用时兑水5斤，防治高粱蚜虫、菜青虫效果达95%以上。

## 二十五 大活透骨草合剂

用搗烂的大活3两，透骨草1两，生石灰半两，水2斤，煮半小时，得液半斤。使用时再加水4—5斤，防治高粱蚜虫的效果为80%左右。

## 二十六 百部肥皂液

（一）配合量：百部草3斤，透骨草1斤，肥皂1两，水20斤。

（二）配制法：先将百部草和透骨草剪碎，放入鍋中加水，熬煮30分鐘，再把肥皂水加入，即成原液。

（三）使用方法及防治效果：原液兑水3—4倍，防治高粱、大豆蚜虫，效果达90%以上。用百部草洗衣服，可以消灭虱子。

## 二十七 草烏杀虫液

草烏是一种野生药材，麻味很大。据磐石县試驗，能治稻蝗和螟虫。

（一）配制法：将1斤草烏搗烂，加凉水5斤，浸泡一昼夜，滤去渣子即成。

(二) 使用法：原液1斤兑水10斤，噴洒防治。

(三) 注意事項：此剂不宜用开水，以免減低藥效。

## 二十八 甘草院花合剂

甘草和院花都是一种中藥，两者結合毒性很大，人吃了会中毒死亡。杀虫效力很高。

(一) 配制法：将甘草、院花各一半，放入鍋內，每斤加白矾水2斤，熬煮半小时后，冷却过滤，即成原液。

(二) 使用方法及杀虫效果：使用时每斤原液兑水4—5斤。磐石县用噴洒方法，防治蚜虫效果为80—100%，防治水稻螟虫时杀虫率达76—80%。

## 二十九 星灵參合剂

(一) 配制与使用方法：苦參1斤，南星1斤，靈仙秧子1斤，兑水30斤，煮成原液20斤，加1%的石灰水5斤，噴洒防治。

(二) 防治对象：粘虫、大豆蚜虫。

(三) 杀虫效果：九台、磐石等地試驗，杀虫效果为80%以上。

## 三十 灵仙杀虫液

用靈仙草20斤，石灰4斤，水45斤，煮二小时，可取液20斤。防治苗期害虫，效果达80%以上。