

卫生专业技术资格考试专家委员会/策划编写

2009 卫生专业职称考试冲关捷径

人机对话版

妇产科学 全真模拟试卷

紧扣新版考试大纲 权威专家组建题库
内容涵盖全部考点 真实模拟考试环境

2009 卫生专业职称考试冲关捷径

妇产科学全真模拟试卷

FUCHANKEXUE QUANZHEN MONI SHIJUAN

主 编 乐 杰

副主编 林仲秋 王绍娟 张珠兰

编 者 (以姓氏笔画为序)

王绍娟	田丽娜	乐 杰	乐晓妮
李 成	李艺扬	李艳芳	李晓文
李雪梅	何 冰	张松灵	张树荣
张珠兰	张海鹏	张媛媛	林仲秋
高 竞	葛 岩	葛 峰	谭季春

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

妇产科学全真模拟试卷/乐 杰主编. —北京:人民军医出版社,2009.1

(卫生专业职称考试冲关捷径)

ISBN 978-7-5091-2293-8

I. 妇… II. 乐… III. ①妇科学—医药卫生人员—资格考核—习题②产科学—医药卫生人员—资格考核—习题 IV. R71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 187813 号

策划编辑:崔玲和 文字编辑:于晓红 责任审读:黄栩兵

出 版 人:齐学进

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300—8139

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:北京国马印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:12.5 字数:404 千字

版、印次:2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~4500

定价:49.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

出版说明

为了满足卫生专业技术人员晋升中级资格应试的需要,人民军医出版社连续多年组织具有丰富试题编写经验的各学科专家以全真模拟试卷的形式编写了《卫生专业职称考试冲关捷径》丛书。本丛书的特点是紧密围绕考试大纲,符合指导用书和临床实践需要,目的是使应试者提高业务能力和应试成绩,顺利通过中级职称考试。我们相信,只要应试者认真复习、掌握试卷所涉及的内容,踏踏实实做模拟试卷,就一定能够顺利通过考试。

本丛书依照最新考试大纲,以全真模拟试题形式将考纲中所有知识点与各学科的系统知识结合起来,经过精心编排,模拟真实的考试环境。为考生提供了将考纲重点、知识难点、解题要点、正确答案相结合的高效率复习模式。力争通过试题将考点融会贯通,为准备晋升的医师提供复习、应试的捷径。特别提醒:复习和做模拟题时,千万不要把主要精力放在背记试题和答案上。

在编写本模拟试卷的过程中,编者得到了多方的支持与帮助,在此表示诚挚的谢意。由于参与编写的人员较多,编写时间仓促,错误或疏漏之处,殷切希望广大读者批评指正,以便及时纠正和改进。

最后,衷心祝愿大家顺利通过考试!

编 者

2008年10月

前 言

本书专为拟晋升主治医师的考生编写,希望通过试做这些全真模拟试题,使考生能够掌握妇产科必需的、系统的知识,从而能够顺利通过考试,这是我们编写《妇产科学全真模拟试卷》的出发点。本书共有6套全真模拟试题,含模拟题2000余道,涵盖教材中几乎所有的知识点,每套全真模拟试题包括基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力4部分。前3部分均为100道题,专业实践能力部分题型改为病例串形式,每套题目有病例4~7个,每个病例下出至少5个提问,正确答案有1个或多个,共出够100个正确选项。读者应在充分复习普通高等教育“十五”、“十一五”国家级规划教材《妇产科学》(第6、7版)及供8年制和7年制学生使用的《妇产科学》教材的基础上,认真思考,完成试题。参考答案仅仅是为了读者检验自己答题是否正确的,千万不要用主要精力去背答案。

本书内容广泛,试题涵盖作为妇产科主治医师应该掌握的全部内容。我们深信,只要考生充分学习,认真做题,一定能够在晋升中级资格(主治医师)的考试中取得优异的成绩。

本书在编写过程中得到吉林大学第一医院、中山大学第二医院、深圳市第九人民医院、深圳市南山区妇幼保健院领导的大力支持,得到人民军医出版社领导和崔玲和责任编辑的积极帮助,得以尽快出版,谨在此表示诚挚的谢意。

由于参加编写的人员较多,加之时间紧迫,书中的不妥之处,殷切希望使用本书的考生和妇产科同道们提出意见和建议,以便及时纠正改进。

主 编 乐 杰

2008年8月

目 录

全真模拟试卷一	(1)	基础知识	(97)
基础知识	(1)	相关专业知识	(105)
相关专业知识	(9)	专业知识	(114)
专业知识	(18)	专业实践能力	(122)
专业实践能力	(27)	答案	(127)
答案	(31)	全真模拟试卷五	(129)
全真模拟试卷二	(33)	基础知识	(129)
基础知识	(33)	相关专业知识	(137)
相关专业知识	(41)	专业知识	(146)
专业知识	(50)	专业实践能力	(155)
专业实践能力	(59)	答案	(159)
答案	(63)	全真模拟试卷六	(161)
全真模拟试卷三	(65)	基础知识	(161)
基础知识	(65)	相关专业知识	(169)
相关专业知识	(73)	专业知识	(178)
专业知识	(82)	专业实践能力	(186)
专业实践能力	(91)	答案	(191)
答案	(95)	人机对话网络版试卷及答案	
全真模拟试卷四	(97)		(193)

全真模拟试卷一

基础知识

第一部分 单选题

本部分在答题过程中可以回退(对已作答试题可返回检查或修改答案)。

单选题(每题1个得分点):以下每道试题有5个备选答案,请从中选择1个最佳答案。

1. 处女膜解剖特征错误的是
A. 膜的厚薄有个体差异
B. 孔的形状、大小因人而异
C. 膜的两面均为鳞状上皮覆盖
D. 含有结缔组织、血管与神经末梢
E. 在初次性交后留有处女膜痕
2. 女性外生殖器形态学特征错误的是
A. 前庭大腺位于大阴唇后部
B. 阴阜为耻骨联合前方的皮肤隆起
C. 阴蒂位于两小阴唇顶端的联合处
D. 大阴唇为一对纵长隆起的皮肤皱襞
E. 两大阴唇之间的菱形区为阴道前庭
3. 女性内外生殖器的血液供应,来自卵巢动脉、子宫动脉、阴部内动脉及
A. 痔上动脉
B. 痔下动脉
C. 阴道动脉
D. 会阴动脉
E. 外阴动脉
4. 女性内生殖器淋巴回流错误的是
A. 输卵管淋巴汇入腰淋巴结
B. 宫颈淋巴汇入腹股沟深淋巴结
C. 宫体两侧淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
D. 阴道下1/3段淋巴汇入腹股沟淋巴结
E. 阴道上1/3段淋巴大部分汇入闭孔淋巴结及髂内淋巴结
5. 肛提肌组成由前内向后外分别是
A. 耻尾肌、髂尾肌和坐尾肌
B. 耻尾肌、髂尾肌和球海绵体肌
C. 坐尾肌、耻尾肌和球海绵体肌
D. 耻尾肌、坐尾肌和坐骨海绵体肌
E. 坐尾肌、耻尾肌和坐骨海绵体肌
6. 输尿管走行顺序错误的是
A. 在腹膜后沿髂内动脉下行
B. 在腹膜后沿腰大肌侧方下行
C. 在阔韧带基底部分向前内方行
D. 在子宫动脉上方交叉穿过
E. 在髂外动脉起始处前方进入盆腔
7. 骶棘韧带解剖特征正确的是
A. 位于骶骨与坐骨棘之间
B. 位于骶髂关节与坐骨棘之间
C. 位于骶尾关节与坐骨棘之间
D. 其宽度即为坐骨切迹宽度
E. 是判断骨盆出口平面是否狭窄的重要依据
8. 卵巢动静脉通过的韧带是
A. 圆韧带
B. 主韧带
C. 阔韧带
D. 宫骶韧带
E. 骨盆漏斗韧带
9. 宫颈组织结构正确的是
A. 黏膜无周期性变化
B. 主要由平滑肌纤维构成
C. 含多量血管及弹力纤维
D. 黏膜内腺体分泌酸性黏液
E. 宫颈阴道部由复层扁平上皮覆盖
10. 月经的临床表现正确的是
A. 月经血易凝固呈块状
B. 一般月经期无特殊症状
C. 每月正常月经量 $>80\text{ml}$
D. 月经初潮年龄多在15~18岁
E. 月经周期是指从上次月经干净到下次月经来潮的第一天
11. 卵巢功能错误的是
A. 青春期有排卵并有月经来潮
B. 新生儿卵巢内有200万个始基卵泡
C. 妇女一生有400个卵泡发育成熟并排卵

- D. 卵巢分泌雌激素、孕激素和少量雄激素
E. 卵巢每月有多个卵泡发育,只有一个卵泡发育成熟而排卵
12. 女性体内雄激素错误的是
A. 睾酮主要来自卵巢
B. 能促进阴毛和腋毛生长
C. 能使少女在青春期生长迅速
D. 是卵巢合成雌激素的中间产物
E. 雄烯二酮在外周组织能转化为睾酮
13. 孕激素的生理作用正确的是
A. 维持和促进骨基质代谢
B. 使子宫内膜呈增殖期变化
C. 使宫口闭合,黏液分泌减少、变稠
D. 增加子宫平滑肌对缩宫素的敏感性
E. 使阴道上皮细胞增生角化,糖原增加
14. 月经周期为 28 日型有排卵的妇女,于月经周期第 6 日刮宫,镜检子宫内膜应是
A. 增殖期早期
B. 增殖期中期
C. 增殖期晚期
D. 分泌期早期
E. 分泌期中期
15. 卵子完成第一次减数分裂是在
A. 出生前
B. 出生后
C. 排卵时
D. 受精时
E. 受精并形成受精卵时
16. 妊娠期母体内分泌系统的变化正确的是
A. 腺垂体不增大
B. 甲状腺功能低下
C. 皮质醇轻度减少
D. 垂体催乳激素增多
E. 腺垂体分泌促黑素细胞激素减少
17. 胎盘的组成是
A. 羊膜、叶状绒毛膜和底蜕膜
B. 羊膜、平滑绒毛膜和包蜕膜
C. 羊膜、叶状绒毛膜和包蜕膜
D. 羊膜、平滑绒毛膜和底蜕膜
E. 羊膜、平滑绒毛膜和真蜕膜
18. 组成胎头后部的颅骨包括
A. 2 块额骨,1 块枕骨
B. 2 块顶骨,1 块枕骨
C. 2 块顶骨,2 块额骨
D. 2 块额骨,2 块枕骨
E. 2 块顶骨,2 块枕骨
19. 诊断妊娠最可靠的组合是
A. 停经史,胎动感,腹部渐膨隆
B. 停经史,早孕反应,B 型超声检查见宫内光团
C. 停经史,早孕反应,双合诊子宫增大,尿 HCG (+)
D. 早孕反应,双合诊子宫增大,附件囊性小肿块,尿 HCG (+)
E. 停经史,双合诊子宫增大,B 型超声见宫腔内妊娠囊、胚芽、原始心管搏动
20. 为孕妇行骨盆外测量,低于正常值的是
A. 髂棘间径 22cm
B. 髂嵴间径 26cm
C. 骶耻外径 19cm
D. 坐骨棘间径 10cm
E. 坐骨结节间径 8.5cm
21. 孕期保健正确的是
A. 定期行产前检查
B. 保证胎儿正常发育
C. 孕期只需超声监控
D. 保护孕妇产时安全
E. 孕晚期预防胎儿致畸
22. 正常胎心率摆动频率 1 分钟内是
A. ≥ 3 次
B. ≥ 4 次
C. ≥ 5 次
D. ≥ 6 次
E. ≥ 8 次
23. 孕妇尿中与胎儿胎盘功能关系密切的激素是
A. 雌酮
B. 孕酮
C. 睾酮
D. 雌二醇
E. 雌三醇
24. 不能推算出预产期的是
A. 末次月经第 1 日
B. 早孕反应开始出现的日期
C. 开始察觉胎动的日期
D. 测量子宫长度
E. 测量腹围值
25. 绘制妊娠图不包括
A. 血压
B. 体重
C. 心率
D. 子宫长度
E. 胎头双顶径

26. 有助于判断中骨盆是否狭窄的指标是
A. 骶耻外径
B. 髂嵴间径
C. 髂棘间径
D. 坐骨结节间径
E. 坐骨切迹宽度
27. 估计妊娠 20 周末胎儿体重是
A. 280g
B. 320g
C. 360g
D. 400g
E. 440g
28. 产程中子宫收缩特征错误的是
A. 宫缩具有对称性
B. 是不自主的节律性收缩
C. 以宫底部最强, 子宫下段最弱
D. 子宫收缩间隔越来越短, 持续时间越来越长
E. 子宫肌纤维在宫缩时变短变宽, 间歇时松弛恢复如旧
29. 骨盆出口平面错误的是
A. 呈菱形
B. 出口前矢状径值约为 6cm
C. 出口后矢状径值约为 6cm
D. 出口横径正常值约为 9cm
E. 出口横径与后矢状径之和 $< 15\text{cm}$, 足月胎儿不易经阴道分娩
30. 真结合径平均值约是
A. 8cm
B. 9cm
C. 10cm
D. 11cm
E. 12cm
31. 临产后宫颈的变化正确的是
A. 形成前羊水囊, 宫口不易扩张
B. 经产妇多是宫颈管先消失, 然后宫口扩张
C. 初产妇多是宫颈管消失与宫口扩张同时进行
D. 宫颈管消失过程先形成漏斗状, 逐渐缩短直至消失
E. 破膜后胎先露直接压迫宫颈, 影响宫口扩张速度
32. 枕右前位分娩机制正确的是
A. 胎头矢状缝坐落在骨盆入口右斜径上
B. 胎头枕部遇肛提肌阻力发生俯屈
C. 胎头下降达阴道外口时出现内旋转动作
D. 胎头内旋转时, 其枕部向右旋转 45°
E. 胎头娩出后, 其枕部向左旋转 45° 为复位
33. 第一产程活跃期的最大加速期是指宫口扩张
A. 3~4cm
B. 4~9cm
C. 3~10cm
D. 6~10cm
E. 9~10cm
34. 总产程及产程分期正确的是
A. 从规律宫缩至胎儿娩出称总产程
B. 第一产程初产妇需 14~16 小时
C. 第一产程经产妇需 10~12 小时
D. 第二产程初产妇需 1~2 小时
E. 第三产程约需 30 分钟
35. 胎头枕下前囟径是
A. 两顶骨隆突之间
B. 由鼻根到枕骨隆突
C. 由大囟门前端到枕骨大孔
D. 由大囟门中央到枕骨隆突下方
E. 由颞骨下方中央到小囟门顶部
36. 产后子宫恢复至非孕期大, 约在产后
A. 3 周
B. 4 周
C. 5 周
D. 6 周
E. 8 周
37. 产褥期临床表现正确的是
A. 恶露通常持续 1~2 周
B. 产后初期产妇脉搏增快
C. 子宫复旧因授乳而加快
D. 产后第 1 日宫底稍下降
E. 产后子宫缩痛多见于初产妇
38. 产后雌激素值降至未孕水平的时间约是
A. 1 周
B. 2 周
C. 3 周
D. 4 周
E. 5 周
39. 输卵管妊娠最常见的着床部位是
A. 伞部
B. 峡部
C. 间质部
D. 壶腹部
E. 壶腹部与峡部连接部
40. 与妊娠期高血压疾病关系最密切的是
A. 羊水过多
B. 粘连胎盘

- C. 前置胎盘
D. 胎盘早剥
E. 羊水栓塞
41. 单卵双胎分娩后检查为两个胎盘及两层绒毛膜、两层羊膜,该受精卵分裂发生在受精后
A. 3日内
B. 6日内
C. 8日内
D. 10日内
E. 13日内
42. 国内资料巨大胎儿的发生率约是
A. 3%
B. 5%
C. 7%
D. 10%
E. 15%
43. 不属于羊水过多常见病因的是
A. 子痫前期
B. 胎盘增大
C. 过期妊娠
D. 妊娠期糖尿病
E. 母儿 Rh 血型不合
44. 胎儿发育指数的计算公式是
A. 子宫长度(cm)-2×(月份+1)
B. 子宫长度(cm)-2×(月份-1)
C. 子宫长度(cm)+3×(月份+1)
D. 子宫长度(cm)-3×(月份+1)
E. 子宫长度(cm)-3×(月份-1)
45. 治疗胎儿生长受限效果最佳的时期是
A. 妊娠 32 周前
B. 妊娠 33 周前
C. 妊娠 34 周前
D. 妊娠 35 周前
E. 妊娠 36 周前
46. 无脑儿可能导致过期妊娠的原因不包括
A. 遗传因素
B. 内源性前列腺素不足
C. 畸形胎儿不合并羊水过多
D. 胎儿甲状腺功能不足
E. 雌激素与孕激素比例失调
47. 胎儿窘迫的病因不包括
A. 子痫前期
B. 过期妊娠
C. 胎膜早破
D. 母儿血型不合
E. 协调性子宫收缩乏力
48. 单臀先露的两下肢姿势是
A. 髋关节屈曲,膝关节屈曲
B. 髋关节直伸,膝关节直伸
C. 髋关节直伸,膝关节屈曲
D. 髋关节屈曲,膝关节直伸
E. 膝关节屈曲,踝关节直伸
49. 出现子宫收缩乏力行人工破膜,适用于
A. 确认为头盆不称
B. 肩先露,宫口开大 3cm
C. 臀先露,宫口开大 4cm
D. 胎头高直后位,宫口开大 2cm
E. 枕先露,S=0,宫口开大 4cm
50. 为治疗产后出血行髂内动脉栓塞术,选用的明胶海绵被吸收需要
A. 1~2 周
B. 2~3 周
C. 3~4 周
D. 4~5 周
E. 3~6 周
51. 最常见的子宫肌瘤类型是
A. 宫颈肌瘤
B. 肌壁间肌瘤
C. 浆膜下肌瘤
D. 黏膜下肌瘤
E. 阔韧带肌瘤
52. 发生子宫内膜癌的高危因素不包括
A. 肥胖
B. 多育
C. 糖尿病和高血压
D. 未生育或少生育
E. 雌激素对子宫内膜的长期刺激
53. 女,32 岁。不孕患者,已知基础体温呈单相型曲线,于月经来潮前 7 日取出宫颈黏液,其特征是
A. 量少、黏稠、浑浊
B. 量少、透明、稀薄
C. 量多、透明、稀薄
D. 量多、黏稠、浑浊
E. 量多、黏稠、透明
54. 初孕妇,25 岁。末次月经记不清,3 周前自觉胎动,检查子宫长度 24cm。符合实际的妊娠周数是
A. 14~16 周
B. 17~19 周
C. 20~22 周

- D. 23~25 周
E. 26~28 周
55. 初产妇,30 岁。左枕前位,临产 8 小时,肛查宫口开全,S+4。此时的产力是
A. 子宫收缩力
B. 子宫收缩力+膈肌收缩力
C. 子宫收缩力+腹肌收缩力
D. 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力
E. 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力+肛提肌收缩力
56. 女,26 岁。结婚 3 年不孕。月经周期不规则,刮宫组织学表明有排卵,其子宫内膜应是
A. 增殖期早期
B. 增殖期中期
C. 增殖期晚期
D. 分泌期
E. 萎缩型
57. 女,38 岁。患慢性肾炎 7 年,要求给予避孕指导。本例选择的避孕措施是
A. 安全期避孕
B. 阴茎套避孕
C. 长效避孕针
D. 皮下埋植避孕
E. 口服短效避孕药
58. 女,34 岁。3 个月前行人工流产术,1 个月后月经来潮,量极少,无明显下腹痛,给予人工周期治疗效果不佳,引起月经减少最可能的原因是
A. 宫颈粘连
B. 盆腔结核
C. 内分泌失调
D. 宫腔部分粘连
E. 盆腔炎性疾病后遗症
59. 女,59 岁。主诉为阴道外有肿物脱出近 1 年,查宫颈已脱出至阴道口外,宫体在阴道内,双附件无异常。本例应诊断为子宫脱垂
A. I 度轻型
B. I 度重型
C. II 度轻型
D. II 度重型
E. III 度
60. 女,30 岁。继发性痛经 3 年,进行性加重,其典型体征是
A. 宫颈举痛
B. 子宫压痛
C. 附件区压痛
D. 后穹窿触痛
E. 直肠子宫陷凹有触痛结节
61. 女,43 岁。月经周期延长,约 2 个月来潮一次,经期 8~10 日,经量多。为确诊生殖内分泌失常类型,在月经来潮前 4 日检查。本例最有价值的辅助检查方法是
A. 测基础体温
B. 测尿孕二醇值
C. 阴道脱落细胞学检查
D. 子宫内膜活组织检查
E. 宫颈黏液涂片干燥后镜下检查
62. 女,48 岁,近 3 个月妇科学普查发现盆腔肿物,患胃溃疡 10 余年。妇科检查:子宫两侧均触及直径 8cm 实性肿物,活动良好,能与子宫分开。本例可能的诊断是卵巢
A. 纤维瘤
B. 库肯勃瘤
C. 囊性畸胎瘤
D. 颗粒细胞瘤
E. 乳头状囊腺瘤
63. 在分娩室一位初产妇的分娩过程是
- | 时间 | 宫口开大 | 胎先露位置 |
|------|------|-------|
| 2:00 | 3cm | -2 |
| 4:00 | 4cm | -1 |
| 6:00 | 7cm | 0 |
| 8:10 | 7cm | +1 |
- 这种分娩过程属于
A. 潜伏期延长
B. 活跃期停滞
C. 活跃期延长
D. 胎头下降延缓
E. 胎头下降停滞
64. 女,28 岁。月经规律,停经 46 日后出现一侧下腹部痛并伴肛门坠胀。此时的阳性体征是
A. 腹部包块
B. 宫颈举痛
C. 宫颈充血水肿
D. 子宫稍大变软
E. 移动性浊音(+)
65. 女,25 岁。停经 46 日,阴道少量流血 10 日,今晨突然下腹痉挛性疼痛伴阴道流血量增多,检查宫口通过 1 指。本例最可能

的诊断是

- A. 痛经
 - B. 先兆流产
 - C. 难免流产
 - D. 过期流产
 - E. 输卵管妊娠
66. 初产妇, 25 岁。足月临产 14 小时, 宫口开全 1 小时 20 分钟, 胎心 142 次/分, 宫缩持续 50 秒, 间歇 2~3 分钟, 产妇不断屏气用力。本例应立即采取的处置是
- A. 氧气吸入
 - B. 行阴道检查
 - C. 行剖宫产术
 - D. 静脉滴注缩宫素
 - E. 肌内注射哌替啶
67. 初孕妇, 37 岁。妊娠 24 周, 有原发性高血压病史 4 年, 糖尿病史 8 年, B 型超声检查提示羊水过多。本例发生羊水过多最可能的原因是
- A. 高龄初产
 - B. 不明原因
 - C. 妊娠合并糖尿病
 - D. 妊娠合并高血压
 - E. 胎儿神经管畸形
68. 初孕妇, 28 岁。妊娠 36 周, 合并糖尿病, 控制饮食及三餐前皮下注射胰岛素 16U、8U、12U, 餐后 2 小时血糖值为 11.1mmol/L, 胎心 166 次/分。本例错误的处理是
- A. 立即剖宫产终止妊娠
 - B. 增加胰岛素用量, 继续待产
 - C. 分娩后胰岛素用量减为分娩前的 1/2
 - D. 监测胎心率, 吸氧, 静脉滴注地塞米松
 - E. 新生儿娩出后 30 分钟开始滴服 25% 葡萄糖液
69. 初产妇, 26 岁。胎儿娩出后 3 分钟, 产妇开始出现较多量活动性阴道流血。本例最可能的原因是
- A. 宫颈裂伤
 - B. 阴道静脉破裂
 - C. 胎盘部分剥离
 - D. 凝血功能障碍
 - E. 宫缩乏力性出血
70. 女, 26 岁。停经 38 日, 诊为早孕, 自诉 1 个月前曾服多种药品。本例恰当的处理是
- A. 可以继续妊娠
 - B. 应用维生素 E 保胎
 - C. 应用绒促性素保胎
 - D. 行人工流产, 终止妊娠
 - E. 等到妊娠 4 个月时做 B 型超声检查, 发现畸形再终止妊娠
71. 初孕妇, 30 岁。妊娠 41 周, 羊水指数 7cm, 临产后产程进展顺利, 宫口开大 3cm, 行人工破膜见羊水 I 度胎粪污染。本例恰当的处置是
- A. 立即剖宫产
 - B. 严密观察产程进展
 - C. 缓慢静脉推注氨茶碱
 - D. 静脉滴注缩宫素缩短产程
 - E. 左侧卧位, 吸氧, 胎心监护
72. 初产妇, 28 岁。妊娠 39 周, 宫缩规律, 枕右后位, 胎心 140 次/分, 肛查宫口开大 2cm, 胎头未衔接。符合本产妇实际情况的骨盆测量数值是
- A. 骶耻外径 17cm
 - B. 髂棘间径 24cm
 - C. 髂嵴间径 27cm
 - D. 坐骨棘间径 10cm
 - E. 坐骨结节间径 8.5cm
73. 经产妇, 36 岁。第一胎曾分娩巨大儿。随后两次妊娠分别在 24 周及 22 周时破膜不久流产。本例最可能造成两次流产的原因是
- A. 子宫肌瘤
 - B. 染色体异常
 - C. 宫颈内口松弛
 - D. ABO 血型不合
 - E. 卵巢黄体功能不足
74. 初孕妇, 25 岁。末次月经 2008 年 3 月 10 日。于 2008 年 10 月 13 日就诊, 检查宫底在脐上 3 横指, 枕右前位, 胎心率正常, 血压 160/110mmHg, 尿蛋白 2.8g/24 小时。本例现在是
- A. 妊娠满 30 周, 宫底高度符合正常情况
 - B. 妊娠满 30 周, 宫底高度低于正常
 - C. 妊娠满 31 周, 宫底高度符合正常情况
 - D. 妊娠满 31 周, 宫底高度低于正常
 - E. 妊娠满 32 周, 宫底高度低于正常
75. 女, 28 岁。停经 45 日, 阴道不规则流血 2 日, 伴轻度下腹痛, 尿 HCG(+), 子宫内膜病理检查结果为蜕膜组织。本例最可能

的诊断是

- A. 早孕
 - B. 葡萄胎
 - C. 先兆流产
 - D. 异位妊娠
 - E. 子宫内膜炎
76. 经产妇, 27 岁。妊娠 38 周, 阴道无痛性流血 2 日, 量如月经量, 检查枕左前位, 胎头高浮, 胎心 142 次/分。产后检查见胎膜破口距胎盘边缘 4cm, 胎盘边缘有黑紫色陈旧血块附着。本例最终的诊断是
- A. I 度胎盘早剥
 - B. II 度胎盘早剥
 - C. 部分性前置胎盘
 - D. 胎盘边缘静脉窦破裂
 - E. 脐带帆状附着前置血管破裂
77. 女, 26 岁。患风湿性心脏病, 妊娠 10 周出现心力衰竭, 其处理原则是
- A. 控制心力衰竭后行钳刮术
 - B. 控制心力衰竭后继续妊娠
 - C. 边控制心力衰竭边终止妊娠
 - D. 立即行负压吸宫术终止妊娠
 - E. 控制心力衰竭后行负压吸宫术
78. 经产妇, 29 岁。临产 4 小时, 骶左前位, 突然阴道流液, 立即听胎心 110 次/分, 宫口开大 4cm, 阴道内触及一带状物, 待手将其送回宫腔后, 胎心 140 次/分。下一步处理应是
- A. 手堵阴道
 - B. 立即行剖宫产术
 - C. 密切观察胎心变化
 - D. 等待宫口开全自然分娩
 - E. 宫口开全行臀牵引术
79. 女, 29 岁。继发不孕 4 年, 月经第 4 日发热、畏寒伴右下腹痛, 血压 100/80mmHg, 体温 38.3℃, 脉搏 120 次/分, 白细胞 $20 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.80。查下腹轻压痛, 宫颈外口有脓性分泌物; 子宫正常大, 有压痛, 双附件增厚, 压痛明显。本例最可能的诊断是
- A. 急性阑尾炎
 - B. 急性盆腔炎
 - C. 急性盆腔腹膜炎
 - D. 卵巢囊肿合并感染
 - E. 异位妊娠合并感染

80. 女, 50 岁。宫颈细胞学检查为巴氏 III 级, 阴道镜下多点活检为宫颈上皮重度不典型增生。本例应采取的治疗措施是
- A. 宫颈激光治疗
 - B. 宫颈锥形切除
 - C. 腔内放射治疗
 - D. 全子宫切除术
 - E. 全子宫切除术+双附件切除术

第二部分 共用题干单选题

进入此部分试题后, 您不能返回前面部分查看试题或修改答案; 本部分在答题过程中不能回退, (对已作答试题不能返回检查或修改答案)。

共用题干单选题(每个提问 1 个得分点): 以下每道试题有 2~6 个提问, 每个提问有 5 个备选答案, 请选择 1 个最佳答案。

(81—83 题共用题干)

女, 44 岁。骑自行车被撞倒, 阴道大量流血半小时急诊入院。查体: 心率 102 次/分, 血压 80/50mmHg, 神志淡漠, 外阴可见大量流血。

81. 本例可能性最小的诊断是
- A. 外阴裂伤
 - B. 阴道裂伤
 - C. 失血性休克
 - D. 不除外内脏损伤
 - E. 功能失调性子宫出血
82. 本例不恰当的处理是
- A. 行诊刮术
 - B. 立即配血
 - C. 立即开放静脉, 补液
 - D. 请外科及泌尿科医师会诊
 - E. 行妇科检查, 明确出血原因
83. 若诊断为右侧大阴唇血肿及阴道下 1/3 裂伤, 正确处理应是
- A. 压迫止血
 - B. 术中止血满意, 无需压迫止血
 - C. 局麻下行阴道裂伤缝合术+血肿清除术
 - D. 硬膜外或腰麻下行阴道裂伤缝合术+血肿清除术
 - E. 硬膜外麻醉下行阴道裂伤缝合术+血肿清除术, 同时补液抗休克治疗

(84—85 题共用题干)

女, 36 岁。停经 8 周, 阴道少许流血 2 日, B 型超声显示胎囊 2.0cm×1.5cm, 有胚芽, 未见原始心管

搏动。

84. 本例最可能的诊断是

- A. 死胎
- B. 先兆流产
- C. 难免流产
- D. 稽留流产
- E. 不全流产

85. 本例最恰当的处理措施是

- A. 立即清宫
- B. 肌注黄体酮
- C. 查血 β -HCG 值
- D. 应用广谱抗生素
- E. 查血常规和凝血功能

(86—87 题共用题干)

初产妇, 26 岁。妊娠 33 周, 阴道少量流血 2 日, 不规则腹部坠胀 2 小时, 肛查宫颈管近消失, 宫口通过 1 指尖。

86. 本例最可能的诊断是

- A. 临产
- B. 前置胎盘
- C. 胎盘早剥
- D. 先兆早产
- E. 晚期流产

87. 本例最不恰当的处置是

- A. 吸氧
- B. 左侧卧位
- C. 口服沙丁胺醇
- D. 口服少量镇静药
- E. 静滴缩宫素调整宫缩

(88—90 题共用题干)

初孕妇, 25 岁。妊娠 29 周, 今晨产前检查时发现血压 144/92mmHg, 尿蛋白阴性。

88. 此时最适宜的处理应是

- A. 轻工作 1 周后复查
- B. 2 周后复查
- C. 1 个月后复查
- D. 出现下肢水肿时复查
- E. 有头痛等症状及时复查

89. 再次复查时结果同前, 此时最适宜的处理是

- A. 卧床休息
- B. 左侧卧位休息
- C. 口服利尿药
- D. 静注冬眠合剂

E. 静脉滴注缩宫素

90. 经过治疗, 孕妇血压降至正常。妊娠末期最恰当的医嘱是

- A. 密切观察血压变化
- B. 定期做羊水振荡试验
- C. 加强营养, 适当锻炼
- D. B 型超声检查定期监护
- E. 胎心监护仪定期监测胎心

(91—92 题共用题干)

初孕妇, 28 岁。妊娠 34 周, 患高血压, 合并子痫前期, 2 小时前突然腹痛伴阴道流血, 色鲜红如月经量。检查血压 70/40mmHg, 脉搏 110 次/分, 宫底在剑突下 2 指, 子宫硬, 肌壁松弛不完全, 胎位不清, 胎心消失。肛查: 宫颈管未消失, 宫口未开。

91. 本例最可能的诊断是

- A. 早产
- B. 子宫破裂
- C. 胎盘早剥
- D. 前置胎盘
- E. 先兆子宫破裂

92. 本例最恰当的处理是

- A. 静脉滴注缩宫素引产
- B. 以抢救休克为主, 死胎不急于引产
- C. 抢救休克, 尽快剖宫产终止妊娠
- D. 立即人工破膜, 等待自然分娩
- E. 立即扩张宫口, 破膜, 缩宫素引产

(93—95 题共用题干)

女, 26 岁。停经 42 日, 尿妊娠试验阳性, 要求行人工流产术。术前妇科检查: 宫体后倾屈, 稍大稍软, 术中探宫腔 9cm, 吸出物未见绒毛, 出血少。

93. 本例吸出的组织最可能是

- A. 葡萄胎
- B. 蜕膜组织
- C. 子宫息肉
- D. 增殖期子宫内膜
- E. 分泌期子宫内膜

94. 为排除宫外孕, 必要的辅助检查是

- A. 急查血常规
- B. B 型超声检查
- C. 吸出物送病理
- D. 阴道后穹窿穿刺
- E. 尿妊娠试验

95. 若 B 型超声显示胎囊在宫底部, 此时诊断是

- A. 漏吸

- B. 吸宫不全
- C. 宫腔感染
- D. 子宫畸形
- E. 子宫穿孔

(96—97 题共用题干)

女,30岁。月经周期正常,因停经6周就诊,尿妊娠试验阳性。检查:子宫稍饱满,左附件区增厚、轻压痛。

96. 本例适当的辅助检查是

- A. 诊断性刮宫
- B. 腹腔镜检查
- C. B型超声检查
- D. 阴道后穹窿穿刺
- E. 血 β -HCG测定

97. 患者突然出现剧烈下腹痛,血压急骤下降,移动性浊音(±)。本例为确诊应进行的检查是

- A. 腹腔镜检查
- B. 诊断性刮宫
- C. B型超声检查
- D. 血 β -HCG测定
- E. 阴道后穹窿穿刺

(98—100 题共用题干)

初产妇,25岁。妊娠40周,规律宫缩10小时,

宫口开大2cm,S+1,前囟位于骨盆6点处,矢状缝与骨盆前后径一致,骨盆外测量无异常,胎心148次/分,胎膜未破,宫缩持续20~30秒,间隔4~5分钟。

98. 本例最可能的诊断是

- A. 枕左前位
- B. 潜伏期延长
- C. 胎头高直前位
- D. 持续性枕后位
- E. 胎头下降停滞

99. 本例应进行的处理是

- A. 应予试产
- B. 立即剖宫产
- C. 人工破膜后手转胎头
- D. 宫口开全后经阴道助产
- E. 胎头不能通过中骨盆则行剖宫产

100. 试产3小时后,肛查宫口开大3cm,S+2,前囟仍位于骨盆6点处,宫缩30秒,间隔3~4分钟。下一步处理应是

- A. 不干预
- B. 人工破膜
- C. 立即剖宫产
- D. 宫口开全后助产
- E. 静脉滴注缩宫素

相关专业知识

第一部分 单选题

本部分在答题过程中可以回退(对已作答试题可返回检查或修改答案)。

单选题(每题1个得分点):以下每道试题有5个备选答案,请从中选择1个最佳答案。

1. 生殖器官与邻近器官的关系错误的是

- A. 膀胱充盈影响盆腔检查
- B. 阑尾炎症可波及右侧附件
- C. 尿道长8cm,邻近阴道易感染
- D. 阴道前穹窿穿刺易引起膀胱损伤
- E. 输尿管于宫颈内口水平外侧2cm向前进入膀胱

2. 妊娠期肝内胆汁淤积症最主要的特异性实验室证据是血清

- A. 尿酸增高
- B. 胆酸增高
- C. 尿素氮增高
- D. 胆红素增高
- E. 丙氨酸转氨酶增高

3. B型超声检查时,能够提示异位妊娠的是

- A. 宫腔空虚
- B. 腹腔内肠管漂浮
- C. 宫旁包块内见妊娠囊
- D. 附件区显现形状不整包块
- E. 直肠子宫凹陷有多量液性暗区

4. 容易引起胎盘早剥的妊娠合并症是

- A. 心脏病
 - B. 缺铁性贫血
 - C. 病毒性肝炎
 - D. 系统性红斑狼疮
 - E. 妊娠期高血压疾病
5. 羊水过多孕妇娩出的新生儿,容易罹患的疾病是
 - A. 肺不张
 - B. 先天性膈疝
 - C. 胎粪性腹膜炎
 - D. 先天性食管闭锁
 - E. 出生前感染性肺炎
 6. 与内因性匀称型胎儿生长受限无关的是
 - A. 染色体异常
 - B. 孕早期病毒感染
 - C. 妊娠期高血压疾病
 - D. 孕早期接触有毒物质
 - E. 孕早期胎儿内部异常
 7. 下列对应关系错误的是
 - A. AFP——甲胎蛋白
 - B. HPL——催乳激素
 - C. AFI——羊水指数
 - D. AKP——碱性磷酸酶
 - E. FGR——胎儿生长受限
 8. 极易发生弥散性血管内凝血是在胎死宫内
 - A. 1周
 - B. 3周
 - C. 5周
 - D. 7周
 - E. 9周
 9. 心脏病孕妇于分娩期血流动力学变化错误的是
 - A. 第二产程宫缩时屏气,周围阻力增大
 - B. 第一产程宫缩使周围循环阻力增加,全身血容量减少
 - C. 第二产程腹压增大,内脏血液涌向心脏,回心血量增加
 - D. 第三产程子宫迅速缩小,腹压减低,大量血液回到内脏,回心血量减少
 - E. 第三产程胎儿娩出后,子宫胎盘循环停止,大量血液进入血循环,回心血量增加
 10. 妊娠合并心脏病对胎儿的影响是
 - A. 心功能Ⅳ级孕妇胎儿窘迫发生率高
 - B. 死胎常见于心脏代偿功能良好的孕妇
 - C. 合并心脏病孕妇和其胎儿的预后均不良
 - D. 参加工作的二尖瓣狭窄手术后孕妇常早产
 - E. 房间隔缺损孕妇发生胎儿生长受限不少见
 11. 确诊妊娠合并心脏病的依据不包括
 - A. 心房颤动
 - B. 舒张期杂音
 - C. 室性期前收缩
 - D. 舒张期奔马律
 - E. Ⅳ级时限较长的收缩期杂音
 12. 心脏病孕妇,妊娠7周时出现急性心力衰竭,最佳的处理是
 - A. 尽早终止妊娠
 - B. 控制心力衰竭后继续妊娠
 - C. 控制心力衰竭后吸宫终止妊娠
 - D. 控制心力衰竭后,钳刮术终止妊娠
 - E. 边控制心力衰竭边终止妊娠
 13. 病毒性肝炎产妇在产褥期的注意事项不包括
 - A. 产妇不宜哺乳
 - B. 新生儿应接种肝炎疫苗
 - C. 使用对肝脏损害小的抗生素预防感染
 - D. 新生儿应在出生后隔离2周,避免接触感染
 - E. 密切观察病情及肝功能变化,以防转变为慢性肝炎
 14. 妊娠合并肝炎对胎儿影响错误的是
 - A. 妊娠早期胎儿畸形增多
 - B. 妊娠中期发生流产、死胎
 - C. 妊娠晚期发生早产、死产
 - D. 胎儿通过垂直传播被感染
 - E. 甲型肝炎病毒通过胎盘传播
 15. 孕妇容易感染并容易成为重症肝炎的病原体是
 - A. 甲型肝炎病毒
 - B. 乙型肝炎病毒
 - C. 丙型肝炎病毒
 - D. 丁型肝炎病毒
 - E. 戊型肝炎病毒
 16. 对急性病毒性肝炎产妇于分娩时的处理错误的是
 - A. 预防产后出血
 - B. 防止肝肾衰竭
 - C. 放宽剖宫产指征
 - D. 应尽可能经阴道分娩
 - E. 预防产程延长,尽早缩短第二产程
 17. 乙型肝炎产妇产后不宜选用的抗生素是
 - A. 青霉素
 - B. 四环素
 - C. 阿奇霉素

- D. 头孢羟氨苄
E. 乙酰螺旋霉素
18. 急性病毒性肝炎妇女,避孕方法最好选择
A. 阴茎套
B. 安全期避孕
C. 放置宫内节育器
D. 口服短效避孕药
E. 使用长效避孕针
19. 妊娠对糖尿病影响错误的是
A. 随妊娠进展,空腹血糖稍降低
B. 胎盘分泌的激素有抗胰岛素作用
C. 血容量增加,血液稀释,胰岛素相对不足
D. 产程中能量消耗及产妇进食少,容易发生酮症酸中毒
E. 产后全身内分泌激素很快恢复至非妊娠水平,不再会发生低血糖
20. 孕妇易患急性肾盂肾炎的原因是
A. 孕激素使输尿管蠕动增强
B. 排尿通畅不易发生尿潴留
C. 孕中期输尿管及肾盂可积尿 100ml
D. 右旋子宫压迫右侧输尿管致机械性梗阻
E. 增大子宫由盆腔进入腹腔,输尿管受压解除
21. 近预产期孕妇患急性肾盂肾炎,治疗措施不包括
A. 首选抗生素为青霉素
B. 体温降至正常后 3 日停药
C. 多饮水,入量不足时输液
D. 卧床休息,以侧卧位为好
E. 肾功能不良依病情适当减少药量
22. 妊娠合并肺结核的产科处理措施不包括
A. 分娩时应尽量避免屏气用力
B. 可以经阴道助产,缩短第二产程
C. 妊娠合并肺结核者分娩方式以剖宫产为宜
D. 合并肺结核者行剖宫产时应选硬膜外麻醉
E. 妊娠合并活动性肺结核者应在预产期前 1~2 周住院待产
23. 妊娠期容易合并贫血的原因不包括
A. 孕妇胃酸分泌减少,影响叶酸吸收
B. 孕期对铁、叶酸、维生素 B₁₂需要量增加
C. 妊娠期血浆增加多于红细胞增加,使血液稀释
D. 孕晚期饮食中铁剂仅 20% 被吸收,应及时补充铁剂
E. 孕妇肾血流量增加,肾小管回吸收减少,使叶酸排泄增多
24. 缺铁性贫血对妊娠的影响不包括
A. 贫血孕妇易发生感染
B. 重度贫血可致心肌缺血
C. 轻度贫血对妊娠影响不大
D. 重度贫血易发生妊娠期高血压疾病
E. 铁是逆向运转,胎儿摄取铁占优势
25. 妊娠合并再生障碍性贫血的处理措施错误的是
A. 妊娠早期应行人工流产
B. 妊娠 4 个月以上患病,可继续妊娠
C. 应尽量经阴道分娩,缩短第二产程
D. 孕期血红蛋白 > 50g/L,对胎儿影响不大
E. 产后预防感染应用抗生素
26. 妊娠合并巨幼细胞性贫血的原因错误的是
A. 妊娠期需要量增加
B. 妊娠期影响叶酸吸收
C. 妊娠期叶酸从尿中排泄增多
D. 妊娠合并胃肠道疾病影响维生素 B₁₂ 吸收
E. 使 RNA 合成受阻,导致红细胞体积增大且迅速被破坏而发生贫血
27. 对特发性血小板减少性紫癜孕妇的处理不包括
A. 脾切除的时间宜在孕 3~6 个月
B. 丙种球蛋白在妊娠期不主张使用
C. 孕期血小板 < 50 × 10⁹/L,有出血倾向者首选肾上腺皮质激素
D. 妊娠 12 周以前就需肾上腺皮质激素治疗者,要考虑终止妊娠
E. 输注血小板将刺激体内产生血小板抗体,加快血小板的破坏
28. 妊娠期阑尾的位置是
A. 妊娠 2 个月末,在髂嵴下 2 横指
B. 妊娠 4 个月末,在髂嵴水平
C. 妊娠 7 个月末,在髂嵴上 2 横指
D. 妊娠足月可达胆囊区
E. 产后 5 日恢复到接近原来位置
29. 中期和晚期孕妇患急性阑尾炎的临床表现与非孕妇最主要不同点是
A. 发热
B. 恶心和呕吐
C. 腹膜炎体征
D. 转移性腹痛
E. 血白细胞计数增高
30. 剖宫产术中发现阑尾穿孔伴弥漫性腹膜炎,最佳的治疗措施是
A. 盆腔引流术
B. 全子宫切除术