



广西植物名录

第三册

单子叶植物

广西植物研究所编

1973·9

说 明

遵照伟大领袖毛主席“**备战、备荒、为人民**”的伟大教导，为了进一步开发和利用祖国丰富的植物资源，更好地为社会主义建设服务，我们将多年来野外调查采集的标本和收集的资料重新整理，编写成《广西植物名录》，供工、农、医等部门在开发利用广西丰富的植物资源时参考。

本册是《广西植物名录》的第三册，收载已知的广西单子叶植物 39 科，322 属，937 种（其中包括亚种 4、变种 72、亚变种 1 和变型 3），绝大部分是分布在广西的植物，少数是从我国各省、区或国外引进广西的种类。

每种植物依次记载：中名，别名，学名，分布，用途。

中名的左上角有“*”号的，是栽培植物。旧有中名不恰当需要更改，或未有中名的植物，我们都拟出新名。在名后有“☆”号的，为新拟中名。

分布仅指该植物在广西的分布（产地）。因资料不够完整，就是在广西的分布也没有全部写上，故在两地（县）之间，或相邻地区，虽然本书未有记录，也可能有这种植物的分布。书中的大瑶山、大苗山等，是指各该山脉和相邻的地区。

科的排列系按《有花植物科志》的系统（1926年版）。每个科中的属、种、亚种和变种等，则按拉丁文字母顺序排列。同属植物的属名，除该属第一个种的属名全写外，其余写属名的第一个字母代之，但在每页的上方，有全写的属名。

为了节省篇幅和便于应用,对学名中的一部分命名人,采用比通常使用的缩写更简略的缩写。例如: L. = Linn., Thb. = Thunb., Hk. = Hook., H.-M. = Hand.-Mzt., Gagn. = Gagnep., W. et A. = Wight et Arn., R. et W. = Rehd. et Wils., S. et Z. = Sieb. et Zucc., M.-A. = Muell.-Arg.

书末有中名索引、拉丁文科名、属名索引,以便检索。

由于我们学习毛泽东思想不够,水平有限,错误之处,请同志们批评指正。

在编写过程中,承兄弟单位热情支持,提供了一些标本、资料,借此致以衷心感谢和革命敬礼!

广西植物研究所

一九七三年九月

本《名录》(包括第一册、第二册和本册)是内部参考资料,请注意保存。

目 录

被子植物亚门 ANGIOSPERMAE

单子叶植物纲 MONOCOTYLEDONEAE

266.	水 藻 科	Hydrocharitaceae.....	1
267.	泽 泻 科	Alismataceae.....	2
269.	樱 井 草 科	Petrosaviaceae.....	3
274.	水 薹 科	Aponogetonaceae	3
276.	眼 子 菜 科	Potamogetonaceae.....	3
277.	川 蔓 藻 科	Ruppiaceae	4
278.	角 茨 藻 科	Zannichelliaceae	4
279.	茨 藻 科	Najadaceae	5
280.	鸭 跖 草 科	Commelinaceae.....	5
283.	黄 眼 草 科	Xyridaceae	10
285.	谷 精 草 科	Eriocaulaceae	11
286.	凤 梨 科	Bromeliaceae	13
287.	芭 蕉 科	Musaceae	13
290.	姜 科	Zingiberaceae	14
291.	蕉 芋 科	Cannaceae.....	21
292.	竹 芋 科	Marantaceae.....	22
293.	百 合 科	Liliaceae	23
295.	七叶一枝花科	Trilliaceae	40

296.	雨久花科	Pontederiaceae	41
297.	菝葜科	Smilacaceae	42
298.	假叶树科	Ruscaceae	48
302.	天南星科	Araceae	48
303.	浮萍科	Lemnaceae	56
305.	香蒲科	Typhaceae	57
306.	石蒜科	Amaryllidaceae	57
307.	鳶尾科	Iridaceae	61
310.	百部科	Roxburghiaceae	63
311.	薯蓣科	Dioscoreaceae	63
313.	龙舌兰科	Agavaceae	68
314.	棕榈科	Palmaceae	70
315.	露兜树科	Pandanaceae	75
318.	仙茅科	Hypoxidaceae	76
321.	蛛丝草科	Taccaceae	77
322.	田葱科	Philydraceae	78
323.	水玉簪科	Burmanniaceae	78
326.	兰科	Orchidaceae	79
327.	灯心草科	Juncaceae	101
331.	莎草科	Cyperaceae	103
332.	禾本科	Gramineae	124
332A.	竹亚科	Bambusoideae	124
332B.	禾亚科	Agrostidoideae	133

单子叶植物纲 MONOCOTYLEDONEAE

266 水 荇 科 HYDROCHARITACEAE

无尾水筛

Blyxa aubertii Rich.

(*B. ecaudata* Hay.)

水田中水草。

鸭仔草 水筛

B. japonica (Miq.) Maxim.

(*B. octandra* sensu Merr., non Planch. ex Thw.

Lagarosiphon alternifolia sensu Merr., non Druce)

水田及水塘中常见的水草。作猪、鸭、鱼的饲料。

黑藻 水王孙

Hydrilla verticillata (L.f.) Royle

兴安、阳朔、平南、田林、都安等地水塘或溪涧。

全草作猪、鱼饲料及绿肥用，又可置水族箱内养鱼用，也作观察叶绿粒回环转动的实验材料。药用，清凉，解毒；治疮疥，无名肿毒。

水车前 龙舌草

Ottelia alismoides (L.) Pers.

柳州、临桂。常见于浅水池中或静水溪流中。

茎叶煮熟可食；常作猪饲料，亦可作绿肥。药用清热利尿；治咳血，哮喘，肝炎，便秘，小便赤涩，子宫脱垂；外治痈疽，癣癬，烫火伤。

苦草 水茜

Vallisneria spiralis L.

Alisma-Sagittaria

柳州、桂林、临桂、兴安、梧州等地。

全草作猪饲料，亦为淡水鱼类很好饲料，可置水族箱内养鱼用。药用治夜尿，妇女白带。

267 泽 泻 科 ALISMATACEAE

大箭 窄叶泽泻

Alisma canaliculatum A.Br. et Bouché

容县。生于水田或溪流中。

泽泻

A. Plantago-aquatica L.

ssp. *orientale* Sam.

(*A. orientale* (Sam.) Juzép.)

容县、南宁、靖西、隆林。

块茎利尿渗湿，泻火止遗；治小便不利，水肿，淋浊，泄泻，白带，腰痛，遗精。

冠果草

Sagittaria guayanensis H.B.K.

ssp. *lappula* (D.Don) Bogin

(*S. lappula* D.Don,

Lophotocarpus guayanensis (H.B.K.) J.G.Sm.

Lophiocarpus guayanensis Micheli)

罗城、南宁、邕宁、岑溪。

全草治疮疥。作猪饲料。

矮慈姑

S. pygmaea Miq.

梧州、南宁。

全草清热，解毒，利尿；治疮毒，湿疹，喉炎。

*慈姑

S. sagittifolia L.

ssp. *leucopetala* (Miq.) Hartog

(*S. sinensis* Sims,

S. trifolia L.,

S. sagittifolia L. var. *leucopetala* Miq.,

S. sagittifolia L. var. *sinensis* (Sims) Makino)

区内各地。

球茎作菜蔬。全草作猪、牛饲料。药用清热解毒，凉血消肿；球茎治肺癆，咳血，难产，狂犬咬伤；全草治黄疸，蛇伤，水肿。

269 櫻井草科 PETROSAVIACEAE

华櫻井草 华无叶葵

Petrosavia sinii (Krause) Gagn.

(*Protolirion sinii* Krause)

大瑶山。腐生草本。

274 水蕹科(田干草科) APONOGETONACEAE

水蕹 田干草

Aponogeton natans (L.) Engl. et Krause

永福。

276 眼子菜科 POTAMOGETONACEAE

水猪菜 小叶眼子菜

Potamogeton crispus L.

桂江、柳江、左江、右江等水域。

本草为重要野生饲料之一，可饲养猪、鸭、鱼。可作绿肥。也是

Potamogeton-Zannichellia

水田中杂草的一种。

眼子菜 箸叶藻

P. malainus Miq.

(*P. gaudichaudii* Cham. et Schl.)

桂林至龙州等地。

作猪饲料和绿肥用。是水田中杂草的一种。

南方眼子菜

P. octandrum Poir.

(*P. javanicus* Hassk.)

十万大山。

蓼叶眼子菜☆ 腺甲草

P. polygonifolius Pourr.

桂林、兴安、龙胜、柳州、龙州。

作猪饲料和绿肥用。

水轮茜

P. pusillus L.

区内各地，生静水池中。

277 川 蔓 藻 科 RUPPIACEAE

川蔓藻

Ruppia maritima L.

钦州地区沿海咸水中。

278 角 茨 藻 科 ZANNICHELLIACEAE

角茨藻

Zannichellia pedunculata Reichb.

各地淡水或咸水中。

279 茨藻科 NAJADACEAE

多孔茨藻

Najas indica (Willd.) Cham.

(*N. foveolata* A.Br. ex Rendle)

各地淡水或咸水中

280 鸭跖草科 COMMELINACEAE

狭叶水竹叶 喜草

Aneilema angustifolium B.E.Br.

桂林、兴安、恭城、龙州、巴马、河池、凌云。

全草作猪饲料。药用作小孩清热药，根治风湿，腹痛。

大苞水竹叶 青鸭跖草、青竹壳菜

A. bracteatum (C.B.Cl.) O.Ktze.

(*A. multiflorum* R.Br. var. *bracteata* C.B.Cl.)

南宁、梧州、藤县。

全草清热解毒；治淋浊，小便刺痛，疮疖。

竹叶参 观音草

A. divergens C.B.Clarke

隆林。

水竹叶

A. keisak Hassk.

(*A. japonicum* Bl.,

A. oliganthum Fr. et Sav.,

Murdannia keisak (Hassk.) H.-M.)

Ancilema

大瑶山、桂林、阳朔。

作猪饲料。

腺毛水竹叶

A. medicum (Lour.) Kostel.

(*A. loureirii* Hance,

Commelina medica Lour.)

博白。

全草利水止咳。作猪饲料。

裸花水竹叶 百日晒、肉草

A. nudiflorum (L.) Wall.

(*A. malabaricum* (L.) Merr.

Murdannia malabaricum (L.) Brückn.)

全州、龙州、南宁、罗城。

全草凉血解毒；治目赤肿痛，疮毒，蛇伤。作猪饲料。

糙叶水竹叶

A. scaberrimum (Bl.) Kunth

(*Commelina scaberrima* Bl.)

宁明。

细竹蒿草 十二娘、土牛七

A. simplex (Vahl) Kunth

(*Commelina simplex* Vahl,

A. sinicum Ker-Gawl.,

Murdannia simplex (Vahl) Braun)

贺县、博白、南宁、百色、田林、凌云、天峨、临桂、桂林、恭城。

全草清热解毒；治小儿热病，肿毒；根补血气，健脾，止血；治吐血，病后饮食不佳。

细叶水竹叶 吊铃草

A. spiratum (L.) R.Br.

(*Commelina spirata* L.,

Murdannia spirata (L.) Brückn.)

临桂。

作猪饲料。

饭包草 竹叶菜

Commelina benghalensis L.

天峨、大苗山、昭平、梧州、富川。

全草清热解毒，利尿消肿；治小便短赤涩痛，赤痢，疔疮。作猪饲料。

鸭跖草 竹壳菜

C. communis L.

区内各地。

全草清热利湿，凉血解毒；治肾炎水肿，尿路感染及结石，扁桃体炎，咽喉炎，肠炎腹泻，白浊，白带，痔疮，疖肿，目赤肿痛，外伤出血，蛇伤等。种子油可制肥皂。花可提制蓝色染料。

全草可作农药防治蚜虫。嫩茎叶可作蔬菜。作猪饲料。

竹节菜 竹节草、竹节花

C. diffusa Burm.f.

(*C. nudiflora* sensu Burm.f. et auct. plur., non L.,

C. longicaulis Jacq.,

C. pacifica Vahl,

C. caespitosa Roxb.,

C. ochreatea Schauer)

苍梧。

大苞鸭跖草☆

C. paludosa Bl.

(**C. obliqua Buch.-Ham. ex D. Don, non Vahl**)

恭城、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、三江、融水、河池、天峨、容县、平南、龙州、宁明、昭平、隆林、田林、靖西。

蛛毛蓝耳草

Cyanotis arachnoidea C.B. Clarke

隆林。

全草止血。

鞘花蓝耳草

C. axillaris Schult.f.

龙州。

鸡冠蓝耳草☆ 鹅冠草

C. cristata (L.) Schult. et Schult.f.

(**C. cristata Roem. et Schult.**

var. griffithii sensu Merr., non C.B. Clarke)

容县、龙州、凌云、乐业、东兰、罗城。

全草治刀伤出血，疮毒。

蓝耳草

C. vaga (Lour.) Schult. et Schult.f.

(**C. barbata D. Don**)

桂林、临桂、灵川、大瑶山。

聚花草 竹叶藤

Floscopa scandens Lour.

(**F. paniculata Hassk.**)

区内各地林区。

全草活血；治内伤。

穿鞘花 倭山虎

Forrestia chinensis N.E.Br.

上林、宁明、大新、龙州、大瑶山、融水、田林、阳朔、都安、
巴马。

全草治风湿，跌打。

疏花杜若

Pollia aclisia Hassk.

荔浦、资源、阳朔、龙胜、恭城、昭平、贺县、平南、大瑶山、
大苗山、凌云、都安。

白叶菜

P. japonica Thb.

巴马、大瑶山、田林。

全草益精，明目，温中，止痛；治呃逆，头痛，眩晕，胃痛，关
节痛。

小杜若☆

P. pumila Hall.f.

龙州。

杜若

P. secundiflora (Bl.) Backer

武鸣、龙州、宁明、龙胜、恭城、阳朔、兴安、大瑶山、大苗山、
平南、百色、凌云、乐业、田林、那坡、贺县。

聚花杜若

P. thyrsiflora (Bl.) Steud.

(*Tradescantia thyrsiflora* Bl.)

德保、田林。

西南杜若☆

P. zollingeri C.B.Cl.

Rhoeo-Xyris

那坡、隆林、凌云、乐业、田林、南丹、巴马。

★紫万年青 蚌花、荷包花

Rhoeo discolor (L'Her.) Hance

桂林、柳州、梧州、南宁、龙州等地。

花、叶润肺止咳，凉血解毒；治肺热咳嗽痰血，百日咳，衄血，菌痢，淋巴结核等。亦常作盆栽花卉。

竹叶菜 竹叶吉祥草

Spatholirion longifolium (Gagn.) Dunn

(**Streptolirion longifolium Gagn.**)

资源、灵川、龙胜、全州、大苗山、隆林、凌云。

竹子子

Streptolirion volubile Edgew.

隆林、凌云、乐业、东兰、凤山。

全草治跌打，风湿，白带，肺病。

水竹草 百毒散、吊竹梅、紫背鸭跖草、红竹壳菜

Zebrina pendula Schnizl.

龙州、那坡、玉林、陆川、梧州、柳州、桂林。一般见于栽培，亦有野生。

全草药用功能同鸭跖草。亦常作绿化花草。

283 黄眼草科(葱草科) XYRIDACEAE

硬叶黄眼草

Xyris complanata R.Br.

东兴。

黄眼草

X. indica L.

合浦。

少花黄眼草 葱草

X. pauciflora Willd.

大瑶山。

全草外治疥疥。

285 谷精草科 ERIOCAULACEAE

毛谷精草

Eriocaulon australe R.Br.

南宁。

药用力能与谷精草同。

谷精草

E. buergerianum Koern.

(*E. pachypetalum* Hayata)

大瑶山、大苗山、桂林。

头状花序清肝明目，祛风利尿；治风热眼疾，目翳羞明，头痛，齿痛，喉痛，肝炎等。作兽药，治牛、猪类同疾病。

鸡冠谷精草☆

E. cristatum Mart.

柳城、大瑶山。

尖苞谷精草

E. echinulatum Mart.

合浦。

丝叶谷精草☆

E. filifolium H.-M.

十万大山、柳城、大瑶山、龙胜。

蒙自谷精草(近似)

E. aff. henryanum Ruhl.

Eriocaulon

临桂。

异花谷精草

E. heteranthum Benth.

(**E. sieboldianum sensu Merr., non S. et Z.**)

柳州、桂林、容县、马山、昭平、凌云。

间有作谷精草用。

小谷精草

E. luzulaefolium Mart.

博白、兴安。

全草清热，治眼疾。

多脉谷精草☆

E. multinerve How, ined.

大瑶山。

发叶谷精草

E. setaceum L.

合浦。

平头谷精草☆ 珍珠草

E. truncatum Buch.-Ham. ex Mart.

马山、南宁、兴安、桂林。

华南谷精草 谷精珠、珍珠草、铜锤草

E. wallichianum Mart.

(**E. cantoniense H. et A.,**

E. sinicum Miq.)

桂林、大瑶山、北流、陆川、博白、东兴、十万大山。

功同谷精草。

大叶谷精草☆ 大叶田中珠

E. whangii Ruhl.